




Ex libris Caroli Gerardi

64328



Handwritten text, possibly a signature or date, heavily obscured by dark ink smudges and stains.



PETRI PAVLI
PEREDÆ
SETABENSIS,

DOCTORIS MEDICI, ET
APUD VALENTINOS PUBLICI

Medicinæ Professoris,

IN

MICHAELIS IOANNIS PASCHALIS
METHODVM CVRANDI

SCHOLIA.

Addita in extremo operis disputatio medica, an Cannabis, & aqua, in qua mollitur, possint aërem inficere.

Opus recens recognitum, & Indicibus suis insignitum.

EDITIO NOVISSIMA.

Ex Libris  Caroli Gerardi

LYCERNI,

Sumptibus Iacobi Cardon.

M. DC. XXX.

P E T R I D A V I
P E R E D A
S E T A B E N 2 1 8

D O C T O R I S M E D I C I E T
A D V A L E N T I N O S P A R I S I

M e d i c i n e P r a c t i c a


I I

M i c h a e l e s J o h a n n e s P a r a c e l s u s
M E T H O D U M C U R A N D I

S C H O L I A

A d d i t a i n e x t r e m o o p e r e d e P e t r o M e d i c o P a r i s i
P e t r o M e d i c o P a r i s i q u a m m e l l i m p o s s i m a c u r a m i n s t i t u i t

O p e r a m e d i c a m e t m e d i c a m e t m e d i c a m
E D I T I O N O V I S S I M A



A M S T E R D A M
A m p h i b u s J a c o b i C a r d o n

M D C L X X



ILL^{MO} AC REV^{MO}

DN. GASPARI
A CHIROGA,

Archiepiscopo Toletano, Hispaniarum
Primate, & fidei Catholicæ primo
cognitori,

Petrus Pereda Medicus, felicitatem.



OGITANTI mihi, Præsul Am-
plissime, cui studiorum meo-
rum primitias consecrarem, oc-
currebant multi, quibus me nul-
lum debere cognoscebam; quibûsque hone-
stè me labores meos, totâmq; familiam
committere possem. Deerat autem aliis ma-
gnarum rerum cognitio, quam mihi ad hanc
rem apprimè necessariam videbam, aliis au-
toritas, quæ meas lucubrationes ab omni
reprehensione contineret: aliis denique pru-
dencia, quæ diuturno rerum usu & experien-
tia comparata, non parum utilitatis meo ope-

ri videbatur allatura. Quibus quidem omnibus, vitæ integritas, facilitas morum, generis splendor maximus, & summa inerant ornamenta virtutis. Tu tamen vnus ex omnibus præcipuè occurristi, in quem visa est natura, ex aliis haustas virtutum dotes transfudisse: & qui præter generis nobilitatem, augustam quidem illam, & planè regiam, multiplici rerum scientia, auctoritate, & prudentia, reliquos antecires. Quid enim memorem tuam in ferendis laboribus constantiam? in regendis clientium animis solertiam? in gubernandis populis sagacitatem? Quid referam beneficia, quibus me tibi deuinctum sentio, cùm fratrem meum in fidem tuam recepisti, & receptum maximis honoribus affecisti? Tacebône humanitatem, qua vnus maximè excellis? Dum enim quantos in litteris feceris progressus contemplor, te earundem ornamentum intueor: dum multarum disciplinarum perfectam cognitionem mihi ob oculos pono, quem tibi anteponam nescio. Denique vbi in omni virtutis genere præstantiam suspicio, tam exiguum tempus ad ista referenda doleo. Quæ ita esse, vel me tacente dignitatis gradus, in quem tanto optimorum hominum applausu euectus es, necessario comprobatur. Illi enim soli ad istam dignitatem, & honoris locum efferuntur, quibus maxima est

est cum virtute coniuncta sapientia, cum sapientia humanitas, & cum humanitate, summa Christianæ religionis observatio. Hæc Philippum Hispaniarum Regem æquissimum, ubi Archiepiscopus renunciatus es, non latuerunt. Hæc Toletanæ civitatis non ignoravit auctoritas. Hæc nullum genus hominum, etsi immane & barbarum, effugerunt. Omnes enim tuam probitatem, humanitatem in pauperes, facilitatem in amicos, & in cæteros integritatis splendorem agnoscunt. Atque, ut hæc omittam, ne videar meridiano Soli accensam facem attulisse, rem per se nobilem sermonis humilitate obscurasse, scias velim, me, Valentiniæ urbis medicum tui perpetuò observantissimum, ut medicinæ candidatis meo quocunque labore gratum facerem, Methodum quandam medendi à Paschalis huius urbis quondam medico insigni conscriptam, emendatiorem excudere, & scholiis illustriorem efficere voluisse. Qua in re quos sim æmulos habiturus, non ignoras, videor enim multos iam mihi blatterantes, & turpia effutientes audire, meque acriter accusantes, quod hæc scholia eo solum nomine ediderim, ut huic graui medico, & aliis practicis facerem iniuriam, non, ut studiosam iuventutem, immenso quodam schedarum onere, citra rationem oppressam,

& multoties prauè edoctâ meis vigiliis sub-
leuarem. Aliquos præterea deierantes, osten-
tationis gratia, non communis vtilitatis ra-
tione hunc laborem suscepisse. Scio & fore
alios, qui suo modo studeant aliquam mihi
infamiae notam inferre. Quod omnes, te pa-
trono, quantum aspernet, animus ipse, quem
tua nobilitas ad hæc scribenda fecit, testatur.
Spero enim me tua humanitate, fide, & no-
mine tanquam Miltiadis clypeo tectum, in-
trepidè omnes aduersariorû ictus elusurum:
neque futurum esse quemquam, qui, si te mi-
hi, operique meo defensorem audierit, non
penitus obmutescat, & eos, quos in me antea
dentes acuerat, non facile obtundat. Hos igi-
tur, Præsul Amplissime, primos labores meos,
rudes sanè & impolitos, meæ tamen in te ob-
seruantiae, & voluntatis sempiternæ monu-
menta accipies, eosq; pro tua sapientia ita fo-
ue, vt qui me tui semper studiosissimum au-
dierunt, iidem intelligant quo tibi magis
deberem, denuò te maiora apud me benefi-
cia collocasse. Experiètur enim ij lectis scho-
liis forrasse, communi vtilitati à me fuisse in-
seruitum, & ob eam rem faciliùs, quod à te
postulo, perpetrasse. Quod vt facias, te ve-
hementer etiam atque etiam rogo, efficies
enim vt qui in puluere & tenebris diutissimè
vixi, excusso nunc puluere & fugatis tene-
bris,

bris, per te in loca clariora euadam, omnem-
que laborem contemnam, si hunc tibi gra-
tum cognouerim. Vale litterarum decus, &
ornamentum, & totius Hispaniæ fidus ful-
gentissimum, tuumque Peredam nominis
tui, & gloriæ propugnatorem acerrimum,
ut fratrem quem apud te habes, & quem tibi
esse charissimum cognosco, ama. Id si fece-
ris, & me tibi iam maximè deuinctum sum-
mo beneficio in perpetuum obliga-
bis, & ad maiora aggredien-
da nunc quasi dormien-
tem excitabis.



LECTORIS.



MEDICINA, quæ tota est practica, cum habeat finem opus aliquod, nempe sanitatis consecutionem, in duas precipuas partes diuiditur: quarum una sanitatem presentem tuctur: & altera, curando morbos, eam restituit. Curatio morborum ab empiricis experientia, à methodicis verò communitatibus quibusdam perficitur. Quorum curatio non rectè procedit, quia nec omnes morbi curantur experientia, neque curamus hominem uniuersalem Proinde Hippocrates, Galenus, & alij docti viri methodo rationali, quæ ex indicationibus constat, morbos curant. Sic multi libros ediderunt, in quibus morborum docent curationem methodo rationali. Inter quos Michaël Paschalius enumeratur, vir sua etate doctus, & expertus: cuius liber per omnium manus circumfertur, & ex ipso multi morborum remedia desumunt. Ceterum cum hic vir doctus scripserit tempore, quo multe false barbarorum sententia vigeant, & veritates Galeni,

Galenī, quas modo multorum annorum lectione
habemus, erant occulta. Proinde in eius librum,
qui inter alios breuiora, & vsitata habet remedia
(quod optimum est) scholia scribere decreui: ut
ex iis, quæ ipse recte docuit, & quæ addita à nobis
sunt ex rei natura, optima & legitima fieret
morborum curatio. Tu lector amice

hac accipe, neque moras
reprehendas.

AMI

AMICVS AD VINCENTIVM
GILBERTVM.

Quæris quid, Gislberte, noui sit: nil ego præter
Hoc vnū scio (namque aliis, quæ plurima vulgus
Nunc hominum narrat, non est cur immorer, ad te
Cum scribam magni Hippocratis, doctique Galeni
Scripta volutantem, vel quæ sunt seria, cumque
Arctantem breuibus chartis, atque ordine pulchro.)
Alta igitur cum concepisset mente Pereda,
Est Asclepiadum qui vnus, foetus, & pariturus
Iam esset, eum excipere ipsa sinu male sana refugit
Tellus, pallenti inuidia stimulata medentum:
Sic, qua concepit foetus, non edidit vrbe
Egregij mens culta viri: partus tamen ipse
Aureus hanc urbem inuisit, quæ flore medentum
Collato tumet, huic vni cupit ille probari,
Quem stupet hæc, & deinde omnis mirabitur ætas:
Téque adit in lucem nunc editus, atque salutat
Nomine non solum nostro, doctique parentis,
Verum etiam Bonifantis amici, quem auguror olim
Artis Phœbææ sidus fulgere coruscum.
Tu hunc partum Gislberte fove, defende, meretur.

MICHAEL IOANNES
PASCHALLVS AD
inuidum.

I Am nouis, exorior: iam depositaque senecta

Humo tollentem splendida colla vides.

Me tamen exuta nitidum prodire senecta.

Palles? tu palles ergo nitore meo?

Eterno o viuinam tu iam squallare regare.

Exunias liceat nec posuisse tibi.

At contra aeterno nuncat splendore Pereda.


Cuius sic macula tersit amica manus.

PAV

PAVLVS ASTOR DERTVSENSIS
PHILOSOPHIAE CANDIDATVS
de sui magistri Scholiis.

Hippolyti lacera vt vidit, disiectaque passim
Membra Deus, pulchris qui nitet vsque comis:
Ingemuit casum iuuenis miseratus acerbum,
Atque salutari contigit illa manu.
Præsentem sensisse Deum quæ tacta, & in auram
Hanc ipsam vitæ mox rediisse ferunt.
Impete barbarico sic, & compage soluta
Artis, Phœbe, tuæ, membra Pereda legit:
Hippocratis pandensque sinus, & laxa Galeni
Æquora percurrens, hinc opem, & inde petit:
Nec magis Hippolytus tibi, quàm tu Phœbe Peredæ
Debes, inuentum qui tibi seruat idem.

SYLLA



SYLLABVS CAPITVM

QVÆ HOC LIBRO

continentur.

LIBRI PRIMI

CAP. I.	D E pilorum decidentia.	fol. 1. a
2.	De morbo Gallico.	11. b
3.	De ulceribus capitis manantibus, & curatione pediculorum capitis, & aliarum partium.	17. a
4.	De dolore capitis à quacunque causa contingat ipsum dolore affici.	23. a
5.	De phrenetide.	24. b
6.	De lethargo.	29. b
7.	De vertigine.	31. b
8.	De morbo comitiali.	33. b
9.	De melancholia.	38. b
10.	De incubone.	42. a
11.	De iis qui amore insaniunt.	43. a
12.	De apoplexia.	45. b
13.	De paralyfi, Latinis resolutione.	48. a
14.	De conuulsione.	50. b
15.	De tremore.	54. b
16.	De ophthalmia.	55. a
17.	De imbecillo aspectu.	58. a
18.	De albugine oculorum.	59. b
		De

SYLLABVS

19. De suffusione.	59.b
20. De dolore aurium.	61.a
21. De sanguinis è naribus profluvio.	62.b
22. De rubedine faciei.	65.b
23. De dolore dentium, atque etiam de ipsis denigratis & mobilibus.	67.a
24. De angina.	68.b
25. De coriza, catarrho, raucedine, & tussi.	71.a
26. De orthopnea, asthmate, dyspnea.	74.a
27. De peripneumonia & pleuritide.	76.b
28. De sanguinis sputo.	81.a
29. De empyemate, id est, suppuratione & tabe.	83.a
30. De palpitatione cordis & syncope.	86.a
31. De imbecillitate ventriculi, & dolore & inflammatione eiusdem.	90.b
32. De singultu.	93.a
33. De appetentia immodica, quam medici caninam appellare solent.	94.a
34. De cibi fastidio.	94.b
35. De cholera.	97.a
36. De diarrhoea.	99.b
37. De lyenteria.	104.a
38. De dysenteria.	106.a
39. De tenesmo.	109.a
40. De cholico dolore, & ileo.	110.a
41. De inflammatione hepatis.	115.b
42. De obstructione hepatis.	117.b
43. De ictero.	119.b
44. De hydrope.	122.a
45. De lienis obstructione.	127.a
46. De suppressione urinae.	128.a
47. De renum calculo & vesica.	131.a
48. De ardore urinae.	137.b
49. De mictu sanguinis.	140.a
50. De	

CAPITVM.

50. De diabete.	140.b
51. De lumbricis.	142.b
52. De hamorroidibus.	145.b
53. De procidentia ani.	149.b
54. De procidentia uteri.	150.b
55. De immodicis mensibus.	151.b
56. De suppressis mensibus.	155.a
57. De uteri suffocatione.	158.b
58. De mola uteri.	160.b
59. De partu laborioso, & secundis detentis.	161.b
60. De ramice.	164.a
61. De arthritide.	167.a

LIBRI SECVNDI

CAP. I. D E syncho.	172.b
2. D E febre ardenti.	180.a
3. De tertiana exquisita.	183.b
4. De tertiana notha.	187.a
5. De quotidiana.	188.a
6. De quartana.	189.a
7. De febribus compositis.	192.a
8. De hectica.	192.b
9. De febre pestilenti.	198.a
10. De exanthematibus, quæ à nostris medicis variola & morbilli dicuntur.	205.b

FINIS.



PETRI PAULI
P E R E D Æ
S E T A B E N S I S,
I N

MICHAELIS IOANNIS PASCHALII
methodum curandi,
SCHOLIA.

*De pilorum decidentia, in quo multa continentur
tyronibus necessaria ad curationem
omnium morborum.*

CAPVT. I.



DECIDENTIA pilorum (quam caluitiem ap-
pellamus) affectio capitis est, qua vniuersi eius
capilli defluunt. Prouenit ea aut ob cutis rari-
tatem, aut ob humoris defectum, ex quo ipsi ge-
nerantur, atque nutriuntur. Porro si à cutis laxi-
tate id contingat, promptè & à calore, & à fri-
gore caput læditur: quod raritatis proprium signum est. Sin
ex alimenti defectu, primùm extenuantur, deinde concidunt
vniuersi. Quam rem in iis, qui tabe laborant, quotidie cerni-
mus euenire, maximum inde argumentum desumentes,
decidentium pilorum ob alimenti deiectione tabis indicium
esse. Huiusmodi affectio morbi Gallici symptoma plerun-
que est, vbi non tam ex prædictis sit causis, quàm ex humo-
rum corruptela: à qua & Alopeciam, & Ophiasim fieri Gal.
existimat. Quo in casu cutis colorem spectare oportet. Nam
si pro naturæ modo albidior sit, pituitæ soboles erit morbus:
sin pallidior, bilis flauæ: sin nigrior, atræ bilis: sin rubicundior,
sanguinis. Sed anteaquam vitam etiam considerabimus prius,

Descri-
ptio.
Causa.

Signa.

DE CVRAND. MORB.

Curatio tamen scientes, quæ qualem humorem soleant adaugere. Pilo-
Primò rum decidentia (nam de vero caluitio hîc non agimus) cura-
Victus tur, primùm, si à sanguine fiat, victus refrigerante & exsiccante,
ratio, & sanguinem minuente: si à flava bile, victu refrigerante &
humeſcente, vt sunt aër frigidus arte paratus, nempe floribus,
herbis, liquoribus, si naturalis non reperiatur: cibus sit pri-
sana hordeacea, lactuca, cucurbita, portulaca, & ius pulli re-
frigeratum, illis vel similibus. Nocent huic calida, vt piper,
cinnamomum, eruca, cape, & similia. Si fiat à pituita, cura-
tur primùm victu calefaciente, & siccante. Quare exercitatio,
& motus præsertim ventriculo vacuo maximè huic pròdest,
quemadmodum & vsus rerum calidarum, vt sunt piper, cro-
cus, cinnamomum, fœniculus, & similia; frigida, quæ pitui-
tam augent, nocent: vt pisces, herbae frigidae, & legumina
omnia præter cicera. Si ab atra bile fiat, primùm curatur victu
calefaciente, & humeſcente, & quiete, & aëre similis veris, &
iure gallinae & arietis, cum borragine, vel buglossa. Quæ
attram bilem augent, huic incommoda sunt, vt caro bubula,
hircina, leporina, & ceruina, caseus antiquus, & omnia salsa.
In omni tamen pilorum decidentia, quæ humores corrup-
punt, diligentissimè vitanda sunt, vt inordinata ratio sumendi
cibos, veluti si cibus difficilioris concoctionis præcedat alte-
rum facilioris. Fugienda etiam est ciborum multitudo in ea-
dem mensa, tum cibatio post cruditatem, necnon exercitatio
immodica statim ab esu: lac denique, & butyrum, si aliis ali-
mentis, præsertim piscibus intermixta comedantur, vitari debent:
quoniam maximè humores corrumpunt, elephantiasinque effi-
cere solent.

Secundò Deinde curetur decidentia pilorum sanguinea per sectionem
Seçtio basilicae dextrae, educaturque sanguinis quantitas respondens
vena. plenitudini: habeaturque ratio præcipua roboris facultatis, se-
cundò magnitudinis morbi, vt Gal. lib. de rat. curandi per san-
guinis missionem docuit. quanquam Hippocrat. 4. de rat. vict. in
morbis acutis, præter illa duo, ætatem floridam addit, & Galenus
in commentario quartum considerandum esse iudicat, videlicet
aëris dispositionem. Hæc tamen omnia sub duobus primis com-
prehenduntur.

Tertiò Tertiò, post sanguinis missionem euacuetur bilis flava se-
Purga- quenti potione, qua etiam sanguinis feruor, & caliditas im-
tio. modica remittitur. ℞. medullæ cassia fistulae recens per setam
extractæ. & medullæ tamarindorum in aqua mente prius in-
fusorum, si fuerit ventriculi imbecillitas, an. ʒ. ss. rhabarba-
ri electi infusi per noctem in aqua. endiuia ʒ. j. electuarij de
suc

succo rosarum. ʒ. ij. ꝑ. decoctionis florum cordialium. q. s. misce, & fiat potio sumenda in aurora.

An verò sumpto medicamento purgante ante opus ince- *De som-*
ptum sit semper dormiendum, discrimen est inter authores: eo- *ne in po-*
rum tamen verior pars vult parum esse dormiendum sumpto *ne.*
medicamento purgante benigno & liquido: diutius tamen
post medicamentum potens & liquidum: multò diutius post
medicamentum medium inter liquidum & solidum quòd à no-
stris medicis dicitur bolus. Maximè verò dormiendum erit sum-
pto medicamento siue benigno, siue potenti, in formam pilula-
rum, quia primum minori calore eget, dum reducitur de potentia
ad actum: vltimum verò maiori.

Opere autem incepto semper somnus nocet, nisi sit immo-
deratum opus egens restrictione, Post opus sufficiens per ho-
ram ante prandium ad lauandum ventriculum, & intestina bibat
ʒ. iiij. iuris sine sale, vt noster Valentinus mos est, vel ʒ. *Valenti-*
iiij. decocti hordei cum cortice, addendo ʒ. j. sacchari: quo de- *ni Itali.*
cocto Itali vtuntur. In prandio parcè comedat, & à prandio
dormiat. Die verò sequenti mundificentur intestina sequenti,
vel simili clystere. ℞. decocti foliorum maluarum, violarum,
sictæ, furfuris & hordei ʒ. xv. olei rosati ʒ. iiij. sacchari rubei
ʒ. ij. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster: & si opus fuerit, adde diaca-
tholiconis ʒ. j.

Si fuerit pilorum decidentia à flaua bile, euacuanda est *De con-*
medicamentis cholagogis, prius tamen facta illius leui con- *coctione*
coctione. Nolo in presentia demonstrare, quid sit conco- *bilis.*
ctio, neque quomodo medicorum coctio fieri soleat in dupli-
ci transmutatione, naturali videlicet (quæ circa alimenta ver-
satur, nihil aliud est, quàm alteratio nutrimenti ad propriam
qualitatem nutriti) & altera, quæ in putrida substantia ver-
satur, & est alteratio cessare faciens putredinem manente sub-
stantia, autote Galeno vltima parte artis paræ. Nolo etiam
hic ostendere, an omnis humor præter sanguinem corru-
ptus, vel putridus, vel ad nutrimentum ineptus eget secunda
concoctione: neque libet mihi explicare, an tenuis humor,
qualis est flaua bilis, indigeat ea, vt reuera indiget: quæ an
fieri debeat per reductionem ad mediam substantiam in-
crassatione (vt crassus humor concoquitur attenuatione)
non est presentis instituti. Quidam ex recentioribus volunt
tenuem humorem calidis & attenuantibus medicamentis
concoqui, quibus dedit ansam errandi comment. 24. lib. 1.
Aphor. quo loco Gal. docet concoctionem in morbis acutis (si
necessaria sit) faciendam esse melicrato decocti origani,

DE CVRAND. MORB.

mentastri, pulegij & similium. Alij volunt renuem humorem per se nulla concoctione egere, contra quos est autoritas Hippocr. Gal. & aliorum autorum, ratio, & experientia crisis factæ. 7. vel 14. die morborum, qui fiunt à flava bile: quæ in eorum initio bona esse non potest propter priuationem concoctionis. Concoctione enim, autore Gal. lib. 1. de crisis, celeritatem, & certitudinem iudicij ostendit. Villanouanus contra Manardum, & contra alios docet nullum humorem corruptum putridum, & ineptum nutritioni, cōcoqui posse. Hæc omnia in expos. 22. aph. lib. 1. tractanda sunt nobis. tamen hoc loco sufficit, humores neque à natura, neque ab arte rectè euacuari posse non præcedenti concoctione: quæ licet à calore nativo præcipuè fiat, alia tamen multa coadiuant, vt sunt syrapi, decocta, succi & aquæ, quæ vias aperiendo in obstructione (quæ in omni febre dependente ex putredine humorum inuenitur) vel reducendo substantiam rei concoquendæ ad mediocritatem, vel illius acrimoniam & intemperiem corrumpendo præparant. Quilibet igitur humor ante vacuationem concoctione eget, crassus tamen difficilius concoquitur. Sed vt sit tyronibus omnibus notus catalogus medicamentorum omnium humores concoquentium, quæ sequuntur adiecimus.

*Medicamenta humorem bilosum concoquentia sunt,
quæ sequuntur.*

Primò omnia medicamenta frigida, à primo ordine vsque ad tertium, siue sint in forma decocti, vel succi, vel aquæ: quibus vsi sunt Arabes, & alij multi. Neque quorundam iuniorum ratio de vi perniciosa plumbi, & æris, quibus distillantur aquæ vi ignis, obstat. Cum etiam omnia medicamenta composita fiant illis vasis: dum tamen decocta & succi inueniri possint, eis est vtendum, propter maiorem facultatem. Aquæ omnes feruè præter rosaceam, violaceam & vitis, carent proprio odore, & sapore. Vbi tamen aquis vtendum est propter defectum simplicium, vel ægrotantium gustum, augenda est quantitas earum. Sunt etiam medicamenta hæc in forma melicrati (quo Græci utebantur propter sacchari inopiam, vel in forma syrapi, quibus nos vtimur) propter sacchari copiam, & ægrotantium delectationem, præcipuè in morbis calidis: nam multi fieri solent syrapi cum melle in morbis frigidis. Pestilentes tamen pharmacopolæ, si syrupos frigidos melle vel saccharo rubro conficiant, ægros interficiunt: quos poena capitali puniendos censeo.

In phar- Simplicia flauam bilem concoquentia (quæ officinarum
macopo- more scribuntur, ne à pharmacopolis vnum pro alio infirmis
las. Fla- concoquentia. tribua

tribuat) sunt hæc: Endiuia, Cichorea, Lactuca, Portulaca, Cucurbita, Veronicularis, Semperuua, Virga pastoris, Solatium, Umbilicus Veneris, Nenuphar, & alia similia. Composita, sunt Syrupus acetosus. S. Syrup. endiuia. S. Syrup. de iuiubis, oxysacchare. S. Syrup. endiuia comp. Syrup. violarum. Syrup. rosarum. Syrup. de succo acetosæ. Syrup. de agresta. Syrup. de pomis. Syrup. acetositis citri, Syrup. acetositis limonum, Syrup. de nenuphare. Syrup. de papauere: iulep rosarum & violarum.

Simplicia, quæ pituitam concoquere valent calefaciendo, attenuando, incidendo, & aperiendo meatus, sunt fœniculum, petroselinum, hyssopus, scabiosa, betonica, capillus veneris, pulegium, calceamentum, fatureia, menta, serpillum, origanum, melissa, pœonia, mel, & similia.

Composita, sunt Syrupus acetosus s. rhodomel, Syrup. de bizantiis, oxymel. s. Syrup. de liquiritia, Syrup. capillorum veneris. Syrup. acetosus compos. Syrup. de hyssopo. oximel compos. Syrup. de stichados. Syrup. de eupatorio. Syrup. de absinthio. Syrup. de prassio, & oximel scilliticum.

Simplicia, quæ atram bilem concoquere valent, sunt borrago, buglossa, lupulus, fumus terræ, scolopendria, ceterac, tammariscus, rubea tinctorum, & similia. Composita, sunt Syrup. borraginis, Syrup. buglossæ, Syrup. de pomis, Syrup. de fumo terræ, s. & comp. quamuis comp. pro parte sit purgans. Syrup. regis Sabor ex Mesue cap. de melancholia sanguinea. Syrup. de epithimo. Concoquuntur humores calidi & tenues breui tempore: frigidi & crassi longiori: exhibendo semel, vel bis, vel ter in primis humoribus, videlicet tenuibus, qui parua egent concoctione. In crassis autem & frigidis, multo tempore. Quare errant qui in omni morbo perpetuò ter exhibent hæc medicamenta, cum quandoque fieri possit vacuatio ab arte sine concoctione ab eadem facta, quando talis à natura perfecta est: Dosis tamen Syruporum vnaquæque est ℥.j. cum semisse vsque ad duas, & aquarum est trium vnciarum. Carpetani solent, & optimè, tantum dosim vnam Syruporum & aquarum præscribere: etsi opus fuerit maiori concoctione, secundam, quandoque tertiam & quartam dosim præscribunt. Nos verò Valentinus tres simul doses describere solemus, quem morem non laudo, cum sæpe maior sit sufficiens minor concoctione, sæpe maior sit necessaria, vt prædiximus. Galli autem Syrupos aquis miscent, addentes sacchari parum, & peluerem aliquem: quam mixtionem lento igne confectam Syrupum aromatizatum appellant. Concoquatur bilis flaua Valentino more sic ℥. Syrup. endiuia s. & oxysaccharæ. s. an. ℥. iij. misce.

Pituita
conco-
quenda.

Atram
bilem
conco-
quenda.

Error
exhiben-
tium Sy-
rupos.
Dosis
Syr. Ca-
stellæ.

Valentinus

Galli.

item ℥. aquarum cichoreæ, endiviæ & lactucæ an. ℥. iij. misce. Eodem modo dabitur forma syruporum & aquarum pituitam vel atram bilem concoquentium, quamuis (vt prædiximus) maiori egeant concoctione pituitosi humores, maximè verò attrabiliarij. ¶ His itaque concoctionibus humorum fiat eorum vacuatio propriis & necessariis medicamentis, tum simplicibus, tum compositis, quorum catalogum nota.

Purgantia flauam bilem.

Simplicia purgantia flauam bilem, sunt hæc, rhabarbarum, scammonium, myrobalani citrini, cassia fistula, manna, tamarindi, succus rosarum, aqua casei, & aloë. Composita verò sunt electuarium de succo rosarum, elect. diaprunis solutium, elect. de psyllio, quo non vtuntur Valentini: hiera. s. pilulæ de hiera. s. pilulæ de rhabarbaro, pilulæ aureæ, pilulæ aggregatiuæ, quamuis bilem mixtam cum pituita euacuent, quemadmodum & elect. diaphænicon, cuius vis non transit hepar.

Pituita.

Simplicia medicamenta pituitam purgantia, sunt agaricus, turbit, myrobalani, chebuli, emblici, bellirici, colloquintida, euphorbium, esula, hermodactyli: Composita, sunt diaphænicon, electuarium indum vtrunque, benedicta hiera. s. & composita, pilulæ de hiera. elephanginæ, aggregatiuæ, de agarico, cochia: de hermodactylis maiores, lucis fixidæ, stomachicæ, sine quibus esse nolo.

Atram bilem.

Simplicia purgantia atram bilem, sunt myrobalani indi, lapis armenus, lapis lazuli, sena, epithimum, polypodium, sunt tamen præter iuniores, qui damnant lapidem armenum, quia non cognoscitur: & lapidem lazuli, propter eius vehementiam. Si tamen bene præparetur lapis lazuli, & lauetur, est medicamentum cardiacum, cum confectio Alcherme Regum hoc lapide etiam bene lauato constet. Composita, sunt dialene, confectio medicaminis, quod scripsit Hamec Hieria Ruffi, pilulæ indæ, pilulæ de fumo terræ, de lapide armeno, de lapide lazuli.

De lapide lazuli.

Formula purgantium medicamentorum compositorum, quarum tres purgant bilem flauam, tres pituitam, alix verò tres, atram bilem, dictæ sunt: perpetuò tamen non est exhibenda similis quantitas, cum varianda sit secundum naturam ægri & humoris: certa enim rei quantitas neque calamo scribi potest, neque lingua proferri: imò quod difficilius est, idem homo in diuersis ætatibus diuersam habet naturam, vt constat ex Hip. aph. 10. secundi lib. quibus iuuenibus aluus, &c. Et propterea optimè Hip. libello de purgantibus medicamentis docuit, quæ à medico sunt considerata in purgandis humoribus: quibus etiam egeat interrogationibus: vbi etiam docuit alimenta non rectè adhibita morbum efficere, quantò magis medicam

dicamenta, à quibus potentiùs alteratur nostrum corpus.

Prima formula potionis purgantis flauam bilem.

℞. medullæ cassiæ fistulæ recens per setam extractæ ʒ. vj. Potio.
rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuix ʒ. j. liqui-
nanti ḡ. iij. elect. de succo rosarum ʒ. iij. syrup. violarum ʒ. j.
decocti florum cordialium, quod s. misce, & fiat potio.

Secunda formula buccellarum quas bolos appellant purgantium flauam bilem.

℞. Medullæ cassiæ fistulæ recens per setam extractæ; vel Boli.
loco eius diaprunis simp. ʒ. ss. elect. de succo rosarum ʒ. iij.
sacchari quod s. misce, & fiant septem buccellæ, & plures, si
opus fuerit.

Tertia formula pilularum purgantium eandem bilem flauam:

℞. massæ pilularum aurearum ʒ. j. diagridij optimi ḡ. iij. Pilulæ.
fiant cum aqua endiuix pilulæ septem, & aurentur, si diues fue-
rit. Poterit æger, si non potest deglutire pilulas, neque potionem
bibere, aut detinere, ad euacuandam bilem flauam accipere ḡ.
v. vel vij. diagridij optimi cum ʒ. j. syrup. violati, vel cum ʒ. j.
conferuæ violarum, vel borraginis, vel rosarum, vel cum iure
sine sale. Poterit etiam si abhorret à medicaminibus mali sapo-
ris, accipere ʒ. ij. syrup. rosarum alexandrinarum, vel rhodo-
mellis earundem rosarum.

Prima formula potionis purgantis pituitam.

℞. diacatholiconis ʒ. ss. elect. indi maioris ʒ. iij. rhodo- Potio.
mellis ʒ. j. aquæ fœniculi, quod s. misce, & fiat potus.

Secunda formula buccellarum purgantium pituitam.

℞. diaprunis simp. ʒ. vj. agarici trochiscati ʒ. j. elect. in-
di maioris ʒ. iij. sacchari, q. s. misce, & fiant septem buccellæ,
seu boli.

Tertia formula pilularum purgantium eandem pituitam.

℞. pilularum de agarico & de hiera simp. an. ʒ. ss. diagridij. Pilulæ.
ḡ. iij. cum aqua fœnic. fiant pilulæ vij. & aurentur.

Prima formula potus purgantis atram bilem.

℞. medullæ cassiæ recenter per setam extractæ ʒ. vj. con- Potio.
fectionis medicaminis hamec & diasenæ. an. ʒ. iij. syrup. borra-
ginis ʒ. j. decocti florum cordialium, addendo ʒ. ss. epithymi &
folliculorum senæ, q. s. misce, & fiat potus, fieri potest cum sero ca-
prino decoctum.

Secunda formula bolorum purgantium bilem atram.

℞. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ per setam ʒ. ss. Boli.
pulueris epithymi ʒ. j. confectionis medicaminis hamec. ʒ. iij.
& ss. sacchari, q. s. misce, & fiant boli vii. saccharo cooperti.

Tertia formula pilularum purgantium atram bilem.

℞.

Pilula.

℞. pilularum de fumo terræ & indarum, an. 3. ꝑ. diagridij ꝑ. iij. cum sero caprino fiant pilulæ vij. & aurentur, si non fuerit pauper. Similibus formulis vti poteris addendo, vel minuendo quantitatem medicamentorum purgantium tam simplicium quàm compositorum, secundum variam quantitatem, & naturam humorum, & ægri: vnum est tamen maximè considerandum, ne tempore quo purgare volumus ægrum misceamus plura medicamenta siue simplicia, siue composita: nam tempore breui multorum medicamentorum mixtura non potest vnicam temperaturam, & formam acquirere. Actio illa, quam medici barbari fermentationem appellant, sufficienti & longo tempore eget, quamuis interdum maiori, interdum minori, secundum variam naturam simplicium temporis, & regionis. Quemadmodum theriaca magna ad sui generationem, seu fermentationem sex, vt minimum, eget mensibus, antea tamen dum recens, & non fermentata esset, somnũ inducit à 3. ꝑ. vsque ad j. 3. postea verò corruptis formis & temperamentis omnium simplicium, introductaque vnica forma, & temperatura, calida est in fine secundi ordinis. Compositum enim medicamentum purgans si recens fuerit, non potest fœlicem & optatum finem inducere: nam prius vnum medicamentum purgabit altero, quandoque vnum impedit opus alterius.

*Error
quorundam.*

Quare errant Medici nostri in purgandis ægris varia medicamenta miscentes, cum sufficiat vnum, aut alterum, etiam si humor euacuandus sit mixtus, cum inueniri possit medicamentum vnicam temperaturam & formam habens, quod purgare valeat mixtum humorem. Quemadmodum diaphænicon; & pilulæ aggregatiuæ. Sed quia in usu medicamentorum purgantium timor est, ne maior copia humoris educatur quàm conueniat ad quam facultas necessario soluitur, cum cuicunque vacuationi sit annexus casus virtutis, aliquando quoque ab immodica purgatione fiunt alij affectus præter naturam, vt febris. Quare perpetuò vacuatio parca tutior est immodica: natura enim sæpe vel euacuat, vel resoluit derelictum à medicamento humorem: immodica tamen & laboriosa purgatio ferè semper fieri solet à medicamentis prauam ac venenosam qualitatem habentibus: benigna enim & salubria, vt cassia fistularis, rhabarbarum, manna, tamarindi, & myrobalani omni tempore, omni ætate, & etiam vterum gerentibus audacter tribui possunt.

Si scire cupis quæ sint benigna, & quæ valentia, & qua hæc egent præparatione & correctione; Mesues suo i. lib. doctissimè tradit, & post ipsum breui epitome Ioannes Tagantius duobus

duobus libris de purgantibus medicamentis simplicibus, quorum priori vniuersales canones Mesuæ collegit, posteriori verò simplicia omnia Medici summè necessaria quinquaginta quinque capitibus scripsit, & illorum veram cognitionem etiam cum Græcis demonstrat, & aliis paucioribus componuntur omnia fermè medicamenta purgantia, quorum dosis in forma elect. rarò excedit ʒ. iiij. & in forma pilularum ʒ. j. quamuis si clementibus & benignis tantùm componantur, dosis augeri possit.

Ad integram tamen & veram huius rei cognitionem (præter ea quæ Mesuës suo antidotario, & Arnaldus de Villanoua, & nunc eruditus Fuchsius suo Nicolai Mirepsij opere medicamentorum scriptam reliquerunt) notare numerum sequentium medicamentorum purgantium, præcipuè eorum quibus nostræ officinæ, & nos vtimur. Hic tamen quantitatem scammonij, esulæ, colocynthidis, hellebori, & similium potentium, vnciæ vnius electuarii, & drachmæ vnius pilularum demonstrabo, quod non parum necessarium est medico: alioqui tanquam cæcus in foueam caderet. Animaduertendum tamen est ʒ. g. xxiiij. continere, quamuis multi granis xx. constare velint, apud primos ʒ. constat xxiiij. ʒ. vel viij. ʒ. scire etiam oportet in constituendis electuariis ʒ. iiij. puluerum indigere lb. j. mellis, aut sacchari.

Diaphænicon Mesuæ tota compositio constat lib. vj. scammonij quantitas est viginti duarum drachmarum: erant ergo qui duodecim drachmas tantùm miscent. Huius electuarii quælibet vncia constat viginti duobus granis scammonij: propter dactylos tamen eius vis non transit hepar. Dosis eius est à drachmis quatuor & semis vsque ad drachmas decem & semis. Error nonnullorum.

Electuarij rosarum compositio Mes. constat libris tribus, & vnciis octo, scammonij quantitas est duodecim drachmarum: quælibet vncia huius electuarii habet grana decem & nouem scammonij cum dimidio: cuius dosis sunt drachmæ quinque.

Confectionis medicaminis, quod scripsit Hamec Mes. constat libris quinque compositio, scammonij quantitas est drachmarum duodecim: quælibet vncia huius electuarii habet grana tredecim cum dimidio scammonij, dosis eius est à drachmis duabus vsque ad quatuor.

Electuarij indi maioris Mes. compositio constat libris sex habet hæc compositio præter alia potenter purgantia drachmas duodecim scammonij: & eius quælibet vncia habet grana duodecim scammonij: dosis est drachmarum quatuor.

DE CVRAND. MORB.

Electuarii indi minoris compositio constat libris quatuor, habent drachmas duodecim scammonii : quælibet igitur vncia huius electuarii habet grana decem & octo scammonii, dosis est dragmarum quatuor & semis apud Mesuen, licet videatur maior inesse vis huic, quam electuario indo maiori.

Electuarii diaprunis solutiui Nic. quælibet libra habet drachmas septem scammonii : quare quælibet eius vncia habebit grana triginta octo scammonii : dosis eius est drachmis duabus usque ad vnciam semis, quamvis Nic. vnius castaneæ quantitatem tribuat.

Electuarii de succo rosarum Nic. compositio libris duabus constat, habetque drachmas duodecim scammonii, quare quælibet eius vncia habet triginta sex grana scammonii, dosis est à drachmis duabus usque ad quatuor. Nicol. tamen castaneæ quantitatem tribuit.

Benedictæ. s. Nic. compositio est trium librarum cum dimidia, habet hoc medicamentum drachmas quinque scammonii, & drachmas decem esulæ, quælibet eius vncia grana octo cum dimidio scammonii habet, & grana decem, & septem esulæ, dosis est ad modum castaneæ Nicolao, aliis à drachmis duabus usque ad vnicam vnam.

Hiera Logodionis Nico. compositio est librarum duarum & octo vnciarum, eius quælibet vncia habet scammonii minus quam duo grana, & colocynthidis grana triginta sex. Dos is est Nicolao ad modum castaneæ, aliis tamen à drachmis duabus & semis, usque ad drachmas quatuor : quæ in clysteribus verò datur, vncia vna & semis.

Electuarii Sebesten Montagnanæ compositio est trium librarum & trium vnciarum, & eius quælibet vncia habet grana sex cum dimidio scammonii : dos is est drachmarum quinque vel sex.

Electuarii Elefscoph Mes. compositio est libræ vnius cum dimidia, habetque drachmas sex scammonii, & totidem turbit, eius quælibet vncia habet scammonii & turbit an. viginti quatuor grana. Dos is est à drachmis tribus & semis usque ad quatuor & semis.

Electuarii de psyllio Mes. compositio constat libris quatuor cum dimidia, & eius quælibet vncia habet scammonii grana viginti sex, & tertiam partem grani : dos is est à drachmis tribus usque ad drachmas quatuor & semis.

Electuarii de psyllio Montagnanæ compositio constat libris octo, habetque eius quælibet vncia scammonii grana viginti quatuor. Dos is est à drachmis quatuor usque ad quinque.

Pilularum aurearum Nic. compositio est trium vnciarum, habet scammonij drachmas quinque, habetque drachma earum scammonij grana quindecim: dosis est à drachma vna vsque ad scrupulos quatuor, Nicolaus dat nouem vel vndecim ad magnitudinem ciceris, huius magnitudinis septem habet quælibet drachma.

Pilularum aggregatiuarum Mesu. compositio est sex vnciarum, & duarum drachmarum: habet scammonij drachmas sex, & quælibet drachma habet scammonij grana octo, & tres quartas grani vnus. Dos is est à drachma vna vsque ad drachmam vnā & semis.

Pilularum fumarix Auicennæ compositio est vnciarum triū, & trium drachmarum, habet drachmas quinque scammonij, & earum quælibet drachmā grana tredecim, & tertiam partem grani vnus: dos is est à scrupulis iij. vsque ad drachmas ij.

Pilularum foetidarum Mes. compositio est vnciarum septem, & drachmatum duarum, habet scammonij drachmas tres, & esulæ drachm. duas & colocynthidis drachmas quinque: quælibet drachma earum habet scammonij grana tria & tres quartas grani vnus, & esulæ grana duo cum dimidio, & colocynthidis grana sex, & quartam grani vnus purgant potenter. Quare errant qui cum Rhase c. de resolutione dant drachmas duas & ss. cum earum dos is sit à drachma vna vsque ad scrupulos quatuor.

Pilularum mezereon Mes. compositio est vnciarum duarum, habetque drachmas quinque mezereon, & quælibet drachma earum grana viginti duo cum dimidio: quare earum vsus est suspectus, nisi in morbis magnis, & præsentē virium robore: dos is est à scrupulis duobus vsque ad drachmam vnā.

*Error
quorundam.*

Pilularum hermodactylorum maiorum Mes. compositio est vnciarum octo, habet quælibet drachma earum colocynthidis grana sex, & tres quartas grani, & euphorbii grana tria cum dimidio, & hermodactylorum grana sex, & tres quartas grani: dos is est à drachma vna vsque ad drachmas duas.

Pilularum hermodactylorum minorum Mes. compositio est vnciarum trium, quæ habet scammonij drachmas duas & semis, & earum quælibet drachma scammonij grana septem cum dimidio, & hermodactylorum grana quindecim, dos is est à drachma vna vsque ad drachmas duas.

Pilularum Arabicarum Nic. compositio est vnciarum vndecim, habet scammonij drachmas octo, & quælibet drachma scammonij grana sex cum dimidio: dos is est ab vncia vna vsque ad vncias duas.

DE CVRAND. MORB.

Pilularum cochiarum Rhase compositio est vnciarum trium & drachmæ vnius, & quartæ partis drachmæ vnius, habet scammonij drachmas duas & semis, & colocynthidis drachmas tres & quartam drachmæ vnius, & turbit drachmas quinque, & quælibet drachma habet scammonij grana sex, & fermè bis tertiam partem grani vnius, & colocynthidis fermè octo grana, & turbit grana propè quindecim. Quare errant qui cum Rhase cap. de cephalalgia drachmas duas & semis dant, cum earum dosis sufficiens sit drachmæ vnius.

*Error
quorun-
dam.*

Pilularum indarum Mes. compositio est vnciarum septem, & drachmarum quatuor: habet hellebori drachmas quinque, & colocynthidis drachmas quatuor, & eius quælibet drachma hellebori grana sex, & colocynthidis grana quatuor, & quatuor quintas vnius grani: dosis Mes. est à drachmis duabus vsque ad drachmas tres, quamuis drachma vna nostris temporibus sufficiat, vt multis placet.

Pilularum de lapide lazuli Mes. compositio est vnciarum septem, drachmarum quatuor, habet scammonij & hellebori nigri an. drachmas duas & semis: & earum quælibet drachma scammonij & hellebori an. grana tria: dosis est drachmarum duarum cum aqua casei, & succedit foelix vacuatio.

Pilularum de Agarico Mes. compositio est vnciarum trium, habet colocynthidis drachmas duas, & turbit drachmas quinque, & earum quælibet drachma colocynthidis grana sex, & turbit grana quindecim: dosis est Mes. drachmarum duarum, alij vero dant scrupulos quatuor tantum.

Pilularum de elaterio Nico. Compositio est sex vnciarum cuius dimidium est elaterium: quare quælibet drachma habet grana triginta sex elaterij & ideo potenter purgant, & non sunt in vsu. Dos is est ab scrupulo vno vsque ad drachmam vnam.

Pilularum de opopanace Mes. compositio est vnciarum septem & quatuor drachmarum: habet scammonij drachmas duas, & colocynthidis drachmas quinque, & earum quælibet drachma colocynthidis grana sex, & scammonij grana duo, & quinta duas grani: dos is est à drachma vna vsque ad drachmam vnam & semis.

Pilularum de Euphorbio Mes. compositio ex duarum vnciarum: habet hellebori & colocynthidis an. drachmas duas, & quælibet earum drachma hellebori & colocynthidis an. grana octo: dos is est à drachma semis vsque ad vnam.

Pilularum sine quibus esse nolo Nico. compositio est vnciarum quatuor: habet scammonij fermè drachmas tres & semis: & earum quælibet drachma scammonij grana octo: dos is est Ni-
colao

colao decem, vel tredecim pilulæ ciceribus similes, & est pondus drachmæ vnius, & semis, aliis verò est à drachma vna vsque ad drachmas duas.

Ex his & similibus quæ à doctoribus scribuntur, scire potest medicus dosim medicamentorum compositorum purgantium, quamuis simplicium dosim prius oportet cognoscere, etiam si talium in compositis propter correctionem & alia maior quantitas dari potest: scammonium enim solum & non correctum malo coroneo rarò datur: si quantitas excedat grana septem, in electuario de succo rosarum, vel diaprunis solutiuo, passim dantur grana decem & octo, vel plura, cum dosis eius sit vnciæ semis.

Vnum tamen est maximè considerandum à nobis, ne vtamur medicamentis potenter, & violenter purgantibus, vt sunt scammonium, colocynthis, helleborus, & similia, nisi rarò, & in magnis morbis, & cum sunt bene correctæ, præsertim in febribus, & morbis calidis. Nostri enim temporibus (quæ in hoc fæliciora sunt) vti possumus semper etiam in vterum gerentibus & pueris clementioribus, quæ benedicta dicuntur, vt sunt mannum Arabum, cassia fistula, rhabarbarum, myrobalani & tamarindi: tempore tamen Græcorum pruna damascena erant cognita clementissima in purgando, & aloë quoque. *Benedicta medicamenta.*

Facta iam totius euacuatione siue per sanguinis missionem cum oportet, siue per medicamenta purgantia, necesse est euacuare à parte affecta per partes proximas, scilicet per nasum vel palatum, præcipuè cum est materia pituitosa: de his tamen cap. de apoplexia fiet sermo copiosior. Laborans hoc morbo sæpe post totius euacuationem mandat sequentem apophlegmatismum (quod nostri barbari medici masticatorium appellant) præcipuè ventriculo vacuo. ℞. pulueris mastichis, sinapis, piperis, pyrethri, zinziberis, origani, thymi, pulegij. an. ʒ. ʒ. cum syrupo de stichade fiant pilulæ ad ciceris magnitudinem. Naribus quoque sæpe tunc admoueatur sequens liquor: ore tamen pleno aqua: ne descendat ad ventriculum prædictus liquor. Cuius hæc est descriptio. ℞. succorum cyclamin, sicla, ceparum, & maioranæ an. ʒ. ʒ. pulueris piperis & castorei an. ʒ. ʒ. misce. His iam factis, raso capite & confrecto panno lineo præcipuè in causa frigida, vbi maiori opus est frictione, admouenda sunt parti affectæ olea, vnguenta, & alia medicamenta, de quibus Gal. primo de compositione secundum locos, tū causa & Aetius 6. sermone c. 55. & Paulus 3. lib. Nos tamen duo tantum vnguenta describemus experta, & optima prius alopeciciæ, quæ fit à causa calida: posterius ei, quæ fit à frigida. ℞. pul

Redit ad curam.

Deriuatio.

Apophlegmatismus.

Erratum.

Vnguenta calida.

DE CVRAND. MORB.

Causa frigida. pulueris corticum auellandarum, amygdalarum, castanearum, & nucum tostorum an. 3. ij. pulueris stercoris caprarum. 3. ij. olei laurini, & rutæ an. 3. ij. olei rosarum. 3. j. aceci coclearium. j. cere quod s. misce, & fiat vnguentum, quo vtere in defluvio hoc pilorum, quod fit à raritate curis & penuria materiæ pilos generantis: cui etiam confert mixtura ex oleis lentisci, myrtillorum, & omphacino cum laudano. Alterum vnguentum conferens causæ frigidæ est sequens. ℞. pulueris vtriusque hellebori, staphisagriæ, sinapis, piperis, stercoris columbi, radicum cannarum, & foliorum ficuum an. 3. i. oleorum euphorbii, castorei & rutæ an. 3. ij. cere quod s. misce, & fiat vnguentum, quo sæpe vngatur pars depilata præcedente forti frictione, & incisione aliquarum partium, quæ non est facienda, cum est causa calida.

Postquam de pilorum decidentia egimus, non erit extra præsens institutum in præsentia agere de iis quæ pilos augent, & quæ ipsos aureos efficiunt, & tandem de iis quæ nigros reddunt.

Augētia pilos. Frequens & assidua frictio, & capitis lotio decocto adianti auget pilos, dicitur tricomenes, quia facit luxuriare capillos, & subnasci, vel polytricum, quia creat capillorum multitudinem: & dicitur etiam callitrichon, quod crines denset, crispet, pulchriorésque reddat, ab aliis ebenetrichon appellatur, præcipue genus nigrum: vox enim ebeni capillum significat nigrum: est officinis capillus veneris. Pectinatio etiam assidua idem efficit: & quæ causas pilorum augent præsertim effectricem, vt vinum, & alimenta omnia calida, & vaporosa.

Idem facit lotio frequens decocti agrimonix, corticis vlmi, verbenæ, corticis salicis, absinthii, abrotani, seminis lini combusti, & cineris radicis arundinum, adde in fine parum lactis capri- ni. Lotio aquæ vitæ addendo parum aquæ rosarum, vel myrthil- lorum idem solet efficere.

Aureos reddentia. Aureos efficiunt capillos multa, quorum nostræ sceminae satis plenam & certam tenent cognitionem: inter ea tamen, quæ maximam habent vim, est aqua (qua aurum ab argento separatur, & dicitur ab illis fortis) cautè tamen est admouenda, nam si tangat cutim & carnem, corrodet.

Aqua mellis per distillationem facta vitreo instrumento aureos reddit pilos, & sine cutis & carnis nocumento, quamuis ipsos scindat. Decoctum seu lixiuium ex cinere genistæ seu genestæ, (quam spartum seu spartion appellant, & Arabes albahin seu albrachim) capillos aureos sine dubio efficit, hoc quotidie nostræ Valentinx experiuntur.

Nigros efficiētia. Nigros capillos multa faciunt, vt Dioscorides, Gal. Paul. & Aëtius volunt, de quibus omnibus in præsentia agere esset præter

ter nostrum institutum : aliqua tamen experta primò simplicia, deinde composita scribemus: semen myrti semen papaueris nigri, cortex nucis, cortex mori celsi, sumac, alcanā, & lac ficuum, folia cupressi, fumus picis liquidæ, fumaria.

Compositum hoc pilos satis nigros efficit, quorum nigror viginti diebus conseruatur, accipe calcis viuæ integræ (quæ dicitur gleba) libræ j. ß. infundatur in aqua per diem facta noua infusione quinquies, eiectis prioribus aquis, postea reiecta aqua, adde illi calci lotæ lithargyrii puluerizati ʒ. j. ß. horis sex, & tali mixtura unge pilos nocte ponendo desuper folium brassicæ, vel pannum lini : postea præcedenti eorum leui frictione, seu agitatione, lauentur sapone & lixiuio comuni clementi : est expertum. Hoc quoque medicamentum ipsos nigros reddit. Accipe lixiuii potentis, quo saponarii vtuntur lib. i. pulueris lithargyrii. ʒ. i. bulliant simul, donec pili candidi illo liquore nigrescant, facto sæpe & sensim experimento, deinde conseruetur liquor, quo actu calido, cum opus fuerit, poteris nigros facere capillos, interponendo pectinem inter cutim & capillos, quos, cum denigrati fuerint, exsiccari, & aqua calida ablui oportet.

Scholiū.

DEcidentia pilorum, quam caluitiem.) Pili vera partes non sunt, quia vita carent, & vero nutrimento. Cum tamen habeant propriam circumscriptionem in corpore, & per se consistere possint: inter partes numerantur à Gal. 2. de temperamentis, ubi inter veras nostri corporis partes, eorum temperamentum inquit : & dicatur. 14. methodi, ubi pilorum defectum morbum in numero partium deficiente appellat. His pilis (qui in corpore generationem habent necessariam, ex excrementum euacuatione) abutitur natura ad ornatum & tegumentorum : ut in illis, qui in capite, & mento implantantur, videre est. Qui verò in superciliis habentur, humores à capite per frontem defluentes, ne oculos ingrediantur, prohibent: sicut pili palpebrarum exigua corpuscula. Cum ergo decorum inter alia pili in nobis concilient, merito eorum curam suscipimus, corrigentes affectus, qui in eis præter naturam euenire solent. In plis consideramus substantiam (hoc est ipsos pilos) in defluuium pilorum, caluitie, Alopecia, & Ophiasis: colorem verò in vitilagine. ¶ Defluuium pilorum si largè sumatur, omnia vitia, in quibus pili deficiunt, comprehendit: propriè tamen (de quo nunc agimus) tantum significat omnium pilorum defectum. Hic morbus est in numero deficiente, non quia deficiat vera pars, sed quia deficit pars ad ornatū corporis necessaria: ac proinde, cum deficit, est restituenda ac si esset una ex partibus, quæ vera sunt. Habet morbus hic duas causas. Raritatem cutis unam, & alteram defectum

Quid sit
defluuiū
pilorum.

DE CVRAND. MORB.

Causa defectum nutrimenti. Raritatem cutis cognoscemus. 1. Quia pili, qui defluuij exciderunt, eandem quam antea habebant, crassitiem, seruant: non pilorum. enim sunt extenuati, cum alimentum eis non defecerit. 2. ex causa aliqua, qua praecessit, rarefaciente cutem: med. scilicet calido, aut lotione aliqua calefaciente. Si nutrimenti defectus causa est, cum colliges 1. ex tenuitate pilorum, excrementum enim, quod cuti aduenit, est paucum & exiguum apponitur. 2. ex morbo praecedente: solet enim ut plurimum hoc defluuium febrem ardentem, aut tabem sequi, de eo enim Gal. 1. de comp. med. secundum locos cap. 2. sic scribit: consuevit haec circa pilos oblatio, saepe iis qui agrotarunt accidere, raro autem circa morbum.

Quid Caluities defluuium pilorum est, sed in Sincipite tantum ob cutis caluities duritiem, & siccitatem eueniens: proinde qui in pueritia hanc cutem & eius habent multam siccam, in senectute calui sunt: unde non recte causa. Arist. caluitiem dixit fieri ob inopiam humoris calidi: neque Hiero ob raritatem cutis, neque Argenterius ob defectum terrei excrementi: reuera enim in caluis excrementum non deficit, non potest tamen penetrare ob cutis densitatem, ac proinde Gal. aliquando caluitiem ad defectum humorum refert, non quod deficiant, ut diximus: sed quia non possunt penetrare, & sic videntur deficere. Atque haec est caluities aetatis discursu facta: est enim altera ut morbi in iuuentute etiam eueniens, potissimum mulieribus ex raritate cutis & defectu alimenti. Hanc autem a prima distingues, quia caluities ratione aetatis adueniens, sensim fit, quia sensim cutis densatur: at illa, qua vi morbi accidit, affatim & repente sauit.

Quid sit Alopecia & Ophiasis sunt casus pilorum capitis, non omnium, alopecia sed aliquorum, unum in duobus est malum: distinguuntur tamen ob & ophia- figuram, & squammas: nam in ophiasis laesa capitis pars serpenti assis. similatur, squamosa quoque est. Qua ab occipite duorum digitorum latitudinem non excedens, usque ad aures serpit. At alopecia (qua causa alopecia a vulpe nomen accepit) nullam propriam habet figuram: & in ea & ophia- cutis squammis caret. utraque affectio fit a vitiosis humoribus per sis. vitiosos humores seu corruptos non intelligens cum Rondoletio tenues & serosos, sed sanguinem prauum, biliosum, pili, aut melancolicum: ex eo enim (cum minus recte mutetur, & nutriat) non assurgunt excrementa, qua sunt materia pilorum: possumus etiam per vitiosos humores, adustos, aut praua qualitate infectos intelligere.

Vitiligo Vitiligo est cutis deprauatus color.

quid. Curabis supradictos affectus hoc modo, a defluuiis pilorum incipiens. Curatio hoc n. cum sit morbus in numero partium deficiente, curabitur restituendo defluuij partem qua deficit: qua cum excremento tertia concoctionis tanquam ex pilorum. materia generetur, oportebit alimentum attrahere parti, ut ea nutrita, excrementis abundet. Opus praeterea erit cutem roborare, & reducere ad moderatam densitatem. Haec commodè prestabimus medicamentis calefacientibus

cientibus (sic enim legedum est, & non humectantibus, ut legitur 2. Corrige de comp. secundum locos cap. 2.) modicè adstringentia permiscentes, tunc locus calida enim attrahent sanguinem, & sic sua substantia caliditatem Galeni. cutis (si aliqua est) temperabit, cum temperatum, aut minus calidum, id quod magis calidum est refrigeret. Iam ergo æstate raso capite, & hyeme tonsis capillis, frictione utemur leui, ut ex attracto sanguine calida intemperie curata, roboretur cutis, & ad mediocrem densitatem restituatur. Deinde oleis lentiscino, mirrhino, aut nostro Hispano, cum laudano ad unguenti formam redactis ungemus caput. Præterea in hoc defluuiò pilorum, non est sanguis mittendus ratione affectus: quia neque raritas cutis, neque defectus alimenti euacuationem postulant: neque est purgandum, quia non contingit ex cacochymia, & si in venis vitiosus sit sanguis prædicta exercebimus remedia: non propter affectum pilorum, sed venarum: ac proinde non videtur audiendus auctor, cum dicit pilorum defluuium à sanguine ortum, curari sanguinis missione: non enim video, quo modo à sanguine aut alio humore oriri possit.

Sanguinis missio in defluuiò pilorum.

Reprehenditur auctor.

Caluities si ratione ætatis contingat, non potest curari, quia neque curatur densitas à siccitate procedens: at caluities in morbo orta, ratione, qua alopecia, curari solet.

Curatio caluitiei.

Alopecia & ophiasis cum ex vitiosis humoribus malè partem nutrientibus proueniant, curantur, purgantes peccantem humorem. Quem ex cutis colore cognoscas: cutis enim in qua desiderantur pili, humoris redundantis admittit colorem. Id etiam deprehendes ex antea dicta vita, natura hominis, & anni tempore. Neque omittenda hoc in loco erit sanguinis missio, si affectus venarum postulet, hoc est sanguis vitiosus, & si oluicias Gal. hoc remedium omisisse, respondeo, consultò id fecisse, tantum agens de partis affectu. Post purgationem ad Apoplegmatisimos accedes: hi enim ex ventriculis cerebri & venis aliquantulum euacuabunt. ultimo administrabis topica, hoc est localia medicamenta. Quæ constabunt ex medicamentis discutientibus prauos humores cutis, & attrahentibus sanguinem. Qualia sunt Thapsia mixta cum cerato ex oleo confecto, ut eius caliditas resisteret: Symplicium etiam, Euphorbium & alia valde calida, temperata tamen ne exacerarent. hoc in loco aduertere oportet, nos non agere de pilorum defluuiò à morbo Gallico eueniente, de quo postea disputaturi sumus.

Alopecia & Ophiasis curatio.

Obiectio.

Colorem in pilo curabimus, remedium applicantes ut ligini quod alimentum cui adherens dissipet, & attrahat sanguinem: ut parte nutrita, excrementum colorem in pilo mutet.

Curatio coloris in pilo.

An verò sanpto medicamento purgante. Cum nullum medicamentum purgans actu, cognitum extra, nisi fortè pilula de chamælea Dioscoridis: sed omne potentia purgandi facultatem habeat, inde habuit etiam contrarietatem, qua queritur: An post assumptionem medicamenti purgantis sit derubendum. Batini semper, Valerini tantum.

An ab assumptione purgantis sit derubendum.

DE CVRAND. MORB.

medica- in solidis medicamentis somnum imperant. Et verò existimo medica-
menti mentum siue liquidum sit, siue solidum etiã in vigilia in actum re-
purgãtis duci. Nisi ventriculus sit languidus : tunc enim in omnibus medica-
fit dor- menti somnus utilis est, longior in solidis, breuior verò in liquidis.
miendũ.

Opere autem incepto semper somnus.) Multis rationibus dor-
Cur post miendum non est, quando humor attractus à medicamentis purgan-
assum- te, inceptit expelli. 1. Quia cum excretio per aluum sit actio volunta-
ptionem ria, in somno, (in quo oriatur animalis facultas non fiat, sequentur-
medica- que ea incommoda, quæ ex humore in ventriculo & intestinis violen-
menti ter detento sequi solent, angustia, morsus, cardialgia & similia alia.
purgãtis 2. Quia in somno ex reuocatione sanguinis ad interna, replentur ve-
non sit na per quas humor peccans à medicamento trahitur. 3. Quia tem-
dormiã- pore somni calor reuocans, mutabit medicamentum in familiarem hu-
dum. morem. Consuetudo autem quam seruabant auctor, & sui temporis

An ab medici ius gallinæ insulsum tribuentes ante prandium, iam aboleta
assumptio- est, & meritò : quia reuera ius gallinæ, aut arietis non extergit : imò
ne medi- impedit purgationem, obtundendo vim medicamenti. Medicamentum
camenti autem extergendi vim habens à nobis tribui solet in die purgationis,
purgãtis aut in sequenti die. Si in die purgationis tribuatur, statim post medi-
fit ali- camenti assumptionem id fiat, quando medicamentum est validũ : ut
quid ex- nulla eius portio in ore ventriculi maneat, vel ut medicamentum ad
hibendũ. fundum ventriculi descendat, in his hominibus qui ab amaris sentiũt
 molestiam, & in his qui facile vomunt. Die sequenti, quando medi-
 camentum validum est, decocto hordei cum cortice, & pauco saccaro,
 aut alio extergente utimur propter dictam rationem. Quod si pur-
 gatio diminuta præcessit, clystrem extergentem, & purgantem, ex
 diacatholicon, benedicta, aut confectiõne hamec infundes.

Quid sit Si fuerit pilorum decidentia à flaua bile.) Humores in corpore,
humor quidam sunt turgētes, & alij in aliqua parte firmati. Turgentes hu-
turgens. mores dicuntur illi qui in loco putredinis, tantam tenuitatē & acri-
 moniam contraxerũt, ut irritata expultrice partiũ facultate, eos hinc
 inde expellat, unde turgentia duas habet cõditiones. Prima, ut humor
 hinc inde moueatur, eo modo quo animal coitũ appetens. 2. est, ut pars
 irritetur ad expellendum. Ac proinde Hip. Turgentiam aliquãdo col-
 locat in humoribus, cum 4. Aph. sent. 1. eos turgere scribit : & aliquã-
 do in parte 3. de fracturis sent. 18. ita ut partē turgere nil aliud sit,

Quid sit quàm incitari ad rei molestæ expulsionem. Humores firmati illi sunt,
humor qui in aliqua quiescunt parte, obstructi, ut in febribus, aut inculcati,
non tur- ut in tumoribus præter naturã. Iam si humor turgeat, statim hoc est
gens. in principio morbi, purgãte medicamento educẽdus est, ex Hip. 2. Aph.
Turga- sent. 22. indicatione sumpta ex eius tenuitate, ob quã nec ab obstru-
ctio hu- ctione eius transitus impeditur. Quod nõ est difficile intellectu illi, qui
moris non ignorat, obstructionem in vena, aut arteria non claudere omninò
turgētis. meatum. Dices nenne Gal. 1. Aph. com. ultimo in turgentia occasiõẽ

arripit

arripuit propinandi decoctum ex thymo, origano, hyssopo, aut alio simili, quod vehementer extenuande facultatem habeat. Respondeo, Galenū supradictis uti medicamentis, non propter obstructionem, ut ipsam aperiant ad purgandum, quoniam hoc etiam seruandum est in humoribus non turgentibus: sed quia aliquando, turgente humore in principio non potest purgare: quia medicamentū deficit, tunc accepta hac occasione, exhibet aperientia, ut obstructione aliquantulum aperta, cesset putredo, & cum ipsa turgentia. Si humor sit in parte firmatus, purgandus non est, quin coctio precedat: iuxta praeceptum Hipp. 1. aph. sent. 2. 2. ubi concocta medicari quod est purgare) praecipit, quod semper obseruandum est etiam in multo humore, cum purgatio concoctionem impediatur, & coctio quietem requirat, hac autem concoctio à natura humoris fit, quae semper humorem alterat, reducens ad benignū id quod non turpote: reliquum verò tanquam inutile expellens, ut in Crisibus expellitur. quo tempore solā instituimus victus rationē. Quod si natura non expellit, aut non integrè expellit, tunc debet medicus ei suppetias ferre, & purgatione facta eius defectū supplere, aliter sequetur recidua, ut aph. 1. 2. lib. 2. nos docet, ut autem id commodè prestare possimus aduertenda est sententia Hip. 9. lib. 2. aph. quae sic habet, Corpora quaecunque quispiam purgare voluerit, oportet fluida facere: quod est, ante assumptionem medicamenti purgantis, debet corpus preparari. Quinque autem modis fieri solet corporis preparatio: prima cum ante assumptionem medicamenti vomitu, aut deiectione per aluum que mo- purgantis, aqua tepida, & lubricantibus medicamentis consuetā reddimus naturam ad tales euacuationes: quam preparationem tantumquam notam emissam fuisse ab Hippocrate scribit Gal. 4. aph. com. 13. corpus Secundo, Preparamus corpus humectantes ipsum, alimentis, potu ad pur- balneo, & quiete. quando helleboro purgare volumus 4. aph. sent. 13. gatio- ne in violentis motus sequatur convulsio, ob consensum, qui est inter nem. orificium ventriculi & cerebrum 3. Preparatio exercetur, quando humorum crassum attenuamus, sicut 4. cum glutinosum incidimus. Ultima verò nil aliud est, quam meatuum apertio, quae videbitur ali- quibus conciliare cum 3. & 4. quia incidere glutinosos humores, & attenuare crassos, nil aliud est, quam aperire. reuera tamen res est diuersa, ut videtur cum obstructionem, at incidimus & attenuamus, etiam si non sit obstructio. Haec autem corporis preparatio varia, non solis medicamentis, sed alimentis etiam & potu exercenda venit: nam quid proderit assumere medicamentū humorem attenuans, si carnem An sit hircinam, autem crassam, & alia, quae crassos generare solent humo- prepara- res non emittit, unde de purgandis non narrat, si medicamentū purgans, randus etsi optimus non agat, aut si cunctis, cum terminibus tamen & mala humor retineant. Praeter dictas corporis preparationes, quas arte prestamus tenet, ad humores etiam purgandum nullam aliam à Gal. aut Hip. legimus scriptam: proinde existimo errare eos, qui humores tenuerunt

DE CVRAND. MORB.

preparant, eum incrassando. quia si humorē crassum attenuamus, ut libere educatur, qua ratione adducti humorē bilosum, qui ex sua natura tenuis est, incrassabunt? Respondent aliqui, eius preparationem non esse incrassationem, sed acrimonia retusionem. Quod falsum esse hinc intelliges, humor bilosus post coctionem debet purgari iuxta sententiā Hip. lib. 1. aph. 22. & cum in coctione bilis victa à natura mitior reddatur, ut Gal. lib. 2. de rat. vic. in mo. acutis com. 44. docet superfluum ergo erit labor eorum, qui temperare conantur bilicem, ut eam expulsionī preparēt. Quid autem debeamus in tenui humore efficere, breui accipe. Si humor tenuis peccat tenuitate, incrassandus est, ut crassior & frigidior factus non penetret, & hoc nomine minorem inferat molestiam, ut in dolore colico à bile facto videre est. Quia bilis si non qualitate, sed quantitate peccet, ita ut corpore educenda sit, varia eget preparatione: si sit in pectore, ut in pleuritide contigit, attenuanda erit, consule Gal. propter eam rationem, quam capite de pleuritide videre poteris: si verò humor tenuis in asperis pulmonū arteriis, à capite distillans inclusus maneat, cum in tussi impetu aëris educi debeat, aliquantulum incrassandus est, ne ab aëre ob tenuitatem diuisus, ibidem immoretur, de his tamen preparationibus humoris tenuis non agimus, quia nō sunt eo consilio, ut humorē medicamento purgante euacuemus: quē si purgare intendimus, nulla procuratione eget, sicut neque aqua in hydropē. Quod si in tertiana & ardētī febre, qua à bile sunt, attenuatibus utimur, ea propter humorem crassum, obstruentem prestamus: non enim humor tenuis obstruere potest, ut lib. 2. agentes de febris explicabimus. Ex dictis intelliges, errare eos, qui Syrupos, humores concoquere affirmant, cum humoris coctio à sola natura fiat: nisi dicamus concoquere illa medicamenta, quae seruant naturā vim, & calidum innatum. Syrupi verò, quos hi concoquentes appellant, corpus preparantes ducendi sunt, ut paulo supra docuimus.

Primò omnia medicamenta frigida] Medicamentū, quo corpus Syrupus ad purgationem paramus, syrupus nominatur. Hic duplex est, unus duplex, clarificatus in officinis seruari solitus, qui nil aliud est, quā medicamentum liquidum ex succis, aut aliis plantarum partibus, cum humore aliquo percoctis, & mellitis, aut saccharatis, ad saporis gratiam, aut custodīe diuturnitatem. Talis est syrupus fumi terre, berraginis, & similes alij, quorum dosis est ℥. ij. cum d'plo decocto aliquorum herbarum. Alter Apozima dicitur, quod medici in eorum domibus prescribunt ex decoctis herbarū & radicū cū melle aut saccharo. Paratur etiam ex aquis, & ex syrupis officinarum, decoctis tamen, permixtisque seminibus aut truncis. Solent multi aquis per alambicum coctis uti extractis cum saccharo, aut aliquo syrupo clarificato uti: ut corpus aquis preparent. Qui mos non placet Musae, & aliis scrupulosis hominibus, distilla- variis rationibus adductis. Quidam ex eo quod aqua per alambicum coctis, extracta caliditate contrahant. Ne proinde in his distillatis aquis, solam

solum concedunt calidarum usum & non frigidarum. nisi frigida aqua seruet odorem rei, à qua distillatur (ut est aqua rosarum) tunc enim concedunt ipsam. Alij harum aquarum usum non probant, existimantes eas ex are aut plumbo prauam acquirere qualitatem. Horum rationes leues sunt: pradieta enim aqua neque calorem acquirunt, neque qualitatem ex are aut plumbo. Non acquirunt calorem, quia non vruntur, & ita si calefunt statim illa caliditas euanescit: non acquirunt prauam qualitatem: quia neque plumbum, neque as tunc liquantur. Existimo ego non esse utendum his aquis stillatitiis, eo quod solum medicamenti tenuem partem continent, cum nos aliquando crassam & roborantem desideremus: tum quia succus potentiùs agere solet. Verum est, coactos aliquando vii debere stillatitiis aquis, in penuria herbarum, qualem non habemus in hac Valentina ciuitate.

Simplicia flaua bile] Hæc medicamenta neque concoctia sunt, neque his debemus preparare corpus ad purgationem bilis: ut ex superiorib. didicisti. Adde hæc esse frigida, & proinde augere obstructionem.

¶ Pilularum de fumo terræ.] Triā hoc loco animaduertit auctor: Examinandum primum tempore quo purgare volumus, non esse miscenda plura nantur medicamenta purgantia, quia tempore breui non potest fieri fermentatio, ac proinde non poterunt in unam formam venire. Secundum aduertit compositum medicamentum recens non posse recte purgare, quia prius auctor. unū altero purgabit, & unū impedit opus alterius. Tertium in purgationibus tutiore esse euacuationem parcam, immodicam. Hac ille. Quæ ad utendum purgationibus trutinam postulant. Quod primò admonet, non posse constare. Quamuis gātibus in corū fermentatione. enim medicamenta composita, in officinis seruata, fermentationem patiantur: potissimum atatis tempore, quam colligimus ex eorum ebullitione, non proinde ut eis utamur, expectandum erit, ut fermentatione absoluta sit. Nam ante ipsam & postea, imò vigente etiam fermentatione, ipsis utimur cum felici successu. Neque enim tunc medicamenti vis impedita est. Secunda admonitio etiam est falsa. Gal. enim lib. quos quibus & quando purgare oportet cap. ultimo, agens de æquatione purgantium medicamentorum purgantium precipit, ut medicamenta purgantia, que miscentur, nisi consentientia, ut equalis fiat purgatio. Est autem equalis, quando medicamenta simul operantur, aut quando cessante uno ab actione, alterum incipit: ita ut fiat continua euacuatio. Nam si uno cessante, longo post tempore alterum incipiat agere, est inaequalis euacuatio, ac proinde damnanda, quia vires, latius quo tempore refici debent, conficiantur. Qua in parte admoneo sio. lctorem, ut in versione Loquillati aduertat vltimum caput libri. In im- Quos, & quando purg. oportet, ita enim malè versum est, ut Latina modica lectio contrariū habeat ab iis, qua in Græca continentur. Vltima admonitio auctoris seruanda est. Si autem cōtingat immodica purgatio, ne quid quam faciendū

quam ex defectu virtutis colliges, succurrere poteris frictione partium extremarum. Offam etiam panis bis cocti, aut regij à nostris dicti in optimo vino intinctam offeres. Eiusdem etiā panis interiora vino ebriata, & cinnamomo inspersa supra ventriculum appones.

De morbo Gallico. CAP. II.

Descri-
ptio mor-
bi Gal-
lici.

Causa.

Signa.

Est morbus Gallicus, quem & Hispanum & Neapolitanum nominant, nostro sanè malo hisce temporibus affectus notissimus, antiquioribus verò ne per somnium quidem notus detestandus tamen perpetuò, qui cùm à pudendis incipiat, in linguam terminatur vario & dolorum & pustularum pro-
uentu, ac præcipuè noctm corpus discrucians. Fit autem à qua-
tuor humoribus à naturali temperie per exustionem in mali-
gnam quandam naturam degenerantibus, à contagio vt pluri-
mum primò affectis. Deprehenditur hoc malum, quia in puden-
dis à principio pustulæ apparent, crustis obiectæ, siccæ & la-
ctea nonnunquam sanie manantes. Iam & in fronte, & circa ra-
dices capillorum pustulæ, seu veriùs dixeris, tubercula diuersi
coloris oriuntur, modò circa vllius medicamenti opem desicca-
ta, modò hinc inde frequenter renascentia. In capite summa
inest grauitas, in collo, humeris atque adeò omnibus articulis
perpetuus, cruciatus, dolorificis ibi tumoribus præter naturam
obortis: qui cùm difficilè discutiantur, tardèque suppurentur, in
nodos sæpe ac durities migrant. Ad extremum fauces palatū-
que & insuper lingua nigris fœtidisque crumpentibus pustulis
turpiter exeduntur.

Victus
ratio.

Hic morbus curatur primò victu humectante, & in actiuis
temperato, vel parum calido: quæ atram bilem efficiunt, maxi-
mè nocent, vt caro leporina, bubula, hircina, & ceruina, caseus
antiquus, omnia falsa, & legumina: similiter quæ faciliè putref-
cunt, vt pisces, & lac. Conferunt, quæ bonum succum efficiunt,
vt panis optimi tritici, pullus gallinaceus, gallina, caro arietina,
hispanica, vitulina, hœdi, coturnicis & similibus: de quibus li-
bello de bono & malo succo, libris de tuenda valetudine & de
facultatibus alimentorum multa à Galeno tradita sunt copiosis-
simè: perpetuò tamen considerandæ sunt vires ægri, & morbi
magnitudo: consideranda quoque est sententia Hippocratis 1.
lib. aphor. quibus semel, aut bis, &c. in cibandis omnibus æ-
gris, vtatur, si potest, exercitatione: præsertim ventriculo va-
cuo, abstineat venere & animi perturbationibus, quæ bilem
atram augment, vt sunt ira, tristitia, & similes.

Sanguis
mis-
sio.

Secundò, sanguinis missione, præsertim si fuerit morbus
recens: vbi vires sunt maiores secta vena iecoraria, aut com-
muni, vt sanguinis copia respondeat plenitudini, fiatque vacuo

ventri

ventriculo & intestinis, nisi timeatur subita suffocatio, aliquando bis aut ter sanguis est mittendus.

Tertiò concoctione per hæc vel similia. ℞. syrupi fumarie. Syrupus
f. & borraginis. an. ʒ. vj. syrupi fumarie comp. & de epithymo præpa-
an. ʒ. ij. misce. Item. ℞. aquarum fumarie, borraginis, lupulo- rans.
rum, & quinque radicum an. ʒ. viij. misce, facta iam concoctio-
ne, diebus nouem.

Quarto vacuatione atræ bilis, per hoc, vel simile medicamen- Purga-
tum. ℞. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ ʒ. vj. confectio- tio.
nis medicaminis quod scripsit Hamec. ʒ. iiij. ʒ. diachar rami ʒ.
ij. ʒ. syrup. borraginis ʒ. j. decocti florum cordialium, quod f.
misce, & fiat potus. Vel. ℞. pilularum de fumo terræ & hermo-
daetylorum maiorum an. ʒ. ʒ. diagridij ʒ. iiij. cum aqua bu-
glossæ, fiant pilulæ vij. Deinde per aliquot dies roboretur ven-
tricus, & partes principes, sanguisque purior efficiatur ele-
ctuario diarhodon Abbatis, vel conserua borraginis, vel bu-
glossæ cum aqua, aut decocto borraginis, vel buglossæ, vel fumi
terræ. Fiat quoque bis, vel ter in mense corporis purgatio, his,
aut similibus pilulis. ℞. pilularum de fumo terræ, hermoda-
etylorum maiorum, & indarum. an. ʒ. ij. cum aqua buglossæ:
fiant pilulæ xv. adde cuilibet earum granum j. optimi diagridij,
doses tres.

Quintò vtatur exercitio forti & balneo, donec sudet copio- Exerci-
sè, bibat tunc per aliquot dies, oleum commune quantitatis. ʒ. tatio &
iiij. cum ʒ. j. optimi sacchari. His omnibus solet curari Gallicus balneū.
morbus, si fuerit recens: qui si habuerit pilorum decidentiam,
eget præter iam dicta frequenti capitis rasione, frictione &
lotione frequenti decocto pulegij, stichados, origani, saluiæ,
roris marini & camomillæ, & similibus. Si his omnibus mede-
ri non possumus huic morbo, adhibebitur syrupus sequens. ℞. Syrupus
Corticis ligni indici, seu Guaiaci in minimas partes diuisi. ʒ. ex deco-
viiij. Interioris eiusdem similiter incisi. ʒ. iiij. senæ. ʒ. ij. epithy- sto gua-
mi, polypodij an. ʒ. j. fumarie, borraginis, cichoreæ, rostri por- iaci.
cini, radicum buglossæ. an. m. ij. florum cordialium an. m. j. li-
quiritiæ, radicum diureticarum an. ʒ. ʒ. fiat decoctum in li-
bris viginti quatuor aquæ optimæ, prius per diem in ea in-
fuso ligno guaiaco ad medietatem secundum artem. Cuius
percolati accipe libras decem, & cum quatuor libris sacchari
fiat syrupus non perfectè decoctus ad modum mulsæ: cui
addes pulueris hermodaetylorum. ʒ. ij. pulueris diarhodon ab-
batis ʒ. ij. cinnamomi electi ʒ. j. Cuius dosis summo mane
erunt vnciæ quinque, vel sex. Hic syrupus in omni tempore Laxa-
etiam prægnantibus, & febrientibus est exhibendus intrepidè & in-
si opus fuerit, cum bibit hunc syrupum æger, euacua ipsum rati.
b. 4 per

DE CVRAND. MORB.

*Altera
purga-
tio.*

per pilulas superius scriptas , vel per medicamentum hoc, si non possit deuorare pilulas. ℞. cassiæ fistulæ præparatæ & diacatholicon an. ʒ. j. confectionis medicaminis Hamec , & diasenæ an. ʒ. vj. diachartami & conferux buglossæ an. ʒ. iij. syr. borraginis, quod s. misce , & fiat confectio ad modum opiatæ: dosis cochlearia duo semel in hebdomada.

*Aqua li-
gni gua-
iaci.*

Si his peractis semper morbus permanferit , forsan curabitur aquis signi guaiaci , prima valentiori , quæ bibitur bis in die , in aurora & nocte à cœna parca per quinque horas : & altera clementiori seu debili , quæ sola in prandio & cœna , & inter prandium & cœnam erit potus : quarum formæ sunt hæ , quamuis secundum variam naturam morbi , & ægri , temporis & regionis. possint fieri valentiores , vel clementiores. ℞. ligni guaiaci lima vel torno in minimas partes diuisi lib. j. aquæ optimæ lib. xx. maneant per diem simul deinde decoquantur ad medietatem , cuius colatura, reiecta parte terrestri, seruetur in vase vitreo, quæ erit prima potentior, eius dosis est vnciæ quinque, vel sex. Deinde accipe lignum primæ aquæ , & iterum cum libris triginta aquæ decoquatur : donec quinta pars consumatur , & hæc erit secunda remissior prima. Quibus iam bibitis fiant aliæ duæ eiusdem formæ, vel similis, mutata aliquantum natura earum, si opus fuerit. Et finitis aquis secundæ libræ ligni guaiaci , fiant ex tertia, & quarta libra eodem modo, donec æger sanetur. Accipiat quilibet hebdomada tres ex pilulis superius scriptis , vel duo cochlearia confectionis purgantis.

*Aqua
smylacis
aspera.*

Fiunt ad idem efficiendum aquæ ex aspera smylace nostri temporis, & est sarça parrilla , quæ ab India ad Hispaniam aduehitur , forma earum est. Accipe vncias sex dictæ sarçæ parrillæ conquassatæ , & per diem naturalem infunde in libras duodecim optimæ aquæ, deinde decoquatur ad medietatem , cuius colatura in vase vitreo conseruetur, sumenda mane , & vespere, quantitate vnciarum quinque , & hæc est prima valentior. Deinde accipe eandem smylacem asperam prius decoctam , & in libris triginta aquæ decoquito donec quinta , vel sexta pars consumatur : & hæc erit secunda mitior ad potum in prandio & cœna, & inter prandium & cœnam. Quibus finitis parentur aliæ eiusdem, vel similis formæ , quemadmodum fiunt ex ligno

*Tempus
curandi
morbum
Gallicū.*

guaiaco. Tempus accipiendis iis commodius est Ver , deinde Autummus. Æstas verò est vehementer inepta & aduersa. Hyems accommodatior æstate , & Vere & Autumno deterior. Nostri quoque temporibus reperta est radix chyna, cuius aqua curare solet morbum Gallicum , & articulare , de qua liber extat scriptus à doctissimo Vessalio. Lege etiam methodum propinandi decoctum huius radicis apud Amatum Lusitanum.

centuria 2. curat. 3. rectissime traditam. Victus ratio (dum bibuntur hæ aquæ) præscripta est iam superius, quamuis in cœna nullæ carnes sunt exhibendæ, sed panis nauticus, vulgò bis coctus, vix passæ, vel radix buglossæ condita, vel cucurbita condita: præcipue si fuerint Castellani. Semper tamen est sequenda Hippocratica veritas superius repetita, quibus semel, aut bis, &c.

Curatur quoque morbus hic usu vini sancti, quamuis biliosis & dispositis ad hæticam minus, quàm aqua ligni guaiaci conferat. Eius forma hæc est. ℞. corticis ligni indicis lima vel torno diuisi in partes minimas ʒ. ix. interioris eiusdem ʒ. iiii. folliculorum senæ, epithymi, polypodij an. ʒ. j. fiat decoctum in libris viginti quatuor aquæ ad medietatem, de cuius colatura accipe lib. decem, quibus probè calefactis adde vini generosi lib. quindecim, & omnia simul maneant in vase fictili, donec calor absumatur, postea conseruetur mixtura in vasis vitreis: quibus adde pulueris hermodactylorum vncias duas: bibat in aurora, & vespere libram semis, huius vini loco primæ aquæ potentioris, & fiat ex ligno, & cortice iam prius decoctis aqua pro potu in prandio & cœna cum libris viginti quatuor aquæ, donec quarta pars consumatur, qua bibita & vino fiat secundo eodem modo, vt dictum est superius, cum de aqua ligni guaiaci agebamus. Hoc tamen breuius quàm aquæ solæ curare potest etiam antiquum Gallicum morbum.

Si fuerit antiquus, & curatu difficilis, fortiolemque poscat curationem, facta iam clementiori medicina nisi morbi & symptomatum magnitudo solitum ordinem inuertat (nam authore Celso lib. 2. non potest vehementi malo succurrere, nisi æquè vehemens auxilium) potentioribus opus erit, inter quæ à multis expertum est, & à me laudatum medicamentum ex mercurio, brachiis, & aliis partibus externis admotum ordine consueto, consentientibus viribus ægri, quia vbi illæ non adsunt, non oportet laborare: neque facultas ipsius argenti viui est tunc pertimescenda, cum olim sæpe morbis multis leuioribus admoueretur, vt scabiei. Galenus tamen nunquam fecit periculum de eo, an interius sumptum, vel exterius admotum interficiat.

Expertum à nobis vnguentum hoc. ℞. axungie porcine sine sale ʒ. iij. oleorum laurini, de lilio & rutæ an. ʒ. j. β. theriaceæ magnæ ʒ. iij. rubæ tinctorum ʒ. ij. argenti viui ʒ. iij. croci, cinnamomi, an. ʒ. j. musci & ambræ an. ʒ. iij. misce & fiat vnguentum. Poterit augeri, vel minui aucto, aut imminuto mercurio, habita ratione virium ægrotantis & morbi. Certa rei quantitas neque præscribi potest, neque scribi. Aliquando suffi-

*Vinum
sanctum.*

*Antiqui
& diffi-
cilis
morbi
curatio.*

*Facul-
tas ar-
genti viui
an ti-
menda.*

*Vnguen-
tum.*

DE CVRAND. MORB.

cit prima vnguenti admotio, aliquando duæ sunt necessariae, aliquando tres, & plures quàm sex, quod per sudores, alui excretiones, & oris deprehendes. Partes quibus admouetur, sunt extremæ, videlicet brachia, tibiæ, spina, & venter versus inferiores partes.

*Qua
partes
inungē-
da.*

At cor & ventriculus omnino custodiantur, ne ab illo medicamento lædatur pars nobilis, vel ei, & toti seruiens. Vnguentum cum admouetur, sit actu bene calidum, & habitaculum, & si non sudauerit, ægri pedibus apponantur lateres calidi cum vino: quod si his non sudauerit, neque oris excretiones, neque alui deiectiones habuerit, cum iis vel saltem aliqua ex ipsis euacuationibus soleat hoc medicamentum morbum hunc curare: tunc totius suffitu erit opus dempto capite, ne vis venefica per nares & palatum cordi, & aliis partibus noceat. Quare æger stans vestiatur conopæo, quod vulgò dicitur pauallon, capite solo nudo apparente, & inter illius tibiæ supra prunas spargatur sequens puluis. ℞ cinnabrij. 3. j. rubear tinctorum, cinnamomi, & croci an. 3. ℞ misce, & fiat puluis ad primum suffitum, & si opus fuerit, fiant duo vel tres: tunc, imò etiam tempore vnguenti ex mercurio habeat in ore crySTALLUM vel aliquem liquorem astringentem, & repellentem ad defensionem dentium & oris. Si verò fuerint vlcera, & caliditas, quemadmodum fermè semper esse solent, lauetur sæpe os sequenti mixtione. ℞. aquæ plantaginis 3. iiij. aquæ portulacæ, rosarum, & lactucæ an. 3. ij. ℞. rhodomellis, syrupi rosarum, & oxysaccharæ. S. an. 3. ij. pulueris aluminis vsti, & mastichis. 3. ij. misce: hoc vel simili medicamento curantur oris vlcera. Aliarum verò partium vlcera omnia, si fuerint sine ossium corruptione solent curari sine medicamentis externis, facta curatione totius corporis per ea, quæ diximus: ossium tamen corruptio cauterio eget, & propria curatione, quæ ab erudito chirurgo administrabitur. Nonnulli in curatione huius morbi antiquissimi, & fortissimi, præter iam dicta vtuntur pilulis addendo grana aliqua pulueris Ioannis de Vigo: ego non auderem vti illo puluere, ne in parua quidem quantitate & correcto: quia est corrodens medicamentum: fit ex argento viuo, & aqua, seu lixiuio forti & potenti, quo aurifices vtuntur. Illius tamen autor. Vigo secunda parte sui operis in peste dat duo grana huius pulueris, quæ (ipso dicente) vomitu & ventris profluuiio violenter purgant, in colica quoque grana duo eiusdem pulueris cum drachma femis philonij Romani laudat tanquam vtile & optimum auxilium: eius tamen vis corrodens externis partibus clemens est, & sine periculo, & pauci doloris: aliquando tamen opus

*Puluis
Ioannis
de Vigo
non pro-
batur in
pilulis.*

opus est miscere parum vnguenti albi, ne dolor magnopere Pulvis intendatur, & ideo vnguento superiori loco argenti viui inde- Ioannis re parum huius pulueris, potentius hoc esset, & tutius, quàm de Vigo interius assumere. Qui deuorandum esse hunc puluerem cen- exterius sent, aquis frigidis, & cordialibus, & aliis corrigunt. Huius admotus pulueris emendatio, autore Petro Andrea Matthæolo Senen- lauda- si fit. ℞. pulueris præcipitati ex Mercurio (qui fit, vt docet tur. idem Matthæolus, libro de ratione curandi morbi Gallici. j. Corre- 3 ij. aquaram plantaginis & acetosæ. an. 3. ij. macerentur etio pu- per noctem, & summo mane prioribus aquis ciectis de inte- lueris. gro alias eiusdem ponderis super infunde in vase æneo, seu te- stacco, ad ignem collides, & non cesses agitare ferrea, vel li- gnea spatula, donec in puluerem redigantur, ex quo sic corre- cto poteris pilulas, quæ sequuntur, componere, & fiet maior correctio. ℞. electuarij cordialis Conciliatoris. ʒ. ss. marga- Pilula. ritarum præparatarum, hyacinthorum, pulueris præcipitati, seu Vigonis an. ʒ. v. pulueris diamusci, & diamargaritonis fri- gidi. an. ʒ. ss. fiant ex his catapotia quinque, quæ sumantur ante solis ortum. Hæc enim eodem autore breuiter tempore Gal- lici morbi dolores tollunt educendo vomitu & eiectione pi- tuitam, & atram bilem. Plurima aliorum morborum genera idem doctor hoc puluere curauit, addendo diuersa medicamen- ta, pro ratione diuersorum morborum, quod ego quemadmo- dum dixi, periculosum existimo, etiam si præter autoritatem Pauli, & Arabis Auicenæ, tot experimentis sit credendum, & cum Hippocrate extremis morbis extrema exquisitè remedia optima sint. Laudat similiter hic autor in hoc, & aliis morbis, qui ex atra bile fiunt pilulas ex helleboro, quas Mes. capite de co ex Haly describit: earum tamen vsus in vere tantum iuueni- bus & robustis confert.

Scholium.

Est morbus Gallicus.) *Varia ac diuersa de Morbi Gallici es- Varia sententia apud doctores extant sententia. Montanus hunc mor- sententia tum, intemperiem iecoris calidam & siccam in certa specie nobis de essen- ignotam esse existimat. Fracastoreus ad humorem pituitosum eum tia mer- refert: Musa eum venenum, & contagionem epydemicale facit. Hi bi Galli- omnes decipiuntur. Montanus quia videmus multoties iecur calidum ei refa- & siccum, & non inficere omnes humores: Fracastoreus, quia hominis tantur, melancholici sanguinei & biliosi, eo afficiuntur: Musa verò, quia hic morbus caret illis symptomatis, quæ à veneno contingunt, neque plures interficit, neque causam habet communem. His ergo ommissis simul cum ortus, & eius originis inuestigatione quia ad curatio- nem non est necessaria, breui eius essentiam hanc ratione accipe.*

Morbi.

Essentia morbi Gallici. Morbi, qui nostrum inuadunt corpus, quidam manifesta qualitate afficiunt, ut qui calidi, frigidi, humidi, & sicci sunt. Alij verò toto temperamento, ut venena, & qua contagione inficiunt, inter quos est morbus Gallicus. Qui nil aliud est, quàm Morbus totius substantia inficiens iecur & humores in eo contentos. In hac definitione, morbus est genus, quo communicat cum aliis morbis: reliqua partes definitionis differentia sunt. Cùm dicimus totius substantia, separamus hunc morbum ab aliis, qui manifesta qualitates sunt: ultima parte qua eum inficere iecur, & humores in eo contentos diximus, distinguimus morbum Gallicum, ab aliis morbis etiam totius substantia, peste, scabie, ophthalmia, & aliis qui non agunt in iecur, sed alias respiciunt partes. Modus, quo his morbus generatur, hic est. Esi contactu, osculis, poculis, pectinibus, vestibus, lintheis, lactatione infantis facta, hic morbus contrahatur aliquando: ut plurimum tamen ex venereo congressu ob coniunctam conuersationem & calorem id contingit. Ex eo enim in pene, aut mulieris pudendo aliqua portio humoris infecti relinquitur, qui aliquando generans vlcus, & aliquando sine ulcere inficit humores proximos, & hi vicinos quoad iecur concipit illam prauam qualitatem: quam communicat humori cacochymo, hoc est in massa superfluitante: si talis non reperitur, partem sanguinis inficit, inde sequuntur morbi varij, cùm humor infectus non possit gubernari à natura. Hac ratione si sanguis infectionem admittat, fiunt phlegmones, & pustula rubra. Si verò unus ex aliis humoribus, molestus cum sit ad aliquam partem decumbat, faciet pustulas, tumores, dolores & ulcera, distincta tamen pro varia humoris natura, verum tamen est, tandem in hoc morbo humores crassos generari, & abundare in corpore: si iecur sit frigidum, pituitam, si calidum, atram bilem. Quæ cùm non possit gubernari, neque à natura mutari ob prauam qualitatem detinetur & adurit, ita ut perueniens ad partes eas exulceret non parcens etiam ossibus ex sua natura duris, hic morbus antiquis medicis ignotus, nostris temporibus Dei beneficio, ut effrenem hominum libidinem reprimeret, apparuit. Quamvis hoc non placeat Vallesio viro in medicina studioso (& docto) qui 4. Epy. com. 1. hunc morbum veteribus cognitum fuisse confirmat, ex Hippocrate, qui 3. Epyd. Sec. 3. sent. 4. morbos recenset, quos in morbo Gallico in dies experimur, ulcera sordida, capitis & menti glabritiem sine febre, & cum exulceratione pudendorum, & faucium, ossa etiam excisa & nudata. Mirandum tamen est de tanto viro, hætenus non animaduertisse in morbo tam populari rem aliquam nouam veteribus incognitam, quum poterat ex contagione, causis, & curatione colligere. ex contagione, quia illa antiquorum ulcera alios non inficiebant, at ea quæ nunc in hoc apparent morbo contagiosa sunt, & ex ipsis solet sequi profluium pilorum. Ex causa, quia apud antiquos pilorum decidentia duas tantùm habuit causas,

causas, ut in primi capitis scholio docuimus: at morbus Gallicus unā tantum habet eis ignotam, nempe vitium excrementi: tu adde dolores, qui etsi eos expertos habuerit antiquitas, non tamen illi semper exacerbabantur nocte, ut in huius morbi doloribus contingit. Curatio præterea hunc morbum nouum esse demonstrat. Pustula enim cutis apud illos, purgato corpore cessabant. Quas in hoc morbo nisi totum habitum corporis euacuemus, perseverantes & cum ingentissimo dolore experimur. Dolores apud antiquos anodymis cessabant: at in hoc morbo magis exacerbantur. Et in summa, nisi medicamenta Alexipharmaca, quæ oppugnent prauam morbi Gallici qualitatem, adhibeantur, nunquam curabitur perseverante semper humorum infectione. sunt autem Alexipharmaca symplex aspera, indica, lignum Guaiacum & Argentum viuum.

Hic morbus curatur primo victu.] Malè præscribit autor ratio- Auctoris nem victus hominibus morbo Gallico affectis, non semper debet esse lapsus. humida, sed aliquando humida, & aliquando sicca. humida cum na- Victus tura est sicca, & humor redundans siccus. Sicca verò in natura hu- ratio in mida & humore humido. Neque etiam debet semper alimentum in morbo atius qualitatis temperatum assumi, cum enim est infectio in Gallico. bile, refrigerante alimento: cum in pituita, aut melancholia, calfaciente utendum est. Quia si imperamus in his alimenta temperata, prout licebit, debent alterari. In corpore frigido calidis, pipere borragine: in calido frigidis, lactuca, ptyzana & similibus.

Secundò sanguinis missione.] Semper constante virtute in Gal- Sanguinis missio. lico affectu sanguinem mittes, si sit plethora, ut euacues: si cacochymia ob sanguinem vitiosum.

Tertiò concoctione.] Omnem morbum Gallicum in Melancho- Purgatio. lico humore collocat auctor, ac proinde non est mirandum, si syrupi ab eo præscripti respeciant. Nos verò qui hunc morbum in omnium etiam aliorum humorum exuperantiis collocamus, non unum solum, sed eum qui redundat, præparare solemus.

Quartò euacuatione atræ bilis.] Pro vario humore peccante, & Purgatio. In proinde infecto, vario medicamento purgante utere, neque si quaris auctorem, semper purganda melancholiam, crassissimam enim cralis, morbo & cum maximo agrotantis dampno. Gallico

Quintò exercitio fortè.] Morbus Gallicus nostri aut tyrannus, his famulis gaudet, pustulis, ulceribus pudendi, tuboribus, gonorrhœa, defluuiis pilorum, tumoribus præter naturam & tantis & variis dem doloribus: ex quibus eius tempora colligimus. Principium, cum sumptio pudendi ulcera apparent, loquimur enim modo de his, qui cum coimata. in contraxerunt. Augmentum cum inguina inflammantur, & ma- Tempora ius augmentum, cum iecur & humeres in eo contenti inficiuntur. in morbo tur, statum verò ex totius corporis infectione, quam ex pustulis, Gallico. doloribus, tumoribus & pilorum defluxu cognoscimus. ubi aduertendum

DE CVRAND. MORB.

tendum est, hunc affectum, in quocunque tempore coniunctum habere humorem: Nam in principio humor fluit ad ulcus, in augmento ad bubonem, quo tempore in iecore humores iam sunt infecti in statu

Curatio pustularum. omnia mala, qua in cute apparent, ex humoribus etiam pendet. Quae ratione his omnibus malis succurres, breuiter explicabo. Si pustula in cute appareant, cum oriantur ex humore praua qualitate infecto, ac proinde irritante partes ad sui expulsionem, curanda sunt, primo sanguinem mittentes in plethora, ut euacuemus, in cacochimia, ob sanguinis vitium: sanguinis autem missio non solum bis aut ter, sed constante virtute, etiam sexies & septies facienda est. Postea purgato humore peccante, tandem ad decoctum ex smylace aspera & Guaiaco deueniendum: ut sudoribus habitum corporis euacuemus. Pustulas vero exsiccabimus aqua forti, aut aqua plantaginis cum

Curatio ulceris pudendi. alumine decocta. Si ulcus sit in pudendo, cum hoc caliditatem aliamquam habeat ex motu & fricatione contractam, prius auferenda erit lotione ex aqua rosacea, nenupharis aut alia, quae frigida sit: deinde sordes (qua impediunt ulceris consolidationem) auferes paucopulvere Vigonis cum unguento albo permixto, ut extersio sit sine morsu. Quod si labia ulceris dura sint aut ulcus difficiliter curetur, solo pulvere tunc utendum: quo & extergimus, & partem illam callosam consumimus, ulcere mundificato cicatrici induces, miscens alumen, tartarum, & aruginem, cum vino albo & aqua rosacea, ita ut aluminis sit maior quantitas, minor Tartari, & adhuc minor aruginis: & si difficulter ulcus cicatricem admittit, unguento ex mercurio ungenda sunt inguina, & pudendum. Hoc enim exsiccatur

Curatio bubonis. ulcera, corrigit intemperiem, & extinguit morbi seminarium. Bubonem hoc modo curabis. Cum bubo sit intemperies cum affluxu humoris, habet aliquid factum, & aliquid quod fit: id quod fit prouidebis, reuelles alio humorem fluentem ad locum affectum. Reuulsio hac sanguinis missione exercebitur, secta basilica eiusdem partis, quae cum loco affecto rectitudinem seruat. Id vero quod in tumore factum esset, curari debet, euacuatione, quae sectione vena pedis eiusdem partis commodè fit: ultimo applicabis supra bubonem emplastrum diachilonis puluerem iridis inspersum, ut dirigatur humor per halitum. Quod si non possit digeri sed ad suppurationem mutetur medicamentasuppurantia adhibenda erunt. Pus autem extrahemus non quemadmodum chirurgi faciunt medicamento caustico aperientes abscessum quoniam dolorem excitabimus magnum, & inde fluxionem ad partem languidam ex sua natura: sed scalpello sectionem facies, folium myrti representante, ut puri via pateat ex Gal. 13. metho.

Curatio gonorrhoeae. c. 5. Neque enim hac in parte sequendus est Musa ante suppurationem aperiens bubonem ne dolore excitato augeamus affectum. Gonorrhoea sequitur, quae duplex est, una propria, in qua assidue semen emittitur, de qua non agimus modo: altera improprie dicta, cum per

pudendum

pudendum substantia alba fluit, qua non est semen, sed pus. Quod colligimus, quia semen sine dolore emitti solet, at pus cum dolore, hac improprie & per similitudinem. Gonorrhœa est, qua in morbo Gallico apparet, ex multis enim vlcusculis in parte interna penis ortis pus egreditur, dolorē sentientes non solū in illa puris excretionē, sed etiam in pudendi crectione, ob partis ulcerata tensionē. Curatur hac sanguinis missione primò, ne ob dolorē attracto humore fiat inflāmatio, & ut portio humoris peccātis euacurtur. Qua purgabimus, & ultimò extergemus, cicatricēque inducemus, in vlceribus, decoquētes hordēū cum rosis, eique mel rosatum colatum permescentes. Quo decocto syphone siue piulco sapē urina meatū lauare oportet, aut hoc alio. ℞. aqua plantaginis ℥. viij aqua rosarum ℥. iij rhodomellis ℥. ij. collyriū albi rasis ℥. ij. dissoluantur, & misce. Si sit magnus dolor, collyriū sit cum opio: urina. n. acrimonia (quia in transitu vlcuscula mordicationem parit tēperanda erit, bibentes decoctionē maluarum & liquiritia cum scrupio rosaceo aut violaceo. Et si magnus sit ardor, syrupo de mucilaginibus à Matthæo. de gradi. descripto utemur, quem capite de ardore urina à me habes descriptū. Solet aliquando in vlceribus prædictis cum multū durant, caruncula innasce, & impedire transitum urina. Quæ curabitur ea ratione, qua Laguna & Amatus Lusitanus docent. Decidentia pilorū in morbo Gallico ostēdit antiquos medicos Curatio eum non cognouisse. Ipsi. n. ut in 1. habes scholio, à duabus tantū can- deciden- sis defluere pilos scripserunt, cū in morbo Gallico à nulla ex illis eue- tia pilo- niat, sed à prauitate excremēti. Remedia ad eiusmodi defluniū mul- rum in- ta habet Anton. Musa in suo li. de morbo Gallico inscripto. Ego unum morbo solum describā, quo si utaris, prohibebis ne pili decidant, & excisi re- Gallico. nascentur: quo dexpertissimum habemus, hoc autē est unguentum ex Mercurio paratū, quo humeri articulos, vertebrae colli, & retro aures iungere debes, quoad in ore iam incipiant vlcera apparere. Tumores præter naturā cessabunt sanguinis missione, seruata rectitudine, facta purgatione, decocto smylacis, & supra tumore hoc utens medicamento ℞. emplastrū de ranis & cōtra durities ana partes æquales, extendatur super alutā ad formā dandā. Dolores in morbo Gallico sine tumore aliquo solēt molestiā inferre alicui, aut multis partibus: hi curantur primò sāguinis missione, ut impediamus fluxum humoris ad partē dolentem. 2. humoris peccātis purgatione, & decocto ligni Guaiaci aut smylacis, & si his non cessent unguēto ex Mercurio par- Modus tem dolentē ungemus: aut si sit in multis partibus dolor, uniuersalem quo pa- faciemus unctionē. Præterea in supradictis affectibus, decoctum ligni ratur Guaiaci & smylacis à nobis propinatū fuit non solū ut sudorem decoctū moueremus, sed ut pernam morbi qualitatem his medicamentis, quæ ex Gua- illi toto temperamento contrariātur radicibus (si fieri hoc potest) euel- iaco, & leremus. Solet autem decoctum variè parari. Aliqui libram ligni in & smy- duodecim libris aqua decoquant ad medicitatis consumptionem. lace in- Quibus dica.

DE CVRAND. MORB.

Quibus omissis, cum vehementem decoctionem imperent, nos duplex solemus parare decoctum unum (quod vulgo aqua fort dicitur) decoquentes usque ad medietatem: quatuor uncias ligni minutatim incisi, & per quatuor horas in duodecim libras aquae infusi: secundum illud idem lignum in triginta libris aquae usque ad tertiae partis consumptionem igni lento etiam coquentes. Quae eadem ratione smylacem praeparamus, primo decocto mane & vespere utimur, ut sudorem moveamus: secundo vero in prandio & coena loco aquae consueta. Quod tertio quoque die faciendum est: ubi adverte in his decoctis recte administrandis naturam, statem, & tempus anni esse considerata. Nam si haec calida sint, in decoctione miscenda, quae temperent caliditatem horum medicamentorum, qualia sunt borrago, & endivia: si vero frigida, quae aliquantulum augeant calorem, stechadam, maieranam & similia miscebis. Neque oportet hoc in loco aliquorum consuetudinem sequi, cum syrupis humores praeparanti-

Quando bus miscent senam & alia medicamenta purgantia. Ex Hippocrate liceat in enim didicimus, coctionem postulare quietem. Aliquando tamen, morbo quando scilicet hic morbus totum habitum corporis occupavit, possumus cum multis evacuationibus per cutem, urinam, & alium praecedente semper purgatione. Quae ratione hoc decocto utimur aliquando. **Gallico** **multis** **uti eva-** **cuatio-** **nibus.** ℞. polypodij, senae & hermodactylorum ana ℥. j. ℞. radicum diureticarum ℥. ij. & borraginis sumi terrij, cicorea, agrimonie an. man. j. ligni sancti minutatim incisi & smylacis asperae ana ℥. iij. sena, Polypodium, & hermodactyli ponantur in ligatura, & decoquantur omnia in duodecim libris aquae usque ad medietatis consumptionem.

Præterea cum decoctum propinamus, an victus in principio debeat esse tenuis aut crassus non caret controuersia. Itali (sicut in morbis acutis efficere solent) victu utuntur crasso, usque ad diem decimum quartum gallinas, hepata gallinarum, lactes, hados & similia concedentes: at postea panem biscoctum solum, aut cum uvis passis. Hispani contra victum tenuem laudant in principio, crassum vero procedente morbo, eoque in progressu morbi praecurantur multae evacuationes, quas non poterit agrotus inedia utens tolerare. Melius tamen faciet, qui cum distinctione cibabit: in robustis utens Italorum victu, at Hispanorum in his, qui vires habent languidas.

Curatio Si fuerit antiquus & curatu difficilis, quando tumores & dolores per unguenta. dum est ad unctiones factas unguento ex Mercurio, seu argento vivo parato: solet autem argentum vivum multis modis parari primo e ratione qua docuit Vigo suam praeparare pulcrum assumendo argentum vivi praevium, idque in alambico vitreo collocantes, cum certa quantitate eius aquae, qua curifices autem ab argento separant eo usque percoquentes, donec tota humiditas assupta sit, & massa remanet: qua rupto viro

extractio

extracta precipitatum dicitur. Quo utendū non est in vnguentis, quæ solent ad morbum Gallicum parari: ob eius vehementiā qua exiccat corpus, ita ut febrē inducat hecticā. Iacobus Syluius corio preparat: ponit enim argentū viuum in corio, & exprimit, assumitq; eam portionem, quæ coriū penetravit, quia tenuis est: reliquam crassam tanquam inefficacem relinquens. Aliqui preparant coquentes illud cum aceto. Alij ipsum vrunt in vitreo vase sine humore aliquo. Mathiolus preparare solet argentū viuum & precipitatum Vigonis, aqua plantaginis vel solani, quod nonnulli tanquam rem secretam seruant. In hac Valentina ciuitate preparamus argentum viuum cum axungia porcina, quia hac eius motum retardat, tum quia nolumus vrere medicamentum, quod sua frigiditate debet agere. Vnguentum ergo huic rei accommodatū non potest describi, quia pro vario affectu, natura & tempore, variè solet parari: vsui tantum tamen nobis hoc est.

℞. Mercurij ℥. iij. ss. extinguatur in axungia porcina sine sale exa- Vnguen-
ctissimè, olci laurini & vulpiniana. ℥. ij. cineris vitis ℥. j. ss. theriaca tum ex
magna ℥. ss. mastichis, & thuris an. ℥. iij. cerusa ℥. j. ss. misce, & fiat argento,
linimentum ad modum vnguenti: huius compositionis basis est Mer- viuo.
curius, axungia illud extinguit, hoc est facit, ne hinc inde moueatur,
& simul temperat ipsum sicut thus & theriaca magna: cinis facit
ipsum penetrare & exiccare vlcera, olea discutiunt, cerusa verò ob
corpulentiam additur, hoc vnguento inungenda est pars, aut articuli.
Neque audiendi sunt, qui existimant humorem, qui tumorem in cute
generat, per eandem partem esse euacuandū, cum per ipsam impetum
faciat: nullum enim inuenies medicamentum, quod eius crassitiem
attenuet, præter hoc vnguentum. Argentum enim viuum adiutum
aliis medicamētis, ex toto corpore euacuat, suāque frigiditate humo-
res ab habitu corporis repellit interius ad loca euacuationi accommo-
data. Mathiolus (quem multi sequuntur) ex puluere Vigonis, aqua
plantaginis extincto, pilulas cōstruit ex granis quinque istius pulue- Pilula
ris, electuario diamargariconis frigido, confectiōe Gentilis cōtra me- Mathio-
lancholiam, & syrupo aliquo. Alij bonum componunt ex precipitato li dam-
& cardiaca confectiōe. Abstineretamen oportet ab his, neque per os nantur.
assumenda sunt, eo quod exiccant partes principes, & dissenteriam
sapissimè inducunt. Si enim habemus medicamenta, qua humorem
securè purgant, cur purgabimus cum periculo? Aliqui hunc morbum
curant suffitu ex cinnabrio vulgò vermillo: quo etiam medicamento Curatio
ob vehementiam non vtor. Quid si eo utaris, caue te inspiretur va- per suffi-
por, quia est infestissimus thoraci & nervis. tum:

De vlcerebus capitis manantibus, quæ à Græcis acho-
res, & à iunioribus barbaris tinea dicuntur. Et de cu-
ratione pediculorum capitis, & aliarum partium.

DE CVRAND. MORB.

CAPVT III.

Descriptio ulceræ capitis manantium. **Q**uas Græci Achores dicunt, Plinius manantia capitis ulcera appellat Vulgus, quia vestium tineis simillima sunt, capitis tineas nominavit. Est autem, autore Paulo, hic morbus affectio quædam capitis tenuissimis foraminibus cutem perforans, quibus glutinosus humor depellitur. Causam habet nitrosam, salisamque pituitam, seu mixtum quendam humorem, qui partim tenuem saniem ac mordacem, partim verò crassum succum in se habet: vnde si qui excernitur humor tenuis sit biliosam dominari saniem coniicimus, si crassus, atque glutinosus, pituitam. Pediculorum verò generatio, quam perdiculationem Latini, Græci phthiriasim nominant, à calidis fit humoribus, crassis tamen, sed cutim subeuntibus, atque in eius profundo pediculos generantibus. Quod plurimum etiam iuuat, & immundities, & crassorum ciborum, earumque rerum usus, quæ excrementa ad cutim detrudunt, ut ficius. Morbus per se patet.

Curatio. **V**ictus. Curatur primò hic morbus victu temperato in actiuis, & humido, & alimentis boni succi: ut pullo gallinaceo, gallina, & similibus. Omnia quæ atram bilem generant, maximè nocent: de quibus capite superiori de curatione morbi Gallici abundè dictum est.

Concoctio. **S**ecundò materiam apparentibus his, & similibus. ℞. syrupi fumarie. S. borraginis. an. ʒ. iij. rhodomellis, syrup. endiuie compositi. an. ʒ. ij. misce. Item. ℞. decocti borraginis, fumarie, radicis buglossæ, & petroselini addendo parum epithymi libram vnam semis.

Purgatio. **T**ertiò, vacuantibus per medicamenta conferentia, quæ humorem terrestrem mixtum cum seroso tenui purgant: de quibus superiori cap. disputauimus, ut ℞. diacatholiconis. ʒ. vj. confectionis medicaminis Hamec. ʒ. iij. diachartami & electuarij de succo rosarum an. ʒ. j. syr. buglossæ. ʒ. j. aquæ borraginis quod s. misce, fiat potus. Præter hanc primam purgationem est utilis & necessaria levis purgatio, bis saltem in mense, inter quas accipiat electuarium diarhodonis abbatis, vel conseruam borraginis cum decocto, vel aqua buglossæ, vel borraginis. Hæc & similia tollunt nocumenta, quæ ventriculo, hepati, cordi, & toti corpori inferre solent purgantia medicamenta, fiat levis purgatio per pilulas has. ℞. pilularum indurum. ʒ. iij. agarici trochiscati. ʒ. ij. cum aqua buglossæ, fiant pilulæ quindecim: adde diagridij. ʒ. decem, & aurentur ad usum, tres pro dosi. Si non potest deuorare pilulas, utatur hac

mixture

18

mixture. ℞. diacatholicon. & diasenæ : an. ʒ. j. diacarthami & confectionis medicaminis Hamec. an. ʒ. ʒ. agarici trochilcati ʒ. ij. syr. borraginis. q. s. misce, & fiat confectio : dosis cochlearia duo.

Quartò, vacuantibus à parte affecta per loca propinqua, videlicet, per palatum & per nares: vt si succus ficlæ adinouetur naribus, vel puluis piperis, vel mandat mastichen, vel alia composita de quibus capite de apoplexia abundè dicemus.

Quintò, repellentibus, & astringentibus, si incipiant achores, *Repul-*
quod lotione assidua partis affectæ, decocto baccharum myrti, *sio.*
plantaginis, rosarum, portulacæ & similium fiet: vel vngatur bis
in die hoc vnguento. ℞. vnguenti albi. ʒ. j. ʒ. vnguenti rosati san-
talati. ʒ. ʒ. misce.

Sexto, cum morbus est in augmento, vel vigore, per ea quæ materiam partis affectæ extrahunt, & dissolunt: primo fiat lotio decocto vrticæ, lapathij, fumaricæ, fœnugræci, camomillæ, & similium, raso prius capite: & vngatur hoc vnguento. ℞. succi lapathij. ʒ. j. olei camomillæ & laurini. an. ʒ. j. ꝑ. olei rosarum. ʒ. ꝑ. aceti cochlearium j. sulphuris. ʒ. ij. tuthiæ, spumæ argenti. an. ʒ. j. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum. In hoc ulcere & aliis capitis affectibus laudantur à Galeno primo de compositione medicamentorum secundum locos, & à Paulo 3. lib. & ab Ætio. 6. sermone multa medicamenta: semper tamen à clementioribus est incipiendum, ut sunt duo superiora. In infantibus tamen omnia sunt suspecta, nisi quæ sequuntur. Primo post rationem victus nutricis debitam, capiti infantis sæpe admouentur semen sesami mansum, vel medulla, seu interior pars ossium mali perfici, vel frictio sæpe fiat carne porcina veteri cum cuti, decocta vino albo. Hæc conferunt ad dolorem, & impediendum inprementum, quamvis omnes ferè cutanei morbi capitis impediant epilepsiam futuram in ipsis. Cum agroti novem iam, aut decem annos nati sunt, fueritque hic morbus confirmatus, & factus ab humoribus adultis similiter, & crassis, cuti adeò contumaciter adhærentibus, ut in se quippiam schirrosum habeant, hi post vacationem egent medicamentis valentioribus, de quibus Gal. Paulus, & Aërius locis iam dictis satis plenè scripserunt. Inter quæ sal, sæx vini adusta, & arsenicum laudantur, & alia his similia, sequens tamen medicamentum spectatum & probatum est in tinea, & aliis vetustis ulcerib. ℞. utriusque hellebori, sulphuris vivi, atramenti, auripigmenti, calcis viuæ, vitreoli aluminis, gallarum, fuliginis, cineris clauellatarum an. ʒ. j. argenti

DE CVRAND. MORB.

*Vnguen-
tū nite.* ꝑ. argenti viui extincti, viridis æris. an. ʒ. ij. fiat ex his puluis, & cum sequentibus misceatur. ℞. succorum borraginis, scabiosæ, fumi terræ, & lapatij acuti an ʒ. j. ꝑ. bulliant omnia, & adde fæcis olei antiqui ʒ. iiii. aceti ʒ. ij. picis liquidæ ʒ. ij. ceræ, quod ꝑ. misce, & fiat vnguentum quo sine dubio curabitur hic morbus, dummodò post curationem ipsam fiat bis saltem in anno corporis euacuatio, ne natura assueta emittere à toto ad caput, iterum expellat. Hoc quoque vnguentum est optimum. ℞. gal-
larum ʒ. iij. feminis cuscutæ ʒ. ij. arsenici rubri, aristolochiæ an. ʒ. iij. salis armoniaci, fuliginis furni, sulphuris, amygdalarum amararum, colocynthidis, radicis papaueris, foliorum fici, foliorum oliuæ radicis arundinis viridis, aluminis, siephmemimitæ, myrrhæ, aloë, olibani an. ʒ. j. ꝑ. fiat ad formam vnguenti cum aceto ad solem.

Historia. Hoc quoque est probatum, & habet minorem vim & intrepidè potest medicus vti eo. ℞. cineris capillorum humanorum ʒ. j. corticum auellandarum combustarum. ʒ. j. ꝑ. fæcis olei ʒ. iiii. mellis sine spuma ʒ. iij. myrrhæ ʒ. j. ꝑ. aloës ʒ. croci ʒ. iij. misce, & fiat vnguentum. Primum ex tribus iam dictis est potentius, & eo liberata fuit quædam iuuenis, quæ quatuordecim annos laborauit hoc morbo.

*Curatio
cū pileis.* Curatur etiam hic affectus à multis doctoribus, & à nostris fœminis nouem pileis, hac forma. Accipe pannum cæruleum lancum, super quem expende picem nigram, & resinam pini, & impone capiti raso, actu calidum: ibique adhæreat nouem diebus, deinde violenter extrahatur pileum adeò, vt pili euellantur saltem vulsellis, quas vulgò pinças vocamus, vel aliis ferreis instrumentis: postea lauetur caput decocto rerum dictarum, addendo parum hederæ: deinde imponatur secundum pileum eadem forma: & eodem modo imponatur tertium, & quartum, vsque ad nonum, seruando eundem ordinem, & modum in omnibus. Curabitur dubio procul, & forsan perpetuò habebit pilorum glabritiem, non secus ac si esset verum caluitium: semper tamen saltem per annum ab hac curatione fiat frequens corporis purgatio.

*Curatio
pedicu-
lorum.
Victus
ratio.
Sectio
vena.* Pediculi interficiuntur, & prohibentur ne fiant: primò debita ratione victus per ea, quæ bonum gignunt succum, & sanguinis corruptionem impediunt, & excrementorum augmentum: quare nimia copia ciborum, & eos immoderatus sumentium ordo nocet, similiter & ocium, & alia multa de quibus in libris de tuenda sanitate, & libello de bono & malo succo agit Galenus. Secundò per sectionem venæ iscorariæ, præcipuè, si sint rubri pediculi, aut corpus sanguineum. Teriò vacuantibus

mate

in materiam putrem, à qua fiunt, per medicamenta propria humori, præcedenti illius concoctione per accommodata medicamenta: de quibus omnibus j. cap. dictum est: semper tamen prius est cognoscenda causa per sua signa. Quandoque sola vestium mutatio satis idonea est ad curationem morbi huius. Quartò post vacuationem curatur balneis aquæ marinæ, vel decocti lapathi, hederæ, absinthij, lupinorum, & similium. Quibus si addas parum hellebori & staphisagriæ, maior vis inerit balneo, seu lotioni. *Purgatio. Balnea & lotiones.*

Multa sunt, quæ pediculos necant, ut argentum viuum mixtum cum sanguine porci, & admotum scapulis, & parti mediæ inter thoracem & ventriculum. Hoc vnguentum potenter eos necat, si cum zona imponatur corpori, maximè si partes multæ corporis eo vngantur. ℥. olei ʒ. iij. Mercurij extincti ʒ. j. ceræ ʒ. β. misce, & fiat vnguentum. *Necatio pediculos: Vnguentum.*

De dolore capitis à quacunque causa contingat.

CAPVT IV.

Dolor capitis, quem cephalalgiam Græci vocant, barba-
 ri sodam, affectus est caput infestans, qui si diuturnus sit, cephalea appellatur: graue quidem malum est, & quod vel leui occasione vehementes excitet accessiones, ita ut neque strepitum, neque vocis ullius vehementiam, neque splendorem tolerare possit infirmus: sed obscuritatem, tranquillitatemque intra cubiculum quærat, idque ob doloris vehementiam: quippe malleo se nonnulli percuti arbitrantur, alii caput distendi, alii aliter affliguntur: idque aut media solum capitis parte, & hemicrania dicitur: aut omnibus simul, atque adeo vel intra caluariam vel extra, quod inde diiudicare poteris. Quibus enim intra caluariam morbus est, iis ad radices oculorum morbus porrigatur. *Descriptio & diuisio doloris capitis.*

Prouenit generatim hoc malum, aut ob nudam intemperiem, aut ob succorum redundantiam, aut ob intemperiem simul, & succorum copiam, nonnunquam per consensum aliarum partium: sæpè etiam à causis externis (quas procatarticas dicunt) ut vltione, frigore, ictu, & ebrietate, aliisque huiusmodi. Si ab intemperie sola acciderit, à frigore quidem, atque calore obortus capitis dolor vehementior erit, ab aliis qualitatibus remissior: aut fortasse nullus, nisi frigus aut calori coniungatur. Communem autem notam habebit à quacunque fiat intemperie, quod nulla aderit grauitas. *Causa generales. Causa solius intemperiei. Signa solius intemperiei.*

in capite : quæ semper, cùm ab humore fit capitis dolor, adesse solet. Si à succorum redundantia contingat dolor : capitis, si quidem à sanguine, causam habet immoderatam victus rationem sanguinem generantis, vel quod ab euacuationibus, & exercitiis, aliisque rebus eius copiam minuentibus cessauit.

Causa sanguinei doloris. infirmus : cognoscetur id per has notas, rubor in facie adest, & oculis : venæ distenduntur, non maiores tantùm, sed etiam minores adeò, ut quæ præ tenuitate nullam sui phantasiam præbebant conspicuæ fiant. Pulsus magnus vehemens ac plenus, vrina subruffa, & crassa, dolor capitis grauans. Si à bile, hunc efficere possunt capitis dolorem, quæcunque immoderate vniuersum corpus, atque adeò caput & calc faciunt, & siccant & bilis insuper copiam coaceruant : cuiusmodi sunt ira, dolor sollicitudo, vigiliæ, labor, exercitatio, inedia, abstinentia, cibi bilem procreantes, ætas vicens, hominis temperamentum biliosum, æstas, atque alia id genus. Qui sic affecti sunt, dolore acriore, magisque pungente, quàm superiores tentantur : os his amarescit, sitiunt, & generatim omnia quæ bilem generare diximus, pro notis sint : quin ea quoque, quæ in iis quos calor solis infestat, reperiuntur : accidit autem ipsis morsus interim maior, & pallor faciei, siccitasque oculorum, & narium, & linguæ. Si à pituita, quæcunque pituitam in capite coaceruant, hanc peperisse affectionem certum est, ut holera, fructus, pisces, lac, aer frigidus, vitæque nullis negotiis impedita, ac deserta.

Causa doloris à pituita. Quæ omnia considerare oportet, & insuper ægri temperamentum, ætatem, anni tempus, & faciei alborem, ut ab his in morbi notitiam deducamur. Demum si à melancholia, causæ, & signa ex capite de melancholia petenda sunt. Si per consensum dolor capitis fiat, à ventriculo, ut plurimum oritur, sæpè etiam ab aliis partibus, ut vtero, hepate, & splene : ubi consideranda sunt signa, quæ primogeneam affectionem ab ea, quæ per consensum est, distinguunt : ea sunt, quod pars quæ per consensum aliam infestat, prior ipsa laborat, & pro modo intensiōis & remissionis eius morbi, quo ipsa afficitur. Illa similiter, aut intentius, aut remissiùs affligitur : adde quòd hæc iugiter, illa quæ per consensum & sympathiam ægrotat, non necessariò semper, sed per interpellationem con-

Causa & signa doloris capitis à causis externis. dolet. Affectiones verò, causæ ; & signa partium, à quibus per sympathiam caput laborat, ex propriis capitibus desumenda sunt. Si à causis procatarëticis, nempe ab vltione, aut calore, causas ex sermone laborantis venabimur, cuiusmodi sunt longior in sole mora, aut in balneo, ira, exercitium, rerum cali-

calidarum, odoramenta, & flammæ vicinitas. Indicium laborantium cute attactu calida, & primo statim manus iniectu aridiore quamprimùm elucet. Sic præterea affecti, præsertim qui ob ardorem laborant, rubris admodum sunt oculis. Si ab aliis fiat causis externis dolor capitis, eadem utemur methodo, causas ab ægro exquirentes. Quibus scitis, morbus proculdubio constabit.

Curatur sex remediorum generibus dolor hic, sit à sanguine fit: primò victas ratione frigida, & sicca, videlicet aëre (si naturalis non sit) arte refrigerato herbis, floribus, & aquis cum aceto, vtrosi, myrto, plantagine, violis & similibus. Cibus sit frigidus, & qui paucum generet sanguinem, vt sunt, lac amygdalarum dulcium parum tostorum (ne oleum earum noceat capiti) ptisana hordeacea cum iure pulli gallinacei, si opus fuerit, lactuca cocta, & postea cum aceto rosato, similiter cucurbita, & cichorea, & similia maximè conueniunt. Quæ sanguinem multum augent, & calefaciunt, nocent, vt caro & oua. Magis etiam quæ vaporosa sunt, vt vinum, cruca, sinapi, cæpe, & alia prima mensa iuuant, quæ aluum lubricant, vt pruna damascena, & vix passæ sine granis. Secunda quæ prohibent vaporum ascensum, claudendo ventriculi orificium, vt sunt caro malorum cotoneorum saccharo condita, mala cotonea, & pira tosta, & coriandrum præparatum.

*Curatio
sanguini
doloris.
Victus.*

Secundò, sanguinis missione, præcedenti ventris lenitione per hunc clysterem, vel similem. ℞. maluarum, foliorum violarum, siclæ, furfuris, mercurialis. an. m. j. fiat decoctum, de quo accipe vncias quindecim, cui adde olei violarum 3. j. olei rosarum 3. iij. cassiæ fistulæ præparatæ & diacatholicanis an. 3. j. salis 3. misce, & fiat clyster. Facta iam ventris vacuatione, scindatur, si fuerit plenitudo totius, media vena, quæ rectitudinem habet cum capite, quia ad cephalicam terminatur & ab hepate vacuat per iecorariam, & mittatur sanguis respondens plenitudinem. Si verò non fuerit plenitudo totius, cephalica secetur, nisi ex suppressis mensibus, & hæmorrhoidibus dolor factus fuerit. Tunc enim tibiæ, vel pedis vena incidenda est, scilicet vena media primò & secundò humerali, si oportuerit.

*Sanguinis
missio.*

Tertiò, repellentibus sanguinem fluentem ad caput potestate & actu frigidis, si fuerit in æstate, & æger inuenis: & in hyeme & sene tantum potestate frigidis, qualia sunt aqua, aut succus rosarum, endiuix, portulacæ, lactucæ, plantaginis, semperuici, solani, singula per se vel mixta cum illis, aut

*Repul-
sio.*

DE CVRAND. MORB.

*Contra
indican-
tia.*

cum aceto, & oleo rosarum futuræ coronali facta rasi-
one sæpè admoueantur, vel ab alto in modum torrentis impellan-
tur ad maiorem penetrationem, quamvis Galenus ea in par-
te capitis statim sensit citissimam clarissimamque refrigera-
tionem sola infusione rosacei frigidi. Hæc tamen repel-
lencia, astringentia, & roborantia partem affectam, nocent,
si fuerit febris. Inhibent enim transpirationem febrilis va-
poris, augentque febrim: nocent quoque cum materia iam par-
tem obsederit, quia ibi eam detinent. Denique si fuerit ce-
phalalgia cum catharro nocent, quia per compressionem eam
augent.

*Purga-
tio.*

Quartò, purgantibus bilem flauam turgentem, aut proxi-
mam turgenti medicamentis cholagogis. Pars enim calidior,
& tenuior sanguinis in bilem conuertitur. Medicamenta hæc
simplicia, & composita multa sunt, de quibus capite 1. egi-
mus. Vnum tamen est maximè notandum, huic affectui præ-
ter naturam non conferre purgantia medicamenta vehemen-
tia, quæ malefica & insalubria dicuntur, sed bona & salu-
bria, vt cassia fistularis, manna Arabum, tamarindi, pruna
damascena, rhabarbarum, & mirobalani citrinæ. Prima enim
calefaciunt nimis sanguinem, & cum ad superiora mouent.

*Salu-
bria me-
dicamē-
ta qua.*

Altera verò sanguinis feruorem tollunt, bilémque benignè
vacuant: ℞. cassiæ fistularis recens extractæ, & medullæ
tamarindorum, an. ʒ. ʒ. rhabarbari electi infusi per noctem
in qua indiuiæ 3. j. ʒ. decocti florum cordialium, pruno-
rum damascenorum, iuiubarum, & drachmæ vnius corti-
cum myrobolanorum, citrinarum quod sufficit, misce &
fiat potus, cui adde syrupi violarum ʒ. j. Si non possit bibere
potum, vel amat magis pilulas, accipiat ʒ. j. pilularum de
rhabarbaro. vel 3. j. pilularum de hiera. S. hæc purgant sine
nocumento.

*Potio.

Pilula.*

*Sectio
vena ad
deriuā-
dum.*

Quintò, sanguinis missione ex vena frontis vacuante ma-
teriam sanguineam à parte affecta, & materiam biliosam, &
sanguineam in capite fixam digerentibus, seu clementer re-
soluentibus: qualia sunt forus capitis ex seminibus althææ,
fœnugræci, lini, floribus camomillæ, meliloti, & similibus
in sufficienti aqua coctis. Oleum camomillæ, vel de semine
lini, vel lumbricorum, si capiti admoueatur idem faciet. Simi-
liter si pullus gallinaceus, vel parvus canis, vel pullus colum-
borum recens per spinam scissorum, vel pulmo arietis actu
calidus.

Topica.

*Alterā-
tio.*

Sextò, remediis frigidis sanantibus intemperiem calidam
relictam in capite ab humoribus calidis: qualia sunt quæ dixi-
mus

mus in tertio genere. Hoc quoque vnguentum est optimum inter hæc genera remediorum. ℞. olei rosarum ℥. j. olei violarum ℥. ℞. mucilaginis, psyllij ℥. iij. aceti rosati cochlearium. j. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum.

Biliofa cephalalgia eisdem sex præsidiorum generibus curatur: primò victu refrigerante, & humectante, prohibente generationem bilis, aut genitam temperante: qualis est victus febricitantium febre biliosa, frigidior tamen sit victu laborantium cephalalgia sanguinea. *Curatio biliosa, Victus.*

Secundò, venæ humeralis sectione, præcipuè si dolor sit vehemens reuulsionis gratia, ne fiat inflammatio in membranis cerebri, minor tamen copia sanguinis euacuanda est in hac, quàm in sanguinea. *Reuulsio.*

Tertiò, concoquentibus materiam biliosam medicamentis annotatis primo cap. & his: ℞. syrupi rosarum ℥. iij. oxy-saccaræ. S. ℥. ij. misce. Item ℞. aquarum cichoreæ, endiuix, & acetosæ an. ℥. iij. misce, vel ℥. ix. decocti prædictorum, vel similibus medicamentorum. *Concoctio.*

Quartò, vacuantibus bilem medicamentis cholagogis, de quibus vide caput primum ut hoc. ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ, & medullæ tamarindorum. an. ℥. s. rhabbari electi infusi per noctem in aqua endiuix. ℥. iij. squinantij. ḡ. iij. diaprunis solutiui ℥. iij. syr. violarum ℥. j. decocti florum cordialium quod s. misce, & fiat potus: vel si abhorret à potu. ℞. pilularum de rhabbaro, & assaiaret. an. ℞. s. diagridij ḡ. iij. cum aqua buglossæ, fiant pilulæ septem, & auerentur. *Purgatio.*

Quintò, & magis tertio post secundum genus repellentibus & refrigerantibus frigidis etiam actu, de quibus diximus in curatione sanguineæ cephalalgix: quamvis in hac frigidiora conferant. *Repellentia.*

Sextò, calidam intemperiem alterantibus frigidis, sincipiti Reverso ex alto inflictis: qualia sunt iam dicta in curatione sanguineæ cephalalgix, & fortiora usque ad narcotica & stupefacientia tactum. His tamen cautè utere, ne noceas parti principi, & frigidæ, soporémque altissimum inducas, à quo pauci liberentur, sed quomodo eis & quando sit utendum, capite de curanda phrenitide demonstrabitur, & cap. de colico dolore. Naribus quoque sunt admouenda frigida, ut aqua rosata, & similia, non nostra camphora, quia calida est. *Refrigerantia.*

Pituitosa cephalalgia eisdem sex remediorum generibus curatur. Primò, victu calefaciente, & siccante, ut aëre æstiuo, vel arte facta per ignem, ac suffitu cinnamomi, caryophyllorum, *Curatio pituitosa.*

DE CVRAND. MORB.

Vitæ.

lorum, & similibum aromatum, vel anthos, vel calendulæ, vel aliorum similibum. Cibus sit panis fermentatus & salsus, habens parum anisi: vel melanthij, vel saccari, vel sit bis coctus. Carnes sint musculosæ, & auium montanatum, & animantium, quæ exercitio vtuntur, & non sint pituitosa. Piper, & alia aromata maximè conferunt, & omnia calida, nisi vaporosa sint: vt allium, cæpe, & similia: hæc enim nocent, quia caput feriunt, & vapores sursum ferunt. Quare sinapi, cruca, & crocus (nisi in parua quantitate vt medicamenta) lædunt, pisces, berbæ frigida, & ledumina, ciceribus demptis, & tandem pituitosa similiter nocent.

*Vaporo-
sa vitæ-
da.*

*Conco-
quentia.*

Secundo apparantibus pituitam, attenuantibus, & incidentibus: de quibus 1. cap. vt hoc, vel simili. ℞. rhodomellis ℥. vj. oxymellis S. iij. misce. Item. ℞. decocti saluæ, fœniculi & petroselinii lib. j. ℞.

*Vacuan-
tia.*

Tertio, vacuantibus pituitam medicamentis phlegmagogis, de quibus cap. 1. & hoc ℞. diacatholiconis ℥. v. agarici trochiscati. ℥. j. diaphæniconis. ℥. iij. rhodomellis. ℥. j. aquæ fœniculi q. s. misce & fiat potus: vel si magis amat pilulas. ℞. pilularum assaiaret, & cochiarum an. ℥. ℞. diagridij ḡ. iij. cum aqua sticados, fiant pilulæ septem: & aurentur, si fuerit diues. In hac cephalalgia bis & ter est necessaria purgatio, secunda vehementior prima per pilulas cochias, & tertia vehementior secunda per pilulas cochias, & foetidas, vel de oponaco, vel serapino, aut per potum ex electuario indo maiori, & hiera logodionis & aliis similibus, præcedenti maiori concoctione ante secundam purgationem per syrupos de duabus radicibus, & de sticados, & oxymelli compositum, & decoctum rerum calidarum: & ante tertiam purgationem præcedat maxima concoctio per syrupum de quinque radicibus, syrupum de sticados S. & oxymel squilliticum cum decocto rerum intensè calidarum: vel aquis, vt sunt saluia, ros marinus, sticados, arethum, origanum, & similia. Et quia hæc cephalalgia diuturna est, præter has tres purgationes magnas utilis erit, & necessaria purgatio frequens sine custodia, clementior siue per scrupulum vnum pilularum cochiarum factis tribus pilulis, siue per cochlearium electuarij indi maioris, vel huius mixturæ. ℞. diaphæniconis & diacatholiconis an. ℥. j. agarici throchiscati & turbit gummosi an. ℥. ij. electuarij indi maioris ℥. ℞. rhodomellis. q. s. misce, & fiat confectio ad modum opiata.

*Auertē-
tia.*

Quarto reuellentibus, seu auertentibus deorsum pituitam, quæ sursum per imperum ruit: qualia sunt præter dicta

tertio genere, acres clysteres, & balani, seu suppositoria, de quibus capit. de morbo comitiali, & de apoplexia, & partium extremarum dolorifica vincula, & frictiones validæ, & lotio eandem partium decocto rerum capitalium: cuiusmodi sunt ros marinus, salvia, ruta, sticados, & origanum, & similia. Cucurbitulæ ceruici & scapulis affixæ sunt optimæ in hoc genere. Repellentia quoque remissa frigida, & calidis astringenti- *Repellē-*
bus mixta sunt vtilia: & etiam in lethargo cum Galeno 13. me- *tia cum*
thodi: vt ℥. aquæ rosarum ʒ. vna aceti ʒ. β. pulueris castorei *astrin-*
3. j. misce. *gētibus.*

Quintò, particularis euacuatio post prædictas, & post pri- *Deriuā-*
mam purgationem est necessaria per loca propinqua parti affe- *tia.*
ctæ, videlicet per palatum & nares: qualia sunt succus siclæ, aut maioranæ naribus instillatus, vel puluis piperis, aut sæpe man- ducet ex sequentibus apophlegmatismis, seu masticatoriis. ℥. pulueris mastichis 3. ij. pyrethri, zinziberis, & galangæ an. 3. j. cum syrupo de sticade, aut aqua maioranæ, aut cera fiant globuli ad magnitudinem lupinorum. De his tamen capite de apoplexia copiosius.

Sextò, dissipantibus pituitam capitis, & corroborantibus ventriculum, & totum corpus, ne iterum tanta copia pitui- *Discu-*
tæ gignatur. Electuarium, rosatæ nouellæ vel aromatici ro- *tientia,*
sati Gabr. vel diacimini multis diebus in aurora in quantita- *q̃ robo-*
te duarum drachmarum cum decocto, vel aqua, vel syrupo *rantia.*
capitali comedatur, dissipabit enim pituitam capitis. Idem facit diamusculus dulcis, vel amarus, vel theriaca magna, vel mithridatum. Hæc mixtura erit optima in hoc genere. ℥. diamusci dulcis ʒ. j. β. diambra ʒ. β. pulueris aromatici ro- *Mixtu-*
sati Gabr. pulueris diagalangæ, & rosatæ nouellæ. an. ʒ. ij. *ra utilis*
syr. de sticade q. s. misce & fiat confectio, cui adde theriacæ magnæ, & mithridati an. 3. j. dosis est cochlearium vnum cum aqua saluæ, vel sticados, vel his simili. Parti dolenti admo- *Topica.*
uenda sunt & vnguenta calida, & fots ex decocto rerum capitalium. Hoc vnguentum est optimum tunc ℥. olei rutæ & lauri an. ʒ. j. pulueris euphorbij, castorei, & sticados an. 3. *Vnguen-*
β. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum. In diuturno dolo- *tum,*
re, ne æger in pessimos cerebri morbos incidat, vel in suffusio- nem (quam cataractam medici barbari appellant) venæ tem- porum incidantur, sanguisque copiosè per eas egrediatur: hoc tamen auxilium, quamquam multis placet, mihi est sus- *Auxiliū*
pectum, quia periculosum est, & nostris temporibus inusi- *suspe-*
tatum. Et in eo vtile hoc potentiale causticum, si futuræ co- *sum.*
renali admoveatur. ℥. vnguenti rosati ʒ. j. cantharidarum ʒ. ij.

Cauterium.

3. ij. pulueris sinapis, & stercoris columbini an. 3. j. misce. Hunc antiquum dolorem curant multa, & parua actualia cauteria aurium. Alii cauteria actu futurae coronali admouent: hæc enim materiam partis dolentis extrahunt. Alii filo lineo, vel argento per ceruicem traiecto, quod setale vocant, hunc dolorem antiquum curant. Oleum pyrethri & castorei, si capiti admoueat, optimum est auxilium. Semen quoque rutæ cum castoreo, si cum vino & oleo decoquantur, & parti laboranti apponantur, erit præsens medicamentum. Idem potest efficere cataplasma ex centurea, betonica, & branca visina, si cum vino & oleo fiat.

Cephalalgia, quæ fit ab atra bile curatur, quemadmodum melancholia, de qua cap. 9. huius libri.

Curatio melancholia.

Curatio eius, quæ fit per consensum.

Cephalalgia per consensum totius, ut in febribus, vel partis alicuius, videlicet ventriculi, iecoris, splenis, vel matricis, curatur per præcisionem causæ prius curato morbo partis primò affectæ: nisi symptomata ad se curam trahant: horum tamen suis in locis fiet mentio. Sed quia frequentius fit per consensum ventriculi: tunc si sit multitudo bilis euaporantis, euacuetur. Et comedat panem succo malorum granatorum acidulcium, vel agrestæ, aut acetosæ intinctum, aut cum rob. malorum cotoneorum.

Curatio eius, quæ fit ab

ictu vel æstu.

Curatio eius, quæ fit ab

ictu vel casu.

Victus.

Sectio

vena.

Cephalalgia ab æstu curatur eodem modo, quo curantur cephalalgia sanguinea, & biliosa ultimo genere remediorum.

Cephalalgia à casu, vel ictu, curatur primò tenui victu, prohibente generationem tumoris præter naturam in parte affecta. Nutriatur ergo lacte amygdalarum, cucurbita, saccaro condita, uvis passis, pyris, & cotoneis rostitis: abstineat à carnibus & vino.

Secundò, sanguinis missione per sectionem venæ mediæ, si fuerit plenitudo: vel humeralis, si non fuerit. Si vulnus sit, consule doctum chirurgum. Si autem tumor fuerit absque vulnere, ab initio parti affectæ oleum rosaceum cum puluere myrthilorum & rosarum est admouendum: vel mica panis cum aceto, & aqua decocta cum eodem puluere: post tertium diem hoc medicamentum est necessarium. ℞. emplastri contra conquassationem, & oxicroci an. partes æquales, extendantur super alutam ad formam datam partis dolentis.

Curatio eius, quæ fit ab

ebrietate.

Cephalalgia ab ebrietate quandoque in mortem terminatur, aliquando non: quare ea, quæ Arist. tertia parte problematum docet, sunt maximè animaduertenda. Aphorismus quoque sextus quinti libri, & quinquagesimus sexti libri non est tradendus obliuioni, videlicet si ebrius quispiam repente

obmutuerit, &c. & quicumque sani dolore capitis, &c.

Victus.

Curatur hæc cephalalgia primò tenui, aut tenuissimo victu, & prohibente vaporum ascensum. Si vinum in ventriculo sit, ipsum euomere est necessarium frictione, aut titillatione radicis linguae, & oris: digitis propriis, aut calamo oleo madefacto, vel per potum vnciarum trium syrupi acetosi. S. vel per decoctum seminis raphani, aut seminis anethi cum syrupo acetoso. S. Si per vomitum vinum non egeritur, tunc per vnciam vnam hieræ. S. aut vnciam semis diaphæniconis euacuetur: deinde dormiat, postea balneum ingrediatur, & partes extremæ oppositæ vinculis & frictionibus dolorificis afficiantur, vt ad se trahant atque à parte læsa reuellant: & oxyrhodinum hoc capiti sæpè apponatur. ℞. aquæ rosarum ℥. ij. olei rosarum ℥. j. aceti ℥. ℞. misce. Brasicæ, præcipuè radix, prohibeat futuram ebrietatem, & curam factam. Vltimò alatur pullis gallinaceis, cum agresta, vel acetosa decoctis pyris, & malis cotoneis tostis, & in fine mensæ puluere coriandri cum saccharo. Potus sit aqua decoctionis coriandri præparati, aut brasicæ.

Vomitus.

Potio.

Oxyrho-

dinum.

In cephalalgia tamen antiqua siue continua, siue cum intermissione, necessaria est frequens purgatio per pilulas clementes, seu benignas, quales sunt de Hiera S. Galeni, & similes à cœna, vt vis earum citius & melius ad caput ascendat. Neque hoc pugnat Hippocrati neque Gal. licet Fuchsius in suis paradoxis aliter sentiat: miscuit enim Gal. succum aliorum cum medicamentis caput purgantibus. Quare Aëtius sexto sermone dum minuit croci quantitatem in Hiera, quoniam caput purgat, non est laudandus, neque crocus (vt ipse vult) caput multum percutit, cum, autore Plinio, qui crocum prius biberint, crapulam non sentiant.

Anti-

qua ce-

phalal-

gia cu-

ratio.

Fuchsius

Aëtius.

Scholium.

Dolor capitis, quem cephalalgiam.] Nomine capitis eas partes intelligimus, quæ cerebrum continent, proinde omnes siue externa, siue interne sint, considerande veniunt. Externa sunt, Pili, cutis, pinguedo, membrana carnea, & periostio, quod in hac parte Pericranium eius appellari solet. Cranion est pars media. Partes interna sunt dura & tenuis meninx, cerebrum, cerebellum, glandula osis cunei. Nervi orientes à cerebro, mamillares processus, & alia. Ex his partibus quædam sentiunt, quædam sensu destituuntur. Non sentiunt pinguedo, cranion & cerebrum, reliqua omnes sentiunt. Quamuis de venis, & arteriis controversia sit ob locum. Gal. qui habetur 16. de usu par. c. 12. ubi venas & arterias sensu omnino expertes facit: ille tamē locus corruptus tibi apparebit, si legas eiusdē lib. c. 2. illic enim partes sentiētes enume-

Caput

quid, &

varia

Pericranium

tes.

DE CVRAND. MORB.

Dolor rans non omittit venas, & arterias, sicut nec in multis aliis locis. **Dolor** symptoma est, actio scilicet deprauata sensus tactus, quia in eo obiectum percipimus aliter atque est. Morbus, ad quem sequitur, est soluta continuitas, manifesta, aut occulta. Manifesta fit à rebus contundentibus, & secantibus, occulta verò ab intemperie nuda, aut cum affluxu, dummodo sit calida, aut frigida, quia humida & sicca medio alio inferunt dolorem: fit etiam à tensione ab spiritu, aut humore facta. Quas omnes causas ad duas possumus reducere, externas, & internas. Dolorem capitis Gal. duplicem statuit. 3. de loc. affect. c. 9. distinctum ratione maioris, aut minoris, unum recentem, qui cephalalgia, & alterum inueteratum, qui cephalæa dicitur. In cephalalgia

Conside- ratione hac omnia considera. Primum à qua causa fiat dolor, ut ei rãda in prospiciamus. 2. an sit in partibus externis, an internis. Quia si est in externis, facilius curatur, neque postulat ita vehementia med. ut dolor à causa interna: praterquam quòd hic dolor requirit ea med. que curatio- penetrent, 3. An dolor sit proprius c. hoc est excitatus à causa existente in c. an verò sit per consensum: ita ut causa extra c. in ventriculo, iecore, parte alia, aut toto corpore: hinc enim habebimus cognitã partem, cui med. sunt applicanda. 4. & ultimum cui intentos esse oportet, est: An caput sit languidum, siue natura, siue occasione, ita ut facile suscipiat causas dolorificas. An verò sit robustum, afficiatur autem à magnitudine causa. Hoc enim animaduerso intelligemus, an caput sit roborandum necne. Signa causarũ doloris capitis in contextu leges.

Sanguis Curatur sex remediorum generibus.] Sanguis si causa est cephalalgie, sua multitudine distendens venas id prestabit. Proinde quomodo causa alimenti quantitas minuenda, ut paucus sanguis generetur: unde sit celeratio consuetudinis id faciat: non enim necessum est, ut plethora intemperies calida sit coniuncta.

Sanguinis missio. Secundo sanguinis missione.] Ante sectionẽ vena oportet clysters euacuare intestina, ne à primis venis substantia inutilis attrahatur. In cephalalgia sanguinea complexus est affectuum, sunt autẽ affectus dolor, & plenitudo. Ex his dolor rarò urget, ac proinde curato à causa, plenitudine scilicet est inchoanda. Plenitudo euacuationẽ postulat: cum autẽ ea que euacuant varia sint, inedia, frictio, balneum purgatio, & sanguinis missio: quo ex his utendũ sit, deliberamus ex methodo medendi, quã doctissimè Ludouicus Collado preceptor ex variis Gal. locis in sua Isagoge ad faciendã medicinam nobis tradidit. Cum ergo plethora sit affectus magnus, non poterit media, frictione, aut balneo euacuari, quia hac sũt parua remedia: postulabit ergo nõ purgationẽ, quia hac cacochymia debetur: sed sãguinis missionẽ, quæ citò & multum euacuat sanguinẽ redundãtem: atque hac est qualitas remedij. Quantitatem eius ex affectu, anni tẽpore, ætate, & aliis colligemus.

Occasio

Occasionem ex absentia cruditatis ventriculi, & animi deliquij, qua impellentia sunt. modū verò utendi hoc est ex qua vena sanguinem mittere oporteat colligimus ex loco affecto. Qui cū cerebrum sit, cephalicam secabimus, unde malè auctor basilicā incidere iubet. Quasi humeraria nō etiam euacuet ex vena caua, ac proinde à toto corpore possumus etiam secare communem qua à capite & basilica euacuet. Si dolor capitis ex suppressione mensium aut hamorrhoidarū oriatur, distingues. Nam si causa in capite fuerit iam coaceruata, cephalicam secabis: & deinde prædictas mouebis euacuationes, sedato dolore. Si verò tantū fuerit consensus, ex crure secabis venam. Quòd si dolor capitis sit cum mensium fluxione, tunc considera, an hac euacuatio sufficiat ad plethorā deponendam. Si sufficit, non est secanda vena: si non sufficit, ex cephalica eam quantitatem sanguinis euacuabis, qua unā cum illa menstrua euacuatione plenitudini satisfaciat.

Tertiò repellentibus sanguinem.] Et si sanguis possit discutientibus euacuari, id nō licet in principio, ne ipsū caliditate attrahamus: euacuabimus ergò medicamentis replentibus. Si distillatio cū dolore coniuncta sit, considera an sit vrgens: si dolor vrgeat, utere repellentibus, si vrgeat distillatio nō his, sed frictionibus, ligaturis, & similib.

Repellentia autem tregmati applicantur, ut per suturas penetrent. Repel-

Quartò purgantibus.] Si cephalalgia sit à plethora, nulla cacochimia coniuncta, non erit purgandum.

Secundò venæ humeralis.] Aliqui sentiunt in cephalalgia biliosa non esse secundā venam: ne agrū ducamus in ebullitione cholericorum, euacuato sanguine, qui est franū bilis. Hos omittimus tanquam barbaros in sanguinis missione non solus sanguis, sed etiā innatās bilis euacuetur. Nisi ergo multa sit quātitas bilis, & exigua sanguinis, est venā. in hoc affectu sanguinem mittimus, non ut bilem educamus, id enim purgatio prestat, sed ut reuellamus. Quia unā cum sanguine vitiosa quantitas bilis effluens minuetur, & contrarium acquireret motum.

Sextò calidam intemperiem.] In biliosa cephalalgia aliquando cogimur importunam vigiliam, & magnum dolorem corrigere, sapientes facultatem animalē: cauere tamen semper oportet ne intemperiem contrariam frigidam inducamus. Vtemur ergo decocto lactuce & seminis papaueris, miscentes chamemelum-caryophyllos, aut cinnamomum ob penetrationem: hisque irrogabimus caput. Si hac non possunt somnum conciliare ad radices. Mandragora, & hyoscyamum, aliāque fortiora, denuciemus. Ungemus etiam tempora oleo violaceo, aut papauerino, aut unguento populcone, ad litis gravis iij. aut iiij. spj. corrigentes opium oleo styracis, chamemelino & aliis.

Pituitosa cephalalgia.] Cū raro vires constent ob frigiditatem tota humoris, & cū cruditas sit in ventriculo, & habitu corporis: proinde in hac cephalalgia sanguinē non mittimus. Coquēda est ergo cruditas

Ad vigiliam.]

In pituita

DE CVRAND. MORB.

mitti- ditas primarum venarū rhodomelle oxymelle simplici, & mulsa, cū
mus sã- decocto fœniculi, capillorū veneris, & stecados in pauca quantitate.
guinem. Ea cocta purgabitur pilulis ex hiera, ex hiera etiā & mulsa. Crudi-
Purga- tatem verò vena caua fortioribus concoquemus, syrupis de hyssopo,
tio. serpillio, stecados: coctione apparente, valentioribus purgabimus, ut
Dolor docet auctor.

capitis Cephalalgia per consensum.] Dolor capitis aliquando contingit
per con- ob consensū totius corporis, qualis est ille, qui in febribus potissimū
sensum. biliosis excitatur, vtilagines enim tenues facile caput petunt. Distin-
gues ergo de febre, est enim intermittens, aut continua. In intermit-
tenti dolor capitis in hora accessionis excitatur. Tuncque non oportet
caput irrigare oxyrrhodino. Quia eius frigiditas detinebit vapores, qui
post accessionem dolorem conseruabunt, qui solet unā cum accessione
cessare, ac proinde euacuatione non eget: nisi voluerimus eo perdurāte
viti frictionibus crurum, & ligaturis. Si febris sit continua, aut habet
dolorem criticum, aut symptomaticum. Si dolor est criticus, nō est se-
dandus: si symptomaticus, distingue. Si dolor incipit unā cum febre,
curandus erit sectione vena, & repellētibus, ne dolor attrahat humo-
res ad caput. Si verò dolor non incipiat cum febre, sed post primam
aut secundam accensionem: si cessante exacerbatione cessat, non erit
curandus: si non cessat, curandus erit ob causam prædictam.

Cephalalgia à casu.] Aliquando in parte interna capitis dolor
citatur ex casu, cui admirabile est medicamentum à Guidone de-
scriptum. Quod ex iure gallina, aut (si est pauper) decocto intestino-
rum, aut ventriculorum (vulgò malcuinat) constat: in quo atteren-
dus est panis, fiat cataplasma, cui misce puluerem ex rosis, mirtillis,
coriandro preparato, baccis lauri, caryophyllis, cinamomo, loto odorato
(vulgò treuol) & aliis calidis.

De Phrenitide.

C A P. V.

Descri-
ptio &
diuissio.
Sedes
cerebri
diuersas
ledi
scribit.
Aëtius
ser. 6.
c. 2.
Signa.

PHrenitis inflammatio est cerebri, aut membranarum eius
cuius tres in vniuersum ponuntur differentiae à Gal. pro nu-
mero principum cerebri facultatum. Prima est, cū sola læditur
imaginatio, quæ in priore ventriculo sedem habet. Secunda, cū
ratio illæsis altis corrumpitur: quod in medio ventriculo fit. Ter-
tia, cū memoria amittitur manente & imaginatione, & ratione,
qui morbus posteriori cerebri parti inest, quæ omnia fusissimè à
Galeno tractantur iij. de loc. affect. Comitatur autem phreneti-
cos peruigilium: nonnunquam tamen inquietus & turbulentus
quidam somnus, ita ut subinde exurgentes exiliant, & vocife-
rentur. Cæterum si sanguinea sit phrenitis ridentes deli-
rant: si biliosa, velut furore quodam perciti sunt. Qui ple-
norem signorum notitiam desiderat, adeat Paulum libr. 3.

Oritur

Oritur autem phrenitis, aut à sanguine exuperante, aut à flaua bile cerebri substantiam, aut meningas eius imbuente. *Non-Causa.* nunquam per consensum à ventriculo fit, aliquando à toto, vt in febribus, & paraphrenitis vocatur.

Morbus igitur hic incipiens quinque auxiliorum generibus *Curatio.* curatur: primò victu tenui refrigerante, & astringente, vel aqua *Victus.* hordei, pilana hordeacea, aut succo malorum granatorum, vel limonum, aut lacte amygdalarum tostarum: cucurbita saccharo condita, radice buglossæ condita, pyris, aut malis coroneis tostis, vel lactuca, aut cichorea cocta, & cum saccharo & aceto preparata. Abstineat omnino à vino, & carnibus, bibat aquam hordei, nisi facultas esset imbecilla: tunc enim ius pulli, aut gal- *Quæ vi-* linæ teneræ est necessarium: in declinatione quoque & vinum *tanda* bene dilutum aqua. Aer si frigidus natura non est, arte refrige- *sunt.* retur & humectetur aqua rosarum, aceto, floribus, & herbis per arcam sparsis. Obscurus quoque sit, diuersi enim colores & figura nocent. Astantes blandè cum alloquantur, quandoque tamen acerbius ipsum increpare debent.

Secundò auertentibus, vt cephalica secta, si non fuerit plenitudo: nam si adsit, media aut cubiti vena hepatica est secan- *Auer-* da. Aliquando etiam tiliarum, aut pedum venæ sunt secandæ, *tentia.* videlicet si ex suppressis mensibus, aut hæmorrhoidibus genita fuerit phrenitis. Præter primam sanguinis missionem sæpe ne- *Sectio* cessaria est secunda, & tertia, vbi fuerit plenitudo, & morbus *venæ.* post primam & secundam sanguinis missionem augetur. Perpetuo tamen robur virium sit præsens, quo deficientes, vel si ætas fuerit ante decimumquartum annum, vel post septuagesimum, sanguis extrahatur per cucurbitulas cum scarificatione *Cucur-* inter scapulas appositas, quamuis præsentem robore virium extra *bitule.* hanc ætatem possit secari vena. Auertunt quoque cucurbitulæ *Fric-* sæpe ceruici, scapulis & partibus infernis admotæ. Similiter *tion-* frictiones, & vincula artuum & partium extremarum, & lo- *nes &* tiones tiliarum decocto rerum partim attrahentium, partim *vincula.* inducentium somnum.

Vacuatio quoque per medicamenta cholagoga præcipuè *Purgan-* salubria, & benigna auertit: vt hoc. ℞. medullæ calliæ fistu- *tia.* laris recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. iij. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuivæ. ʒ. iij. syr. violati ʒ. j. decocti florum cordialium, quod s. misce, & fiat potus. Si fuerit magna copia bilis, medicamenta purgantia valentiora, vt (electuarium de succo rosarum, & diaprunis solutiu) erunt necessaria, vt quinto genere auxiliorum dicemus.

Tertiò, repellentibus materiam fluentem, qualia sunt oxy-
dum, & rhodinum

**Repellē-
tia.** rhodinum ex parte vna aceti, duabus olei rosarum, & quatuor aquæ rosarum, & alia: de quibus capite de sanguinea, aut biliosa cephalalgia dictum est. Hæc omnia sincipiti sunt admo- uenda, vel ab alto infligenda, aut collo pannus lineus madidus liquore repellente est circumponendus, vt impediatur motus, & ascensus humorum. Omnia tamen hæc ante mutanda sunt, quàm incalescant. An verò intensè frigida actu oporteat esse, an remissè, dictum est capite de cephalalgia sanguinea. Odores frigida naribus adiungantur sæpe, vt aqua rosarum, acetum, violæ, mirtus, nenuphar, santali, & similia.

**Corrigē-
tia intē-
periem.** Quartò, corrigentibus calidam intemperiem à bile, aut san- guine bilioso relictam, & laxitatem viarum per quas ascendit, quæ sunt frigida & astringentia omnia, vt syrupus rosarum, de agresta, granatorum acidorum, & cotoneorum cum duplo aquæ rosarum, aut portulacæ, aut plantaginis, vel solani. Hæc & simi- lia sumantur mane, aut post cœnam, vt petant citiùs caput cum vaporibus à cibo elatis. Sincipiti quoque & fronti sunt admo- uenda dicta capite de cephalalgia sanguinea, aut biliosa.

**Digerē-
tia.** Quintò, digerentibus & vacuantibus materiam, quæ in meningibus superest per ea quæ bilem purgant, si non suffece- rit prima & vnica purgatio (de qua in secundo genere diximus) secundò per similia, vel valentiora medicamenta cholahoga, fiat vacuatio sumptis prius medicamentis concoquentibus bi- lem: qualia sunt iam dicta in superiori quarto genere remedio- rum. Capiti quoque ad materiam euacuandam, resoluendo admo- ucantur tertia quaque hora pulmo arietis calens naturali calore (si fieri possit) aut pullus gallinaceus, capo, canis par- uus, catulus, aut columbus per spinam sectus, & exenteratus, habens tamen calorem aliquem vitalem: & si supra hæc anima- lia sic parata apponatur parum pulueris sequentis, erit effica- cius remedium, somnūque inducet. ℞. florum camomil- læ, & meliloti an. p. ij. rosarum, violarum, & coriandri præ- parati an. p. ss. corticum papaueris albi ʒ. iij. contundantur omnia. Hæc resoluentia non conferunt, nisi in vigore & de- clinatione: ante tamen vigorem in ipso incremento est opti- mum auxilium ex alto in caput instillare lac humanum, aut caprinum actu calidum.

Pulvis. Et si vigilæ fuerint immodicæ, vt sæpe sunt, præsertim in biliosa phrenitide, ex alto infunde capiti hoc decoctum. ℞. hordei sine cortice ʒ. j. coriandri præparati, & corticum papa- ueris albi an. ʒ. ss. florum camomillæ, rosarum, & violarum an. p. j. radicis iuschiami ʒ. ij. fiat decoctum cum libris tribus aquæ ad dimidium. Quia per vigilas febris & inflammatio augen- tur,

**Admo-
nitio.** **Decura-
tione
sympto-
matum
huius
morbi.**

tar, facultasque omnis soluitur, summa cura oportet somnum *Vigilia.*
 conciliare: præter iam dicta, primò temporibus, & futuræ co- *Decocti.*
 ronali adinouendum est vnguentum populeonis: secundò in
 cœna vtetur iure pulli gallinacci, si opus fuerit, cum lacte
 drachmæ vnius seminis papaueris albi. Tertiò naribus sæpe
 instilla oleum violaceum, aut papauerinum cum granis tribus,
 aut quinque opij. Quartò adinoueaturo ano suppositorium mel-
 lis cum paucò opio.

Quintò, & vltimò: cū alia iam dicta non suffecerint, & mor-
 bus fuerit acutissimus, bibat drachmam semis vsque ad drach-
 mam vnā philonij Romani, dummodo non sit defectus ca-
 loris innati: quia ab his & similibus medicamentis narcoticis
 interiùs sumptis extinguatur paucus calor. Hæc tamen & simi- *Narcoti-*
 lia ante annum sunt pessima, & post annum, quo antiquiora, *ca qua*
 tanto meliora: vt docet Galenus duodecimo methodi. *meliora.*

Ischuria, seu vrinæ suppressio est alterum symptoma huius *Suppress-*
 morbi, cuius curatio capite proprio tradetur. Vnctio tamen ra *sio vri-*
 dicis penis, & pectinis oleo scorpionum cum cuniculi pingue- *na.*
 dine, & titillatio eiusdem penis promouet vrinam suppressam.
 Eandem suppressam mouent parietaria, & apium, & alia diure-
 tica vino cocta pectini admota.

Paraphrenitis est delirium non continuum, sed cum inter- *Para-*
 missione, symptomâque febris ardentis, & non inflammatio fa- *phreniti-*
 cta, sed fiens. Hanc febrem nostri medici proprietariam, seu ha- *dis cura-*
 bentem prauam & veneficam qualitatem appellant: cuius sym- *tio.*
 ptomatis curatio similis est fermè curationi phrenitidis, cum
 quæcunque curant morbum factum, curent & fientem, mitiori-
 bus tamen auxiliis hic affectus indiget Maior & prior cura est
 adhibenda feбри tanquam causæ, quam affectui: nisi symptoma
 ad se curam omnem traheret propter sui magnitudinem.
 Animaduertendum tamen est ne victus sit tenuis, vt in phreni- *Febris*
 tide absoluta, quia hæc febris propter malignitatem suam vene- *prius cu-*
 natam facultatem, & spiritum vitalem resoluit. *randa, si*

Quare maiori copia alimentorum eget, qui enim virili- *nil ob-*
 ter comedunt, liberantur meliùs à peste: nutriatur ergò la- *stet.*
 borans hoc symptomate iure gallinæ cum aqua carnis & suc- *Obser-*
 co agrestæ, aut acetosæ, aut malorum cotoneorum, aut limo- *na.*
 num, aut citri. Si fuerit magna imbecillitas, utilis & necessa-
 rius erit hic, aut similis huic clyster nutriendus & refrigerans,
 & purgans. ℞. iuris pulli gallinacci decocti cum hordeo sine *Clyster*
 cortice lib. i. cassiæ fistularis præparatæ si sit aluus dura) ʒ. j. *optimus.*
 olei violarum ʒ. iij. sacchari rubri ʒ. j. mucaginis psyllij aqua
 rosarum extractæ ʒ. ʒ. vitellorum ouorum numero 2. misce.
 d. 2. Præter

DE CVRAND. MORB.

**Os &
lingua
quibus
abluen-
da.
Electua-
rium.**

**Epithy-
ma.**

**Cardia-
ca confe-
ctio diui-
ribus.**

**Pauperi-
bus.**

**Mixtu-
ra.**

**Condi-
tum.**

Præter repellentia & reuellentia, siue per sanguinis missionem, siue per purgationem, & alia iam dicta superius, oportet humectare, refrigerare, & mundificare os & linguam, primò lacte amygdalarum dulcium, siue saccharo, & coctione: deinde mucagine seminis psyllij, & cotoneorum, aqua rosarum extracta, his sæpe & similibus os abluatur. Ad totius refrigerationem, & humectationem utile est electuarium diatrium santalorum, aut diarhodonis abbatis, aut diamargaritonis frigidi, si manè cum aqua endiuia aut buglossæ, aut iure pulli gallinacei refrigerato, hordeo sine cortice, aut lactuca, aut alia simili herba frigida sumatur aliquot diebus. Cor omni tempore, etiam ante vacuationem (quia non potest obstructione laborare, ut aliæ partes) hoc epithymate refrigeretur sæpe, atque adeò in horas.

\mathcal{L} . aqua rosarum \mathfrak{z} . iiij. aquarum acetosæ & buglossæ an. \mathfrak{z} . ij. aceti albi \mathfrak{z} . β . pulueris diamargaritonis frigidi & santalorum omnium an. j. misce. Ad calorem febris remittendum, & corroborandum, & resistendum prauæ qualitati & venenosæ est optima hæc confectio cordialis. \mathcal{L} . theriacæ de citro \mathfrak{z} . j. β . confectio de hyacintho, & requiei magnæ an. \mathfrak{z} . iiij. conseruæ acetosæ, buglossæ an. \mathfrak{z} . β . pulueris diamargaritonis frigidi, & coralli rubri præparati an. \mathfrak{z} . j. margaritarum electarum \mathfrak{z} . β . foliorum auri numero 2, syrup acetositatis citri, quod s. misce, & fiat confectio. Cuius dosis est cochlearium vnum omni hora cum aqua acetosæ, aut rosarum, aut buglossæ. Si fuerit pauper sola theriaca de citro erit bona. Similiter ad eundem affectum, & ad sitim conferet sæpe, præcipuè ventriculo vacuo, bibere aquam decocti hordei cum hac mixtura. \mathcal{L} . iulep. rosarum \mathfrak{z} . iiij. syrupi acetositatis citri \mathfrak{z} . ij. misce. Aut cum hoc condito. \mathcal{L} . conseruæ rosarum \mathfrak{z} . ij. conseruæ acetosæ, violarum, & nenupharis an. \mathfrak{z} . j. conseruæ borraginis \mathfrak{z} . β . sacchari, quod satis est, misce, & fiat conditum auro coopertum.

Scholium.

Deliriū.

**Phreni-
ris duo-
bus mo-
dis sumi-
tur.**

PHrenitis inflammatio est cerebri.] Delirium (quod ex primo prorhetico.com. 1. insania dicitur) comprehendit sub se delirium in melancholicis, & furentibus, phrenitum & paraphrenitum, qua ex consensu aliarum partium fit. Phrenitis, de qua modo disputamus, duobus sumitur modis. Primò largè. ita ut Typhomaniam etiam comprehendat, qua est delirium cum inclinatione in somnum. De qua loquitur Hippocrates 3. Epid. p. 3. sent. 45. cum sic scribit. Nullus autem phreniticorum vehementer insaniuit, ut in aliis: sed alia quadam veteriosa in somnum delatione, capite gra-
uati

uati moriebantur. Eodem etiam loco sent. 62. sic habet, Sopiebantur in primis phrenitici, cum enim haberent, ut Galen. ait in com. caput affectum per se, facile illud suscepit humores crudos, qui tunc abundabant, à calore ad ipsum delatos. Hunc affectum, nempe delirium, cum inclinatione ad somnum vulgò appellamus modorrha, aut modorilla. De hac phrenitide improprie, quæ non est inflammatio, Phrenitis non disputamus modò: sed de altera quæ proprie phrenitis dicitur. tis quid. Hac nil aliud quàm delirium continuum cum febre acuta. Delirium genus est, quod communicat cum aliis deliriis: illa dictione continuum, differt phrenitis à paraphrenitide, hoc est, à delirio, quod in accessionibus febriū, pleuritide, peripneumonia, & ex vaporibus calidis ab ore ventriculi ad cerebrum ascendentibus contingit. Ultima definitionis parte phrenitis distinguitur à mania, & melancholia. Vallesius 3. epid. part. 1. comm. ultimo existimat de essentia Vallesij phrenitidis non esse delirium continuum, quoniam hoc interrumpi- lapsus. tur aliquando, neque semper æquè sit, quoniam agrotus ad mentem redit. Hoc colligit ex Hippocrate, qui supradictò loco agens de agroto in Dealcis horto habitanti, quarta inquit die vigilauit, delirauit aliquantulum, quinta non dorminit, delirauit septima: similiter octaua dormiuit, intelligebat. Hic homo phreniticus erat, & ante solutionem morbi intelligebat, ergo non est necessum ut phreniticus semper deliret. Ad Galenum autem qui phrenitim delirium continuum habere scribit) respondet, dici continuum, quia reditus ad mentem non habet certas intermissiones, & statas periodos, certè vir alioqui doctus non rectè considerauit phrenitidis essentiam. Si enim delirium ex inflammatione sequitur, perseverante inflammatione quomodo intermitteret, non erit continuum? Tum si phrenitis nō est delirium cōtinuum, quomodo distinguetur à paraphrenitide? Neque id rectè ex Hippocrate deprompsit, nunquam enim Hippocrates intermittere delirium in phrenitide scripsit: & si in illa sententia id voluit, non erat vera phrenitis, sed paraphrenitis. Quod si sit phrenitis illa, de qua loquitur, ut restera est, non etiam rectè colligit, quia Hippocrates illa dictione (intelligebat) significat agrotum parū delirasse, id colligo ex die 11. in qua agrotus omnino, aut ut Vallesius vertit, semper mente cōstitit: si omnino, ergo antea delirium remissum fuit, sed nō omnino. Phrenitis symptoma est in actione laesa principe. Phrenitis Morbus, ad quē sequitur est inflammatio cerebri, aut membranarū tis an sit eius: ubi per inflammationē tumorem præter naturam intellige, non morbus, quemlibet, sed eum, quem Erysipelas appellamus, in eo enim humor an symputrescens cerebrum calfacit, & deliriū excitat continuum ob caloris perseverantiam: sit febris ob putridos vapores cordi cōmunicatos. Aliqui contendunt cerebrum non posse inflammationem pati, quia est pars rara, sicut & pulmo, carens venis & arteriis: secundo

*An cere- ex Gal. qui tertio de Pras. ex pul cap. 8. pulmonem non posse affici
brū possit schirris sentit. Contrariam sententiam habemus ex Gal. 4. de Pras.
timore ex pul. c. 8. ubi cerebrum intempericm cum fluxione & circa flu-
affici. xionem posse pati scribit. Inflammatio ergo potest esse in cerebro &
membrana tenui. Quae dua partes adherentes cum sint, affectiones
sibi communicant. Quod non est dicendum de dura meninge qua*

*Vallesij
lapsus.*

*cum separata sit, sola potest affici, neque cerebrū ei consentire. Quod
si aduertisset Vallesius, non scripsisset lib. 5. epid. posse esse inflam-
mationem in cerebro sine delirio, ex eo quod in fracturis capitis vi-
derit, inflammatione existente in dura meninge, hominem non deli-
rare. Rationes supradictae nil concludunt. Prima, quia pulmones ob
raritatem rarò Erysipelate afficiuntur: cerebrū verò, cum sit molle
& non rarum, ea frequenter corripitur. Tum supponit rem falsam,
cerebrum enim arterias & venas habet, sed paucas. Secunda ratio-
ne, etiam si ostendat Galenum existimare cerebrum pulmonis schir-
ris non affici, reuera tamen mos est Galeni, id quod rarò sit contem-
nere ac si nunquam contingeret: qua ratione quintanos circuitus
non admittit, sicut neque schirrum in cerebro & pulmone: cum re-
uera in his partibus contingat, ut aliquando vidimus in pulmone*

*De phre-
nitide ex
septo
transuer-
so orta.*

*arietis: & una cum Ludouico Collado in hominibus anatome disse-
ctis, rarò tamen id euenit, quia schirrus ex crasso sanguine genera-
tur, & pulmo nutritur ex sanguine tenui, & cerebrum ex humido:
ac proinde Gal. non scripsit simpliciter non posse cerebrum & pul-
monem schirris affici: sed fortasse non posse affici: dicet quis, si phre-
nitis est propria cerebri passio, cur Gal. 4. lib. de cau. pul. c. 14. phre-
nitim non solū ex tenui meninge, sed & ex septo transuerso ortū
habere scribit? ideo enim ut ipsimet docet. 5. de loc. affec. c. 3. veteres
septum appellabant phrenas, quia hac parte inflammatione affecta
phrenitis sequi solet. Vallesius ad analogiam id refert, quae est inter
septum & cerebrum. Cuius sententiae falsitas apparet ex varia &
distincta natura cerebri & septi, cerebrum enim totum est spermato-
zicum, at septum multa parte carnosum. Tum quia similitudo sub-
stantiae est inter cerebrum & membranam. Quod si similitudo id
faceret, cur eandem non habet pulmo, & pleura, ex quorum inflam-
matione etiam sequitur delirium: obiectioni ergo hac ratione satis-
facere oportet. Cum ea inflammatio quae in septo est, respirationem
impediat (est enim septū respirationis instrumentum) calor augetur
in Thorace & corde, sanguisque attenuatur & bile scit, eoque remi-
ne cerebrum ascendens herisypelas in eo generat: vel (quod idē est)
phrenitim. Hoc de locis affec. considerans Gal. dicebat delirium fa-
ctum à septo, pulmone, pleura, & orificio ventriculi differre, quod à
septo factum sit continuum: quod verò ab aliis partibus excitatur,
intermittat. Differt tamen septi phrenitis, ab alia quae primò in ce-
rebro*

*Vallesij
lapsus.*

rebrosit, quòd in hac statim apparet delirium : in illa verò, qua ex septo pendent, primò febris ex inflammatione, & deinde delirium sequatur. Et ideo Gal. delirium ex septo ortum parum à continuo distare affirmat, ubi non negat esse continuum, cum ibidem continuum faciat : sed parum ait à continuo distare, hoc est inter hac exiguum hoc esse discrimen, ut diximus: quod unum unà cum febre incipiat, & alterum parum post febrem. Quo tempore apparens cōtinuitatem sicut & primum seruat. Vnde non est quod Vallesius adm. neat Galenum, ut sileat illam dictionem parum, qua (ut ex dictis patet) necessario scribi debuit. Causa phrenitidis est fluxio sanguinis biliosi ad cerebrū. Differentia phrenitidis tres sunt, quas hac ratione colligo. Cum phrenitis delirium sit, & delirium cōmune sit imaginationi, & rationi, meritò una differētia phrenitidis erit, cum delirium in imaginatione, & altera, cum in ratione reperitur, tertia verò, cum utraque actio laesa est. Inde colliges praesenti loco duos errores auctoris. Primum, cum memoriam laesam differentiam phrenitidis appellat. Alterum collocans actiones principes in cerebri ventriculis, qua in corpore eius sedem habent. Temperamentum enim cerebri tanquam animae instrumentum illas actiones exercet.

Male Vallesius monitorem se facit Galeni.

Causa phrenitidis & differentia.

Duo lapsus auctoris.

Potus.

Morbus igitur hic.] Cum febris acuta in phrenitide sit, & sitis, non est quod aqua hordei marceremus agrotantem, sed frigida simplici utamur. Et cum consuetudo in morbis sit seruanda, vinum bibant, paucum tamen & bene dilutum. Vtemur etiam carnibus, pullo scilicet gallinaceo solo, aut cum hordeo confracto (à nobis dicitur farto) lactuca, aut acetosa, qua oxalis dicitur. In summa requirunt phrenitici victum frigidum & humidum, aut frigidum : etsi coniunctam habeat siccitatem, quia hac debiliter agit.

Secundò auertentibus.] Cum phrenitis sit inflammatio habens aliquid factum, & aliquid fiens, id quod sit, debet prohiberi ne fiat, & factum curari. Qua omnia commodè in principio praestamus sanguinis missione, qua reuellit humorem aliò, & euacuat ex parte inflammata, inanis enim eius venis iterum remigrat humor ad eas. Debet secari cephalica, etsi sit plethora, quia rectitudinem seruans cum parte affecta, ex ea citam & multam euacuationem facit: hanc autem venam secamus, etsi fiat phrenitis ex suppressione mensium: quia ex Galeno reuulsio non est facienda ex loco, à quo fluit humor, sed ex eo, ad quem fluit. Iubet etiam auctor bis aut ter esse secandam venam quando est plethora: qui ostendit, se ignorare sanguinis missionem in phrenitide tunc esse sistendam, quando non fluit tam multus sanguis ad locum affectum.

Curatio phrenitidis,

Vacuatio quoque per medicamenta.] In phrenitide medicamento purgante non est utendum, ut postea dicemus.

Tertiò repellētibus.] In principio phrenitidis debemus euacua-

re humorem in parte affecta inclusum. Quod prater sanguinis missionem prestat etiam medicamentum frigidum: hoc enim, ut auctor est Gal. 5. lib. sim. c. 4. duplici ratione euacuat, primò, repellendo, secundo unà cum calore multam educendo humiditatem. Repellemus ergò oxyrrhodino, (quod ex aqua rosarum, oleo rosarū, & pauco aceto censtat) aqua solacum aceto, succo lactucæ cum aceto, & aliis similibus, in quibus acetum miscemus, quia prater frigiditatem quam habet, sua partium tenuitate alia cum eo mixta medicamenta deducit, per bregmasis suturas, per quas non solum vis medicamenti, sed & eius substantia usque ad cerebrum penetrat.

Humorẽ
ex cere-
bro non
educi
purga-
tione.

Exami-
natur
medica-
mẽtum.

Quintò digerentibus:] Materia, qua in cerebro continetur, non purgatione totius corporis, quæ per aluum, aut vomitu fit, educenda est: sed per proprios cerebri meatus. Quod in declinatione, in qua euacuationis solius indicatio urget, fieri ab omnibus observatur, capiti applicantes digerentia. Hoc nos non laudamus, quia ex Galeno humor faciens Erysypelas, tenuis cum sit, facile dissipatur. Aliqui hoc medicamento viuntur. ℞. capitum papaueris num. 2. seminis lactucæ. p. i. cortices radices mandragoræ 3. j. florum cordialium 3. ij. chamemoli pug. ss. cariophyllorum num. 6. contundantur, & fiat pulvis: quem immittunt in pulmonem arietis, aut intra columbum & bregmati apponunt. Hoc medicamentum inutile est in declinatione, optimum tamen in augmento & statu, cum repellat, somnum, conciliet, & leuiter digerat, quæ omnia in statu desiderantur.

Vigilia
prospi-
ciendū.

Et si vigilie fuerint immodicæ.] In augmento phrenitidis debemus ob vigiliam sopire facultatem, quam in lethargo excitamus. Vigilia symptoma est ad se aliquando trahens curationem, cum ita est immodica, ut deiciat vires: in ea enim ob perpetuum motum ad externa calidum innatum dissipatur, & unà cum ipso spiritus. Decoctio ab auctore proposita optima est, adde tamen ei calendulam, cariophyllos, aut aliud calidum, quod narcoticam vim medicamenti reprimat, & penetrare ipsum faciat. Lotio etiam pedum cum decocto foliorum lactucæ, capitum papaueris crasse contusorum & chamemelo. Si hæc non prosint, utre vnguentis c. de capitis dolore scriptis. Hæc etiam potio, qua frequenter utor, utilis est. ℞. emulsionem 3. j. seminis papaueris in aqua nenupharis extractam, syrupi papaueris 3. j. ss. confectiois de hyacintho 3. ij. cum aqua nenupharis q. s. misce, & fiat potio.

Paraphrenitis.] Delirium in accessione febris ardentis à magna sit caliditate, neque ibi est venenum, ut aucter existimat, cum symptomata veneni absint. An verò cardiaca confectio hoc loco proposita aliquid valeat, ex his qua capite de Syncope à me explicantur, intelliges.

De Lethargo. CAP. VI.

Lethargus, quem Latinorum nonnulli veterum nomināt, *Descriptio.*
 affectio est phrenitidi contraria: ab obliuione sic dicta, *prio.*
 quod ea correptos rerum omnium obliuio inuadat: vnde mar-
 corem, & inexpugnabilem quandam dormiendi necessitatem *Diuisio.*
 cum obliuione & alienatione mentis eam dixeris. Lethargi (au-
 thore Aëtio) duplex origo est: quandoque enim à præcordiis, &
 visceribus per sympatiam oritur: quandoque in cerebro primò
 incipit: ac quibusdam statim ab initio euenit, quibusdam non
 nisi ex acutorum morborum decidentia, præcipuè ex phreniti-
 de, vbi ob medicamentorum stupefacientium vim ea cerebri
 pars fuerit refrigerata. Sæpius etiam à febre synocha in Le-
 thargum inciditur: & à pluribus aliis ægitudinibus, & genera-
 tim, omnibus, quas ingentes inanitiones consequuntur. Sed nec
 obliuisci oportet, quod sæpe in singulis diuturnarum febrium
 circuitibus ægrotantes sopor inuadit, quemadmodum in quo-
 tidianis, hemitritæo, & quartanis etiam nonnunquam vsu venit.
 Fit hoc malum à putrescente pituita posteriorem cerebri par- *Causa.*
 tem imbuente, & refrigerante, in somno impellente.

Comitatur autem lethargicos lenta quædam febricula, nec *Signa.*
 adeo vehemens, vt ea, quæ laborantes caro præcedere solet:
 quia in re lethargus & carus distinguuntur. Pulsus horum ra-
 rus est, magnus & vndosus, spiratio rara & imbecilla. Somno-
 lenti omnes huiusmodi sunt, desidiosi, ignaui interrogantibus
 ægrè respondent: sunt etiam vsque adeò obliuiosi, vt ad meien-
 dum sæpe excitati, porrectam matulam manu tenentes obli-
 uiscantur. Delirant porro, & expergefacti clamantes intuen-
 tur, sed illico ad somnum reuertuntur. Oscitant frequenter, &
 quasi claudendi oris obliti hiantes persistunt. Supini iacentes
 ad pedes delabuntur, & increbrescente morbo velut cadauera
 segnes decumbunt. Quibusdam alius humidior est, aliis ita
 sicca, vt nihil reddat. Lotium præterea quale iumentorum esse
 solet, emittitur. Ad extremum stertentes veluti sepulti arctissi-
 mo somno tenentur.

Curatur lethargus quinque remediorum generibus. Pri- *Curatio.*
 mò, victu tenui calfaciente, & exiccante, vt aëre calido arte *Vitus.*
 factò, si sit hyems, aut autumnus, suritu rerum calfacientium,
 sereno & lucido. Parietes quoque ardeant picturis diuersis co-
 loribus: nutriatur mullà, aut iure cicerum nigrorum, aut ptisa-
 na hordeacea, cum decocto forniculi facta, aut granis pincis
 saccharo conditis (est pygnonada Hispanis, aut corice citri

DE CVRAND. MORB.

*Quali-
menta
noceant.* condito. Si facultas sit imbecilla, iure columborum & cicerum indigebit: semper tamen Aphorismum decimunoctauum primi libri sequere, considerando tempus, regionem, ætatem & consuetudinem infirmi. Omnia pituitosa alimenta maximè nocent, & vaporosa præter porrorum barbas, quæ si cum hordeo decoquantur, sunt optimæ. Inter cætera ceparum esus copiosus magis lethargum gignit, vix quoque recentes hunc morbum efficiunt. Potus sit decoctum cinnamomi, aut seminis fœniculi, aut aqua mellis potens, videlicet constans quatuor partibus aquæ, & vna mellis, & hæc erit nutrimentum optimum, vinum maximè nocet, nisi in declinatione, & in ægro imbecillo, & nisi sit debili stomacho.

*Auertē-
tia.* Secundò, auertentibus, ut sectione humeralis, aut mediæ, si sit plenitudo: extrahaturque sanguinis copia respondens plenitudini & viribus: & quia semper reformidanda est cruditas, ne sanguinis quantitas sit copiosa, diligenter obseruabitur. Auertunt etiam & clysteres acres, de quibus capite de apoplexia, quamuis aliquantò mitioribus indigeat lethargus. Cucurbitulæ scapulis admoueantur sæpe, & aliquando cum sanguinis vacatione, præsertim si æger fuerit iuuenis, & sanguineus. Vincula & frictiones dolorificæ partium extremarum satis reuelant. Vomitus sine violentia solius ventriculi auertit à capite, siue fiat sola frictione & titillatione oris, & linguæ, siue oxymelle. S. cum decocto seminis raphani, aut anethi, vel cum syrupo acetoso. S. & eodem, aut simili decocto. Vacuatio per Hieran. S. aut Agaricum trochiscatum auertit satis, aut per vnciam semis diaphæniconis.

*Repel-
lentia.* Tertiò, repellentibus actu calidis, quæ sint minus frigida quàm in phrenitide, & primo & secundo die capiti, præcipuè posteriori parti rasæ admoueatur oxyrhodinum ex aceto, oleo, & aqua rosarum: post secundum diem adde oxyrhodino pulueris castorei drachmam vnam, & semper iuxta septimum adde quantitatem eius, & loco olei rosati adhibe oleum ex lilio, & parum aceti squillitici.

*Vacuan-
tia.* Quartò, vacuantibus materiam à capite per medicamenta purgantia, præcedente prius concoctione, syrupis, & aquis, aut decoctis materiæ pituitosæ (de quibus caput primum vide) videlicet vsu rhodomellis, oxymellis compositi, aut syrupi ex hyssopo, aut ex stæchade cum oxymelle squillitico. Hoc, aut simili potu fiet vacuatio: ℞. diacatholiconis ʒ. v. electuarij indi maioris ʒ. iij. β. agarici trochiscati ʒ. j. rhodomellis ʒ. j. decocti communis quod s. misce, & fiat potus. Alexander Trallianus solebat purgare lethargicos medicamento:

℥. j. castorei ℥. diaridij ℥. ij. cum aqua, aut syrupo, vel decocto fiat potus, & post illum omnes ferme autores laudant illud, quamuis nostris temporibus minuenda sit quantitas diaridij, & augenda castorei, ut ℥. pulueris castorei 3. j. diaridij 5. vij. cum rhodomelle, fiant pilulae, aut potus. Ex hoc habemus medicamentum purgans bilem flauam, mixtum cum medicamento non purgante, fieri, purgans pituitam, ut in superiori mixtura experientia docuit. Similiter purgatorium bilis mixtum cum purgatorio pituitae purgat pituitam, ut in electuario indo scammonium mixtum cum turbit, & aliis purgat pituitam. Vacuatio quoque per loca proxima, videlicet per nares & palatum est necessaria: quare saepe naribus & palato admoueat parum huius decocti. ℥. pulegij, origani, stachados, rutae an. m. j. sinapis, euphorbij an. 3. j. fiat decoctum cum libra vna aceti ad tertiam partem. Intrudatur puluis hic naribus: ℥. Pulueris hellebori & condisci an. 3. ij. misce. Os & palatum saepe fricentur mithridato, & theriaca magna, & sale, haec & similia in forma apoplegmatis, & errhini vacuant materiam à capite per dicta loca, de his capite de apoplexia sermonem habebimus copiose: sed tamen oportet scire, lethargum semper omnia remedia desiderare minora, tum quia minor est morbus, quam apoplexia, tum propter febrem.

Deriuā-
tia.Errhi-
na.Apophle-
gmatis-
mus.

Euacuat & resoluit materiam sal cum milio bene tostus, callidus, & admotus capiti raso. Idem fiet hoc cataplasma: ℥. caricarum p. ij. sinapi p. j. cum aceto fiat cataplasma. Cucurbitulae bene ignitae occipiti affixae idem faciunt. Optimè quoque euacuat castoreum mixtum cum humanis capillis adustis, & aceto admotum capiti raso, & excitat à somno.

Obser-
ua.

Eandem aut saltem parem vim habet hoc medicamentum: ℥. pyrethri, sinapis, scyllae an. 3. j. castorei, euphorbij an. 3. v. cum succo aphroditellorum, aut sampsuchi, fiat cataplasma: si ante appositionem horum pili euellantur cum dolore, erit melius. Si morbus hoc diuturnus fiat, aeger multis diebus in aurora bibat tria, aut quinque grana castorei cum rhodomelle, aut syrupo de stachade, aut aqua saluiae, aut sampsuchi: vel accipiat drachnam vnam mithridati, aut theriacae magnae, aut diagalangae, aut diatrium piperum: post haec & in vigore maximè confert balneum decocti rerum calfacientium, ut pulegij, thymi, roris marini, saluiae, rutae, & similium. Obserua historiam Tralliani, quam Fuchsius lib. i. cap. 13. de morbis curandis refert.

Topica.

Historia

Quintò, per ea, quibus symptomata huius morbi curantur,

Sympto-
ma.

DE CVRAND. MORB.

enatis cu tur, quæ solent esse duo præcipua, somnus videlicet profundus,
ratio. & excrementorum primæ & secundæ concoctionis suppressio.
 Primi curatio ex superioribus, præsertim quarto genere reme-
Somni diorum expositis peti potest: præter illa pedes, & tibiæ fricari
profundi debent vehementer cum sale & aceto. Odor rutæ decoctæ cum
curatio. aceto excitat à somno, similiter euulsio violenta pilorum ex
 partibus infernis & supernis, sonus tubarum, & voces scrofula-
 rum excitant à somno. Fumus qui æditur ex vitione pilorum
 hominis maximam ad hæc vim affert. Simili ratione fumus
 pennarum vulturis. Eiusdem est facultatis pulmo suillus capiti
 admotus. Tantundem efficiet sanguis testudinis fronti apposi-
 tus. Æquè est efficax frictio plantarum pedum vrtica & sinapi
 aceto decoctis. Pili capræ viti, & cornu cerui, & capræ adustum
 si naribus admoucantur, possunt expergefacerè quamuis altissi-
 mè dormientem. Ad expellenda stercora, glandes acres, & cly-
 steres multum valent, (de quibus aliqua scripta extant capite
Suppres- de apoplexia) & alia plerâque hoc capite secundo, & quarto ge-
sa urina nere remediorum explicata, maximo adiumento erunt. Suppressio
curatio. urinæ curatur iis, quæ diximus in extremo capite de curatione
 phrenitidis, & iis quæ dicenda sunt c. xlvj. huius morbi proprio

Scholium.

Circa **L**ethargus, quem Latinorum.] Lethargus ex sententia mul-
lethargi torum fit ex pituita non putri irrigante cerebrum, Qui ducti
essentiã sunt in hanc sententiam ex Gal. 1. Protre. par. 1. com. 1. ubi scribit,
refutan- Lethargum tunc contingere, cum pituita diluerit & humectauerit
tur. cerebrum. Hi errant, ut ostendit febris, quæ comitatur Lethargum,
 quæ sine putredine pituita excitari non possit, cum pituita humor
 frigidus sit. Neque Galeni locus eis fauet, quia etsi in eo pituitam
 madefacere cerebrum scriptum sit, intellige tamè ita madefacere, ut
 simul putrescat. Quod ei contingit, cum tumore efficiens inculcatur,
 ut prohibitam habeat transpirationem: hoc ex eodem loco colliges, ubi
 Gal. phrenitim ait fieri, cum bilis locum, in quo princeps anima pars
 residet, prehenderit: non enim inde rectè colliges, bilem sine putredine
 phrenitim efficere. Quod autem in lethargo pituita putreat Gal. 1 3.
 meth. c. 21. nos docuit. ubi noxium humorem, qui citra febrem altos
 inuehit sopores, in apoplexia, & cathoco reperiri scribit: humorem verò
 putridum cum febre in lethargo. Quod autem tumore efficiat pituita,
Lethar- eodem lib. c. 20. videbis: ubi Gal. lethargum vitium contrarium phre-
gus sym- nitidi secundum speciem esse affirmat, atque hæc est causa, cur in
ptama principio similia postulent remedia. Lethargus est symptoma in
est. actione principis læsa, est enim abolita memoria, & ratiocinatio in-
 firma: sic & imaginatio. Qua in parte duos practicoꝝ errores
 collige,

collige, primum auctoris Rondoletij & aliorum lethargum diuidē- Duopra-
sium in lethargum merbum, & lethargum symptoma. Si enim est cūtorum
actio lesa, quomodo erit morbus? secundum auctoris, & aliorum errores.
etiam, qui ex phrenitide, cū in ea multum refrigeramus cerebrū,
lethargum fieri dicunt. Si enim somnus ille fit refrigeratione cere-
bri, & non ab œdemate, quomodo erit lethargus? Obiiciet nobis ali-
quis, in lethargo nōne pituita putrescens calore concipit, quomodo
ergo inclinationem ad somnum generat? Respondeo, lethargus est in-
temperies cum affluxu humoris. Hic autem humor totus nō putret, Morbus
sed aliqua eius pars, reliqua suam seruat naturā. Pars qua putret, in le-
vapores mittit ad cor paucos, & nonnil calidos, indeque ortum ha- thargo.
bet in lethargo febris lenta. Reliqua verò pars, qua non putruit,
somnum inducit refrigerando, & humectando cerebrum: hac enim
ratione densatur, & spiritus animales incrassantur, quo tempore li-
berè facultas non potest alterare, ut ex 13. method. cap. 1. colliges.

Secundò auertentibus.] Cū lethargus sit tumor prater na- Sanguis
turam, postulat in principio reuulsionem, & euacuationem: quod nis mis-
commodè prestat sanguinis missio ex cephalica, quia rectitudinem sio.
seruat cum loco affecto, & hac ratione citò & multum euacuamus.
Neque est quod timeamus cerebri refrigerationem, cū caleat à
febre, & ab humore putri.

Tertiò repellentibus.] Repellimus in principio eo modo, quo Repellēs
diximus superiori c. Aliqui diuidunt medicamentum repellens in medica-
illud quod verè repellit, quale est oxyrrhodinum, & in illud, quod mentū.
impropriè repellens ab ipsis nominatur, eo quod unā cum frigidita- Refutā-
te habet aliquam caliditatem, quale est illud, quod c. de phrenitide tur qui-
descripsimus eo contextu qui habet. Quintò digerentibus, &c. Hac dam.
tamen diuisio ad libitum est ficta, cū calidum non repellat, adde
in principio inflammationis calorem nullum habere usum: dices
posse nos miscere calida ob penetrationem: neque propter hanc cau-
sam licet, cū acetum frigidum existens id præstet.

Quartò vacuantibus materiam.] Cū medicamentum pur- In le-
gans non educat humorem in tumore inclusum, sed cum qui est in thargo
venis, omittendum est, in declinatione ergo lethargi euacuandus est non pur-
humor à capite discutientibus, quæ aliquantulum vehementia de- gandi.
bent esse ob humoris crassitiem: huiusmodi sunt oleum rutaceum, de Discu-
spica, unguentum Aragon, & Marciat. Vtemur medicamento pur- stentia.
ganti, quod per nares errhinum dicitur, euacuet attrahendo, ut est
euphorbium, helleborum album & alia mitiora, qualis est succus
Leta, aut per os (apophlegmatismus appellatur) quod præstabimus
ungentes palatum hiera simplici: vel cum ea aliquid ex euphorbio
miscentes, medicamentum etiam masticatum utile erit. Capiti pi-
leos applicabimus ex rebus calidis mastiche saturcia, cariophyllis,
corticibus

DE CVRAND. MORB.

corticibus citri, ruta, thymo, his pulueratis, & cum 3.ij. pliris arcon. Nicolai permixtis. His enim cerebrum corroboratur, & humor discutitur. Aut sacculos discutientes bregmati appone.

Somnus Quinto per ea.] Somnus naturalis à cerebro fit: hoc enim, cum
quid. requiescere vult, aut spiritus reficere, somnum inducit animalibus,
primo de caus. symp. c. ult. Est ergo somnus naturalis quies facultatis animalis à cerebro inducta. Quies non est omnimoda, sed per quietem intelligit Gal. remissionem facultatis, reuera enim tempore somni descendit ad instrumenta sensus & motus, sed minor. Hac autem remissio à cerebro efficitur: unde male Arist. humiditatem constituit causam somnam efficientem, cum ipsa potius sit causa iuuans: hoc superiori loco significauit Gal. Sic enim habet cerebrum cum quiescere vult somnum inducit, praesertim cum altrix in eo facultas humiditate fuerit instaurata. Male etiam Argentorius somnum dixit fieri à reuocatione caloris natui, eo quod hic est instrumentum commune, cum instrumentum facultatis animalis sit spiritus animalis, & somnus in cerebro fiat. Maiorem videtur habere difficultatem locus Gal. 3. de caus. pul. cap. 9. ubi scribit, somnū fieri cum natuius calor ad alimentum se conuertit: huic tamen loco satisfacimus dicentes Gal. in eo non tradere causam somni, quam cerebrum esse docuit: sed tradere id quod in somno contingit, in eo enim fit reuocatio caloris consentiente facultate vitali, facultate animali: ut colligo ex 3. de caus. pul. c. 8. in somno hoc naturali facultates naturalis, & animalis roborantur: naturalis, quia calor reuocatur, animalis, quia quiescit ab opere. In eo verò somno, qui praeter naturam est, cum calidum innatū longo tempore priuetur motu ad exteriora, & perseuerantem seruet motum ad interna, suffocatur. Ac proinde huic symptomati occurrere oportebit. Est autē somnus praeter naturam longus, & qui difficilem habet exurgens actionē. Fit autē à frigiditate, & humiditate. Humiditas enim grauat cerebri facultatem. Frigiditas verò, ut diximus, stupidū reddit cerebrum, ipsum condensans, & incrassat spiritus animales, & hac ratione impedit alterationis descensum. Excitabimus ergo ex hac frigida & humiditate dormientes: calidis & siccis, & attenuantibus pituitam, & discutientibus eam id praestabimus decoquentes satureiam, rutam, thymum & alia cum aceto, & naribus inspirantes vaporem Bregmati adhibebimus unguentum, ex oleo rutaceo, castorei, succo scilla cum cora constructum. His tamen medicamentis utere in augmento, non in principio, ne attrahas ad partem affecta.

De Vertigine. CAP. VI.

Descriptio. **C**VM in morbo obtenebrationes, hebetudinesque oculis obuculantur, & omnia rotari & circumferri videntur, malum

malum illud est, quod Latini vertiginem, Græci verò scothoma appellant. Valeant ergo barbari, qui nodum in scirpo quærent, scotomiam à vertigine differre volentes. Nam si discrimen vllum ponendum sit in affectione, non in omnibus erit constituendum. Vnde Gal. 4. de rat. victi. in morbis acutis, commentario 43. differre inter se dinon, & scodinon autumat, cum enim caput circumagi videtur, dinon id est, vertigo vocatur affectio. Cum autem & præter id, tenebricosus fuerit aspectus, scotodinos, hoc est tenebricosa vertigo dicitur. Fit autem ob inordinatam spiritus flatusi motionem, qui vel in capite generatur, vel sursum ex infernis extollitur partibus. Qui præter ea, quæ dicta sunt, plura de vertigine volet cognoscere, adeat Gal. loco superius citato, & 3. de loc. affect. nobis enim breuitatem affectantibus hæc satis sunt.

Curatio non potest esse eadem in omnibus, semper tamen, quæ humores, & spiritus immobiles reddunt, conferunt: ut in accessione. aër temperatus, aut frigidus, & obscurus, quies, cibus frigidus, & astringens, excepta vertigine, quæ à pituita fit, quæ calidis indiget cibus. Sit quoque tenuis victus, quia morbos ex repletionem (cuiusmodi est apoplexia) gignit, nisi ex coitu, & fame fiat, in quibus cibi boni, & multi sanguinis sunt necessarij. In omni vertigine nocent alimenta difficilis concoctionis, & vaporosa, & rerum aspectatio, quæ in orbem torquentur, ante quæ celeriter mouentur, despiciere ab alto, & ambulare per loca periculosa. Ira, tristitia, & timor maxime nocent. In initio mensæ, quæ alium molliunt, ut pruna damascena, passæ vix sine granis, sunt comedenda: in fine, quæ os ventriculi astringunt, & impediunt ascensum vaporum: ut caro malorum cotoneorum condita, aut coriandrum præparatum. Potus sit aqua ex cinnamomo, & aqua mellis, aut aqua decoctionis coriandri, si fuerit à causa calida. Vinum non bibat, nisi habeat ventriculum imbecillum, aut sit totius corporis defectus. In accessione quies est necessaria, & frictio partium infernarum, & odor rosarum, myrti, & similium, quæ spiritum animale quiescere faciunt. Si verò accessio fuerit magna, aut longa, vacuatio per acrem clysterem, aut glandem fiat, de quibus capite de epilepsia, aut apoplexia dicemus. Aliquando in ipsa accessione est necessaria sanguinis missio per venæ sectionem, vel per cucurbitulas cum scarificatione, ne transeat in epilepsiam, aut apoplexiam. Extra accessionem, quando est ex sanguine præcedenti debita ratione victus iam dicta, fiet sanguinis missio per sectionem venæ humeralis aut mediæ, si sit magna plenitudo: deinde concoquatur

DE CVRAND. MORB.

Purgatio. quatur bilis per duos, aut tres dies syrupo rosarum cum decocto coriandir. Post hæc euacuetur bilis hoc, aut simili medicamento. ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ʒ. ss. rhabbari electi infusi per noctem in aqua endiuixæ ʒ. j. diaprunis solutiui ʒ. iij. ss. syrupi rosarum ʒ. j. aquæ buglossæ quod s. misce, & fiat potus: vel fiat vacuatio per ʒ. j. pilularum de rhabbaro: vltimò fiat corporis refrigeratio, & partium corroboratio per electuarium diarhodon Abbatis cum syrupo rosarum, aut aqua frigida, & astringente: & hepar vngatur ceroto santalato.

Ex bile flaua. Quando fit à bile flaua, eadem est curatio dempta sanguinis missione, quæ aut non fit, aut si fiat, minor copia sanguinis in hac, quàm in sanguinea extrahatur.

Ab atra bile. Ab atra bile rarò, aut nunquam fit: si autem fiat, inquire eius curationem capite de curatione melancholiæ. Quum est per consensum ventriculi, à quo sæpe nasci solet, vomitus statim est utilis, quem concitat decoctum seminis raphani, aut anethi, aut atriplicis cum syrupo acetoso, s. aut maiori, vbi opus est oxymelle. s. aut cum vncia vna oxymellis scillitici. Rarò in hoc morbo conuenit vomitorium potentius, quia nocet commotio

Euacuatio. magna. Deinde euacuetur humor, qui est in ventriculo, per propria medicamenta purgantia præcedenti concoctione per rhodomel, aut syrupum de hyssopo, aut oxymel compositum cum decocto, aut aquis conferentibus. Hiera. s. aut pilulæ elephanginæ, aut agaricus trochiscatus aut diaphænicum, aut pilulæ stomachicæ optimè euacuant materiam detentam in ventriculo.

Corroboratio. Tandem quæ ventriculum corroborant, conferunt, siue sint interna, siue externa: de quibus cap. de curatione imbecil. ventriculi satis copiosè dicemus. Mica panis cum succo malorum cotoneorum sæpè comesta ventriculo vacuo vertiginem tollit.

Si fiet per consensum vteri, aut aliarum partium, suis in locis patefiet curatio.

A pituita. Quando est à pituita (à qua fit sæpe) post victum tenuem & calidum, secundo, decoquatur pituita per medicamenta dicta cap. j. incipiendo à mitioribus: vt est rhodomel, vsque ad valentiora: vt sunt oxymel compositum, syrupus de quinque radicibus, & oxymel scilliticum cum aquis, aut decoctis conferentibus.

Victus. Tertiò, vacuantibus pituitam curatur, qualia sunt: agaricus, turbit. Hiera. s. & comp. diaphænicum, electuarium indum, & pilule de agarico, & alia multa dicta cap. j. Sed quia hic morbus diuturnus esse solet, multis purgationibus est vtendum, sumpto initio à leuioribus ad valentiora, præcedente semper concoctione apta, & debita. Hoc medicamen-

tum

rum est medium. ℥. diacatholicon. ʒ. ʒ. Agarici trochiscati ʒ. j. diaphanicon ʒ. iij. ʒ. thodomellis ʒ. j. decocti saluæ. quod si. *Pilula misce, & fiat potus.* Hæ pilulæ sæpe deuorantur, sunt efficaces. *nobilis, si valentque plurimum ad affectum hunc tollendum, & radicitus euellendum, caput & omnes sensus confirmant.* ℥. nucis muscatae, cubebæ, caryophyllorum, xyli aloës, masticis an. ʒ. j. cardamomi, spicæ, seminis maioranæ, rutæ, præoniæ, siseleos, zinziberis, asari, piperis an. ʒ. ʒ. agarici electi ʒ. iij. colocynthidis. ʒ. iij. myrobolanorum chebulorum ʒ. ij. scrupini, hellebori an. ʒ. j. salis gemmæ, nitri an. ʒ. ʒ. aloës hepaticæ pondus duplum, fiant pilulæ cum benedicta. Harum dosis est drachmæ vnus, & in vñu frequenti scrupuli vnus. Vacuatio per loca propinqua, videlicet per nares, & palatum est necessaria in forinis di- *Deriuatio.* nerfis, de quibus dictum est cap. de cephalalgia pituitosa, & cap. de lethargo. copiosius tamẽ dicemus de eis cap. de apoplexia, vbi nomina omniũ harũ formarũ, & barbararũ, & Latina indicabimus.

Vltimò, euacuanda est, & resoluenda materia capitis per in- *Resolutio, & corroboratione.* terna, & externa medicamenta, & cerebrum corroborantia: vt ʒ. j. theriacæ magnæ, aut mithridati, aut diatrion piperon, aut diagalangæ multis diebus sumpta cum ʒ. j. aquæ saluæ, aut stichados, aut toris marini, aut similis naturæ capitalis in forma aquæ, aut decocti, aut syrupi. *Topica.* Ceruix & caput vngatur oleo rutæ, aut laurino, aut costino aut ex castoreo. Emplastrum ex ruta scilla, serpillo, satureia, & cepa cum melle, & oleo camomillæ confectum capiti raso admotum cum lana succida omnem vertiginem tollit. Quidam laborans vertigine antiqua, post vacua- *Exemplum.* tionem per pilulas cochias curatus fuit lotionē assidua capitis rasi decocto camomillæ, & rosarum. In diuturna vertigine, & feruẽ incurabili est summum auxilium venas non pulsatiles post aures abscindere. Quorumdam experientia probatum au- *Exemplum al- terum.* xilium est cauterium prædictarum partium. Passus est quidam vertiginem propemodum insanabilem, amisso fere sensu cap. & cum immenso stupore ob frigus intensum, & post multa remedia, quæ nihil profuerũt, cataplasinata ex sola vitrica toti capiti raso per noctem admoto curatus est, factus postea multis ampullis plenis aquolâ pituita, à quibus multa emanauit pituita.

Scholium.

Cum in morbo obtenebrationes.) Cum visa iudicamus cir- l'ertigo
cumolui, symptoma hoc à Circis ducit, à Latinis vertigo di- quid.
citur. 4. acut. com. 42. cum autem tenebrosa simul coram oculis
apparent cum visus amissione, secundo dicitur affectio, à latinis
e vertigo

DE CVRAND. MORB.

vertigo tenebricosa. 4. aphor. cum. 17. prædictæ duæ affectiones ratione maioris & minoris distinguuntur: tenebricosa enim vertigo maior rem causam arguit, nempe bilem adustam. Vertigo aliquando è febrilibus euenit. 4. acutorum sent. 42. conante natura humores euacuare, de qua non agimus modò: sed tantùm de ea, quæ citra febrem contingit. Quæ vel fit ex proprio capitis affectu, vel per consensum. Per proprium affectum fit, cum humor, qui causa est vertiginis, est in cerebro. Id deprehendes ex eo, quòd nullius partis affecta signum apparet. Per consensum, cum à ventriculo, utero, alia parte est prima mali origo, ut ex signis affecta partis cognoscere poterimus. Vertigo est symptoma in actione laesa, deprauata scilicet imaginatio, quæ rem quietam circumuolui indicat. Hoc symptoma ex alio sequitur, quod est vitiũ excrementi, cum inæqualiter mouetur spiritus flatulentus in capite. Vnde intelliges non rectè colligere Lupeium ex 4. acut. com. 42. ex sola ventriculi vellicatione fieri vertiginem: reuera enim illa vellicatio ex humore fit, ex quo excitati vapores vertiginis sunt causa. Neque existimandum est, ut ferè omnes scribunt, vertiginem tunc fieri, cum spiritus flatulentus in tur aliq. cerebri ventriculis inæqualiter mouetur: sed opus est, ut ille spiritus causa descendat ad oculum, & ante humorem crystallinum motum illum motus exerceat: aliter enim non apparebunt res in gyrum moueri. Causa spiritus istius motus aut est externa, ut motus in gyrum, & vini potio: aut interna, quæ, ut diximus, vel est in capite, aut in alia parte. Morbus, ad quem sequitur vertigo, est intemperies frigida, in qua diminutus calor flatum excitat.

Vertigo à causa frigida fit. Extra accessionem quando est ex sanguine.] Cum omnis vertigo fiat à causa frigida 4. acut. com. 42. quia à calore diminuto spiritus eleuari solent: difficile certe videtur quæ ratione plethora vertiginis causa sit, nisi dicamus id fieri, eò quòd à plethora fiant interceptiones venarum, hoc est repletiones, à quibus solet calor obui, & spiritus non rectè diffuari, cum in vertigine sanguinem nutritimus, Aetius præcipit euacuationem accuatim non esse faciendam, quia vertiginosi facile concidant: quod non erit seruandum, cum sanguinis missio iacente homine exercetur.

De Epilepsia, seu morbo Comitiali.

CAP. VIII.

Descriptio. Morbus comitialis (quem epilepsiam Græci vocant) concussio est omnium corporis partium non perpetua, ut in emprosthotano, opisthotano, & tetano conuulsionis speciebus, sed temporum interuallis accidens: neque hac solum re ab illis differens, sed mentis quoque, ac sensuum obliuione: ut auctor est Gal. lib. iij. de loc. affect. cap. v. Cuius tres sunt differentie,

Diuisio.

rentiæ, quarum prima in cerebro per primatim affectionem fit: secunda per consensum ab ore ventriculi : tertia, quæ tamen & ipsa rarò accidit, cum à parte aliqua incipit affectus post sentiente ægro ad cerebrum usque ascendit: ut in eo puero accidit, è cuius crure velut frigida quædam aura per coxam, & lumbos in caput tendens quotidie cerebrum afficiebat: visus quoque est (autore Paulo) morbus comitialis ab utero in quadam muliere, quo tempore uterum gerebat, qui post edito fœtu quieuit. Omnibus tamen his formis commune est, quod cerebrum afficitur. Fit autem hic morbus à crasso humore pituitoso, aut melancholico, spiritus animalis meatum, qui in cerebri ventriculis est, obstruente. Cum verò per sympathiam, quis laborauerit, simile quiddam cerebrum patitur, ventriculo à re aliqua infestato: nam ut singultire hunc cernimus quoties aut ciborum mole grauatur, aut putres humores ipsum infestant, ita etiam & neruorum principium concuti credibile est, ut à se expellat, quicquid sit, quod à parte primò affectu ad ipsum effertur. Præcedit hunc morbum mœstitia corporis, atque animi inconstantia cum motu minimè voluntario, eorum quæ perceperunt, obliuio, insomniorum visiones turbulentæ, dolor capitis & faciei pallor: lingua præter hæc, inordinate mouetur, quam etiam nonnulli mordent. Inuadente accessione statim cœcidunt, conuellunturque, nonnunquam stertunt, & circumaguntur. Præcipuum verò, ac maximum signum est oris spuma: nam cætera communia sunt & in aliis morbis. Obnoxij huic morbo ante omnes sunt pueri, & inter hos recens in lucē editi, post hos adolescentes, ab his ætate constantes, omnium minimè senes & decrepiti. Hæc affectio proxima est apoplexiæ, cum idem locus utrobique laboret & idem humor in causa sit: verum apoplexia ob omnimodā carentiam illius potentiae, quæ ad neruos defluit, morbus autem comitialis, propter motum vitiosum generatur, ut habet Gal. ij. aph. com. xlv.

*Causa.**Causa humoris biliosi per sympathiam.**Signa.*

Morbus comitialis, si hæreditarius fuerit non suscipit curationem: si non fuerit hæreditarius, & cerebrum primò afficitur, difficilis est curatu: præfertim si æger sit natus xxv. annum, affectusque fuerit ante illam ætatem simili, aut eodem morbo. Infans recens natus (cuius multi fratres in eadem, aut simili ætate perierunt epilepsia) præcedenti prius optima præuisione in victu materno, si ante primam lactationem patum huius mixturæ acceperit, liberabitur à futura epilepsia. ℞. sacchari optimi bene puluerizati ℥. ij. olei sisamini recentis, aut amygdalarum dulcium quod s. misce, & fiat confectio ad modum lochi: quæ non solum ante primam lacta-

*Curatio**Infantium cum ratio præseruans. victus.*

DE .CVRAND: MORB.

tionem, sed multis diebus e& sumenda, semper tamen ventri-
culo vacuo. Aliqui loco olei ponunt butyrum recens, purgat
hoc medicamentum prauos humores ventriculi, & intelti-
norum, à quibus pravi vapores ascendunt, epilepsiámque
efficiunt. Paulus Ægineta infanti nato ante lac exhibet mel.
Nostræ scēminæ Valentinæ consilio medicorum ante lac
etiam primum exhibent cum melle parum decocto puluerem
radicis pæoniæ, & fel testudinis, aut parum limoniatae smar-
ragdorum.

*Duo me-
dicamen-
ta præ-
stantis-
sima.*

Ego sequutus multorum experientiam hæc duo medica-
menta summopere laudo, primum bis, aut ter in die sumptum,
alterum verò semel in hebdomada: hæc enim corroborant ce-
rebrum, nervos & ventriculum, & purgant ab eisdem parti-
tibus. ℞. limoniatae smaragdorum. ℥. ij. pulueris radicis pæo-
niæ maris, & seminis eiusdem an. ʒ. j. coralli rubri præparati
ʒ. ij. visci quercini, & cranci humani puluerizati an. ʒ. ij. pul-
ueris vermium rubi, & succi rutæ an. ʒ. j. corn. cerui vlti &
unicornis an. ʒ. ij. pulueris pullorum hirundinis adustorum ʒ.

*Clyster
in acces-
sione.
Glādes.*

ʒ. ʒ. rhodomellis, aut syrupi de hysso. quod s. misce, & fiat
confectio: ex qua sæpe accipiat infans quantitatem vnus ca-
stancæ ℞. Hieræ picæ. S. ʒ. ij. agauri trochiscari ʒ. iij. rho-
domellis ʒ. iij. misce, & fiat confectio. Dosis semel, aut bis in
hebdomada cochlearium vnum. Aliquando est necessarius hic
aut similis clyster præsertim in accessione ipsa. ℞. decocti ru-
tæ, saluæ, & roris marini an. ʒ. iij. ʒ. olei rutæ ʒ. j. ʒ. hieræ
logodionis ʒ. iij. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster. Glandes, seu

*Auertē-
tia, &
reuel-
lentia in
accessio-
ne.*

suppositoria hæc & similia sunt optima: pulueris hieræ picæ.
S. ʒ. iij. salis gemæ ʒ. ʒ. mellis, quod sufficit, misce, & fiant
duo suppositoria, aut tria. In ipsa quoque accessione frictiones
extremorum, vincula dolorifica & cucurbitulae scapularum
sine scarificatione ante primum annum, & post cum scarifica-
tione maximè conferunt. Curantur quoque infantes hoc labo-
rantes morbo cauteriis parvis auribus, & superiori parti cer-
uicis, quam nonnulli nucam appellant, admodis. Radix pæo-
niæ maris secta ad modum coronæ collo appensa præseruat ab
epilepsia.

*Diligen-
tior cu-
ratio in
gratiam
Valenti-
orum.*

Eandem aut similem vim habet corallium, aut lapis sma-
ragdus, aut hyaspis viridis. At quia infantes, & pueri in no-
stra vrbe Valentia sæpe laborant hoc morbo, & pereunt, præ-
ratio in ter dicta in curatione, & præseruatione eorum, his decreui
gratiam alia non pauca addere. De infanti summo mane postposito
Valenti- lacte, saltem iij. horis, quantitatem vnus ciceris huius mixtu-
orum. ræ, & liberabis eum ab epilepsia, Deo fauente. ℞. succi rutæ
coch

cochlearium vnum, folia auri numero v. lapidis smaragdi
 preparati ḡ. x. misce. Eandem, aut maiorem habet facultatem
 notum Plinij auxilium, quod affert Antonius Carthaginensis,
 vermiculorum lanuginolorum in rubo reperorum, quorum
 tres aut quatuor lacte, vel aqua mellissæ simul deuorentur Pro-
 dest mirum in modum infantibus hoc medicamentum, accipe
 cepæ album perforatum, plenum theriaca magna, & croco,
 decoctum in furno, & ab eo exprimatur succus: cochlearia
 tria bibat infans, reliquum in forma emplastri ventriculo im-
 pone. Confert quoque multum huic infantili morbo ʒ. j. fre-
 quenter sumpta hieræ. S. cum decocto roris marini, aut sal- *Syrupus.*
 uæ. Summè prodest huic morbo puerorum, ventriculo mun-
 dificato cochlearium vnum huius syrupi. ℞: florum buglossæ,
 borraginis, rosarum, radicum, & seminum præoniæ, gentia-
 næ, limaturæ eboris, vineæ an. ʒ. ss. crani humani ʒ. ij. cro-
 ci ḡ. x. fiat decoctum in libris. iij. aquæ ad medietatem: de
 quo colato accipe libram vnam, & cum saccharo sufficienti fiat
 Syrupus.

Si morbus comitialis fiat ex lacte in ventriculo infantum *Si ex la-*
 coagulato, à quo symptomata veneni generantur, hoc cata- *ste coa-*
 plasma ventriculo bis aut ter admotum deicit, ventriculi re- *gulato*
 pletionem. ℞. foliorum vlmī p. iij. decoquantur in vrina pue- *in ven-*
 rorum & cum vnciis duabus butyri fiat cataplasma: paris, aut *triculo.*
 maioris facultatis est hoc. ℞. foliorum maluarum, absinthij,
 & vlmī an. p. ij. decoquantur in vrina hominis, & cum vnciis
 duabus butyri, & fermenti, & ʒ. j. olei nardini fiat cataplasma:
 quod ter admoueat ventriculo ante, & terro. Sal cum melle *Sal cum*
 deicit ventriculi repletionem, siue sit ex lacte coagulato, siue *melle.*
 corrupto, vel ab alia causa, auctore Gal. v. de sanit. tuenda, & iij.
 de facultatibus alimentorum, cap. 14. Si mel & sal lacti miscean-
 tur, ipsius in ventriculo coagulationem impediunt, fallitur ergo
 Auicenna fen. 6. lib. 4. tr. 2. c. 21. de congelatione in stomacho, *Error*
 dicens sal ita lactis coagulationem, vel (vt ita dicam) calcatio- *Auicen-*
 nem efficere. *na.*

Si superioribus non euacuatur lac concretum in ventri- *Potio-*
 culo, neque eius symptomata finiuntur, præbe infanti ʒ. ss. *nes.*
 coaguli hædi, aut leporis, cum aqua pauca calamenti. Aut
 da, præsertim grandioribus hanc potionem. ℞. Pulueris ca-
 lamenti ʒ. j. theriacæ magnæ, & coaguli hædi an. ʒ. ss. aquæ
 rubæ tinctorum ʒ. j. syrupi acetosi. S. ʒ. ss. misce. Hæc coagu-
 la, quanuis lac coagulatum non sit, id coagulant, coagula-
 tum verò dissoluunt, & per inferiora, aut per vomitum de-
 pellunt, quemadmodum theriaca magna veneno affectos

DE CVRAND. MORB.

*Vis the-
riaca
magna.* curat, & sanos veneno afficit. Hæc tamen theriaca magna sola (teste Gal. in libello de theriaca ad Pisonem) nocet pueris, præsertim calidis, quia superat vires caloris naturalis, & spiritus infantium, & multum lætificat, & cordis spiritus dissolvit: mixta tamen cum aliis, & eius parva quantitas dari solet audacter, præsertim in hoc morbo mortem denuntiante.

*Fœmina
Valenti-
na.* Valentinae fœminæ ad deiiciendam ventriculi infantium plenitudinem, & cruditatem, exhibent mixturam seminis sinapis, milij & sesami cum rhodomelle, & oxysaccara composita, has non damno. Aliæ eis dant pulverem contra indigestionem,

*Pelleja-
na dam-
natur.* qui vulgò dicitur, la Pellejana, quia eius inuentrix fuit fœmina Valentina dicta Pellejana: constat medicamentis calidis, & ferri fœce, quare has minus laudo. Aliæ præbent eis succum bursæ pastoris, quæ à Valentinis nominatur paxeripeu, hoc medicamentum restringit, & non purgat, nisi per accidens, ideoque has damno. Aliæ homicidæ imprudentes infantibus, ex-

*Bursa
pastoris.* hibent cerussam, aut argentum viuum, aut minium, quod medicamentum Betici vulgato proverbio derident. Aliqui phar-

*Aduer-
te in
pharma-
copolas.* macopolæ eos interficiunt medicamentis valenter purgantibus, quos summe reprehendo, & pœna capitali dignos censeo.

Aliquando infantes afficiuntur capitis ulceribus manantibus, & tumoribus aurium, & mandibularum: & aliquando per nares, & palatum mucorem, & excrementa pituitosa depellunt: per has enim vias cerebrum, & nervi deponunt excrementa, quæ re-

*Error
emper-
icorum.* tenta parere solent morbum comitiale. Quare errant imperiti medici, & fœminæ, dum hæc curare nituntur. Possem ego in præsentia exempla aliquot adducere, sed brevitatis causa prætereo.

*Gran-
diorum
curatio.* Si fuerit æger grandior iam factus, in ipsa accessione summo studio oportet statim eum excitare, ne pereat subito, aut in apoplexiam incidat: semper tamen considerandum est, an fiat per consensum ventriculi, aut aliarum partium: ut medicus possit iis partibus prius medicinam facere, de quibus suis locis dicemus. Quæ verò solent laborantem ex accessione excitare, & liberare, sunt vineula extremorum dolorifica, frictiones etiam illarum partium cum sale, & aceto, clysteres acres,

*Auer-
sentia.* & suppositoria valentiora, de quibus cap. de apoplexia loquimur: voces & strepitus magni excitant, quamvis maximi, & repentini soni extra accessionem eam inducere possint, & aliquando mortem inferre, ut contingit filio Matthæi de Gradi, repentino tubarum clangore. Conferunt quoque in ipsa accessione in conspectum ægri illata magna lumina subito capite;

quædam quoque ad eum instanti accedunt, & manu &

& corpore ægri erectis, & apertis palpebris. Si vinciantur dolorificè testes ægroti fiet proculdubio, vt ab epilepsia excitetur. Hoc quoque medicamentum sæpe naribus admotum idem eff- *Deriuā*
ficere solet: ℞. succi Cyclamini, pulueris seminis rutæ, & coa- *ria.*
guli leporis an 3. ij. mouet enim sternutationem, & excitat: sed prius scindenda est vtraque humeralis, vel inter scapulas per cucurbitulas cum scarificatione sanguis est mittendus. Quod si prædictis non liberatur ab accessione, naribus impone sæpe parum huius pulueris: ℞. hellebori 3. j. castorei, euphorbij, condisi an. 3. ss. misce, & fiat puluis.

Ioannes Agricola in lib. quem de Herbis inscripsit, cuius- *Aqua ce*
dam aquæ meminit ex cerasis, quam etiam multi experti, *rasorum*
sunt, ipsius verba subiiciam. Ex cerasis distillata aqua certissi-
mum statim affert remedium, cum primum in os epileptici
iam paroxysmo correpti inditur. Vnde illico reuiuiscit, & co-
dem temporis puncto surgit liberatus, neque vlllo spasmo am-
plius conuellitur, donec per clementum noua materia aucta,
vt fieri solet, alius paroxysmus oriatur. Elicitur hac arte in
vas exstillationi accom modum, imponuntur cerasa non multò
antè decerpta, adhuc succi plena, fiat humoris intra cerasa
contenti ex igne mediocri eliquatio, quem diligenter, vt rem
pretiosam, atque ære multò redimendam, curabis asseruan-
dam, de quo in os epileptici paroxysmo laborantis coeffun-
das 3. iiij. aut plures, & statim inhibebis impetum violenti
morbi. Considerabis tamen ex tribus cerasorum generibus,
ea esse ad hanc distillationem eligenda, quæ Valentinis di-
cuntur reginalis, dulcia quidem illa plus quàm alia duo ge-
nera, quorum alterum magis rubrum, alterum magis nigrum.

Extra accessionem si fiat à pituita, à qua ferè semper de- *Extra*
pendet, curatur quinque auxiliorum generibus. Primò vi- *accessio-*
ctu calefaciente, & exsiccante, vt aëre, natura, aut arte para- *nem.*
to, zinzibere, cinnamomo, caryophyllis, rore marino, stæca- *Victus.*
de, & similibus igni appositis, dummodo hæc non moueant,
& detegant epilepsiam, qualia sunt pellis caprina, odor he- *Mouētia*
patis caprini, & suffitus cornu illius, lapis gigates ignitus *epilepsia*
naribus subiectus conuulsionem concitat. Hoc quoque facit
suffitus sulphuris, apium, vt multorum est sententia, quibus
videtur Plinius assentire, epilepsiam detegit. Contrarium
scribit Gal. libello de puero patiente morbum comitiale,
si Galeni sit. Suffitus ex galbano, & odor myrtæ epilepsiam
mouent, præsertim corpore non euacuato, quamuis non-
nullis displiceat, cum apud eos, maximè huic morbo confe-
rant, præsertim in declinatione. Dioscorides tamen sentit

DE CVRAN. MORB.

myrrham calfacere, astringere, glutinare, exsiccare, & sopire: nonnulli sunt, qui affirmant prædicta & similia medicamenta in accessione ipsa conferre, & intermissione nocere, & detegere, ut dictum est initio huius capitis de theriaca magna, & de coagulo in lactis coagulatione. Cibus sit, qui bonum, & paucum, & calidum sanguinem efficiat, ut est ius pullorum, columborum agrestium cum ciceribus nigris, & paucopipere: & quia solet esse diuturnus hic morbus, & eget multis euacuationibus maiori nutritione & liberaliore opus est. Utatur ergo turtura, perdice, pullo gallinaceo, gallina tenera, lepore paruo, & cuniculo: semper tamen parum piperis, aut cinnamomi, aut zinziberis addatur: aut eruca, aut sinapi melle conditum. Carnes arietinae sunt bonae, praesertim in Hispania: capita tamen arietum & hircorum pessima sunt, reperitur in eis succus putridus male olens, à quo forsan fiet epilepsia. Coturnix noxia est in hoc morbo, & forsan Arabes loco eius perdicem scripserunt, quanquam apud eos aequè perdix & coturnix nocent, quia solent laborare epilepsia. Similiter anguilla, pisces, legumina omnia præter cicera, herbae frigidae, lacticia, & omnia vaporosa, & cepae, allium, & quae sunt difficilia concoctu maximè obsunt. Cæna sit minor prandio. Potus erit aqua mellis, aut cinnamomi. Si verò habuerit ventriculi imbecillitatem, bibat vinum optimum bene aqua dilutum per horam saltem ante potum. Immodica agitatio, & motus nocet praesertim à cibo, coitus quoque & animi perturbationes.

*Qua no-
ceant.*

Potus.

Ruulsio.

*Praeser-
vatio.*

Secundò, sanguinis missione (praesertim si sint signa sanguinis cum pituita) per sectionem duarum simul humeralium, & extrahatur sanguis respondens plenitudini. Si ætas & virium robur absint, extrahatur sanguis per cucurbitas cum scarificatione ex scapulis. Si ex suppressis mensibus, aut hemorrhoidibus genitus est hic morbus, venæ tibiarum, aut pedum sunt secandæ, in vere tamè magis cõuenit sanguinis missio ad præseruationem.

Decoctio

Tertiò, cõcoquentibus pituitam, ut rhodomelle, ozymelle. S. & comp. syrupo de hyssopo, de stachade, de duabus radicibus, oxymelle scillitico, cum aquis, aut decocto capitali: videlicet, saluiae, prœoniae, stachados, & roris marini, & similium. Hæc materia per multos dies est apparanda, primò mitioribus, secundò post primam purgationem mediis, tertiò post secundam purgationem valentioribus, & si opus fuerit, quartò & quintò.

*Purgan-
tia.*

Quartò, phlegmagogis, de quibus primo capite diximus, ut drachma vna hieræ. S. cum drachma vna agarici trochiscati facto potu cum decocto, aut aqua capitali, pilula elephagina, de

de agarico, Hiera composita, benedicta, pilulæ mastichinæ, diaphænicon, electuarium vtrunque indum: pilulæ cochix optimè euacuant pituitam. His pilulis sine magna custodia vti poterit:

℞. pilularum cochiarum, agarici trochiscati, & pilularum assa- *Pilula*
iaretan. ℥. ij. optimi diagridij. ḡ. xv. cum aqua præoniæ fiant pi- *ad vsu.*
lulæ xv. & aurentur: ad vsu tres pro dosi: aut si magis amat
aliam formam: ℞. diacatholicon. ℥. j. ḡ. diaphænicon ℥. j. aga-
rici trochiscati. ℥. ij. electuarij indi maioris ℥. iij, pulueris rosa-
tæ nouellæ ℥. ij. rhodomellis, quod sufficit, misce, & fiat confe-
ctio. Dosis semel in hebdomada cochlearium vnum.

Quintò, resoluentibus materiam reliquam, & cerebrum cale-
facientibus, & siccantibus, & roborantibus, ne postea similè ma-
teriam generet: qualia sunt theriaca magna, mithrydatū, & dia-
muscus dulcis, & pliris arcoticon, & conferua acori veri: quorū
drachma vna multis diebus summo manè cum vncijs duabus
aquæ, aut decocti, aut syrupi capitalis sumatur, post primam &
alias purgationes maximum in hoc genere auxilium erit.

Sequens quoque confectio est optima in hoc genere om-
ni hora sumpta, præsertim manè: ℞. limoniatæ sinaragdo-
rum. ℥. j. ḡ. diamusci vtriusque an. ℥. ḡ. theriacæ magnæ ℥. ij.
pulueris galangæ, calami aromatici, & radicis præoniæ an. ℥. iij.
cranei humani ℥. j. syrupi de starchade quod satis est, misce,
& fiat confectio. Hoc electuarium est mirabile: ℞. pulue-
ris rosatæ nouellæ, & aromatici rosati an. ℥. j. ḡ. pulueris ca-
lami aromatici, & galangæ an. ℥. ij. pulueris cranei humani,
& coralli rubri præparati an. ℥. j. sacchari dissoluti in aqua
præoniæ quod s. misce, & fiat electuarium in tabulis. Cura-
tur hic morbus radice eryngij cum melle condita, si multis
diebus comedatur: aut sequenti conferua: carnis radicis præ-
oniæ, & eryngij prius benè decoctæ lib. mellis quod s. misce,
& fiat conferua: adde pulueris galangæ, & calami aromatici,
& cinnamomi an. ℥. iij. Nicolaus Florentinus vir magni
nominis nostris temporibus curauit nobilem quandam xl.
annos natam. quæ ab infantia affecta fuit eodem morbo
(quod Gordonius tanquam difficile non credit) hoc medi-
camento: ℞. herbæ sancti Pauli, seu paralesis (hæc dicitur à
Gattinaria costus, seu pipella, & à Dioscoride Phlomis, &
est verbasculum) m. iij. & cum iusta mellis parte fiat confer-
ua, cuius cuilibet libræ adde pulueris caryophyllorum, py-
rethri, & radicis præoniæ an. ℥. iij. Dosis est vnciæ ḡ. cum aqua
aut syrupo capitali. Vncia vna & semis aquæ herbæ prædictæ
cum pauco saccharo, si triginta diebus bibatur, curat hunc mor-
bum. Eandem habet vim oleum terebinthinæ, si in quantitate

*Confe-
ctio.*

*Resolu-
tio.*

*Confe-
ctio opti-
ma.
Electua-
riū mi-
rabile.*

*Radix
eryngij.
Confer-
ua.*

*Olser-
ua.*

DE CVRAND. MORB.

medij cochlearij sumatur. Drachma vna sequentis pulueris est eiusdem ferme facultatis. ℞. cinnamomi electi, galangæ, spicæ, nardi an. ʒ. ʒ. pulueris cranei humani ʒ. j. ʒ. misce.

Cauteria laudantur.

Scilla vis.

Confectio ex scilla.

Consilium.

Laudatum & expertum remedium in hoc sunt cauteria actualia, & potentialia futuræ coronali admota, euacuant à parte affecta. Probatum est aliquos epilepticos vulneribus capitis affectos, curatis vulneribus nunquam in morbum comitiales recidisse. Medicamentum ex scilla est in hoc morbo summum remedium, præcedenti tamen prius euacuatione consentanea, autore Gal. in libello de puero morbo comitiali laborante, quod omnes post Galen. experti sunt. Accipe cæpe narcissi diuisum in partes minimas, ponaturque in vase vitreo, in quod prius mel conseruatum fuerit, luto, aut alia re bene obturato, & per quadraginta dies caniculares soli exponatur, & singulis quibuscque diebus multum moueatur, & agitetur: quo tempore exacto, accipe liquorem ex scilla expressum, & cum sufficienti mellis quantitate fiat confectio. Cuius dosis in iuuenibus, & senibus sit cochlearium vnum in singulos dies: puerorum verò dosis à quarto anno vsque ad decimum quartum erit dimidium cochlearij. Infantibus recens natis vsque ad quartum, & quintum annum minimè conuenit: illorum enim ætas non fert huius medicamenti valentem facultatem: neque potest vacuationes necessarias prius tolerare. In periculosis remediis non laudo audaces medicos: hoc enim auxilio infantem, & canem recens natos subito mori vidimus.

Scholium.

Duobus modis fit Epilepsia. Vallesij lapsus.

Ventriculi qui obstruuntur in epilepsia.

MORBUS comitialis.] Cum Galenus Epilepsiam appellat conuulsionem, nomine conuulsionis motum conuulsuum intelligit. Epilepsia duobus modis fit; primo, proprio cerebri affectu, secundo per consensum: Vallesius lib. 13. de loc. affect. Omnem Epilepsiam ait fieri ab humore crasso obstruente cerebri ventriculos, ac proinde miratur qua ratione possit fieri per consensum. Non animaduertens solam eam Epilepsiam, qua est propria cerebri passio, à dictis humoribus fieri, eam verò qua per consensum fit à vapore, aut alteratione ad cerebrum ascendente, ipsamque irritante ad eius expulsionem. Est tamen aduertendum epilepsiam fieri tantum ab humore crasso obstruente cerebri ventriculos, non omnes, sed secundum aut tertium: nunquam enim fit, ab obstructione anteriorum ventriculorum: ratio est, quia in epilepsia debet impediri transitus spiritus animalis, quod in obstructione anteriorum ventriculorum non contingit. Ex his multorum errores effugies. Primò Rondeletij:

qui

qui epilepsiam sentit fieri ex obstructione meatuum, qui in anterioribus cerebri ventriculis pituitam ad glandulam huic rei dicatam expurgant. Quoniam etsi demus talem obstructionem, & pituitam in anterioribus ventriculis detentam, cum non sit prohibitus transitus spiritus ad principium spinalis medulla, non sequetur Epilepsia. Secundus error est eiusdem existimantis obstructionem cerebri, qua Epilepsia causa est, à tenui humore etiam fieri: reuera enim hoc repugnat natura humoris tenuis, qui penetrare potest, & non obstruere. Tum hoc etiā repugnat curationi eius epilepsia, qua est propria cerebri passio ab obstructione pendēs: hac enim attenuantibus crassos humores, & incidentibus glutinosos perficitur, quorum nullum humori tenui conuenit. Tertius error adhuc maior est Ioannis Langij, qui sentit Epilepsiam aliquando fieri ab obstructione à vapore crasso orta. Qua enim ratione vapor impediet transitum spirituum? Epilepsia proximè accedit ad apoplexiā, eò quod obstructio incepta facile poterit crasso humore addito perfici. Aduenit hac frequenter pueris, cum septimestres sunt, & perseverat. usque ad annos pubertatis. 2. aph. sent. 45. lib. 5. sent. 7. pueris aduenit frequenter ob voracitatem, & robur facultatis expultricis. Cessat autem in pubertate ob magnam mutationem, qua viris ab atate & coitu contingit, mulieribus verò ex menstrua purgatione. Post pueros frequenter hoc malum adolescentibus euenit, omnium minimè senibus, quia cum languidam habeant expultricem facultatem, ueniat. non facile mouetur ad expellendum rei alicuius molestiam, quod Lupeius non animaduertit.

Morbus comitialis si hæreditarius.] Cum sani homines sanos, & agri agros generent: Epilepsia hæreditaria erit, cum patre, aut matre ea affectis, filius imbecillitatem capitis contrahit: hac (quæ uis ab autore incurabilis fiat) curari potest. roborato capite, & optimo ritu. Praservantur ab ea pueri, quorum fratres simile malo perierunt, melle cum pauco fœniculo cocto & despumato, & postea permixto cum oleo amygdalarum dulci. Mel enim cum fœniculo attenuat crassos humores, & eos cōcoquit, oleum verò amygdalinū fluidam aluum seruat. Præterea ex medicamentis, qua laudantur ab autore, primum exhibendum non est: quia si pueri exiguum alimentū, etsi familiare, non possunt ferre in ventriculo, qua ratione medicamentum ex tam variis & multis inutilibus rebus commixtum ferre poterunt? Prasertim cum supradictum ex melle medicamentum id efficiat. Tum si in officinis habemus paratos syruos pituitam incidentes & melancholiam attenuantes, ad quid cranium humanum, smaragdus pulvis vermium rubi, & similia? Certè hic, & similes viri cum ad manum habeant medicamenta, ut admirationi sint, ad ea, quæ difficulter parantur, & cum mi-

DE CVRAND. MORB.

nori utilitate, ne dicam incommodo confugiant. Secundum medicamentum auctoris, si in ventriculo non sit pituitosus humor collectus, optimum est. Tertium vero, quod incipit, ℞. succi ruta, est omit- tendum: in eo enim auri folia inutilia, & smaragdus maxime la- dens obstruendo, & incrassando humorem ingrediuntur, omittere etiam oportet Pliny medicamentum. Et in summa qui existimant

**Epilep-
sia non
habet
medica-
menta**

aliqua esse medicamenta, qua epilepsiam curant: occulta vi, deci- piuntur maxime. Quia hic morbus manifestus est, nempe obstru- ctio, aut res cerebro contraria: siue sit alteratio, siue vapor, reme- dia ergo erunt etiam manifesta agentia, qualia sunt illa, qua mor- bo contrariantur.

**toto tē-
peramē-
to ope-
rantia.
Epilep-
sia ex la-
ctis cor-
ruptio-
ne.**

Si morbus comitialis fiat ex lacte.] Epilepsiam ex lactis cor- ruptione curabis, prius interdicens lac, deinde purg. in lo ventricu- lum pulvere hiera picra, & rhodomelle si validus puer sit, ita ut sit 3. aut 3. j. & ℞. pulueris, & rhodomellis 3. ℞. cum decocto fo- niculi: in grandioribus pulvere praedicto & terebentina 3. ij. cum decocto praedicto. Suppositorio reuellere poteris à ventriculo, ex 3. j. pul. hiera. 5. Gal. faciens duo suppositoria in sufficiente quantitate mellis, & addendo unicuique, si opus fuerit, salis gemma ʒ. ij. Ne- que opus erit uti coagulis, cum habeamus oximel Rhodomel, & alia similia lac coagulatum dissoluentia.

**Plexitu-
do ven-
triculi.**

Valentinæ feminae.] Hanc plenitudinem commodè depone- mus hoc medicamento. ℞. hiera. 5. Gal. 3. j. oxizaccari. 5. 3. j. de- cocti hordei, quod s. misce, & fiat potio.

Extra accessionem si fiat.] Omnia calida & euaporantia, quia calefaciunt cerebrum, & vapore illud replent, fugienda sunt. San- guis mittendus est ex cephalica, ut reuellemus à capite, & euacue- mus ex cerebri ventriculis, vena enim cerebri inanita humorem attrahent ex eius ventriculis.

**Euapo-
rantia
fugien-
da.**

Quintò, resoluentibus materiam.] Nullum praestantius re- medium curat Epilepsiam, quam sit optima victus ratio, & lo- cus etiam siccus. Quod si aliquis habeat Epilepsiam, cuius cura- tionis nulla sit spes, huic opus erit tempora veris sanguinem mit- tere ex parte longinquiori, ex pede scilicet ut reuellemus: tunc

**In despe-
rata epi-
lepsia
aliquid
agendū.**

enim nullus est adhuc in capite affectus postulans euacuatio- nem. Purgatione etiam & optimo victu videntes, accessio epi- lepsia, non ita frequenter, ut solebat, neque cum tanta molestia aliquid apprehendet.

De melancholia. CAP. IX.

**Descri-
ptio.**

Melancholia quædam est mentis alienatio citra febrem ab humore melancholico proveniens qui mentis sedem, quæ

quæ cerebrum est, occupat, & eius temperiem immutat. Trifariam ea fit, ut autor est Galen. Interdum enim vniuerso, qui in *Causa* *& diui-*
 venis continetur, sanguine melancholico affecto, cerebrum *sio.*
 ipsum communem etiam totius corporis noxam sentiens ob
 generale vitium afficitur: nonnunquam vero reliquo sanguine
 naturam seruante, & innocuo existente, solus is qui in cerebro
 inuenitur, dignus est, qui notetur, cum in melancholicam na-
 turam sit alteratus. Quod bifariam contingit: aut enim aliun-
 de in ipsum deriuatur, aut in ipso met genitus est, cum videli-
 cet internus calor, aut bilem, aut crassum, atrumque sangui-
 nem superassauerit. Quæ sanè distinctio non parum ad curatio-
 nem conducit. Siquidem vbi vniuersus corporis sanguis me-
 lancholicus extiterit, auspicari curationem à sanguinis missio-
 ne conuenit: vbi verò solum is, qui in cerebro continetur, infir-
 mus (quantum ad hanc attinet dispositionem) secta vena non
 indiget, quamuis ob aliam causam secari possit, quod aut pro-
 pter plethoriam erit faciendum, aut præseruationis gratia, ut
 Ætius opinatur.

Est præterea tertium melancholiæ genus, quod à ventriculo
 oritur, medicis plerisque hypochondriacum flatuosumque no-
 minatum, propter ascendentem in cerebrum melancholicam
 quandam exhalationem similem ei, quæ oculorum suffusiones
 inducit.

Operæ pretium autem erit, communes primum notas re-
 censere, post ad peculiâres aduenire. Sunt verò communes
 notæ, metus tristitia, hominum odium, & auersio. Variæ præ-
 terea sunt melancholicorum imaginationes: alij se fictilia
 vasa arbitrantur esse: alij animalia bruta, alij mortem expe-
 runt: quam sibi non rarò consciscunt: simul etiam & perhor-
 rescunt eandem, atque abominantur: quod admiratione ma-
 gis dignum est. Nonnulli semper rident, Democritum imitati,
 alij Heraclitum referentes, in perpetuo sunt luctu. Sunt qui
 se Deo plenos, & cœlesti numine afflatos opinantur, futu-
 râque prædicere posse. Sed longum esset omnes horum ima-
 ginationes recensere, & longius multo omnium causas red-
 dere, cum hæc vna res ex earum genere sit, quæ fieri non
 possunt. Verum si quis exercere se in hac contemplatione vo-
 let, licebit sanè illi per me, verum ea lege, ut philosophiæ
 conuenientia dicat, verbi gratia siccitatem, in eo qui se te-
 stam esse credebat, causam explicabit: in eo verò, qui se caput
 non habere arbitratur, & leuitatem, quam spiritus eleua-
 tus præstabat. In cuius curationem, præter alia dicitur exco-
 gitasse Philotimus pileum plumbeum, cuius pondere appres-
 lus

Signa

commu-
nia.

DE CVRAND. MORB.

*Signa
particu-
laria.*

sus caput se habere intelligeret. Iam ad peculiare notas accedamus. Eos qui per consensum totius corporis melancholici sunt, hæc sequuntur, graciles sunt, malicentieque, venas habent latas, hirti sunt, squalent, duri, nigri, aliquando rufi nonnunquam flani, denique vndeunque & ex toto melancholici apparent, idque aut propria natura, aut propter vigilias, sollicitudines, iras, mœrorem, ciborum usum & antea actam victus rationem, quæ ad torrendum sanguinem, & in melancholicum convertendum aptissima est. Quæ postquam optimè consideraueris, cubiti insuper venam secato (certissimam enim hinc coniecturam facies) secabis autem mediam: quod si emanans sanguis melancholicus sit, pro laborantis viribus educatur, si purus & sincerus, nequaquam: sumpto hinc argumento, quod solum is, qui cerebrum occupat, sit melancholicus: qui aliter est, educendus. Hypochondriaca melancholia sic dignoscitur. Primò enim stomachi accidentia emergunt, flatus inquam gurgulationes, cruditates, eructationes acidæ, & alui desiccatio, & ab egestionibus, vomitu, & eructatione percepta leuitas, & quod ager omnes molestias circa hypochondria versantes percipiat.

*Viæ
ratio.*

Initio quinque auxiliorum generibus sanatur, nam confirmata ægrè, aut omnino nunquam curari potest. Primò, victu humectante, & in actiuis temperato, ut est ius arietis, & gallinæ cum borragine, aut buglossa alteratum. Bibat vinum buglossarum, id est, habens radicem buglossæ, rubrum, me-

*Cibi me-
lancho-
lici.*

diu in ætate, & substantia, bene dilutum aqua. Quæ atrabilem gignunt, maximè nocent, ut salsa omnia, caro ceruina, hircina, bubula & leporina, nisi hæc tria animalia essent propinqua ortui: tunc ratione humoris optimi sunt alimenti. Legumina quoque nocent, & multum calida, qualia sunt eruca, sinapi, piper, zingiber, & similia. Animi perturbationes, & coitus immodicus satis nocent, aliquando tamen prodest, si moderatus sit: præsertim si ex semine detento, & corrupto profectus fuerit hic morbus. Blandè iis inferuendum est, aliquando tamen acribus sunt increpandi & tractandi, sed perpetuò cautè. Nam aliqui sunt obiurgandi, verberandi & vinciendi, ne manus violentas medicæ, aut aliis inferant. Sæpe oportet obseruare melancholici phantasiam, & imaginationem. Si quis enim eorum mente sua informet & fingat, in ventre se habere ranas, aut serpentes (ut quidam melancholici iam figurarunt) promittat medicus se animalia illa facile expulsum, & post purgantis medicamenti effectum ea animalia deiectionibus immixta viua ægroto ostendat.

ostendat. Si æger cibum, potumque fastidiat, ei omnia ferme genera alimentorum, ut licebit, sunt offerenda, ut possit gratum sibi accipere. Si verò nihil, aut parum comederit, hoc nutriatur clystere. ℞. iuris gallinæ, decoctionis florum cordialium lib. j. oleorum violarum & amygdalarum dulcium an. ℥. ij. butyri recentis, & cassiæ fistularis præparatæ an. ℥. j. vitellorum ouorum nu. 2. misce, & fiat clyster. Nutriatur quoque bonis odoribus, præcipuè hæc mixtura sæpe naribus admota. ℞. succi pomorum redolentium lib. j. aquæ rosarum ℥. iij. vini albi optimi, & bene olentis ℥. j. ℥. misce. Somnus conciliandus est iis, quia longa est eorum vigilia, & maximè eis nocet. Quod si lactuca, & lac seminis papaueris non possint somnum inducere, tibias, & pedes sæpe lauentur decocto lactucæ, violarum, foliorum salicis, & arundinum, corticum papaueris albi, & iuschiæ. Naribus quoque & fronti, aut temporibus admouenda sunt olea violarum, aut papaueris, aut vnguentum populeon.

*Clyster
nutriens.*

*Somnum
indu-
centia.
Topica
soporife-
ra.*

Secundò, apparantibus atram bilem syrupo de pomis, de buglossa, de borragine, de fumaria. S. & comp. de epithymo cum duplo aquarum, aut decocti buglossæ, barraginis, fumaricæ, lupulorum, scolopendriæ. Hæc tamen multis diebus sunt bibenda quia terrestris est, & admodum resistit atra bilis.

*Præpa-
ratio.*

Tertiò, vacuantibus melancholiam, quæ si sit sanguinea, aut cum præsentia sanguinis: & si fiat per consensum totius, statim à legitima & iusta victus ratione est vena media seu communis secanda, autore Gal. iij. de loc. affect. cap. vj. sanguinisque tantum extrahendum est, quantum respondeat plenitudini: cum ex repressis mensibus, aut hæmorrhoidibus inhibitis nascitur, venæ tibiarum, aut pedum sunt incidende, & in confirmata iam & veteri frontis vena aperienda erit. Vacuanda quoque erit lenibus & clementibus, quæ hæc sunt epithymus, & aqua casei, & myrobalani indi: ut ℞. pulueris epithymi ℥. ij. aquæ casei ℥. iij. misce: vel epithymi ℥. j. corticum myrobalanorum indorum. ℥. j. ℥. fiat decoctum in vnciis sex feri caprini, donec vnciæ duæ consumantur. Deinde valentionibus, ut folliculis, sene, diasene, confectio- ne medicaminis quod scripsit Hamec, pilulis indis, & de fumoterræ. Multi quoque lapidem armenum, & lapidem stellatum, seu lazuli laudant in purgando hoc humore, sed ego his non auderem vti simplicibus, neque in compositione, quia primus incognitus est, secundus verò est malignus, nisi fuerit bene electus, & præparatus lapis stellatus, in die ta- men purgationis per pilulas ab opere bibat æger decoctum fructuum,

*Vacua-
tio.*

*Sectio
vena.*

*Quæ ve-
na se-
canda.*

*Purga-
tio lenis.*

*Valen-
tior.*

*Deco-
ctum.*

DE CVRAND. MORB.

- die pur-* fructuum, & florum humectantium: ut sunt vuarum passarum sine gra-
gationis nis, pruna damascena, violarum, borrago, & similia: ne intempe-
sumen- ries sicca à medicamento sicco multum intendatur. Quia mor-
dam. bus hic est diuturnus, necessaria est vacuatio frequens, quae fiet
 optimè hac confectione. ℞. cassiae fistulae preparatae ℥. ij. con-
Cōfectio fectionis medicaminis Hamec, & dialenae an. ℥. j. conferuae
 borraginis. ℥. ss. pulveris diarhodon abbatis. ℥. ij. syr. buglos-
Pulvis sae, q. s. m. & fiat confectio. dosis est cochlearia duo semel
saluber- in hebdomada. Pulvis hic optimus & ferme diuinus est, exper-
rimus. tusque à multis grauissimis medicis, & eo multi melancholici
 curati sunt. ℞. epithymi ℥. iiij. lapidis lazuli optimi, agarici
 trochiscati an. ℥. ij. scammoni. ℥. j. caryophyllorum numero
Laudes 20. misce, & da. ℥. ij. cum sero ouino, aut caprino, aut aqua
huius borraginis, aut buglossae: hoc medicamentum dilige, & eo
pulueris. utere, si vis salutem aegris restituere, & honores assequi. Dicitur
 à quibusdam pulvis benedictus.
- Auersio.* Quartò auertentibus à cerebro & corde ad ignobiles partes:
 ut partium extremarum frictionibus, vinculis, foru ex decocto
Clyster. rerum parum calidarum, cucurbitulis, balneis, & clysteribus: ut
 hoc: ℞. maluarum, fumarum, borraginis, lupulorum an. m. j. epi-
 thymi, senae an. ℥. iiij. fiat decoctum. de quo accipe lib. j. cassiae
 fistularis preparatae ℥. j. olei violatum & sesaminis an. ℥. ij. sa-
 lis. ℥. ij. misce, & fiat clyster.
- Discutiē* Quintò, reliquias resoluentibus, & corroborantibus ca-
ria, corro put & cor & tandem humectantibus, & intemperiem capitis
borātia, & totius siccam sanantibus, primum fit per diamuscum dul-
& alte- ce, & amarum, per electuarium de gemmis, per electuarium
rantia. laxificans, Rhasis in quantitate drachmarum duarum, cum
 aqua buglossae. Fit etiam resolutio, & illarum partium prin-
Cōfectio cipum corroboratio per hanc confectionem. ℞. margarita-
 rum ℥. ss. hyacinthorum, zaphirotum, smaragdorum, utrius-
 que corallij an. ℥. ss. cinnamomi, macis, galangae, nucis
 muscatae an. ℥. j. caryophyllorum, piperis longi cubebarum,
 ligni aloës, storacis, calamithae, seminis basiliconis an. ℥. ss.
 croci ℥. j. musci ambræ an. ℥. iiij. sacchari candi, carniū
 vuarum passarum an. ℥. j. conferuae borraginis, & buglossae an.
 ℥. j. aquae rosarum, muscatae sac ℥. j. chari optimi, quod sat est,
 misce & fiat confectio: dosis quolibet mane drachmarum trium
Simpli- cum vnciis tribus aquae buglossae. Corroborant etiam caput
cia robo- auellanæ & amygdalæ tostae à cibo, & coriandrum prepara-
rantia tum, & sequens pileum, ℞. coriandri preparati ℥. ij. rosarum,
caput. florum borraginis, buglossae, & violarum an. ℥. ss. cubebarum,
Pileum nucis muscatae, stechados, maioranæ, anthos an. ℥. j. corticum
co robo- rans.

papaueris albi ℥. iij. in puluerem redigantur omnia, & fiat pileū,

Intemperies sicca curatur balneo totius capitis ex maluis, violis, althea, lactucis, borragine & buglossa, capitibus & intestinis veruecum. Capiti raso admoueatur butyrum recens, & farina hordei, vel hoc vnguentum, quod spinæ etiam adiuuendum est ad totius humectationem. ℞. olei amygdalarum dulcium ℥. ij, olei violarum, & papaueris an. ℥. j. β. butyri recentis ℥. j. mucilaginis althæ & fœnugræci an. ℥. ij. axungia gallinæ ℥. iij. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum.

Si sit per consensum partium circa hypochondria, habitatione victus iam dicta superius, cui addes in hac & in omni carnem accipitris, cum succo maioranæ, quæ habet miram facultatem in curanda melancholia, & pulli noctuæ. Est etiam experta in curatione eius aqua per distillationem ex muribus boni pastus cum gallina & aquis cordialibus facta, forsan est in muribus vis, & natura curandi hunc morbum, quemadmodum in accipitre, qui accipiter nutritur muribus. In præcedenti quoque euacuatione, & aliis multis remediis præter sanguinis missionem, quia rarò in hac confert, summopere est resolvens flatus spiritus, quod primò & præcipuè fiet per clysterem hunc, & similem, tertio quoque die iniectum. ℞. blitis, matricariæ, cuscuthæ, melissæ, maioranæ an. m. β. polypodij, senæ, carthami an. ℥. j. epithymi, thymi an. ℥. β. ameos seminis aneti, seminis fœnuculi & carui an. ℥. iij. fiat decoctum, de quo accipe ℔. i. cui adde diasenæ, hieræ logodionis, & confectionis medicaminis Hamec. an. ℥. β. olei camomillæ, & de lilio an. ℥. ij. salis. ℥. ij. misce. Spiritus flatus dissipatur fori ex camomilla, meliloto, calendula, rore marino, radicibus quinque diureticis, seminibus anethi, fœniculi, cynthi, ameos, carui, & baccis lauri ventriculo semper vacuo, saltem bis in die, & post forum quotidie ad dissipandum flatum venter vngatur hoc vnguento. ℞. olei anethi, de lilio, laurini & rutæ an. ℥. j. pulueris rosatæ nouellæ & diacymini an. ℥. ij. ceræ quod sufficit, misce & fiat vnguentum. Si ante cibum comedat cochlearium vnum huius pulueris, flatus valenter dissipatur. ℞. coriandri præparati ℥. j. pulueris buglossæ ℥. β. cina-momi electi, cortici citri, seminis fœniculi, anisi, & carui, an. ℥. iij. origani ℥. ij. ligni aloës ℥. j. sacchari ℥. iij. misce, & fiat pulvis. Syrupus sequens est ad flatum dissipandum accommodatissimus, & caput cum corde corroborandum. ℞. serici crudi ℥. ij. seminis basiliconis, caryophyllorum, foliorum citri an. ℥. j. corticum mali cidonei & corticum citri an. ℥. iij. radicum buglossæ, nu. 7. foliorum buglossæ m. iij. fiat decoctum

Alteratio.

Vnguentum humectans

Hypochondriaca curatio.

Accipitris & murium vis.

Clyster flatus dissolvens.

Topica.

Forus.

Vnguentum Pulvis.

Syrupus dissipans flatus, & firmans caput.

DE CVRAND. MORB.

*Pauperibus
utilia.*

decoctū in quantitate debita aquæ, de qua accipe quantitatem conuenientē ad lib. iiii. optimi sacchari, & fiat syrupus, aromatizetur hoc puluerē mastichis, zinziberis, galangæ, zedoariæ, spicæ an. 3. ij. ligni aloës, caryophyllorum, nucis muscatæ, an. 3. j. musci, ambræ an. 3. j. Dosis. 3. ij. Pauperes tamen loco eius, & diuites si velint vtatur electuario rosatæ nouellæ, aromatico rosato, diacymino, & similibus. Si melancholia fiat per consensū hepatis, aut splenis, aut vteri, aut aliarū partiū curatis illis facilis erit curatio huius morbi, de quibus suis in locis agemus.

Scholium.

*Quid
melan-
cholia.*

*Morbus
in epile-
psia.*

*Duplex
melan-
cholia.*

*Corrigi-
tur Gal.
locus.*

Melancholia quædā est. Melancholia hoc in loco, non humore, sed affectum ē causa nomen assumentē significat. Est enim deliriū sine febre cū metu & tristitia. In hac definitione deliriū est genus, quo cōmunicat cum phrenitide & mania. Reliquis verò partibus melancholia ab eis distinguitur, quia phrenitis est cum febre, mania sine metu & tristitia. Pars affecta est cerebrū, ut constat ex actione eius laesa. In ea j. n. imaginatio est deprauata, multipliciter tamen 1. de caus. symp. cap. ultimo, ita ut stultorum infinitus sit numerus. Morbus ad quē sequitur (loquentes de ea que proprius affectus) est intemperies frigida, & sicca cerebri ex melancholico humore orta. Humor melancholicus, cū non solū habeat generationē ex hepate frigido, sed ex caliditate sanguinis tenuem partem consumente: proinde non est mirandū si per febriles morbos multi melancholici fiant. Melancholia hæc aut fit per propriū affectū, aut per consensum. Per propriū affectū euenit, quādo humor melancholicus in ipso cerebro continetur. Quod bifariam contingit, primò cū melancholia ibi generatur, secundo cū aliunde fluit. In cerebro generatur à caliditate sanguinem excitante, cūque melancholicum efficiente, unde corriges locum lib. 3. de loc. affec. c. 6. qui sic habet. In cerebro (hoc enim sub audiendum est) melancholicus humor genitus est, cum videlicet internus calor, aut flauam bilem, aut crassum atrūque sanguinem assauit. Declendum erim est totum hoc (aut flauam bilem, aut) quia flaua bilis assata sit atra bilis, non autem melancholia. Aliunde fluit melancholicus humor cum lien (à quo expurgatur) minus rectē ipsum attrahit: Aut iecur multā generat melācholiā, aut, cū ab alia causā in venis conseruatur, tunc enim in cerebro, languidum si sit, colligitur. Per consensum excitatur melancholia, quando ex hypochondriis ortam habet, quam solent medici hypochondriacam nominare. Hanc melancholia morbi diuisionem consideramus propter curationem; quia si in toto corpore contineatur sanguis melancholicus, seralimus venā, ut reuellemus à cerebro. Si

verò

verò in hoc affectu solus sanguis, qui est in cerebro melancholicus sit, abstinendum erit à venæ sectione, euacuemus optimum sanguinem, & qui necessarius est ad coctionem melancholici humoris: nisi ipsum eduxeris ratione plethoræ.

Est præterea tertium melancholiæ genus.] Melancholia per Melan-
consensum hæc est. Quæ sit à vaporibus melancholicis ex venis ven- cholia
triculi ascendentibus ad caput, etiamsi non sint acres: unde hac in per con-
parte errauit Iacotius. Hic autem melancholicus humor in venis ven- sensum,
triculi detentus, & obstructione faciens aliquando putrescit, & ali-
quando non. Si putrescit, calorem in illis venis generat, quæ intel-
xit nomine inflammationis Diociles, non autem phlegmonem, ut multi
male voluerunt, eritque cum siti. Quod si hac putredo effatu digna
sit, Melancholia habebit febrem adiunctam. Si humor in venis præ-
dictis non putrescat, ichores melancholici ad ventriculū descendentes
acidum ructum, ledentque eius coctionem: cumque error primæ coctio-
nis non possit emendari, in secunda, corpus male nutrium gracile scet.

Melancholia signa communia sunt metus, & mæstitia, si multū Melan-
perseuerent, 6. aph. sent. 23. adde tamen sine causa manifesta: signa cholia si-
communis hæc dicuntur, quia conueniunt melancholia, quæ est præ- gna.
prius affectus, & illi quæ per consensum accidunt. Causa tristitia &
timoris est cerebri, & spiritus animalis (qui ex sua natura debet
esse lucidus) obtenebratio. Hæc autem, in ea quæ sit per propriū asse-
ctum, ab humore, at in illa, quæ lege consortij accidunt, à vapore nigro
pendet. Quod autem hæc sit optima causa Gal, 2. de caus. symp. cap.
ultimo, exemplo ostendit: si enim tenebræ externa timorem & mæ-
stitiam inducunt, nonne melius id efficiunt illæ, quæ interna sunt?
Dices non metus, & mæstitia sunt cordis passionēs; cur ergo causam
earum in cerebro collocamus? Respondeo, ex opinione mali ortum
habere predictas passionēs, spiritum autem denigratum deprauare
imaginationem, ita ut excitet opinionem mali præsentis & futuri,
& hac ratione incutere timorem & tristitiam.

Quintò, reliquas resoluentibus.] Si in melancholia, quæ pro-
prius est cerebri affectus, intemperiem & frigidam & siccam habe-
mus in cerebro, debemus ergo cerebrum humectare, & ex eo humore
euacuare, quod commodè præstat balneum, caput etiam consum la- Male an
uabimus decocto ex capite arietino, chamomillo, violis, fenugræco, ctorem,
& floribus buglossæ. Hinc videbis errorē auctoris, & aliorum præ- & alios
dicorum caput roborantiam in hoc affectu confessione per os as- præcticos
sumpta, longa quidem, & ex rebus siccis constituta. Si enim cerebrū in melā-
humectandū est, quæ ratione hi id efficiant? tum si ex capite abbe- cholia
mus euacuare humorem, topicis id præstandū erit, & non internis. explicā-
Debet præterea medicus in melancholia lianem roborare, ut attra- tia præ
hat melancholicū succum, quod præstabit oleo de absinthio & aliis. pinare.

DE CVRAN. MORB.

Lapsus Si sit per consensum partium.] Ea quæ dicit auctor de carne
auctoris. accipitris, muribus, & pullis noctua, falsa cum sint omittantur: quia
Curatio hypochondriaca hac affectio ratione cognoscitur, ac proinde remedia
melan- ratione inuenta, & nõ experientia admittet. Curabitur ergo victus
cholia ratione humectante, secundo humor obstructionem in venis ventri-
hypocon- culi efficiens præparabitur syrupis, in prima melancholia ab auctore
driaca. propositis: ita ut illa, in qua putredine habet humor (quam ex siti
Purga- colligemus) misceamus syrupum endiuia compositum cum decocto
tio. endiuia, borraginis, & aliorum, quæ aliquantulũ refrigerant. Tertiò,
 hoc medicamento purgabimus. ℞. pul. hiera picra. ʒ. iiij. aut iiij. cõ-
 fectionis hamec ʒ. ij. dissoluatur in decoctione hordei q. s. & fiat po-
 tio. Hamec melancholiã educit, at hiera serosos & tenues humores in
 ventriculo cõtentos, & simul ipsum roborat, ne eos recipiat, poterit-
Vngueta que frequenter uti hoc medicamento. ℞. pul. hiera. ʒ. Gal. ʒ. iiij rho-
ad lienẽ. domellis. ʒ. j. cum aqua fœniculi q. s. duobus tamẽ aut tribus diebus
Ad ani- præassumpta decoctione ex hordeorum cortice, & fœniculo parata.
mi deli- lien ungatur hoc unguento, quod corroborat ipsum, & attenuat hu-
quium. morem melancholicũ. ℞. olei al. sinthij, de capparibus, tamaricis &
 ireos. ana. ʒ. j. ʒ. ammoniaci dissoluti in aceto ʒ. iiij. brionia ʒ. iiij.
 massa emplastri de meliloto loco cera q. s. fiat unguentum. Et cum
 aliquãdo ex flatu in hac affectione fiat animi deliquiũ utemur hoc
 medicamento. ℞. confectiois Gentilis contra melancholiam ʒ. ij.
 conserua borraginis ʒ. j. misce: hac cum aqua melissa accipienda
 est. cui, si vigiliis molestetur ager, adde syrupi papaueris. ʒ. j.

De Incubone. C A P. X.

Descri- **I**ncubo, vel incubus, quem Græci ephialtem appellant: sumpta
prio. quidem appellatione vel ab eius nominis viro, aut quod ma-
 gis credibile est, à vocis significatione, cum hoc morbo correpti
 inuadi se ab alio opinentur: porro & à Themisone pnigamon,
 aut pnigalion dicitur: quod præfocari ægrotantes videantur. Vt
 tamen nominetur, malum est, ubi aliquis in somno opprimi se,
 & incumbente quadam mole, teneri arbitratur. Cæterum oritur
 is morbus à crapula potissimum, & iugi in ventriculo cruditate,
 vaporibus nimirum inde in cerebrum ascendentibus, qui & ipsũ
 obruant, & iter spiritibus animalibus aut facultati animali per
 nervos occludant. Qui sic affecti sunt, tardè admodum difficilẽ-
Signa. que mouentur, torpent in somno, cum in corpus cerebri facultas
 non defluat, suppressam vocem aut frustra conantur rumpere,
 aut incertã, inarticulatãque reddunt. Ad hæc suffocari se ima-
 ginantur; & ab ingruente aliquo detineri, denique ea omnia,
 quæ vigilantes epileptici perpetiuntur, hæc eadem per quietem
 perferunt, qui hac molestantur affectione. Cum summa tandem
 anxietate

anxietate tenuiori facto spiritu, & in halitu digesto discussõe, & referatis cerebri meatibus subito expergefiunt. Succurrendum huic malo est incipienti, si enim semel inualuerit, graues sæpe affectiones parit, Epilepsiam scilicet, Maniam, & Apoplexiam, cum horum velut præludium quoddam fit, autore Ætio. Hic tamen si inter somnum, & vigiliam superuenerit, malus est, deterior verò si cum sudore frigido.

Curatio eius similis est curationi morbi comitialis, quamuis mitior, semper tamen æger à somno excitetur violenter, & cum increpatione, sæpe quoque fiat in eo vacuatio per Hieram S. Galeni, & agaricum trochiscatum.

Curatio.

Scholium.

Incubo vel incubus.] In incubone cerebrum laesum esse confirmant medici ex actionibus eius laesis, quæ sunt, imaginatio sensus & motus. Imaginationem laesam colligunt, quia qui hoc malo detinentur, existimant quiddam sibi incumbere. Quamuis id Rondoletius & alij ad plenitudinem venarum thoracis referant. Sensus etiam laesus est, quia ut aiunt, is in somno torpidus est, sicut & motus voluntatis difficilis. Ex his aliqua falsa sunt: imprimis, quod ait Rondoletius stare non potest, quia si plenitudo est in thorace, sensum grauitatis inducit in vigilia, non autem in somno, in quo mens aliò leuius reintentata est. Adde hanc plethoram non ledere imaginationem. Falsum etiam est, id quod ij dicunt, in incubone scilicet actiones sensus & motus ledi: dicere enim esse sensum in hoc malo affectis, cū dormiunt, torpidum, nonne ridiculum est? quasi in aliis dormientibus qui sit acutus? Quod autem motus laesus non sit, constat ex eo, quod brachia & crura mouent, respirant etiam. Vnde dicendum est, Incubonem esse symptoma, in actione laesa principe. Est enim imaginatio deprauata, quæ contigit ex speciebus rei alicuius suffocantis, & opprimentis, in cerebro motis. Tunc enim existimant se esse oppressos, ita ut, si v. lint loqui, quasi detineantur. Dices cur in vigilia non contingit? Respondeo, non esse necessum, ut quæ in somno, eadē in vigilia afficiant: somniamus enim dormientes, & non vigilantes. Videamus modò, quem morbum sequatur hoc symptoma. Aliqui existimant, morbum esse obstructionē ventriculorum cerebri: & hi differunt, quia multi existimant obstructionem hanc esse, in anterioribus ventriculis, aut in principio spinalis medulla ab humore factā. Alij sequuti Posidonium à vaporibus frigidis & crassis spiritus animales per nervos ferri prohibentibus, eam fieri sentiunt. Qui omnes errant maximè: nam si tanta est obstructio, ut impediatur transitus spirituum, fiet ergo caros epilepsia, aut apoplexia. Tum si obstructio est incubus, cerebrum afficitur non ut similis pars, sed ut instrumentum.

Sententia aliquorū de incubone.

Quid sit incubo.

Morbus ad quem sequitur.

Refutatur ali-

Vera ſe-
rentia.

mentia, ut Altomarius ex Ætio probat: qua ergo ratione erit laſa imaginatio? Sententia Poſſidonij nulla ratione poteſt admitti, non enim poteſt ratio capere modū, quo vapor poſſit impedire tranſitum alicuius ſubſtantia, cum ſit tenuis, & ſicut aër facile cedens. His omiſſis dicimus, in incubo, ſi cerebrū afficiatur proprio affectu, morbum eſſe intemperiem frigidam & ſiccam: ſi verò per conſenſum, morbū eſſe, aut in via: ſi vapor, ex obſtructione venarum ventriculi aſcendat: aut tumorem præter naturam, ſi ſcyrum lienis ſequatur.

Error
multo-
rum.

Inde colliges errorem multorum medicorum ſentientium hunc affectum fieri à Damone, ducti in hanc ſententiam ex eo, quod quidam Damones appellantur à Theologis incubi. Hi enim etiā ſi hoc nomine appellantur, non quia hunc affectum efficiant: ſed à coitu, quia aſſumentes aërea corpora, ſub virorum forma mulieribus incubent ſicut & ſuccubi appellantur illi Damones, qui fœminam mentientes, viris ſuccumbunt. Et ex horum coitu natos fuiſſe gigantes multi ex Theologis affirmarunt. Ex ſupradictis intelligis quam malè omnes cauſam iſtius morbi ad crapulam & cruditates refe- rant, cum hæc nunquam imaginationem ledant.

Curabitur hic morbus ea ratione, qua melancholia.

De iis qui amore infaniunt. CAP. XI.

Descri-
ptio.

Descri-
ptio ſol-
licitudi-
nis.

Nota.

Curatio.

Præſer-
uatio.

EX amore poſſe aliquos infanire argumento eſt. Antiochus Seleuci filius, qui Stratonicam nouercam miſerè deperiuit, atque alij quamplurimi, quorū frequens eſt in hitoriis mentio, & in poëtarum monumentis non rara, quamuis ſub fabularum inuolucro. Eſt verò (vt Ouidius cecinit), amor res plena ſolliciti timoris: ſollicitudo autem, vt ait Paul. Ægineta, animi quædā affectio, cum videlicet ratiocinatio in vehementi, ac laborioſo quodam motu conſtituitur. Occaſionē huic morbo exhibet res ipſa amata. Deprehenditur malū, quia oculi concaui fiunt, lachrymas nullas oſtendant, ſed voluptate quaſi perpetua perſuſi apparent, agitantur & ſubſiliunt identidem palpebræ, & aliis omnibus corporis partibus illæſis ac conſiſtentibus, ſolū hi amantibus concidunt. Pulſus peculiaris huic morbo nullus eſt, quod medicorū aliqui ſunt opinati, ſed quales ſolent eſſe illorum, qui multis ſollicitudinibus ſūt impliciti. Eraſiſtrati denique arte oportet vt, vt morbus ex toto detegatur. Præcipua huius morbi curatio tradita eſt capite de curatione melācholiæ, præter illa, duo ſunt maxima remedia eorum, qui amore infaniunt, primū & firmiſſimum dare ei, quam diligit. Cum hoc non ſuppetat, alterum eſt neceſſarium, & primò ſtude, ne fiat melancholicus, per ea quæ dixi

diximus cap. 9. nam i[m]aginationem læsam habent, & aliquoties rationem, quare statim fugiat: absentia enim & aliorum rerum occupatio est summum remedium, autore Ouidio libello de remedio amoris.

Anerfio

Otia si tellas, periere Cupidinis arcus,

Da vacua menti, quo teneatur opus.

Consule igitur Poëtam eo in libro. Necessariæ ergo sunt venationes, piscationes, ludi, instrumenta musica, ambulatio per loca viridia & iucunda, ubi aues & philomelæ resonant, communicatio, & frequens cum amicis, & consanguineis confabulatio prodest: & tandem opitulatur multum profectio ad lóginas regiones, præcipuè ad insignes vrbes, vt Valentiam & Barchinonam apud Hispanos: Lutetiam Parisiorum apud Gallos, & Romam Christianorum caput, quod si hæc non satis sint cum Ouidio.

Hortor vt & pariter binas habeatis amicas,

Fortior est plures si quis habere potest.

Et post hæc omnia sic finit curationem Ouidius,

Quid moror exemplis, quorum me turba fatigat?

Successore nouo vincitur omnis amor.

Aliquando curatur hæc insania ebrietate, & coitu non immodicis.

Scholium cap. seq.

ATtonitum morbum Græci.] Malè video ferè omnes medici- Error
 cos apoplexiam definientes, priuationem sensus & motus in multorū
 toto corpore, hac enim ratione, qui vulneratus usque ad cerebri circa es-
 ventres repente concidit sine sensu, & motu, tum & plegmono de sentiam
 cerebri dispositione affectus apoplexiam habebit. Quod, quàm fal- apople-
 sum sit, optima eius definitio ostendet. Est apoplexia sensu, & mo- xia.
 tus amissio in toto corpore, ob impeditum transitum spirituum ani- Apople-
 malium facta. Prima parte definitionis, apoplexia cum paralyse xi defi-
 conuenit: Secunda verò ab ea distinguitur, cū paralyse non habeat nitio.
 sensus & motus defectū in toto corpore. Vltima verò parte sepa-
 ramus apoplexiā ab ea sensus & motus priuatione, qua etsi in to-
 to corpore fiat, euenit tamē ex dissipatione spirituum animalium: qualis
 est illa, de qua loquitur Gal. 7. de placitis, qua sequitur cerebri vul-
 nus usque ad ventriculos penetrās: ab ea etiā, qua fit ex repletionē
 venarū & arteriarū cerebri, qua cōtingit ex consūptione spirituum
 animalium cerebri, eueniente ex eo, quod spiritus vitales ex arterijs nō
 possint ad cerebri ventriculos descendere. Causa apoplexia est, quic- Causa
 quid replet cerebri vñtres, ita vt nō possit animalis spiritus permea- apople-
 re, hac autē repletio, aut si maior obstructio, fit ab humore crasso pi- xie.
 tuita scilicet, aut melancholia, aut à phlegmone maxima tenuis

DE CVRAND. MORB.

meningis, ita ut eius magnitudo internū cerebri meatum repleat.

Lapsus Qua vera cum sint, non est quid sequaris *Valesij* sententiā lib. 7.
Vallesij. epid.com. 83. scripiam: qua sentis ab omni humore fieri apoplexiā.

Et quod peius est, quasi dā apoplecticas passiones à crasso flatu ad-
mitti: quia bilis flaua, tenuis cum sit, permeabit per meatū, non

Cur in autē obstruet. Quod autē non obstruat vapor, superiori scholio dixi-
apople- mus. Obstructio (qua morbus est in via) in apoplexia magna est, ac
xiadica- proinde Gal. lib. 3. de loc. affect. in apoplexia corpus cerebri ma-
tur cor- gis ladi, quam ventriculos scribit, quasi dicat, cerebrum, ut est in-
pus cere- strumentum, ladi, quia totus ventriculus est repletus: cum enim to-
bri lasū tus nō repletur, ut in epilepsia euenit, tunc lasos vētriculos appellat
Gal. Et non corpus cerebri lasum. Et quanuis Gal. aliquando per

Lapsus corpus cerebri eius substantiā similarē intelligat, malē *Vallesij*. 5.
Vallesij. epid.com. 47. explicat, quid sit vergere humorē ad corpus, aut ad
animā: non enim vergere ad corpus cerebri, est vergere ad eius su-
persiciē externā Et vergere ad animā ad internā: cū pars exter-
na Et interna cerebri, idem habeant temperamentū, in quo animā

Differen constituit Gal. Et nos anima instrumentū. In apoplexia aliquando
tia apo- seruatur respiratio, aliquādo non, Et inde orta sunt differētia apo-
plexia plexia, à Gal. tradita 2. li. aph. com. 42. ex quibus tres sunt apo-
unde o- plexia illius, qua fortis dicitur: quarta debilis est. Prima differē-
riantur. tia ea est, in qua prohibita est respiratio, qua curationē non admittit
sed citō interfecit, tandiu in ea viuentes agros, quandiu illi qui
prafocati moriuntur. Secunda differentia apoplexie est cum vio-
lenter respirant. Tertia in qua nō est violenta respiratio, inequalis

Explica- tamen Et inordinata. Vltima (quā debile appellauimus) cum res-
tur Gal. piratio aliquē seruat ordinē. Et hac, inquit Gal. si debite fiant ne-
cessaria, citō curatur. Quod cū sit contra aphorif. in quo Hipp. de-
bile apoplexiā non facile curari scribit, proinde ubi est citō. legē-
dum est, fortē, ex græco codice. Vel si seruemus lectionē per citō cu-
rari, intelligemus, statim in paralyfim transire. Hic trāsitus euenit

Apople- humore penetrante neruorum substantiā, Et hoc nomine impedire
xia trā- facultatis alterationē. Quod in epilepsia nō contingit, quia humor
sit in pa eā generans ita crassus est, ut nō possit peruadere neruos. Obijcies
ralysim Gale. 4. li. de ratione victus in acutis com. 27. Epilepsiā in para-
nō epile- lysim finiri scripsisse. Respōdeo verū hoc esse sed rarō euenire: id au-
psia. tem quod rarū est, cū contemnat Galenus ac si non esset, ideo in li-
br. 4. de locis affect. c. 2. epilepsiā nūquā in paral. finiri existimauit.

Sanguinea apoplexia) Sanguinea apoplexia meminit, cuius ha-
tēnus manifeste saltem nō fecit mētionē. Nos verò ex his qua dixi-

Apople- mus, vario modo curādā apoplexiā intelligemus. Si apoplexia fiat
xia cu- ex phlegmone tenuis meningis, curabimus eā primò sanguinē mit-
ratio. tes, Et applicātes capiti repellētia: Et vs sūmasim dicamus ea pra-

stabi-

Reprehē
duntur
practici
in sāgu-
nis mis-
sione.
Verasen-
tentiade
sangi-
nis mis-
sione in
apople-
xia.

Reprehē
disurcu-
ratio
apople-
xia pifui
rosa.

Cly, 2e-
tes non
enachō?
ex toto
corpore.

aph.

DE CVRAND. MORB.

aph. com. 2. ubi propositis medicamentis errhina & apophlegma-
risma appellatis, qua ex parte nempe cerebro euacuant: addit, cly-
sterem quoque ex hoc genere facis. Si ergo clyster ex parte euacuat.
intestinis scilicet & primis venis, qua ratione in apoplexia: Hoc
primo videtur medicamentum, quod neque affectum, neque eius causam
respicit. Ad id quod ex 4. acut. adferunt satisfacimus, dicentes Ga-
lenum solum scribere id, quod instituit auctor illius lib. (qui non est
Hippocrates, non autem hoc approbare, potissimum cum sit contra ra-
tionem. Errant secundo supradicti medici in medicamentis vomito-
rijs, quia cum hac solum ventriculum euacuent, non curabunt apople-
xiā, qua est cerebri affectus. Ultimo statim in principio purgantes

In prin-
cipio a-
pople-
xia, non
est pur-
gandum.

crasse peccare videntur: nam si ager est in accessione apoplexia, non po-
terit purgans medicamentum deglutire. Si post accessionem, iam non apo-
plexia, cum terminata sit in paralysem. Dices purgati tunc humorem
pituitosum: si hoc affirmas, non etiam effugies: nam aut ille humor est in
venis, aut in ventriculis cerebri. Si est solum in venis, iam non curas
affectum urgentem, morbum scilicet, qui est obstructio cerebri. Si vero
humor est in cerebri ventriculis, cum extra venas diffusus sit in par-
te contentus, per proprios meatus partis debet euacuari. Adde hu-
morem esse firmatum in parte, ac proinde post coctionem esse euacuandum.

Apople-
xia ex
humore
crasso fa-
cta vera
curatio.

Qua cum ita sint, inde videbitis quantum erret ille, qui non curans à
bono praeceptore methodum curandi perdiscere, ad eos libros, quos
practicos vocant, confugit: hic enim praterquam quod decipietur pas-
sim, multos interficiet. Curabitur ergo apoplexia ex humore crasso
facta hoc modo, methodo rationali. Apoplexia est symptoma, actio
scilicet abolita sensus & motus. Morbus, ad quem sequitur, est ob-
structio ventriculorum cerebri, tertij vel quarti. Causa istius mor-
bi est humor pituitosus, ex venis ad ventres cerebri descendens.
Sunt ergo tres affectus complicati in hac apoplexia, symptoma,
morbus, & causa morbi: ex his affectibus actio laesa cum habet
suam essentiam in fieri, & ab alio dependentem, non poterit cu-
rari contrariis. Oportebit ergo urgentiori succurrere, nempe ob-
structioni, & si possimus, non negligentes causam. Hac commodè
praestabit sanguinis missio ex cephalica vena, qua (praterquam
quod potest exerceri in accessione & post accessionem) reuellit &
euacuat ex loco affecto: reuellit enim humorem fluentem ad cere-
brum, euacuat autem ex cerebri ventriculis: vena enim tenuis me-
ningis & cerebri inanita attrahent ex ventriculis humorem. Du-
bitabis, si ventriculus est plenus, nonne à sanguinis missione ab-
stinebis, cum ea impediatur, ne crudus humor feratur ad venas? Res-
pondeo, nos sanguinem mittere propter urgentem affectum, noxa enim illa,
qua ex cruditate sequetur, deinde poterit emendari: quod quamvis
ex Galeni methodo curandi colligamus, habemus tamen Galenariam

Dubium.

ningis & cerebri inanita attrahent ex ventriculis humorem. Du-
bitabis, si ventriculus est plenus, nonne à sanguinis missione ab-
stinebis, cum ea impediatur, ne crudus humor feratur ad venas? Res-
pondeo, nos sanguinem mittere propter urgentem affectum, noxa enim illa,
qua ex cruditate sequetur, deinde poterit emendari: quod quamvis
ex Galeni methodo curandi colligamus, habemus tamen Galenariam

aucto-

*anctorem ex Arabum familia subscriptorem, qui c. de phrenitide in Finita principio (inquit) secunda vena est etiam ventriculo pleno. Finita apople-
 accessione apoplexia, quando iam terminata est in paralyfim, consi- xia in
 derabimus, an ager habeat inclinationem ad somnum, quam si ha- paraly-
 beat, etiam sanguinem mittemus, non ratione paralyfis, qua morbus sim quid
 longus est, sed ratione apoplexia, non presentis, sed eius qua futura facien-
 timetur: oportet enim magis inanire venas cerebri, ne ex ipsis fluat dum,
 pituita, quod simul cucurbitulis & frictionibus prestabimus. Quo
 tempore clysterem parabimus acrem, & euacuentur pituitosa ex-
 crementa ab intestinis & primis venis. ℞. centaurea minoris. m. j.
 fursuris, fenniculi, anethi, seminis lini, ana. pug. j. decoquantur in
 sufficiente quantitate aqua, de colatura sume lib. 2. in quam dissolve,
 biera logodionis ℥. j. benedicta ℥. ss. olei rutacei ℥. iij.*

De Apoplexia. CAP. XII.

Atonitum morbum Græci apoplexiam nominant, est au- Descri-
 tem apoplexia animalium functionū in vniuerso corpo- ptio.
 re subita cessatio, cum videlicet omnes pariter nerui, tum sen-
 tiendi, tum mouendi vim amiserunt propter noxam communi
 neruorum origini cerebro inquam illatam. Hæc eadem cum
 alterutram tantum partem infestauerit, dextram nempe, aut si-
 nistram; Hemiplexia & paralyfis Græcè, resolutio Latinè dici-
 tur, de qua sequenti capite sumus dicturi. Initium huic morbo Causa
 dare procatarectica causæ sæpenumerò consuevere, cum videli-
 cet caput alicuius, aut casu, aut vehementi aliquo ictu vulnera-
 tum est, aut aliqua alia re percussum. Tunc enim ad eam par-
 tem humores confluunt, vt quæ propter ingentem cerebri con-
 cussionem eos ad se venire permittat. Aëris quoque admodum
 frigidi occurfus eandem solet noxam cerebro inferre. Nam &
 caput, spongiæ instar velut manibus apprehensum constringit:
 & illius humores, atque excrementa in internos cerebri mea-
 tus cumulatim retrudit. Magna tamen ex parte à causis inter-
 nis prouenit, nempe à copiosa pituita, quæ nihil aliud est, quàm
 frigidus quidam, crassus atque viscidus humor, qui cerebri ven-
 triculos confertim & semel impletos ita obturat, vt animalibus
 spiritibus nequaquã peruios esse patiatur. Quod si, vnde genera-
 tus sit hic humor, quæsieris, meminisse debes, quæ superius cum
 de cephalalgia agebamus, dicta sunt, & quod nimix cruditates,
 crebræque potissimum ebrietates huiusmodi succos peperere.

Porro, tam grauis hæc affectio est, vt probè de ea scripse-
 rit veræ medicinæ vetustissimus autor Hippocr. Apoplexiam
 fortem soluere est impossibile, debilem verò non facile, cum
 illa

DE CVRAND. MORB.

illa statim interficiat, hæc verò in paralyfim tranfiens non ni-
fi longo tempore curetur. Interficit autem propter respiratio-
nis lætionem, à qua etiam hoc habet, vt vel fortis, vel debilis
dicatur. Nam fi prohibita fit penitus transpiratio, maxima est
& acutiffima apoplexia, ficut omnium maximè debilis, quæ pa-
rum habet in anhelitu impedimenti, quæ inter has duas inter-
iacent, pro vt magis ad alterutram accedunt, fortiores aut debi-
liores dicentur. Læditur verò maximè anhelitus, cùm priuatur:
quando verò respiramus, fed magna cum vi læsus sanè est, &
tunc anhelitus, fed minus, minus etiam cum neque intentus,
neque violentus est: inæqualis tamen atque inordinatus. Præ-
ter hæc etiam intermiſſus editur, omnium tamen minimè cùm
aliquem feruat ordinem. Et mirari quidem ſubit, quomodo
mufculis omnibus feratis, & motu carentibus in apòplexiis il-
li, qui refpirationi inferuiunt, quamuis difficulter moucantur,
tamen plerunque. Videtur autem hoc fieri propter refpirandi
neceſſitatem, quæ neruorum vim excitat ad operationem. Præ-
cedit hunc morbum (autore Paulo) capitis confertus, & acutus
dolor, venarum, quæ in iugulo ſunt elatio, vertigo oculorum,
incerti & diſcurrentes lucis ſplendores, extremarum partium
ſine cauſa refrigerationes, dentium ſtridores, in ſomno lotium
emittitur atrum, paucum, & farinaceum habens ſedimentum.
Qui iam in hoc malo ſunt ſenſu omnino carentes (vt Ætius
ait) mortui viuunt, quapropter clauſis oculis dormientium
more decumbunt ſterrentes. Opprimi hoc mali genere ſenes,
atque eos maximè qui temperatione ſunt magis pituitofa: quod
ſi iuuenem, & æſtuo tempore corripuerit, maxima eſt apople-
xia, & quæ magnam arguat cauſam, vt ex aphoriſmo 34. ſectio-
nis ſecundæ didicimus.

*Nota
preſentis
morbi.
Signa.*

*Curatio
ſangu-
nea.
Reuul-
ſio.*

Sanguinea apoplexia tribus remediorum generibus curatur.
Primò reuellentibus, vt ſectæ vena basilica primum, ſi magna
eſt plenitudo, aut vtraque cephalica ſimul: quia ſeruata rectitu-
dine in morbo breuiſſimo & fortiffimo cephalicæ ſectio eſt
vtilior. Frictionibus totius corporis, præcipuè partium inferna-
rum, & earundem ligaturis dolorificis, lotionibus calidis, cu-
curbitulis, ſine ſcarificatione primò, deinde cum ſcarificatione,
clyſteribus, & glandibus acribus, minùs tamen potentibus quàm
in pituitofa.

*Deriva-
tio.*

Secundò, vacuantibus materiam cerebri, & ventriculorum
eius iterum ſectæ vna, aut duabus cephalicis, poſt vena frontis,
Deinceps fit vacuatio per hoc, vel ſimile medicamentum. ℥.
hieræ picræ. ſ. ʒ. j. pilularum de rhabarbaro ʒ. j. rhodomellis ʒ. j.
aquæ cichoreæ. q. ſ. miſce, & fiat potus.

Tertiò,

Tertiò , alterantibus intemperiem calidam à sanguine reli- *Alicra-*
ctam: vt oleo & aceto rosatis, & similibus : quæ initio non con- *tio.*
ducunt (quamuis repellant) propter obstructionem. Electua-
rium diarhodon. abbatis est in hoc genere optimum.

Pituitosa apoplexia, quæ ferè semper fit, curatur quatuor au- *Pituito-*
xiliorum generibus, primò, victu tenuissimo, præsertim primis *sa.*
tribus diebus , deinde solo iure pullorum columbi cum ciceri- *Victus.*
bus nigris, & pipere nutriatur, & aqua mellis, & nucleis pincis
saccharo conditis.

Secundò auertentibus , vt acris clysteribus caput & pi- *Auersio.*
tuitam vacuantibus , qualis est hic : ℞. vtriusque cyclamini,
centauræ minoris , hellebori, albi , colocynthidis in ligatu-
ra positæ an. m. j. fiat decoctum in lib. tribus aquæ ad con-
sumptionem duarum , cuius ℥. vj. in anum mittantur , & si
citò ab ano elabantur, rursus repetantur, & infundantur, donec
humorum copia vnà cum clystere deiciatur , sequens clyster
est optimus, & potens. ℞. saluæ, roris marini, stachados, rutæ,
hyssoi, & pulegij an. p. j. fiat decoctum, de quo accipe libram
vnā, cui adde hieræ logodionis ℥. j. pilularum cochiarum ℥. j.
olei rutæ & de lilio an. ℥. ij. salis gemmæ ℥. j. β. misce , & fiat
clyster. Glandes acres quoque auertunt, & euacuant, & maximè
sunt necessariae præcipuè cum clyster accipi , aut retineri non
potest, quales sunt hæc: ℞. pulueris Hieræ logodionis ℥. v. salis
gemmæ, colocynthidis, & hellebori an. ℥. j. mellis q. s. misce, &
fiant tria suppositoria filo appensa.

Tertiò, vacuantibus pituitam crudam (quia hic morbus est *Purga-*
acutissimus , dependens à materia fixa in membro principe , & *tio sine*
ideò quodammodo turgida, quare moram, & tempus apparandi *prepara-*
non concedit) etiam valentibus , & largioribus medicamentis *tione in*
purgantibus : virtus enim expultrix in iis est sopita , & meatus *moris.*
angusti , vt sanguis & spiritus per ipsos permeare non possint.
Huiusmodi sunt pilulæ cochix, pilulæ foetidæ, pilulæ de sarcoc-
olla & euphorbio, dissolutæ ℥. j. β. earum cum ℥. ij. aquæ ste-
chados, & ℥. j. syrupi de hysso: aut fiat vacuatio per hunc aut *Potus.*
similem potum: ℞. electuarij indi maioris ℥. iij. agarici tro-
chiscati ℥. j. rhodoniellis. ℥. j. aquæ saluæ quod sufficit, misce,
& fiat potus. Deinde fiat vacuatio per loca propinqua gargariza-
tu, vulgò gargarisma dicitur, & errhinis (quæ dicuntur à medicis *Deriva-*
& pharmacopolis barbaris nasalia, aut caputpurgia) & sternuta- *tio.*
mentis & apophlegmatismis , quæ à nostris dicuntur mastica-
toria. Hæc , quia magnam agitationem propè affectam partem *Auerse.*
efficiunt, nocent ante vacuationem vniuersalem, aut totius cor-
poris, nisi in maxima necessitate, vbi timetur subito mors.

Errhina,

DE CVRAND. MORB.

Errhina, seu caputpurgia medicamenta, quæ sternutamenta efficiunt, aut sunt.

Mitiora, vt { Aquæ capitales distillatæ, anagallidis vtriufque succus, caparum succus, cyclamini succus, brassicæ succus, succus sielæ, succus foliorum enulæ campanæ. Aut,

Valentiora, vt { Ireos succus, marrubij succus, radicis nigellæ succus, hellebori succus, radicis agrestis, cucumeris succus, castoreum, piper, helleborum album, euphorbium.

Apophle Apophlegmatismi (vocant nostri masticatoria) aut sunt,

gmatis-
mi. Mitiores, vt { Hyssopus, origanum, thymus, pulegium, capares:

Valentiores, vt { Synapi, mastix, radix acori, zinziber, piper, pyrethrum.

Hoc schemate continetur cognitio medicamentorum à capite purgantium per proxima loca, tam habentium facultatem mitiorem, & clementem, quàm eorum, quæ sunt valent facultate prædita: quorum formas tyronibus in hunc modum describemus. Gargarizatus clementis formula: ℞. maioranæ, origani, saluiæ, roris marini, stæchados an. ꝑ. j. fiat decoctum in lib. ij. aquæ donec tertia pars absumatur, cuius collaturæ adde rhodomellis, oxymellis compositi an. ʒ. iiij. misce, & fiat gargarizatus. Valentioris formula est: ℞. aquarum saluiæ, stæchados, betonicæ, roris marini an. ʒ. iiij. aquæ vitæ ʒ. j. hieræ S. ʒ. j. mithridati, & theriacæ magnæ an. ʒ. ij. oxymellis scillitici ʒ. ij. syrupi acetosi S. & rhodomellis an. ʒ. iiij. misce, & fiat gargaryzatus, quo sæpe os & palatum abluatur. Formula errhini solidi mitioris est hæc: ℞. pulueris maioranæ, saluiæ, piperis, caryphyllorum & nucis muscatæ an. ʒ. j. terebinthinæ & ceræ, quod s. misce, & fiant errhina, seu nasalia effigiem pyramidis referencia. Valentioris errhini formula hæc est: ℞. pulueris pyrethri, piperis lōgi, hellebori, castorei an. ʒ. j. terebinthinæ & ceræ an. q. s. misce, & fiant errhina, seu nasalia formâ pyramidis, quæ naribus imponantur.

Formu-
la om-
nium.

Forma errhini liquidi, seu caputpurgij mitioris: ℞. succi betæ, brassicæ, & ciclamyni an. ʒ. iiij. misce. Valentioris formula hæc est: ℞. succi ireos, marrubij & cucumeris syluestris an. ʒ. ij. pulueris nigellæ, & piperis an. ʒ. j. pulueris hellebori & euphorbij an. ʒ. s. misce, & huius parum naribus instilletur. Forma pulueris hæc medicamenta naribus immissa sternutamenta efficiunt, & caput purgant.

For-

Eorma apophlegatismi , seu masticatorij minoris hæc est. ℞. pulueris piperis, mastichis, zinziberis & galægæ an. 3. ℞. origani, thymi, pulegij an. 3. j. cum oxymelle S. & pauca cera, fiant formulæ ad magnitudinem lupinorum. Valentioris formula hæc est. ℞. pulueris sinapis, statifagriæ, piperis, & pyrethri an. 3. j. ℞. hellebori 3. j. cum oxymelle scillitico & cera, fiant formulæ ad magnitudinem lupinorum, quorum vnus in ore detineatur semper & manducetur.

Post hæc capiti raso admoueatur hoc vnguentum, seu sinapismum. ℞. olei coltini, castorei, & de euphorbio an 3. j. pulueris sinapis, euphorbij, & serapini an. 3. j. acetî cochlearium vnum, ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum. Demum frixorium ferreum, seu candentem sartaginem tantopere oportet capiti adnoueri, vt capilli ægri comburi videantur.

Et quia ab hac apoplexia, quæ debilis vocatur, multi euadunt, non omnes (Galeno teste) quibus signa lethalia sunt, moriuntur: multi etiam citra expectationem vllam sanantur, quia accidunt monstrain rerum natura: ad cognoscendum viuatur ne, an mortuus sit æger, cum sit simillimus mortuis. obseruanda erunt hæc signa, quæ à respiratione colliguntur, priusquam operi manum admoueamus, ne vsu veniat nobis quod aliquibus medicis, qui in mortui aluum clysterem infuderunt, & venam cadaueris iusserunt secari. Si lana carpta, aut gossipium carptum naribus, aut ori admota, vel candela accensa, aut cyathus aquæ plenus pectori etiam appositus moueantur, vitæ certissimum est indicium. Speculum quoque tersissimum ori & naribus admotum, si maculetur, respirationem & vitam testatur: & quamuis nulla indicia vitæ appareant, si fuerit æger imbecillus, aut suapte natura frigidus, non est sepeliendus nisi post tres dies. Illo enim spatio mouentur omnes corporis humores, & extra illud, aut mortis aut vitæ euidens demonstrabit signum: & ideo Euangelium secundum de Lazaro inquit, fœtet, quia quatrduanus est: primis tribus diebus aliqui corde frigidi visi sunt reuixisse.

Topica.

Obseruatio.

Mortis, aut vitæ exploratio.

Tempus sepeliendi.

De paralyti, quam Latini resolutionem dicunt. Cap. XIII.

Dictum superiori capite iam est paralytim tunc fieri, cum alterius lateris nerui dextri scilicet, aut sinistri motu pariter ac sensu priuantur, quibus si pauca quedam adiecerimus, nihil (vt reor) quod ad naturam morbi

Descriptio.

DE CVRAND. MORB.

ris mollificatio cum priuatione sensus & motus. Animadu-
uertere tamen oportet, quod non semper integrum latus re-
soluitur: nam, & tota manus, & totum crus interdum (vt in-
quit Galenus) resoluitur, atque solus in crure pes, & quæ sub
genu sunt, & vt verbo rem complectar, sæpenumero vnius
tantum membri sensus deperditur, ac motus, vt linguæ, oris,
vesicæ, & aliarum corporis partium. Porro cum in paralyti nunc
motus, nunc sensus, sæpe verò vterque simul pereat, resolu-
tio potissimum tunc dicitur (aurore Gal.) cum motus amissus
est. Nam cum sensus tantum eripitur, expertem sensus parti-
culam magis dicimus, quam resolutam, quamuis id etiam in
usu sit, vt resolutam appellemus. Vnde tamen id accidat, vt
perdito sensu particulæ seruetur motus, & contra: & quare
etiam ambo simul intercant, consulere quintum caput oportet
quarti libri de morbo & symptomate: nunc illud nouisse satis
erit, propter horum amissionem paralytim fieri. Sequitur hic
morbus frequenter apoplexiam, & (Galeno autore quarto de
victu acutorum, cōmentario vigesimo octauo) paraplexia pri-
uatum dicitur. Quare generalius nomen erit paralytis, omnē re-
solutionem cōplectens, siue ea apoplexiam sequatur, siue aliū-
de proueniat. A quacunque verò fiat occasione, humorem fri-
gidum, crassum, & lentum causam habet, qui neruos obstruens,
spiritibus motū ac sensum deferentibus viam præcludit. Mor-
bus cuius ex amisso sensu, ac motu facile patet: monere tamen
interim conuenit imperitiores huius artis in faciei resolutione,
quando alterius parti nerui resoluti sunt, vt in ea affectione
(quam Græci caninam conuulsionem appellant, vulgus Me-
dicorum oris torturam dicit) malum non in ea parte consiste-
re, in quam altera inclinata est, sed in illa, quæ seipsam decli-
nat, & in contrarium trahitur: cui etiam medicamenta sunt ad-
mouenda, quod ad curationem non paruum affert momentum.
Sed quando oris tortura fit à conuulsione, agra pars trahit ad se
sanam, vt docet Gal. lib. 2. de causis morborum, cap. 7. & lib. 3.
& 4. de locis affectis. Errant ergo Auicenna, & Gentilis calum-
niantes Galenum optimum veritatis indagatorem. Cognosces
torturam fieri à conuulsione, dolore, tensione, & duritie qua-
dā. Contraria sunt, quando fit à resolutione.

Causa.

Nota.

*Pars de-
lapsa la-
borat.*

*In quo
differat
paraly-
sis &
stupor.*

Differt verò hic morbus ab stupore, quamuis sub eodem ge-
nere vterque contineatur, magnitudine: cum enim incipit affe-
ctio, stupor fit: postquam verò consummata fuerit, resolutio:
vnde Galenus libro 2. de locis affectis cap. 1. mediam quan-
dam dispositionem stuporem facit inter resolutionem, & inte-
gram valerudinem.

Cur

Curatio resolutionis quinque remediorum generibus constat: *Curatio*
 primò, victu calefaciente, siccante, & pituitæ generationem
 prohibente, vt aëre arte parato, suffitu rerum calefacientium, si
 opus fuerit: initio tamen, dum fluit materia, & ante euacuatio- *victus.*
 nem, calefactio fiat remissa, ne si maior fiat, humores calefiant,
 & augeatur fluxus. Panis sit bis coctus, & aniso inspersus, vel
 semine melanthij, vt est mos Agarenorum, ab illis dicitur xe-
 nuz. Carnes sint auium montanarum, quales sunt perdices, tur-
 tures, columbi syluestres, & similes iis. Bibat aquam cinnamo-
 mi, aut aquam mellis, quia vinum nocet neruis, tum quòd in
 acetum in iis conuertitur, tum etiam quòd ad ipsos demittit
 humores: quamuis in medicamentis cunctis melle, aut saccharo
 non noceat acetum, vt in oxymelle S. & similibus.

Secundò concoquentibus pituitam incidendo, tenuando & *Præpa-*
 tergendo eam clementioribus, primò per v. aut vj. dies: vt *ratio.*
 rhodomellis ℥. x. Item ℥. aquarum saluix & fœniculi an. ℥. iij.
 misce. Secundò, valentioribus, vt sunt syrapi de hyssopo, de stæ-
 chade cum oxymelle. S. & comp. Tertiò, valentissimis, vt sunt
 syrapi de v. radicibus, oxymel compos. & scilliticum, & syru-
 pus de stæchade. His omnibus simul, aut aliquibus cum dupla
 quantitate aquarum, aut decocti rerum capitalium paratur pi-
 tuita, perpetuò tamen sit quantitas maior syruporum sine ace-
 to, quia, vt dixi, maximè neruis nocet.

Tertiò, vacuantibus pituitam primò clementioribus, vt *Purga-*
 sunt Hiera. S. agaricus trochiscatus, pilulæ elephanginæ & *tio.*
 assaiaret. Secundò & tertiò valentioribus, vt sunt pilulæ de
 agarico, pilulæ cochix, fœtidæ, de sarcocolla, de euphorbio,
 & similes, electuarium indum vtrunque, post ergo primam
 concoctionem clementem fiat vacuatio sic. ℥. pilularum de
 Hiera. S. & agarici trochiscati an. ℔. ij. fiant pilulæ vij. aut
 ℥. diacatholicon. ℥. ℔. agarici trochiscati ℥. j. electuarij indi-
 maioris ℥. iij. ℔. rhodomellis ℥. j. aqua fœniculi q. s. misce,
 & fiat potus. Post secundam concoctionem fiat per hoc, aut
 simile medicamentum vacuatio. ℥. pilularum de agarico, &
 cochiarum an. ℥. ℔. cum aqua saluix, fiant pilulæ vij. aut ℥.
 agarici trochiscati, & turbit electi an. ℥. ℔. electuarij indi ma-
 ioris ℥. iij. rhodomellis ℥. j. aqua saluix quod s. misce, & fiat
 potus. Tertiò, & quartò, si opus fuerit, fiat vacuatio per pilu-
 las fœtidas, aut de sarcocolla, quamuis inusitata sint hæc de
 sarcocolla, vel ℥. ℔. electuarij indi maioris, vel diachartami
 facto potu cum aqua, aut decocto capitali addendo ℥. j. rho-
 domellis: quia pilulæ diutius in ventriculo detinentur in iis
 & similibus morbis, qui à ventre longo intervallo distant.

DE CVRAND. MORB.

laudantur magis, fitque per eas melior & maior euacuatio.

Auersio. Quartò, auertentibus materiam in partem contrariam, ne fluat ad spinalem medullam: quod fiet per medicamenta purgantia: de quibus tertio genere diximus, per clysteres & suppositoria dicta cap. præcedenti. Auerti etiam potest materia errhinis, sternutatoriis, apophlegmatismis, & gargarismatis, de quibus in extremo cap. superiori abundè diximus. Huic tamen mitiora, & illi valentiora conueniunt, quia apoplexia maximus & acutissimus est morbus.

Resolutio, & corroboratio. Quintò, dissipantibus & resoluentibus materiam partium affectarum, & cerebrum, & ipsas roborantibus; perpetuò tamen est diligenter animaduertenda sententia Gale. acut. 1. locorum affectorum illius, cui ex casu è curru digiti resoluti erant, quem sanauerat admoto emplastro spinali medullæ:

Observatio. qua parte affecta nerui ab ea ad digitos progrediētes obstructi erant: ab aliis imperitis medicis medicamenta tantum digitis imponebantur. 3. j. theriacæ magnæ, aut mitridati cum aqua, aut syrupo calido capitali multis diebus sumpta hæc omnia efficit. 3. ij. diamusci dulcis eandem habent vim, si multis diebus deuorentur, radix acori condita, aut eryngij est optima. Hæc confectio habet quoque eandem, aut similem facultatem.

Confectio ʒ. diamusci dulcis 3. ij. acori conditi 3. j. conseruæ anthos, & stæchados, an. 3, iiij. theriacæ magnæ, & mithridati an. 3. ij. pulueris galangæ, piperis, cassiæ signæ, calami aromatici an. 3. j. syrupi de stæchade, quòd satis est, misce, & fiat confectio: Dosis. 3. ij. cum 3. ij. aquæ, aut decocti, aut syrupi capitalis. Partem resolutam, & spinalem medullam, iuxta

Topica. vertebrae, per quas oriuntur nerui, quibus sensus & motus illi parti datur, unge bis in die hoc vnguento. ʒ. olei euphor-

Vnguentum. bij, castorei, rutæ, & de lilio an. 3. j. vnguenti aragon & dialtheæ compositæ an. 3. ʒ. cera quòd satis est, misce, & fiat vnguentum. Aliquando præsertim præcedenti hac vnctione, & existente humore in profundo cucurbitulæ admotæ parti resolutæ materiam dissoluunt. Balnea potentia calida & sicca naturalia, & artificiosa, sunt optima, vt sunt sulphurea, & quæ fiunt ex decocto roris marini, camomillæ, saluiæ, rutæ,

Historia origani, & similium. Quidam affectus diuturna resolutione post consentaneas vacuationes curatus fuit hoc medicamento: Accipe lapidem molarem ignitum quem sparge vino maluatico, cuius suffitu & euaporatione pars resoluta calefiat bis in die, post vaporem vngatur hoc vnguento. ʒ. olei de euphorbio 3. iiij. olei rutæ 3. j. castorei, pyrethri, triopiperon an. 3. j. pulueris rosarum 3. ʒ. cera. q. s. misce, & fiat vnguet.

Hæ

Hæ pilulæ sunt maximè efficaces in hoc genere. *℞. castorei, assæ fœtidæ, an. ʒ. j. ligni aloës electi ʒ. j. cum mithridato, pilulæ xij. fiant: quarum dosis sunt tres tertio quoque die dandæ ante solis ortum per horam. Si multis diebus bibat ʒ. iij. aquæ roris marini cum granis tribus pyrethri, erit ad hæc optimum remedium.*

In resolutione, quæ fit cerebro primo affecto, cauterium *Aquæ* actuale in initio colli iuxta nucam, vulgò ita dictam, est effi- *roris ma-* cax remedium, & alterum post vltimam vertebra, sed eorum *rini.* penetratio debet esse non magna. Si verò sit particularis, cau- *In para-* terium fiat in parte affecta, sed prouidendum est, ne his, aliis- *lysi per* que remediis calidis pars resoluta inflammetur, vt sæpè fieri so- *prima-* let ab imperitis medicis. *riã affe-*

Si resolutione laboret aliquis, propterea quòd ex alto ceci- *ctionem* derit, aut propter inflictum vulnus, desperatus est ille æger, *observa-* præsertim si tumor induruerit, à quo obstruantur nerui, & *tio.* tandem resoluantur. Si verò ab aliquarum vertebrarum luxa- *In para-* tione resolutio genita sit, per reductionem vertebrarum in *lysi ex* suum locum curabitur. Post reductionem ad dissoluendum *casu, aut* humorem, si sit in neruis, hoc medicamentum affectæ parti *ictu, &c.* semel in die admoueatur. *℞. farinæ fœnugræci, bdellij, ar-* *Empla-* *moniæ an. ʒ. j. piperis albi, seminis been an. ʒ. ʒ. axungia strū re-* *stituto* *anatis ʒ. iij. olei de lilio ʒ. j. semis, misce & fiat ex his secun-* *membro* *dum artem cataplasma, seu emplastrum, quod parti resolutæ* *admo-* *uendum.* *& origini neruorum admoueatur.*

Scholium.

Dictum superiori capite.] Paralysis aut est exquisita, in *Diuidi-* qua sensus & motus deficiunt, aut non exquisita, quando al- *tur pa-* terum eorum seruatur: quacunque sit, aut est in medio corpore, *ralysis.* aut in vna tantum parte. Si medium occupat corpus, morbus erit in cerebro, aut in principio spinalis medullæ: quod distingues ex dimidia capitis parte affecta, aut non affecta. Si paralysis vnius *Paraly-* tantum partis sit, tunc in neruo illius partis querendus est morbus, *sis quid* ac proinde exortus neruorum sunt intelligendi, lege lib. 2. de caus. *sit.* *symp. cap. 5. Paralysis est symptoma, actio scilicet abolita. Morbus, Morbus* ad quem sequitur, est obstructio ab humore crasso, aut tumore fa- *in para-* cta. Dices, si nerui non sunt caui, quomodo obstruentur? Respondeo *lysi.* *Gal. obstructionem appellare 2. libro de caus. symp. Omne illud, Obiectio.* quod impedit transitum humoris, aut alterationis. Quamuis ta- *men hæc sententia probabilis appareat, existimo tamen in paraly-* *si morbum esse in numero addito, est enim additus humor impe-* *diens*

DE CVRAND. MORB.

*dicus actionem: neque poterit dici humor ille obstructio, si propriè lo-
quamur: quia nervus caret cavitate, & hac ratione suffusio etiam
Practici dicereur obstructio. In curatione paralysis reucllunt practici humo-
taxan- rem ab spinali medulla purgatione, omittentes sanguinis missio-
tur, nem, malè tamen, cum hac sola reucllat humorem à parte affe-
cta, quod non poterit rectè præstare purgatio carens in principio oc-
Obiectio, casione, humore existente crudo, & non sequace. Si obiicias humo-
rem esse frigidum in paralysis, & ideò non esse mittendum sangui-
nem: Respondebo, aut humorem frigidum esse multum & secretum
à sanguine, aut habere satis insignem quantitatem sanguinis ad-
mixtam. Si multus est, & secretus à sanguine, tunc non mittemus
sanguinem, quia non constant vires: si verò multum sanguinem
habeat permixtum, sanguinis missio exercenda erit. 6. epy. par. com.
43. non ratione morbi, quia cum fiat ex pituita, purgationem pestu-
lat: sed ratione affectus venarum, hoc est sanguinis vitiosi. Sangui-
ne ut decet, misso & humore purgato, discutiemus in parte inclu-
sum topicis medicamentis, ita ut in principio sint leuia, ut totum
euacuent humorem, aliter enim euacuata parte tenui reliquum in-
durabunt, & incurabilem efficiunt affectum. Deinde hoc vteris un-
guento. ℞. olei laurini & vulpini an. ʒ. ij. ʒ. axungia ursi ʒ. j. ʒ.
sagapeni, opoponacis ana. ʒ. iiij. unguenti marciaton ʒ. j. ʒ. cera pa-
rum, & fiat unguentum, quo caput, aut principium spinalis medul-
la, aut principium nervi, si sit paralysis particularis, inunges.*

De conuulsione. CAP. XIV.

*Descri-
ptio.*

COnuulsio, quam Græci spasmon appellant (auctore Gal. vj. aph. com. 39.) affectio est inuoluntaria ad simi-
lem venientibus nervosis partibus dispositionem, quam
etiam in motibus voluntariis assumunt. Vnde & ab eodem
rectè dictum est libr. 5. de morbo & symptomate, conuul-
sionem esse, quæ nervos musculósque ad eundem cogit
affectum, in quem ipsi ab animali facultate, cum habitum
naturalem seruarent, ducebantur. Quæ si ita sunt, constabit
sanè conuulsionem in conuulsis partibus factam hac sola
ratione à motu naturali differre, quòd præter voluntatem
nostram conuulsio fiat, cum in ea non ab arbitrio, sed à
morbi imperio nervi in suam originem conuellantur: qua
sola in parte dissimiles sunt, naturalis motus, quem volun-
tarium dicimus, & is qui in conuulsionibus reperitur, cæ-
terò similes sunt ferè. Quod rem ipsam consideranti, &
Galenì insuper librum tertium de locis affectis, & quin-
tum de morbo, & symptomate legenti, facile constabit.

Eodem

Eodem enim modo fiunt: nam voluntarius motus interim intentus versus principium musculis, interim ab irruente spiritu impletis perficitur, ita conuulsio eodem modo accidere solet. Nam & spiritus intra ipsos generantur, qui eos inflare possint, & complures etiam affectus, qui illos intendere queant: *Diuisio.* cuiusmodi est phlegmone: quos omnes Galenus ex Hippocrate in duo capita reuocauit, plenitudinem, & inanitionem. Phlegmone plenitudinem parit, ardentissimæ & aridissimæ febres inanitionem. Porro quod neruosa corpora omnia tendi possunt, siue oppleta ea sint, siue inanita, argumento sunt musica instrumenta: etenim rumpuntur eorum chordæ, siue in humido, vaporosoque, siue in arido & squallenti cubiculo intentis etiamnum chordis collocentur. Quod cum intel- *Species.* ligant huius rei haud ignari artifices, eas antequam reponant, laxare solent. Conuulsionis in vniuersum tres species traduntur Græcis appellatæ nominibus, quarum prima emprosthotonus dicitur, id est, tensio ad anteriora, & fit quoties caput, ceruix, reliquumque corpus in pectus contrahitur. Secunda opisthotonus, id est, tensio ad posteriora, acciditque cum caput in dorsum conuellitur, scapulisque velut annectitur. Tertia ex vtraque composita, tetanus appellatur, Latinis tensio, Celso rigor: qua affectione qui laborant, recta ceruice velut frigore concreti rigent, ita ut neque in hanc neque in illam partem flecti possint: sed quasi ab vtraque impediuntur, in neutram inclinant. Quæ sanè species aut differentia conuulsionis reliquis periculosior est autore Hippocr. Quicunque *5. lib. aphor. 6.* tetano corripiantur, in quatuor diebus pereunt, si verò hos effugerint, salui fiunt: peracutus enim morbus est: vnde & iudicationem fieri oportet in primo circuitu dierum criticorum, non toleranti natura longiori tempore tensionis laborem. Et contingit sanè per has differentias interdum vniuersum corpus conuulsione tentari, interdum vnâ partem, proinde ac in paralyti quoque fieri diximus. Conuulsio verò *Simile.* vniuerso corpore (ut omnes quidem autumant) talem quampiam partem affici necesse est: quæ ut in arbore caudex ramorum, sic ipsa sit omnium neruorum communis origo aut quoties vel crus, vel altera tantum manus conuellitur, illius membri conuulsio neruorum, qui ad ipsum perueniunt, originem affectam fuisse declarat rami cuiuspiam exemplo in arbore. Atque huius quidem conuulsionis, quæ scilicet particulare aliquod membrum afficit; multæ sunt differentię: quippe si quis violenti aliquo dentium stridore vexetur, maxillares musculi conuulsione laborant, per inuersiones verò

DE CVRAND. MORB.

& strabismus conuelluntur oculorum muscoli. Iam & gonorrhæa conuulsionis species censetur, verum distinctione adhibita: si enim rigido pene semen effluat, veluti conuulsio quædam est: si non rigeat penis, ad retentricis facultatis imbecillitatem referri debet. Sed longum esset omnes differentias recensere. Causas huius morbi, tametsi superius obiter eas attigimus, clarioris tamen & vberioris institutionis causa accuratius repetemus. Dux ab Hippocrate in vniuersum ponuntur plenitudo, & inanitio: oppletis siquidem, aut vehementer exinanitis neruosis partibus conuulsionem accidunt, quemadmodum euenire in lyricis fidibus antea dictum est: & in tergoribus quoque ac loris acridere Gal. ait: verum tertium eis adiacere conuenit, nempe consensum aliarum partium, à quibus conuulsio non raro excitatur, quam conuulsionis differentiam, qui Arabum sequuntur placita, spasmus non proportionatum ad materiam appellant, quod scilicet non contingat propter materiæ multitudinem neruos implentis, neque propter eiusdem inopiam eos inanientis, atque exsiccantis: sit autem quoties aliquid à parte primò affecta, ad cerebrum ascendit, quod ut excutiat, vehementer & inquietè concutitur. Solet autem per consensum infestare neruorum originem, ita ut ad ipsam aliquid ascendat, quod hanc conuulsionem inuehat, vel impactus neruosis partibus erodens aliquis humor, ut in eo qui propter æruginem in ventriculo contentam conuulsionem patiebatur, ut videre est v.aph. com. j. aut venefica aliqua qualitas, aut spiritalis substantia in cerebrum elata, ut de puero refert Gal. qui quotidie in epylepsiam incidebat, propter nescio quid, quod à crure in cerebrum ascendebat simile illi, quod ab scorpione, & ab aliis venenatis feris in icta parte relinquitur, quod cum mole minimū fit, facultatē maximum est. Iam & neruorum punctura hoc ipsum efficere potest (quod Galen. confirmavit tertia parte artis medicinalis) quoniam ea pars cerebro continuatur, promptaque est ad conuulsionem excitandam: & vniuersim, id omne quod propter illatum partinocumentum cerebrum ita afficit, ut ipsum ad expulsionem rei noxiæ per huiusmodi motus exciter, hoc genus conuulsionis efficere potest.

Nota. Notis quibus morbus dignoscatur, non est opus: satis enim per se patet, à qua tamen fiat causa, sic deprehenditur. Conuulsio, quæ à plenitudine fit, sanum corripit subito eueniens, aut saltem non multò post morbi initia: quæ verò propter inanitionem accidit, non similiter euenit, sed post arduas febres, plurimásque euacuationes, siue per sudores, vomitum, deiectionem

deiectiones infernas, sanguinis profusionem, siue aliquo alio modo factæ fuerint. Hæc enim omnia, atque alia his similia cum corpus exhauriant, conuulsionem inaniendo inducunt. Tertiam illam differentiam quæ per consensum est, ab ægro-
tantis, aut assidentium sermonibus oportet exquirere.

Conuulsio ex repletionem pituitosa (à qua frequentius fit) curatur sex remediorum generibus. Primò calfaciente, & sic-
cante victu simili resolutorum victui, de quo præced. cap.

Secundò, pituitam conquoquentibus, primò clementibus, *Curatio*
secundò valentioribus, tertio valentissimis, de quibus cap. su- *pituito-*
periori abundè diximus, nisi doloris vehementia, & magni- *sa.*
tudo ordinem perueteret, tunc oportet vacuare materiam, etiã *Victus.*
si non sit turgida, ne pereat æger. Ante concoctionem etiam *Purga-*
per medicamenta valenter purgantia, quorum formas capite *tio sine*
superiori docuimus, & sequenti etiam genere trade- *præpa-*
mus. *ratione.*

Tertio, purgantibus materiam paratam, si intermissionem *Purga-*
fecerit dolor, aut crudam, si vehemens & magnus fuerit. Qua- *tio.*
les sunt pilulæ de agarico, de hiera composita, cochix, fœti-
dæ, de sarcocolla, & de serapino, & opopanace: quamuis tres
ultimæ non sint deuorandæ, nisi ægri vires validæ sint, &
morbus magnus, & alia minus valenter purgantia medica-
menta non satis idonea sint, Electuarium etiam indum pur-
gat pituitam, & alia de quibus 1. cap. & capitibus de cepha-
lalgia pituitosa, de apoplexia, & de resolutione satis copiosè
diximus. Primum ergo propter tyrones post primam initio- *Vacua-*
rem concoctionem, sequentibus pilulis fiat vacuatio. ℞. pilu- *tio se-*
larum cochiarum, & agarici trochiscati an. 3. ℞. cum aqua *cunda*
saluix fiant pilulæ viij. aut hoc: ℞. diacatholicon. 3. ℞. ele- *validior*
ctuarij indi maioris 3. iiij. ℞. agarici trochiscati. 3. j. rhodo-
mellis 3. j. aquæ præoniæ q. s. misce, & fiat potus. Secundò, post *Tertia.*
secundam valentem concoctionem his pilulis euacua. ℞. pi-
lularum cochiarum, de agarico fœtidarum an. 3. j. diagridij
ḡ. iiij. cum aqua saluix, fiant viij. pilulæ: aut ℞. electuarij indi
maioris 3. iiij. j. ℞. agarici trochiscati, & turbit electi an. 3. ℞.
salis 3. ℞. Rhodomellis. 3. j. ℞. aquæ stæchadis q. s. misce, &
fiat potus. Tertio, post tertiã valentio rem concoctionem fiat
his pilulis vacuatio: ℞. pilularum fœtidarum 3. ij. pilularum
cochiarum 3. j. diagridij. ḡ. iiij. cum aqua roris marini fiant
pilulæ viij. Aut. ℞. agarici trochiscati, & turbit electi an. 3. ℞.
diachartami, & electuarij indi maioris an. 3. iiij. rhodomellis
3. ℞. aquæ roris marini, quod satis est, misce, & fiat potus.
Quarto, auertentibus ad inferiora materiam, vt clysteribus *Auersio.*

DE CVRAND. MORB.

acribus, & glandibus, frictionibus, & vinculis dolorificis in parte contraria, errhinis, apophlegmatismis, gargarizatu, & similibus, quorum copiosam tractationem vide cap. xij. de euacuatione apoplexiæ.

Discussio

Quinto, digerentibus, seu resoluentibus materiam nervis affixam internis, & externis, ut usu longo diamusci utriusque, mithridati, aut theriacæ magnæ, confectionis anacardinæ, & simulum. Acorus conditus est etiam in hoc utilis

Confectio.

cum aqua, aut decocto, aut syrupo capitali. Hæc mixtura confert multum in hoc genere: ℞. diamusci dulcis ℥. j. diagalangæ ℥. ss. pulveris diacymini, & aromatici rosati an. ℥. ij. pulveris calami aromatici, galangæ, & radices pæoniæ an. ℥. j. ss. radices acori conditæ ℥. iij. syrupi de stæchade. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis est cochlearium vnum cum

Topica.

aqua roris marini, aut alia simili. Vnctio ex oleo de lilio, vulpino, de semine lini, rutaceo, de castoreo, & de euphorbio, & similibus est optima. Admouere etiam parti conuulsæ pulmones arietum, aut animalia parua bruta recens per dorsum incisa, est quoque optimum remedium ad resoluendum, ut sunt pulli gallinacci, columborum, parui canes, & catuli. Confert quoque manum, aut partem conuulsam in bouem, aut aliud animal recens cæsum immittere, & ibi, dum calescat, tenere. In vinum nouum feruens immittere manum est uti-

Balnea.

le. Probatissima sunt in hoc morbo balnea, præsertim naturalia, ut sulphurea, aluminosa, & falsa, aut à nobis parentur ex sulphure, sale, alumine, & herbis, & floribus capitalibus incoctis. Suffitus, & vapor prædicti decocti per lapides ignitos in cacabum iniectos, si toto corpore, aut parte resoluta (si totum non fuerit) sub conopæo, ne expiret vapor exceptus maximè conducit: post quem, aut balnea, vnctio melior erit, & validior oleis iam dictis, & hoc vnguento: ℞. olei rutæ,

Vnguentum.

& de lilio an. ℥. j. ss. olei de euphorbio & laurini an. ℥. j. dialthæ compos. & vnguenti aragon. an. ℥. ss. pulveris castorei, & diacymini an. ℥. j. ss. ceræ, q. s. misce, & fiat vnguentum.

Lenimentum.

Præstantissimum quoque est remedium partes conuulsas oblinere adipe anseris pinguis, exenterati, & cati parui minutatim concisi, & lardo veteri, myrrha, thymno, terebinthina abietis, farti, & confuti, & tosti. Accipiatur adeps non primus, sed secundus decidens, & distillans in vas fere plenum aceto. Post perfectam tosturam anser in paruas partes diuisus eodem aceto percoquatur, à quo fuit adeps extractus, & alio, si non sufficiat primum usque ad separationem ossium, & iterum colligatur adeps supernatans, qui mixtus cum priori

valen

valentiori referuetur ad idem hoc, quod supra diximus, efficiendum. Sequēs, quoque vnguentum est optimum: ℞. olei rutæ, lumbricorum, & de lilio an. ʒ. j. ʒ. olei castorei, & colti-
ni an. ʒ. j. agrippæ, dialthex, & marciaton an. vñciam ʒ. ceræ
quod satis est, misce, & fiat vnguentum: quo pars conuulsa
vngatur, & vertebræ, per quas nerui oriuntur illi parti sensum
& motum tribuentes, aut ceruix, & tota spina, si fuerit vni-
uersalis conuulsio.

Sexto, corrigentibus symptomata, præcipuè dolorem, qui
aliquando solet esse tam intensus, & intolerabilis, vt vix
æger possit illum ferre. Balneum olei communis est bonum
mediocriter calidum, melius si sit cum decocto seminis lini,
fœnugræci, lumbricorum, foliorum, maluæ, violarum, & ca-
momillæ: optimum erit balneum ex oleo vulpino, sed hoc
maiori pretio emitur. Dolorem hunc lenit oleum rosaceum
cum ouorum vitellis aliquot. Eiusdem, aut maioris etiam
facultatis panis calidus est, cum è furno educitur, cum lacte
caprino. Oleorum camomillæ, lumbricorum, & terebinthi-
næ mixtura pari facultate pollet, aut maiori sæpè. Aliquan-
do præcipuè in maximo dolore, & aliis iam expertis est ne-
cessarium hoc, aut simile medicamentum narcoticum. ℞. olei
rosati ʒ. iiij. thebaici ʒ. ʒ. iusquiami, papaueris albi. ana. ʒ.
ij. corticum mandragoræ ʒ. j. aceti. ʒ. ij. misce, & fiat instar
vnguenti, aut. ℞. medullæ panis tritici. p. ij. lactis q. s. vitel-
la ouorum numero iij. opij. ʒ. ʒ. misce, & fiat cataplasma, ad-
de croci in puluerem redacti ʒ. ʒ.

Si ex sanguine sit conuulsio, à quo rarò dependet, vena se-
canda est contraria, vt si brachium dextrum conuellatur, ba-
silica sinistra, & vicissim: si verò tibia, basilica eiusdem partis:
si totum, basilica dextra, aut vtraque simul, si sit magna ple-
nitudo. In omni parcè sanguis extrahatur, ne vires disso-
luantur, quod docet Ætius serm. vj. c. 18. agens de sangui-
nis missione in resolutione, quæ parem exposcit curationem.
Oportet autè moderatè detrahre sanguinè, ne refrigeretur.

Si sit conuulsio à bile flaua, aut ab atra bile, vacuetur sta-
tim, præcedenti tamen iusta concoctione, præcipuè quæ gi-
gnitur ab atra bile, per propria medicamenta, de quibus c. ix.

Si est ab inanitione & siccitate, curatur humectantibus a-
limentis, & medicamentis, vt cap. de hæctica, lib. 2. longius
demonstrabitur, videlicet iure gallinarum pinguium, capo-
num, perdicum, vituli, arietis, suis teneri & similium animã-
tium cum herbis, aut rebus humectantibus, vt est cremor
hordei. Ius etiam aut aqua testudinum, limacum, & ranarū

*Sympto-
matum
correctio
per topi-
ca.*

*Sanguini-
nea.
Sectio ve-
na.*

*Bilioſa
& atra-
biliaris.
Eius qua
est à sic-
citate.
Victus
hume-
tans.*

in

DE CVRAND. MORB.

in salubribus aquis degentium confert, lac humanum primò, secundò asininum, tertio caprinum alimentum salutare est in hac conuulsione. Vinum generosum, dilutum potenter humectat. Balneum ex foliis maluarum, violarum, radicum althææ, caricarum, passularum enucleatarum, capitum & pedum arietinorum est optimum ad humectandum. Partes conuulsæ, & tota spina ungatur hoc unguento, ℞. oleorum sesamini, amygdalarum dulcium & violarum an. ʒ. ij. mucilaginis, seminis lini, & fœnugræci an. ʒ. j. β. axungia gallinæ ʒ. ij. ceræ, quod satis est, misce, & fiat unguentum.

Vnguentum.

*Eius
qua est
ab ictu
venena-
torum.
Venenu
educen-
tia.*

Si conuulsio est ab ictu animalium venenatorum, extrahe venenum admoto parti affectæ ano galli gallinacci, aut gallinæ glabro, scabiosa pertrita, & cū vitello oui instar cataplas-
matis apposita venenū educit, ideoque carbunculis pestiferis imponitur. Cæpe crudum, vel coctum, admotū parti læsæ, eius-
dēque succus venenum expellit. Idem efficit theriaca magna applicata (quanquam vtilior est interiùs assumpta) cucurbitula cum scarificatione parti punctæ affixa est adiuumento.

*Eius
qua est
à casu
& per-
cussione.*

Si à casu, aut percussione aliqua conuulsio sequatur, post victum tenuem, & sanguinis inissionem, & euacuationem per clysteres, parti affectæ, quæ parum emolliant, dolorem sedent, & moderatè resoluant, sunt adinuenda, vt est hoc: ℞. hordei decorticati, camomillæ, farinæ fœnugræci, foliorum maluarum, an. p. ij. omnia decoquantur, & cum oleo camomillæ, rosarum, & terebinthinæ fiat cataplasma.

*Eius
qua fit
ex pun-
ctura
neruo-
rum.*

Si ex punctura non penetrante nerui est, scindatur neruus, aut perforetur: melius enim est viuere parte vna priuata sensu, & motu, quàm mori. Deinde apponantur quæ resoluant, & exsiccent humorem in neruis inculcatum, & aperiatur vulneris os, vt possit optimè & liberè pus effundi, & ideò oleum pypericum, sulphur, euphorbium cum oleis lumbricorum & rosarum, & pauca terebinthina erit optima mixtura in hac conuulsione.

Scholium.

*Conuul-
sio quid.
Pars
neruosa.*

*Pratiū
neruosa-*

Conuulsio quæ Græci.] Cōuulsio est motus deprauatus par-
tiū neruosarum, quo versus suum principium retrahuntur. Prima parte huius definitionis cōmunicat cōuulsio cū palpitatio-
ne, tremore, & alijs motibus deprauatis: reliqua parte ab illis di-
stinguitur. Per partes neruosas cū Gal. 5. libr. aphor. com. 1. intelli-
gimus neruos, ligamenta, fibras musculorū, & tendones. Principiū
harū partium varium est nā principium nerui est cerebrum, aut

spinalis medulla, ligamenti, os, tendonis, finis musculi: fibrarum musculi, eius caput. Harum partium omnium, aut unius retractione concipium. uulsio appellatur. Quod si Gal. aliquando Conuulsionem appellat retractionem musculorum versus suum principium, id facit, quia musculus est instrumentum motus voluntarii. Aduerte tamen hanc definitionem esse conuulsionis, cum fit, nam conuulsio facta motus est abolitus. Causa conuulsionis sunt, omnia quae praedictorum corporum longitudinem abbreviare possunt, quae ad duo capita reuocat. Hipp. catur lib. 6. aphor. sent. 29. repletionem, videlicet, & inanitionem, exemplo cor- Gal. darum usus. Quod si aliquando frigiditatem causam conuulsionis scri- Causa bat, de causa externa loquitur, Auctor tertiam causam conuulsionis conuul- addit consensum aliarum partium, decipitur tamen, quia per aliarum sionis. partium consensum non fit conuulsio, sed motus conuulsiuus, qui ce- Auctoris rebri est affectus, aut principij spinalis medulla, & non nervorum. lapsus. Neque etiam sequendus est, cum dicit nervos in conuulsione ab spi- ritu posse contrahi, nam haec contractio non perdurat, ut ostendit ea affectio, quam vulgo rampa appellamus: tum Galenus 2. de caus. symp. ex sententia pneumaticorum loquitur. Differentias conuulsio- Obie- nis lege apud auctorem. Difficile tamen alicui videbitur, conuulsio- ctio. nem ex repletione nervi fieri sine sensus & motus laesione, quia si nervus repletur, non poterit alteratio facultatis permeare. Respon- deo in conuulsione repleri nervum inaequaliter, ita ut quadam nervi partes liberae sint, & per ipsas alterationem descendere.

Conuulsio ex repletionem.] In curatione conuulsionis eius cau- sas aduerte, quia ea pro varia causa variatur. Si fiat ab humore pi- tuitoso (ex eo enim ut plurimum euenire solet) auctor purgat, auertit, & topica adhibet medicamenta, recte quidem: Omittit tamen unum remedium maxime necessarium, quod reuellit & euacuat humorem, quod est sanguinis missio. Haec in principio imperanda est, ita tamen Sanguis exerceatur, ut non euacuet quantum postulat morbus, quia aliquid nis mis- mittendum est propter symptoma, nempe dolorem qui ob vigilias & sio. sudorem vires deicit: aduerte etiam sanguinem solum esse mittendum in hoc affectu cum pituita satis insignem quantitatem sangui- nis habuerit admixtam. Si a sanguine fiat conuulsio, etiam venam Lapsus secabis. Conuulsio nunquam a bile ortum habet, quia, ut diximus, auctoris. tenuis est, & proinde non potest replere corpora nervosa, ac ideo ne sequaris auctorem. Cum conuulsio fiat ab humoribus frigidis, & An in crassis, aliqui, inter quos est Vega, sequuti Cornelium Celsum con- conuul- tendunt, ad eius curationem nobis licere excitare febrem, ut humo- sione. li- res attenuati euacuentur, & eorum frigiditas corrigatur. Quam ceat no- sententiam possumus auctoritatibus corroborare: prima est Hipp. bis exci- qui 4. aph. sen. 37. sic scribit. Qui a conuulsione, id est, epitona, tare fe- & emprostoteno, aut distensione nervorum, hoc est tetano tenetur, brem. febre

DE CVRAND. MORB.

febre superueniente liberantur, ubi Gal. in commentario, duas (inquit) habet medicamentum intentiones, in conuulsione, superfluum soluere humiditatem, & calfacere frigiditatem, quas duas febris complet. Preterea 2. aphor. sent. 26. Febrem (ait) conuulsioni superuenire melius est, quam contra. Tertio Hippocrates 6. epid. par. 6. sen. 7. Si prius (inquit) epilepsia capiantur aliqui, & quartana superueniat liberantur: & quamuis hac loca videantur ostendere licere nobis in hoc affectu febrem excitare: multò clariùs idem Hippocr. 2. epy. sec. 5. statim post principium, id visus fuit docere, si puerperis (inquit) conuulsio fiat, ignem excitato: ex quo loco multi colligunt non solum posse nos excitare febrem, sed & putridam, cum Hip. semper per ignem intelligat magnam febrem. Caterum existimo nò licere ad curandam conuulsionem febrem excitare, quia in ea, non possumus deliberare, de quantitate, occasione, & modo utendi quæ sunt remedij conditores. Rationes propositæ ex auctoritate desumptæ nihil persuadent: nam omnes, quæ in aphorismis & lib. 6. epy. habentur, tantum docent, febrem, quæ conuulsionem & epilepsiam sequitur, eas sanare, aut melius esse febrem sequi conuulsionem quam contra: quia si febris sequitur conuulsionem ex repletionem oram, calore iuuabit. Maiorẽ vim videtur habere locus qui habetur lib. 2. epy. ex quo aliqui ex nomine ignis persuasi, colligunt debere nos magnam febrem, hoc est putrem excitare, nam diaria non est magna febris. Hi maximè decipiuntur, non enim est in nostra manu febrem mouere putrem, imò si Hippocratis animus fuit, excitandam esse febrem, nomine ignis diariam intelligit, si aduertamus dictionem, excitato, quia nos calefacientibus medicamentis & alimentis, solam hanc generare possumus. Et quamuis hoc ita sit, censeo, Hippocratem non voluisse excitare febrem, sed nobis præcepisse, ut medicamentis calidis, ex quibus illa oriri potest, utamur, quibus curare solemus conuulsionem: vel dicere possumus, Hippocratem in epydimiis particularia exempla scribere, non tamen artem vniuersalem constituere: quam cum in aphorismis proposuerit, proinde in ipsis aliter, ac in epydimiis in febre in conuulsione loqui.

De Tremore. CAP. XV.

Descri-
ptio.

TRemor (vt auctor est Gal. v. de morbo & symptomate) contrarius quidam motus est ex contrariorum in se motuum successione proueniens. Cum enim facultas imbecillior reddita membrum in sublime tollit, ipsa verò grauitas deorsum trahit, pugna quædam fit inter facultatem & membri grauitatem non permittente facultate deorsum ferri membrum, vt in resolutione membrorum solet, neque grauitate concedente, vt facultas ipsum sublime seruet, vt conueuerat, dum valebat. Itaque

vicissim

vicissim facultas nunc vincitur, nunc vincit, atque hinc nascitur tremor ex duobus scilicet morbis contrariis compositus motus, altero, dum membrum sursum à facultate fertur, altero, dum ob gravitatem, & morbum deorsum premitur. Fit autem in vniuersum tremor ex imbecillitate neruorum, quod palam senectus ipsa (vt Paulus ait) testatur, in qua est incurabilis tremor, specialiter verò id omne quod motricem facultatem imbecilliore reddit, huiusmodi solet symptomata inducere: cuiusmodi est frigidius naturæ temperamentum, frigida aquæ potus non in tempore sumptus, pituitosi humoris abundantia, vini multi, præsertim meracioris immoderatio vsus, senectus, & animi affectiones, vt timor. Vnde his, qui per prærupta ingrediuntur, crura tremunt, & qui incurrentem in se feram videntes fugiunt, tremuli euadunt, neque non toto corpore tremunt, quibus coram terribili aliquo magistratu negotium est, quippe loqui iussi ne vocem quidem citra tremorem reddere poterunt. Signa ex agri temperamento, & sermonibus patebunt: si iis enim animum aduertas, proculdubiò non solùm notas, sed & causas quoque intelliges. *Causa.*

Tremor curatur abscissa causa eius: sed quia fermè semper fit à pituita, vt resolutio, & conuulsio ex plenitudine, superuacuum esset in præsentia eandem rem iterum tractare postquam satis abundè c. duobus præcedentibus de ea dictum est, mitioribus tamen remediis indiget hic affectus, quàm resolutio, & conuulsio ex repletione pituitosa, quia à minori fit causa. *Curatio. per remedia mitiora.*

De Ophthalmia. CAP. XVI.

Ophthalmiam medici aliqui duplicem faciunt, veram & non veram: non veram conturbationem oculi, seu vacillationem appellant, & ab externa aliqua occasione fit, verbi gratia: sole, igne, fumo, puluere, ictu aliisque id genus, & à Græcis taraxis dicitur, hoc est, lucis perturbatio, vt apud Paulum videre est, qui sic eam nominat, & velut genus quoddam facit eius (quæ vera dicitur) ophthalmiæ. Porro tam facilis curatu hæc est, vt vel cognita tantùm causa, ac separata discutatur, modò id in principio fiat, alioqui neglecta in veram sæpe ophthalmiam transit. Est autem vera appellata ophthalmia, quam Latini lippitudinem nominant, adnatæ membranæ, seu (vt barbari dicunt) coniunctiue inflammatio. Fit hoc genus morbi (de vltima, quæ dicitur vera, loquor) aut ob plenitudinem vniuersi corporis, ob quam adnata quoque humoribus plena distenditur, vel propter

*Diuisio**Definitio**Causæ.*

DE CVRAND. MORB.

acrimoniam humoris in oculum influentis, vel propter crassorum humorum, aut flatuenti spiritus tensionem.

Nota.

Notæ sunt adnatæ, rubor, ex oculis lachrymæ manantes, & in maioribus oculi angulis, qui ad nasum sunt, sordes quædā accretæ, & vniuersim omnia, quæ in inflammationibus reperiuntur externis: quia perpetuò interna sequitur febris, symptoma necessarium: ab hac tamen febris non procreatur, nisi sit dolor ingens, & corpus paratissimum ad eam.

Curatio.

Curatur verò ophthalmia sex remediorum generibus, primò victu refrigerante, vt aëre natura frigido, vel industria nostra sparsa area aqua, floribus & foliis refrigerantibus: & aëre ob-

Victus.

scuro, quia lumen resoluit spiritus, humoresque commouet: & victu tenui, quo partes inanitæ retineant tenaciùs humores ne ad oculum confluant. Carnes, oua, vinum, quæ sanguinem augent interdicta sunt: somnus, & quies laudantur: his enim oculi quiescit, & humores.

Reuulsio.

Secundò, auertentibus sanguinem fluentem, vt sectione cephalicæ eiusdem partis, si non fuerit magna plenitudo: tunc enim media, aut iecorata est secanda. Si verò in vtroque oculo fuerit ophthalmia, vtraque cephalica est secanda, aut vtraque

Sectione vena.

media. Sanguinis copia, & numerus sectionis venarum respondeat plenitudini, magnitudini morbi, & viribus ægri. Sed si hæc, aut alia quæuis inflammatio à mensibus, aut hemorrhoi-

Aducrte.

dibus detentis proficiscatur, vena tiliarum, aut pedum est secanda. Fit quoque auersio in hoc morbo per clysteres parum

Auersio.

acres ex cassia præparata, diacatholicon, & similibus: per frictiones partium extremarum, per ligaturas dolorificas, per cucurbitulas sine scarificatione, & cum scarificatione in scapulis, & per forum ex aqua calida partium extremarum, & per purgationem hanc, aut similem factam medicamentis benignis, & salubribus: vt ℞. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. ss. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuivæ ʒ. j. ss. syr. rosarum ʒ. j. aquæ buglossæ quod sufficit, misce, & fiat potus.

Repellentia topica.

Tertiò, repellentibus materiam fluentem fronti admotis, si fluxio sit per venas, & arterias extra cranium, vt sæpe accidit: quia hæc tunica à pericranio producitur, qualia sunt aquæ rosarum, plantaginis, portulacæ, solani, albumen oui, acetum, cortices granatorum, balaustix, & bolus Armenus præparatus aqua frigida maceratus. Si verò per venas, & arterias intra cranium materia fluat, nocent hæc repellentia capiti, & fronti admota, cum materiam versus nervos opticos impingant: tunc enim naribus & oculis sunt repellentia ad-

Topica oculis apta.

mouen

mouenda. Ipsi oculo, aut oculis immittimus sæpe aquam rosa-
ceam albumini oui permixtam, aut lac cum è mamma emul-
gens, aut hanc mixturam. ℞. aquæ rosarū ʒ. iij. collyrij albi
rhafis sine opio ʒ. ij. tuthiæ præparatæ ʒ. j. sarcocollæ nutritæ
ʒ. ʒ. misce, & fiat collyrium, adde corallij rubri præparati ʒ. j.
mica panis lacte caprino cocta & oculis admota est etiā opti-
ma ad repellendum, & dolorem sedandū. Sed si his dolor non
vincatur, adde emulsionem seminis papaueris, & macaginem
psyllij, & in summo dolore fit collyriū album rhafis cum opio:
hoc tamen medicamentū, & simile narcoticum non est ocu-
lis admouendum, nisi in vehementissimis doloribus, & quādo
alia mitiora, & securiora non sufficiunt, quia spiritus crassos
reddunt, & videndi facultatē infirmāt lege com. 3 1. 6. lib. aph.
in maximis tamen doloribus, & vigiliis, vbi etiam mors time-
tur, necessaria sunt hæc medicamenta narcotica. Vide histo-
riam de quadam nobili, cap. de ophthalmia doctoris Gatinarie.

*Admo-
nitio.*

Quando dolor est remissior, alia priora absque narcoti-
cis satis sunt, vt in non vera, quæ sæpe curatur sola absen-
te causa externa, seu primitiua, & aliis leuioribus, quæ supe-
rius diximus: vel decocto seminis fœnugræci, & seminis
psyllij, aqua rosarum, & oculis calens admotum, optimum
remedium est.

Quartò apparantibus bilem non naturalem, & crassam sy-
rupus acetoso S. & rhodomelle, aut syrupus malorum granato-
rum, & endiuie comp. cum syrupo rosarum, cum aquis fœ-
niculi rosarum, & plantaginis, & similibus.

*Prepa-
ratio.*

Quintò, materiam concoctam euacuantibus, vt rhabarba-
ro, myrobalanis citreis, agarico trochiscato & pilulis de rha-
barbaro, aut aggregatiuis, & aliis pari facultate præditis,
vt hoc est: ℞. diacatholicon. ʒ. v. rhabarbari electi infusi per
noctem in aqua endiuie ʒ. j. ʒ. electuarij de succo rosarum
ʒ. iij. diaphænicon ʒ. j. ʒ. syrupi rosarum ʒ. j. decocti florum
cordialium q. s. misce, & fiat potus. Sanguinis missio ex ce-
phalica eiusdem partis euacuat omnes humores, à parte affe-
cta, & ab alijs proximis.

*Purga-
tio.*

Sextò, reliquias materiæ ex oculo vacuantibus, & resol-
uentibus: vt admoto decocto seminis fœnugræci, seminis fœ-
niculi, & camomillæ, spongia, aut molli lintheo. Balneum &

*Resol-
utio.*

vinum potus cum Hippocr. 6. Aphor. potenter resoluunt. Idem

Topica.

efficit ouum, ita coctum, vt concretum & induratum sit, ocu-
lis impositum. Pari vi pollebit drachma. j. aloës cum vncia j.

*Corrobo-
ratio, &*

aquæ fœniculi, si oculo applicentur. Hoc medicamentum
oculos roborat, reliquias siccant, & absunt. Idem præ-

alteratio.

stat

DE CVRAND. MORB.

stat sarcocolla, aqua rosarum, vel potius lacte muliebri nutrita, & soluta.

Ophthalmia antiqua curatio. Si antiqua fuerit ophthalmia, & intermittens præcedenti debita victus ratione, & humoris concoctione syrupo rosarum & rhodomelle, cum aqua, aut decocto seminis fœniculi, purgabis 3.j. pilularum lucis ma. aut sine quibus esse nolo, aut de agarico semel in heptomada. Iterum purgabis 3.j. prædictarum, aut similium pilularum: & oculis non sunt admo- uenda repellentia intensè frigida, imò iis semper adde parū

Cautio. aquæ fœniculi, aut rutæ, ne fiat albugo, aut suffusio oculorū: hanc tamen & vlcera oculorum gigni prohibet filū colo tra-

Cervix, filo traj- citur. iectū per tres digitos sub nuca, prius tamen apprehende for- cipi cutem, donec sensus tactus abeat, post acui incerto filo crasso facto ex pilis caudæ equinæ, vel (ne tantus dolor ex-

Historia citetur seta, vel lino perforamus, vt in vulnere, acu ablata filum maneat, quod vlcus diu apertum seruet, vt per id puris multitudo euacuetur. Diuitibus aureum annulum immittunt, loco fili acu ablata. Quotidie remouent dictum filum vel an- nulum, & manè, vespèrque terunt terram. Hoc auxilio re- uellente & vacuante multis oculi acies fermè amissa fuit in pristinam sanitatem restituta, vt ego sæpe expertus sum in plerisque, & in filio meo nato octo menses.

Instru- menta

Scholium.

Ophthalmia com- munita- ta habet do- ladi actionē morbo non in ipsis, sed in principio, aut parte, qua- defert facultatem, existente. Præterea in his instrumentis una pars similis est quæ operatur, reliquæ verò ei præbent usum, Vna pars & ideo in actione corū laesa, morbus aut erit in parte, quæ opera- similis tur, aut in alijs. Quod in oculo verū esse deprehendes, hic enim à agit in cerebro per neruū opticū facultatē accipit, pars autē quæ in ipso instru- videt, est tunica aracnoides, una cum humore crystallino, reliquæ mento. oculi partes ei præbent usum. Dices nonne Gal. humorē, Crystalli- Visionis nū, visionis instrumentū appellat? Respondeo, nomine humoris cry- instru- stallini Galenur, etiā mēbranam intelligere, vt latè in libris de mentū. symptomate & morbo explicatū habeo. Oculi actio (quæ visio est) Ophthalmia quid nem appellant. Hæc nihil aliud est quā inflammatio adnata mē- Causa brana: nomine inflammationis intelligentes tumorem præter na- ophthal- turam, qui in hac membrana, ob multas, quas habet venas, so- mia. let accidere. Causa ophthalmie aut est externa, aut interna. Ex-

terna sol, fumus, & alia quæ dolorem, aut calorem in oculo excitando fluxionem mouent. Interna causa est fluxio sanguinis, quæ fit à plenitudine corporis, aut venaarum capitis, aut ab humoris acris fluxione. Quæ in parte nobis non placet sententia Montani & Iacotij, existimantium ophtalmiam fieri etiã per essentiã sensim collecto excremento in membrana adnata: nam ex Galeno, ex his excrementis sensim collectis fit apostema & non tumor, qui ex eius sententia sæper fluxionẽ sequitur. Malè etiam multi ophtalmiã à flatu fieri sentiunt, hic enim bene poterit ob tensionem dolorẽ generare, non autem ophtalmiam, quæ est inflammatio. Præterea sententia auctoris, quæ diuidit ophtalmiam in veram, & non veram, sequenda non est: quia à quacumque causa fiat ophtalmia, est dicta membranae inflammatio. Altomarius ophtalmiã morbum compositum ex intemperie, tumore, & soluta continuitate, appellare solet. Decipitur tamen quia tumor, si non ledit actionẽ, non erit morbus, sed symptomã, sicut & soluta unitas. Est ergo ophtalmia intemperies membranae adnata, cū fluxione humoris, quæ si actionem vitiat affectũ generando in humore crystallino, erit causa morbi, aliter verò morbus. Tumor & soluta unita symptomata sunt, quæ ad intemperie cū affluxu sequuntur, sicut & dolor, qui in hac parte mēbranosa, ac proinde multũ sensibili ita maximus aliquando esse solet, vt ad securationem attrahat, cū fiat causa augens affectũ, nempe tumorem.

Secundò aduertentibus sanguinem fluentem.] Auctor & alij practici in ophtalmia, si plethora sit in corpore, secant basilicam: si verò suppressio mensis, secant venam pedis. Qui quantũ errent intelliget, qui ex Galen. didicit, reuulsionem faciendã esse ex parte, ad quã fluit humor, & ex vena, quæ cū loco affecto se aperit. Secanda ergo erit ob dictas causas in hoc affectu cephalica eiusdem partibus, quæ citò & multũ euacuat ex oculo affecto. Purgatione etiam auctor in principio reuellit, sequutus fortasse Gal. qui 13. metho. cap. 11. phlegmonẽ oculi incipientẽ sola purgatione vno die secuisse scribit. Hoc poterimus refellere, eò quòd humor in ophtalmia non turgeat, quia in principio inflammationis, non solum reuellere, sed ex parte affecta debemus euacuare, quod non poterit præstare medicamentũ purgans. Aliqui respondent verum esse in ophtalmia solum in principio sanguinẽ esse mittendum, aliquando tamen, cum vires non sufficiunt ad eam euacuationem, posse nos purgare, cum purgatio minores postulet vires, quã sanguinis missio, atque hoc considerando Gal. 13. method. faciendo id, quod potuit purgasse. Alij satisfaciunt, contendentes etiã in principio ophtalmie semper esse secandã venã, in quæ id violasse Gal. 13. method. nã ibi non purgauit in tumore præter naturam, sed in phlegmone oculi, hoc est ardore, id enim existimant intelligere Galenũ per phlegmonem.

Montanus & Iacotius errant.

Auctoris lapsus. Altomarius decipitur.

Practicorum error circa missionẽ sanguinis.

An in principio ophtalmie liceat purgare.

DE CVRAND. MORB.

Horum sententia nobis non placet, quia non semper in principio ophthalmia debemus sanguinē mittere, licet enim aliquando purgare, ut si fiat ophthalmia à bile, de qua loquitur Gal. 13. method. tunc enim purgatione utemur, qua ex venis exacuantes bilem re-

Obiectio uellimus à loco affecto. Dices est inflāmatio, debemus ergo ex parte euacuare. Respondeo, hanc inflāmationem esse rxiguam, & ex humore tenui factam qui citò exhalat, ac proinde non egero euacuatione, qua fit per sanguinis missionem, verum est posse sanguinem mittere, si sanguis sit prauus. Obijcies iterum, humor est firmatus, debet ergo prius concoqui, & postea euacuari. Respondeo, hoc intelligendum esse in morbis venarum, & non in aliis.

**Repellē-
tia in
principio
ophthal-
mia.** Tertiò repellentibus.] In principio ophthalmia cū humor extra venas fluxerit, opus est ipsū ex ea parte euacuare, non calidis, quia attrahent humorē, sed repellentibus, qua adstringentia sunt. Deliberare autē debemus de his inter alia naturā partis considerātes: hac enim cū sit membrana, ac proinde multū sensilis, non ferez medicamenta multum frigida, & adstringentia: quia ipsam contrahent, & exasperabunt. Applicabimus ergo oculis, & non naribus, ut malè vult auctor, ea qua moderatè reperiunt, qualia sunt rosa, & albumen oui confractum. Supra frontem tamen bene possumus validè repellentibus uti, albumine oui cum aceto, bolo

**Extergē-
tia sem-
per in
ophthal-
mia sunt
vtilia.** armeno, aut sanguine draconis. Præterea cum inflāmatio sit in parte, qua non tegitur cute dura & crassa, semper ex ipsa aliqua humeros portio resudat, & idè cum repellentibus digerentia semper miscere oportebit: huiusmodi sunt, collyrium album, Rhasis sine opio cum aqua rosacea, aut plantaginis. Applica autem medicamenta oculis instillando ipsa, aut pannum lineum, vel tenuem

**Quomo-
do appli-
candum
medica-
mentum.** stupē madefac, & sic utere, dūmodò non permittas ea exsiccari, aut calefieri: instillamus, aut lineo panno utimur, quia pars non potest ferre graua & ponderosa medicamenta in quare auctor errat si mul cum aliis, micā panis, aut pomū applicans: non sinimus ea exsiccari, quia adhærebit, & deinde extrahitur cum dolore, à quo au-
**Dolor in
ophthal-
mia.** gebitur affectus: non sinimus calefieri, ne attrahant. Dolor in hoc affectu ob vehementiā, aliquando ad se attrahit curationē, quo tēpore utere optatis medicamentis, collyrio albo rhasis, cum opio, aut oui albumine agitato cum decocto papaueris albi. Rarissimè tamen contingit, ut ad hac veniamus medicamenta, qua visū hebetant,

**In aug-
mento.** quia rarò talis contingit dolor. In augmento morbi repellentia cū digerentibus misce his, ita tamen ut repellentiū facultas vincat, quia fluxio augetur. Coque ergo myrtos, aut rosas cū semine lini: aut fœnugracū cū aqua plantaginis, aut (quod est elegantissimū remedium) albumen oui, & aquam rosaceā cū paucò vino miscebis.

In statu. In statu aqualiter miscenda sunt digerentia & repellentia.

Quartò

Quartò, apparantibus bilem.] Bilem preparat, & purgat, quasi ophthalmia à sola bile oriatur, & non à sanguine optimo, melancholico etiam, aut pituitoso. Dices, est ne purgandum in hoc affectu? Respondeo, purgandum esse sine aliqua preparatione in principio, si ophthalmia à bile fiat: at si humore crasso eueniat, apparentibus signis concoctionis purgabimus ipsum.

Sextò reliquias materiæ.] In declinatione cum nil fluat ad oculos, digerentibus solis euacuanda est materia. In declinatione.

Si antiqua fuerit ophthalmia.] In antiqua ophthalmia filo per collum traiecto sub nuca utitur, de quo remedio hoc modo deliberabis. In antiqua ophthalmia fluxio perseuerat, hæc reuelli debet euacuatione aliqua: & cum sanguinis missio, purgatio, in adia, cucurbitula, & aliæ similes non prosint: deueniendū ergo erit ad duo remedia, quorum vnum est cauterium, & alterum filum per collum traiectum: & cum cauterium multum dolorem inferat, & vlcus ex ipso relictum non ita facile possit apertum seruari, proinde ad filum deuenimus: atque hæc est qualitatē deliberatio. Quantitatē colligimus ex ulcere, quod magnum nō debet fieri: occasionem ex euacuationibus totius corporis præcedentibus: modū utendi ex loco affecto, qui cum sit oculus, ut ab eo reuellamus, & euacuemus partem contrariam, & proxima remedium applicamus, qualis est ceruici superior pars. Remedia in ophthalmia supradicta nobis significare visus fuit Hip. 6. aph. sent, 31. ubi sic scribit: dolores oculorum, mcri potio, aut balneum, aut fomentum, aut vena sectio, aut medicamentum epotū soluit. Si non sit plethora, & dolor fiat à sanguine crasso venas adnata membrana replente, à vini potione soluitur: quia vinum fundit humorem, & suo motu ipsum educit, quod idem 7. aphor. com. 48. habet Gal. Si dolor à bile acri oriatur, dummodo absit plethora, balneum utile est, quia ab eo bilis acrimonia temperatur, si ophthalmia sit in declinatione, cum ad partem affectam nil influat, fomento calido, quod humorem dissipat, uti oportebit, sicut vena sectione in principio, & purgatione in principio, aut postea, ut supra docuimus. Antiqua ophthalmia. Deliberatio remedij.

Explicatur aph. 31. lib. 6.

De imbecillo aspectu. CAP. XIX.

Oculorum visus, ut aliarum partium operatio, tripliciter læditur (autore Gal. cap. 80. artis medicinalis) aut quia vix, aut quia vitiosè, aut quia nullo modo cernimus: de ultimis duobus in præsentia non agimus, cum de iis in sequentibus capitibus, & aliis locis verba facturi simus. De prima igitur læsione hoc loco sermonem instituimus, quæ est affectio oculorum, p̄tio causa qua minus æger videt. Cuius variae sunt causæ externæ, & internæ iuxta illud carmen: Descriptio causæ.

h 2 Allia

DE CVRAND. MORB.

Allia, vina, venus, puluis, ventus, faba, fumus.

Ista nocent oculis, sed vigilare magis.

Nota.

Ex his, aut aliis fit hic affectus, aut per consensum totius, vt in hectica, aut aliarum partium, de quibus suis locis, vel oculis primario affectis. Quorum omnium causæ, & notæ satis ex ægri dictis, & per se patebunt.

**Cura-
tio.**

Quando vitium proprium est in oculo ab humore largiori, curatur quinque generibus remediorum. Primò, victu tenui exsiccante, dummodò sit cibus facilis concoctu, obserueturque ordo traditus à Gal. in lib. de alimentorum facultatibus, & de sanitate tuenda, circa ordinem, horam, quantitatem, & qualitatem ciborum. A cibo, comedenda sunt, quæ vaporem prohibent

Victus.

ad caput ferri, vt panis tostus, coriander tostus, aut conditus, caro cydoniorum, vel ipsa cydonia tosta, aut pira, addendo parum sacchari, & seminis feniculi, hoc enim oculos roborat, vt in serpentibus, & buffonibus experientia demonstrat. Rapæ si bene concoquantur, sua proprietate visum roborant. Viperarum

**Vis ra-
parum.**

carnes bene apparatus similiter aciem oculorum confirmant. Eius præparatio cap. de elephantiasis demonstratur. Avis pica, & hepatis hirci tota substantia corroborant aspectum. Similiter & lentium frequens vsus, si ab humiditate nascatur imbecillitas.

**Noxia
oculis.**

Quæ verò huic affectui maximè nocent, sunt cruditas, coitus immodicus, & somnus diurnus.

**Præpa-
ratio.**

Secundò apparantibus materiam, primò melle rosato colato, & oximelite S. cum aquis, aut decocto feniculi, hyssopi, saluæ, & similibus. Secundò syrupo de hyssopo, de stæchade, oximelle compos. cum decocto, aut aquis superius dictis, & similibus.

**Purga-
tio.**

Tertiò, materiam concoctam vacuantibus, primùm pilulis ex Hiera S. elephanginis, mastichinis, agarico trochiscato, aut Hiera S. Secundò pilulis de agarico, sine quibus esse nolo, & lucis. m. Vltimò si opus fuerit valentibus pilulis cochiis, aut foetidis. Dosis omnium horum medicamentorum ex dictis primo capite, & ex doctrina Mes. & Nicolai in eorum antidotariis est satis cognita.

Auersio.

Quartò auertentibus ad infernas partes, aut posteriores, vt clysteribus, glandibus, ligaturis brachiorum, & crurum frictionibus, fomento, & lotionem ex decocto rerum capitalium, multiplex versus occipitium reuersi capitis, apophlegmatismis, ex rhinis, cauterio post aures aut in coronali commissura, vel filo

**Robora-
tio, & re-
solutio.**

collo affixo, de quo dictum est in fine 6. cap.

Quintò, roborantibus partem affectam, & resoluentibus reliquias materiæ: vt nuce muscata quotidie sumpta visus

recupe

recuperatur : myrobalani quoque cepulæ, si duæ bis in hebdo-
mada, aut ter sumantur, visum reficiunt. Idem præstant acorus
conditus, theriaca magna, mithridatum, diamuscus, & pliris ar-
coticon, si multis diebus in quantitate 3.j. vsque ad 3.ij. sumat
æger. Hoc quoque auxilium validè visum corroborat: ℞. succi *Acnen-*
fœniculi depurati 3.vj. succi rutæ depurati 3.iiij. mellis 3.j. fac- *tia visū.*
chari 3.ß. foliorum auri num.iiij. misce, per duos, aut tres dies
æstatis insolentur omnia, facta sæpe permutatione ab vno vase
in aliud, vt omne excrementum abiiciatur. Eandem, & maiorem
habet vim hæc aqua oculis sæpe admota: ℞. chelidoniæ, fœni-
culi, rutæ, fileris montani, euphragiæ, verbenæ, rosarum rubra-
rum an. libr.ß. 3. pulueris caryophyllorum, & piperis an. 3.ij. ex
his fiat aqua per distillationem instrumento vitreo & igne pau-
co. Puluis aqua picæ, si oculis adinotetur, ipsos vehementer iu-
uat. Idem præstat succus, aut puluis hepatis hircini assi: cui si
addas parum pulueris caryophyllorum, & piperis erit efficacior.
Hoc medicamentum visum maximè confirmat: ℞. tuthiæ Ale-
xandrinæ quinquies incensæ, & extinctæ aqua rosarum 3.ß.
balsami optimi 3.iiij. vini albi odoriferi 3.j. misce. Serpentes
nemorales abscissis capitibus & caudis, si coquantur vino albo *Medica-*
& fœniculo, donec caro ab ossibus separetur, visum mirum in *mentum*
modum tuentur. Hoc medicamentum est omnium in hac re *nobile.*
nobilissimum: ℞. fileris montani, maioranæ, euphragiæ, rutæ,
chelidoniæ, fœniculi. an. 3.iiij. zinziberis, spicæ, piperis longi,
caryophyllorum, tuthiæ incensæ & post restinctæ, vt diximus
sarcocollæ nutritæ lacte asinæ, ligni aloës an. 3.j. fellis vnus
anguillæ, & vnus accipitris, & vnus hirci montani, si possimus
nancisci, balsami 3.ß. mellis rosati colati 3.iiij. Omnia simul
mixta, & redacta in puluerem, quæ possunt redigi, vase vitreo,
bene obturato insolentur in æstate per xl. dies, & in hyeme sub
stercore quolibet die bis, vel ter agitetur illud vas, postea con-
seruetur liquor vase vitreo, qui oculis adinotus sæpe visum cor-
roborat, & auget etiam. In senibus tantam vim habet hoc me-
dicamentum, vt aliquibus visum sit nullum medicamentum
huic simile, aut par hætenus extitisse, quorum summam veri-
tatem ego felicissimo successu sæpè expertus sum.

Scholium.

Oculorum visus.] Confusè certè procedit auctor in hoc cap. Præti-
quod intelliges, si legas cap. 2. de cau. symp. ubi inquit Ga- cerum
len. causas læsa visionis. Si ergo rectè voluerimus curare, hoc modo error
procedendū erit: Imbecillus affectus est symptoma morbi ad quem
h 3 sequi

DE CVRAND. MORB.

sequitur, aut est intemperies, aut morbus instrumentarius, aut communis, qui soluta unitas dicitur: morbo intellecto contrariis ipsum curabimus. Præterea quæ multi ex practicis scribunt de medicamentis tota substantia corroborantibus aspectum, qualia sunt avis pica, hepar hirci, rapa, & similia, falsa sunt, & fictitia: quia morbi actionem videndi hebetantes manifesti sunt, ac proinde contrariis medicamentis, etiam auferendi. Neque obiciat fœniculum. Hoc enim caliditate sua digerendo humiditatem confert: qua eadem ratione opus erit curare affectum, de quo loquitur auctor in hoc capite, & simul emittere aurum, hirci hepar, tuthiam incensam & extinctam in urina pueri, & alias compositiones ab ipso propositas, cum aliqua inutilia, & multa simplicia vnius facultatis contineant, quod maximum vitium est.

De curatione albuginis oculorum.

CAP. XVIII.

Diuisio.

Albuginum oculorum dux sunt differentia, quædam enim in summa corneæ superficie consistunt, & Græcis nephe-
lia, atque vlæ, Latinis verò nubeculæ, caliginēsque & tenues albugines nominantur: quæ verò in interiori parte sunt, & ut Paulus ait, alterius radices egerunt, hæleucomata Græcis, Latinis albugines crassæ dicuntur.

Descriptio.

Utraque autem, cicatrices sunt, ac maculæ in cornea post vulnerum curationes relictæ: sic autem appellantur, quod ovi albumen referant: omnes enim cicatrices (autore Ætio) in nigro oculo candidæ videntur: densata enim cornea tunica subiectus cæruleus color non ampliùs pellucet. Eminentes præcipuè albescunt, planè minùs candicant, cauiore parti nigræ oculorum quodammodo assimilantur. Hæc Ætius. Morbus intuenti patet, non est igitur opus signis.

Causa.

Curatio.

Albugo in senibus est incurabilis, præsertim antiqua, in iuuenibus difficilis curatu, in pueris & infantibus, facilior, semper tamen est similis curatio præcedenti, in victus ratione, vacuatione auertentibus, præsertim per filum, de quo cap.

Fotus.

16. His omnibus iam factis, & admotis oculis medicamentis dictis in quinto genere auxiliorum præcedentis capituli, præter illa, frequens fotus ex decocto seminis fœniculi, fœnugræci, camomillæ, rutæ & raparum est utilis, & necessarius: post quem potentiùs medicamenta poterunt albuginem dissipare, & omnino abstergere. Mel, & eius aqua bene eam tollit, similiter & aqua distillationis ex rhodomelle. Pulvis sacchari candi habet eandem vim, & maiorem, si addas pa-

Abstergentia.

rum

rum pulueris ossis sepiæ. Sequens aqua optima est in hoc, & à me in meo filio probata, qui natus erat octo menses: ℞. fœniciuli m. ij. rutæ chelidonix an. m. j. mellis optimi ℥. iij. sacchari candi, & rhodomellis an. ℥. tuthiæ Alexandrinæ, & sarcocolle nutritæ an. ℥. ij. vini albi optimi cochlearia duo, misce, & fiat ex his aqua per distillationem igne pauco. *Aqua probata.*

De suffusione. CAP. XIX.

QUod Latinis suffusio sonat, hoc Græcis hypochima, & hypochylis, barbaris verò cataracta dicitur, & nihil aliud est, quam frigidi, crassi, & lenti humoris, & glaciei instar congelati inter ceratoidem tunicam, id est, corneam & crystalloidem, seu maui humorem tenuem effusio. Causæ iam dictæ sunt nempe humores crassi per nimias cruditates iuxta pupillam inter corneam, & crystalloidem aceruati: præter hæc etiam violentus vomitus, & ictus, & ventriculi affectiones. Notæ ab Ætio hæc referuntur. Inchoante suffusione pusilli culices, & caliginosa quædam corpuscula assidue oculis occurfare solent quibusdam veluti lanarum filamenta, & telæ araneorum quibusdam circa lucernas circuli offeruntur: quæ cum apparere incipiunt, pupilla minus accuratè spectantibus interdum pura videtur, interdum colorem pelagi præ se ferre. Sed incrementum ægritudine accidentia quoque increbrescent, quæ ubi ad summum peruenerint ægri excæcantur, & pupilla ad candidum colorem sine vilo penitus splendore mutatur. Quamuis in variis suffusionibus varij colores conspici soleant: quædam enim æris colorem, quædam vitri imitatur, quædam subalbescit, quædam ad caruleum vergit, quædam glaucescit, quædam insanabilis est: hæc Ætius. Porro tunc cognoscitur, num sanatis sit suffusio, quoties altero oculo clauso pupilla eius oculi, in quo est suffusio, & clarior apparet, & dilatur, ut docet Galen. 4. de morbo & symptomate, cap. 2. Si culpâ neutrius oculi accidat suffusio, in utroque oculo, & non in altero tantum, id fit, & per intervalla quoque, & prius aliquid in ventriculo præsentitur. *Definitio.* *Signa.*

Suffusio curatur quinque remediorum generibus, quemadmodum imbecilla visio, & albugo, sed valentioribus. Quæ absoluta est, & confirmata, accusatur: eget tamen viro docto & probato: si verò absoluta nondum fuerit, curatur primò victu calido, & sicco (quia materia est vaporosa, & aquosa) de quo diximus cap. 16. Sed si aer conueniens desit, ut in hyme, arte oportet moliri, igne, scilicet, & suffitu. Abstinencia quoque *Curatio* *Victus.*

DE CVRAND. MORB.

quoque, & ieiunium huic morbo diuturno plurimum est salubre. Cœna sit levis, si semel comedisse his non sufficit, vino, iusculis, & pituitosis alimentis minimè utendum est: semper enim sunt eligenda calida & sicca.

Præparatio & vacuatio.

Secundò & tertio concoquentibus materiam aquosam, & vacuantibus per ea, quæ diximus cap. 10. & alia similia, sed toties est coquenda materia, & vacuanda, donec in totum sit affectus curatus, non solum semel, sed bis, ter, quater.

Auersio.

Quartò auerrentibus, ut acris clysteribus, balanis, frictionibus fortibus partium extremarum, & aliis omnibus, de quibus dictum est satis cap. 16.

Resolutio.

Quintò, resoluentibus, & dissipantibus reliquias materiæ primò interiùs sumptis, ut ʒ. j. theriacæ magnæ, aut mithridati, aut. ij. ʒ. diamusci dulcis multis diebus cum syrupo, aut aqua capitali sumptis tempore capiendi somni, ut cum cibi vapore eorum vis rapiatur in cerebrum. Si sæpe accipiantur ʒ. ij. confectionis Ham. Mesp. cap. de imbecillitate visus valenter & optimè dissipabitur materia. Admouenda sunt oculis aliqua præter dicta duobus superioribus capitibus, quæ possint resolvere, & tergere maculam, albuginem, & suffusionem non confirmatam, semper tamen optima præcedat corporis euacuatio,

Tergentia.

aliàs fieret attractio vaporis, & aquæ ad oculos. Inter ea quæ potenter omnem albuginem, & suffusionem non confirmatam tergant, est sagapennum mixtum aqua fœniculi, & aqua mellis, & saccharo concreto. Idem præstat pulvis capitum hirundinum, si cum aqua distillationis urinæ puerorum, & fœniculi oculis sæpe admoveatur, post hæc valentiora conferunt, ut sunt genera fellis: sed priùs oportet experiri antè dicta, & aqua distillationis corticum fabarum. Hæc quoque aqua est optima,

Aqua efficacissima.

& efficacissima, ℥. vini albi ʒ. iij. succi fœniculi sine sedimento ʒ. ij. camphoræ ʒ. j. tuthiæ Alexandrinæ ʒ. j. ʒ. zinziberis ʒ. ʒ. mellis ʒ. iij. omnia simul in vase æneo ix. diebus in umbra conseruentur, postea per filtrum fiat distillatio, cuius aquæ duæ guttæ manè & serò oculis instillantur: ultimò verò, & cum alia non sufficiant, sunt admouenda fella, priùs mitiora, videlicet piscium, suum, agnorum, gallinarum, & perdicum: deinde acriora, ut accipitris, falconum, & aquilæ. Ultimæ verò est

Curatio

admouendum fel viperæ: sed quia est venenosum eo non esse utendum censeo, sed in eius usu oportet os plenum esse aqua, & theriaca magna, ne aliquid venenosum in ventriculum, aut thoracem descendat: fel tamen tauri, & apri est viperæ tutius & satis potens.

Scholium.

Quod Latinis suffusio.] Suffusio non est morbus in via, ut *Quid suffusio.*
voluit Vega: quia nullam obstruit cavitatem. Sed ex Galeno
 est morbus in numero addito: est enim in oculo additus humor ad
 eius actionem non necessarius, imò eam impediens. Hic humor con-
 cretus in humore aqueo continetur, prohibens quominus species re-
 rum visarum ad humorem crystallinum perueniant. Vel quod ve-
 rius apparet, est ipsemet humor aqueus concretus ex alimento cras-
 so, à quo nutritur. Causa istius morbi, est affluxus crassi humoris, *Causa*
 qui vel à capite prouenit, præsertim si imbecillitatem habuerit na- *suffusio-*
 tiuā à frigidity sola, aut cū humiditate coniuncta, pendentē, vel *nis.*
 à toto corpore, cū ob prauā victus rationem humor crassus au-
 getur. Solet curari suffusio, si incipiat (quia inueterata solū acū
 postulat) considerantes fluxionis causam si à capite fluat humor,
 eius intemperiem corrigemus, euacuato prius humore purganti me-
 dicamento: si à toto corpore fluat, sanguinem mittimus, ob sangui-
 nem prauum, & deinde purgabimus, & ultimò ad Topica deue-
 niemus, quæ sensim digerāt humorē in oculo cōcretum: qualia sunt *Curatio*
 decoctum fœniculi in vino albo, aqua etiam chelidoni, aut fœ-
 niculi, aut ruta. cum tutthia & similia. Hæc curatio cōmuniter so-
 let exerceri. Si tamen voluerimus rem penitiùs considerare, intelli-
 gemus, hanc non esse optimā curationem, quia suffusio incipiens (ut
 experientia longa docere tibi poterit) nunquam dictis medicamen-
 tis curatur, quia humor sub membranis inclusus ea contemnit.
 Meliùs ergo crit omittere supradictam curationē: quæ impedit per- *Refuta-*
 fectam humoris concretionem, & hoc nomine verā curationē: quæ *tur præ-*
 exercebitur, si statim utamur, extremitatibus animalium, eorundē *dicta*
 cerebris, & alio victu incrassante, ut humor concreseat, & durior *curatio.*
 fiat: & hac ratione possit acū, à pupilla regione in oculi angulū mu-
 tari; atque hæc est curatio eius suffusionis, quæ proprius est affectus.

De dolore aurium. CAP. XX.

Aures perinde, ac aliæ quoque partes nostri corporis *Dolor*
 dolore infestantur, & vehementi: plurimo enim sensu *quid sit*
 pollent. Dolent autem nonnunquam propter causas ex- *ex lib.*
 ternas, cuiusmodi sunt refrigeratio in peregrinatione à *de sym-*
 ventis frigidis proueniens: interdum propter intromissum *pto. cau-*
 humorem in balneis aquarum frigidarum, aut insigni ali- *sis.*
 qua qualitate præditarum. Oritur etiam & ex causa calida,
 à quacunque occasione accidat, ut sole, igne, vento, bal- *Causa.*
 neis, atque aliis id genus. Præterea & ex ictu, vulnere, con-
 fusione, acri aliquo medicamento, aut vermi in aurem in-
 gres

DE CVRAND. MORB.

Nota. gressio. Internæ quoque causæ multæ sunt, vt intemperies aliqua, aut nuda, aut cum humoris affluxio, inflammatio, flatulentus spiritus, vlcus, ac vermes intra aures geniti. Signa causarum externarum ex ægri sermonibus colligi possunt.

Internarum verò notas si exquires: si nuda fuerit intemperies, nulla adest grauitas, sed si calida fuerit, ardor, & maius acumen doloris: si frigida, obtusior quodammodo dolor est, & frigus sentitur. Idem de reliquis est iudicandum. Si verò præter qualitatem humor quoque infestat, præter iam dicta grauitas inest, ac pondus quoddam. Omni autem intemperiei, seu nuda fuerit, seu cum humore, hoc est commune, vt à similibus lædatur, iuuetur autem moderato contrariorum vsu. Si sit inflammatio, adest febris, grauitas, pulsatio, & dolor intolerabilis: si flatulentus spiritus, tentio, & tinnitus in aure sentiuntur: si vermes, interiorem motum quendam æger sentit, & in splendido, aliquo loco cerni possunt, vel ex iis aliquis foras prodit. Si vlcus, pus inde promanat.

**Curatio
si ab in-
temperie
calida.**

Curatur quinque remediorum generibus, primò, victu tenui, & refrigerante: quare à carnibus & vino abstinendum est. Sit eorum cibus lac amygdalarum, cremor hordei, lentes, cichorea, lactuca, pyra, & mala cydonia assa, & potus aquæ hordei.

Reuulsio

Secundò, auertentibus secta vena humerali eiusdem partis, si non fuerit plenitudo: vel media, existente plenitudine. Mittatur sanguis respondens dolori, & plenitudini semel, bis, & ter si opus fuerit. Si ætas, & vires non ferant sanguinis missionem per sectionem venæ, per cucurbitulas, & scarificationes inter scapulas sanguis extrahatur, fiatque debita reuulsio.

Auersio.

Clysteres refrigerantes, & parum acres, cucurbitulæ, ligaturæ, & frictiones partium extremarum, & fots quoque auertunt & maximè conferunt. Vacuatio per medicamenta benigna similiter auertit, & est necessaria, vt per hoc, aut simile. ℞. rhabbari electi infusi per noctem in aqua endiuix. ʒ. j. ꝑ. medullæ cassiæ fistularis recent. extractæ ʒ. vj. syrupi violarum ʒ. j. aquæ buglossæ q. s. misce, & fiat potus. Si magis amaret pilulas (quamuis vtilior sit potus) ʒ. j. pilularum de rhabbaro fieri potest euacuatio, aut aliis pilulis, quæ bilem purgant.

Purgatio.

**Topica
repellē-
tia.**

Tertiò repellentibus, vt in oxyrhodino, aut lacte humano, vel caprino vel ouino. Hæc, & similia parum calida sunt auribus instillanda. Aut oleo de portulaca aut violato, aut de nenuphare, aut de papauere. Oleum rosaceum & terebinthina simul mixta dolorem aurium tollunt, & repellunt, si

oleum

oleum rosaceum sit in magna quantitate, & terebinthina in parua. Sed si dolor fuerit vehemens qui autore Galeno cora. 38. *Sympt-* primi prælagiorum facultates destruit, ad se trahit curationem, *matris* egérque narcoticis, medicamentis, quæ nõ abscissa causa ipsum *curatio.* dolorem curant. De his Galenus 3. de compositione medicamentorum secundum locos satis abundè: inter alia tamen laudat mixturam ex lacte humano cum albumine oui, & pauco opio: laudat quoque Galenus castoreum cum opio æquo pondere vtrumque, aut si dupla portio castorei: vel vicissim, si maior & vehementior fuerit dolor. Hæc mixtura est etiam optima in hoc genere: ℞. micæ panis, aut farinæ hordei lib. β. sapæ, quod sufficit, misce, & fiat cataplasma: adde castorei ℥. β. opij & croci an. 3. ij. Hæc tamen narcotica non sunt admouenda, nisi cum alia non possunt curare, aut in maximis doloribus aliis non conferentibus.

Quartò, dissipantibus, & resoluentibus reliquias materiæ, vt *Curatio.* oleo lumbricorum, camomillæ, amygdalarum dulcium, sesami- *Resolu-* no, terebinthina sola, & decocto camomillæ, fœnugræci, & se- *tio.* minis lini, althææ, & similibus.

Quintò, frigidis sanantibus intemperiem calidam in auribus *Alter-* relictam, qualia sunt oxyrhodinum, & alia dicta tertio genere, *tio.* & oleum rosaceum cum mucagine seminis psyllij.

Si inflammatio in suppurationem terminetur (quod per doloris, & febris remissionem post augmentum cognoscitur) pus per incisionem instrumento ferreo factam extrahendum est, aut vocibus, & sternutamentis, aut medicamentis parum acris, si non appareat pars suppurata: deinde abstergentibus, & mundantibus, & postremo glutinantibus, & exsiccantibus curabitur. In his tamen consule chirurgum doctum.

Dolor ab intemperie frigida, præcedenti debita vacuatione: si *Si à fri-* fuerit cum materia, curabitur oleo camomillæ, nardino, ex li- *gore sit.* lio, laurino, rutaceo, & costino, cæpe tostum etiam curat illum dolorem. Succus rutæ cum sanguine anguillæ statim mitigat *Topica* omnem aurium dolorem. Succus rosis marini cum oleo rosa- *sedantia* ceo, & sapone Gallico vetustissimos aurium dolores curat: adeps *dolorem.* pulmonis vulpis auribus admotus, est optimum præsidium in dolore aurium. Idem præstat spoliolum serpentis decoctum oleo, *Pili Na-* aut succo conuenienti calido, aut frigido, habita ratione causæ: *quera.* Pili Naqueræ facultate præditi sunt à tota substantia curandi omnem aurium dolorem.

Scholium.

**Dolor
auris.**

A Vres perinde.] Dolor auris symptoma est. Morbus ad quem sequitur, est soluta unitas, aut manifesta, quæ sit ab icctu, con-
iunctione, & aliis: aut occulta, quæ ab intemperie calida, vel frigida,
aut à re distendente prouenit.

Curatur quinque remediorum.] In hoc capite relictis aliis
causis solum curat auctor dolorem à phlegmone ortum, ubi signifi-
care voluit phlegmonem sola caliditate dolorem generare, cum re-
uera tensionem in ea considerare debuisset.

**Quæ ve-
na se-
canda.
Purga-
tio.**

Secundò auertentibus.] Semper secunda est cephalica, ob cau-
sam multoties repetitam. Quòd si in venis sit cacochimia, purgabis
etiam non cassia, & rhabarbaro, quæ clementer id efficiunt, neque
eorum vis multum se diffundit: sed aliis fortioribus, diaphrasi, ele-
ctuario de succo rosarum, & similibus.

Topica.

Tertiò repellentibus.] Cum repellentibus misce acetum, ut
penetret, neque acetum laedet, si partem consideremus, quæ sicca cum
sit, acris medicamenta sustinet. Oleo ergo rosaceo, & paucio aceto
uteris. Omitte autem terebinthinam, quæ ab autore proponitur,
quia præter caliditatem, impedit penetrationem medicamenti. Ad-
uerte tamen hæcenus non curasse dolorem, sed eius causam, nempe
phlegmonem. Tunc autem eum curabimus, cum neglecto phlegmone,
soliis symptomatis habebimus rationem. Si ergo dolor urget, stupo-
rem inducenti medicamento uteris, qualis hoc est: ℞. olei rosarum
℥.j. opij. ℥.iiij. aceti parum ut penetret. Quæ in parte omittit medi-
camentum ex mica panis, & sapa constructum, quoniam quæ ipsi
componunt, opij vim refringent, neque etiam parti affectæ cataplas-
ma applicatur, quæ in parte interiori condita est. Quæ Rondoletius
scribit de cocleis, de medulla cruris porci saliti, & auctor de pilis
Naquera, & alia tota substantia sedantibus dolorem, omittantur,
ac si non essent scripta: quia causam doloris cognoscimus, & ideo
remediis manifestæ qualitate operantibus curabitur.

**Ronde-
letius &
auctor
labun-
tur.**

Quintò frigidis.] Non est, quòd hæc frigida applicemus, quia
si intemperies ex humore calido orta fuit, dissipato humore non
remanebit.

De sanguinis è naribus profluvio.

C A P V T XXI.

Causa.

Sanguinis è naribus profluij, quòd Græci hæmorrhagiam
appellant, multæ sunt causæ, partim internæ, partim etiam
externæ, eas autem omnes breuitatis gratia iuxta Galeni pla-
cita s. method. medend. in tria capita reducimus: fuit enim
sanguis

sanguis à venis , arteriisve nasi , vel referatis illorum orificiis, vel tunicis ruptis , diuisisque , vel sudoris instar transcolatus. Porro referantur arteriarum venarumque ora , aut propter nimiam sanguinis multitudinem, quæ vel in toto sit corpore, capite, vel hepate, liene, vel vtero : præsertim si non probè fluant menses, vt ex Aph. 33. sectionis 5. deprehenditur: in caput enim tunc fertur , atque inde per nares vi erumpit : nonnunquam & citra plenitudinem propter vasorum imbecillitatem hoc ipsum accidit , aut ob acrem aliquam qualitatem in humoribus re-
 pertam. Diuiditur autem tunica ex vulneratione, contusione, ruptione, & erosione velut sudor transmittitur , aut tunica ipsa rarefacta , aut sanguine tenuiore facto , quod multis de causis contingit : aut quia plus æquo exercitationibus homo sit vsus, aut medicamentis calidis sanguinem tenuantibus , aut victus ratione , qui sanguinem biliosorem reddiderit. Notæ tum ex *Notæ.*
 ægri sermonibus, tum ex eius intemperamento, aut antea acta vita colliguntur, quamobrem omnes eas recensere non erit opus. Hoc tamen animaduertere oportet, cum à capite sanguis per nares profluit, in eo summam adesse grauitatem: cum ab hepate, in hypochondrio dextro: cum ab splene, in sinistro : cum à matrice , circa vmbilicum dolores , ac tensiones quasdam sentiri: cum per crisem sanguinis profluuium sit , ea signa accidunt, quæ ab Hippocr. numerantur 3. Prognosticorum 33. prognostico, & à Galeno in libris de crisibus, atque alibi frequenter.

Sanguinis profluuium, à quacunque fuerit parte ortum si vires non deficient, non est sistendum, quia eo multis liberamur morbis , vt in libris de iudiciis Galenus testatur. Non criticum verò , quatuor remediorum generibus sistent. Primò , victu refrigerante , & astringente meatus, per quos sanguis fertur , vt aëre arte parato per acetum , aqua rosarum , lactucæ, plantaginis , folia salicis, myrti , lactucæ , nymphæ , & similia. Cibis ex succo acidulcium granatorum, limonum, aranciorum , acetosæ , & similia paratis, qui, si glutinosi fuerint, magis laudantur , quales sunt pedes , & capita vituli , arietis, hœdi, & aliorum animalium, amygdum, farina orizæ, caseus recens pinguis, oua dura, quia paucum & crassum sanguinem gignunt , præsertim albumina. Initio cum facultas non est imbecilla, abstine à vino , carnibus, & ouis sorbilibus & tremulis, largiorem , & liquidiorum sanguinem generantibus. Potus sit aqua calyceata , tandem animi & corporis quies est necessaria illis, & silentium.

Secundò , auertentibus , in quibus præcipua spes curationis versatur , vt crurum , & brachiorum dolorificis ligaturis, frictio

Aduer-

te.

Curatio

Victus

Auertiō.

DE CVRAND. MORB.

frictionibus, foribus ex aqua actu & potestate calente, cucurbitulis sine scarificatione hypochondrio apposis è regione naris, à qua sanguis effluit, & inter scapulas cum scarificatione, vbi vena scindi non possit ad virium defectum, aut ætatem puerilem, quamvis sanguinis missio per venæ sectionem sit remedium efficacissimum ad reuocandum impetum floris in contrarium: secunda est vena media eiusdem partis, si sit totius plenitudo, vel humeralis, si non sit plenitudo: quòd si ab vtraque nare fluat sanguis vtraque media, aut humeralis simul scindantur. Post primam sanguinis missionem, si secunda fuerit necessaria, & tertia, semper secunda est humeralis eiusdem partis: aliquando tamen prius est facienda sanguinis missio, per sectionem venæ pedum, aut tibiæ, videlicet cum ex detentis mensibus, aut hæmorrhoidibus nascitur hoc profluvium, præsertim si natura tentaueris per infernas partes sanguinem vacuare, & hæc sit vniuersalis regula Hippocr. Gal. rationi & experientiæ accommodata. Duo quoque sunt, quæ maximè auertunt subito reuocando sanguinem, calorem, & spiritum, timor incussus, & aqua frigida injecta in faciem ægri incogitantis: sed videndum ne sit æger maximè imbecillus, aut morbo comitiali obnoxius, quia hæc duo epilepsiam efficerent, aut subito interficerent. Ligatura arcta testium, vel eorum ablutio aqua frigida, si subito fiat, potenter auertit.

Admotio. Tertiò, sistentibus, & cohibentibus sanguinem, & glutinantibus sumptis, vel admotis, vt lactuca, portulaca, & aliis alimentis dictis initio huius cap. syrupo rosarum, cydoniorum, malorum granatorum, de acetositate limonum, & citri, præcipuè vbi sanguis est biliosus, & nimis tenuis, & conserva rosarum, acetosæ & nenupharis ℥. ij. aut 3. j. trochiscorum de terra figillata, aut de carabe cum 3. ij. aquæ plantaginis, aut portulacæ, aut similium cohibent sanguinem. Naribus, collo, & fronti sunt admouenda quæ refrigerant, & impellunt inchoando à mitioribus ad valentiora. Prima mixtura bona est ex aqua rosarum, albumine oui, & aceto, cui si addas puluerem astringentem, vniuentem, & obstruentem, erit efficacissima: qualis est ex rosis, balauistiis, gallis sumac, farina moletrinarum, mastiche, aloë, & mirrha, thure & pilis leporis, & similibus.

*Consi-
lium.* Ex his omnibus, aut aliquibus accipe ij. 3. cum aqua, aut succo astringente, naribus impone, & collo, & fronti: sed si supra venas ruptas apponatur medicamentum, citius sistet sanguinem. Gypsum cum albumine oui, aut aqua, aut aceto

*Sumenda
& ad-
mouenda.*

*Repellē-
tia.*

nari

naribus admotum videmus potenter sanguinem sistere.

Puluis limacum cum crusta tostorum sistit sanguinem, & *Sistentia*
 puluis ranarum combustarum. Aliqua sanguinem sistunt sta- *sanguini-*
 tim à tota substantia, seu proprietate, vt stercus asininum, vr- *nem à*
 rica, porrum, ocimum, seu basilicon. Hæc enim recentia, tri- *tota sub-*
 ta, & in nares immissa, aut illorum succus possunt sanguinem *stantia.*
 inhibere. Acetum potens cum gossypio, aut panno lineo sæpe
 fronti, aut collo applicitum illico sanguinem sistit. Quædam *Verula*
 vetula Monspessulana sola mēta naribus imposita curauit san- *curatrix*
 guinis profluuium è naribus trium dierum. Cinis panni linei
 prius atramento tincti aceto mixtus, & cum gossypio naribus
 immissus consilio cuiusdam viri sapientis curauit hoc proflu-
 uium. Medicamentum ex puluere corticum quorum, & gypsi
 cum albumine oui, naribus & fronti adiunctum cito, repri-
 mit sanguinem. Idem fit, mixtura luti reperti in mola fabro-
 rum, & bolo armeno cum albumine oui. Cauteria actu, &
 medicamenta scarotica, quæ vtendo scharas, & crustam gignunt
 potentissimè sanguinem, & subito inhibent, sed si schara deci-
 derit, maior & periculosior hæmorrhogia esset. Quare eis non *De Nar-*
 est vtendum, nisi cum alia iam scripta, similia non suffece- *coticis.*
 rint. Quando salus deplorata est, & victa à morbo facultas om-
 nium prædictorum, narcoticis curatur, quæ sanguinem glā-
 ciant, & membra stupefaciunt, vt athanasia recenti, & requie
 magna à scrupulis duobus vsque ad scrupulos quatuor, & phi-
 lonio antiquo Persico, aut Romano à drachma semis vsque
 ad 3. j. Hæc somnum conciliant, & hoc etiam modo fluorem
 sedant, sed hæc & similia narcotica partibus externis adnota,
 tutiora sunt, vt cap. 5 de curatione phrenitidis docuimus.

Quartò, auferentibus causam hæmorrhagiæ, vt medica- *Purga-*
 mentis cholagogis, si biliosus fuerit sanguis, qualia sunt rha- *tio.*
 barbarum, myrobalani citrinæ, & tamarindus, & hæc mixtu-
 ra vel similis. ℞. medullæ tamarindorum 3. vj. rhabarbari electi
 & corticum myrobalanorum citrinarum an. 3. j. syrupi ro-
 sarum 3. j. aquæ buglossæ, quod s. misce, & fiat potus. Si verò *Cōcoctio*
 sanguis fuerit pituitosus, præcedenti coctione per rhodomel, & *pituita.*
 aquam basiliconis, plegmagogis curatur, vt diacatholicon. 3. *Potio.*
 vj. corticum myrobalanorum. Kibulorum & agarici trochisca-
 ti an. 3. syr. de menta. 3. j. syr. de menta. 3. j. aquæ buglossæ,
 quod s. misce, & fiat potus.

Quæ sã-
guinis
excretio
fit toto
genere
prater
naturã.

Causa
fluxio-
nis san-
guinis.
Causa
interna
tres.

Libera-
tur Ga-
lenus à
cõtradi-
ctiõne.
An dia-
pedesis
fit pro-
fluuium
sanguis.

Criti-
cum pro-
fluuium
sanguis.

Sanguinis è naribus.] Sanguinis excretio ferè sèper est toto ge-
nere prater naturã. Addit Galenus illã dictionẽ ferè, propter
eã sanguinis euacuationẽ, quæ singulis mensibus mulieribus per u-
terũ contingit: hæc enim, cũ non sequatur affectum morbosũ, toto
genere prater naturã non est. Aliarum partium sanguinis euacua-
tiones toto genere prater naturã dicũtur, quia sèper sequũtur ali-
quẽ morbũ, unde malè Fucsius, & alij existimant, sanguinis eua-
cuationẽ dici toto genere prater naturã, quia id quod euacuatur,
est sanguis nobis familiaris, inde enim sequeretur euacuationẽ eã
sanguinis, quæ per vterũ singulis mensibus accidit, esse toto genere
prater naturã, in ea enim optimus sanguis excerni solet. Sanguinis
profluuiũ fit à causis externis, & internis: externa sum duæ lib. 3.
de caus. symp. c. 2. vulnus, & ruptio: vulnus à re vulnerãte, ruptio
verò à tensione fit. Conuulsio additur ab aliquibus, malè tamen,
cũ hæc media rptione, aut medio vulnere sanguinis profluuiũ ef-
ficiat. Causa interna sunt tres ex eodẽ Gal. Prima in facultate cõ-
sistit, cũ scilicet retentrix vasorum fuerit imbecilla, aut expul-
trix immodicè irritata. Secunda est sanguinis vitium, cũ peccat quã-
titate, aut qualitate. Tertia causa est vasorũ noxa: quæ tripliciter
cõtingit, primò, cũ vas est tenue, secundò, cũ molle: & tertio cũ du-
rũ, ab his enim tribus faciliè rũpuntur vasa. Obijcies Gal. lib. 5.
methodi, alias causas, nempe ruptionẽ, erosionẽ, & apertionem pro-
posuisse. Respondeo has causas sanguinis profluuij 5. lib. method. pro-
positas, à superioribus non distingui, quia ruptio à plethora erosio
à sãguine biblioso, apertio verò à vitio facultatis, aut à plethora.
Quid de diapedesi? Respondeo, nõ esse profluuiũ sanguinis, sed cruẽ-
ti seri, ut 3. de caus. sympt. docet Galenus, vel si cõcedamus, diape-
desim esse sãguinis euacuationẽ, ad anastomosin erit reducenda, quia
ex lib. 5. method. cap. 2. diapedesis duobus modis fit, primò attenua-
to sanguine, & tunica vasorum rarefacta, secundò apertis orificiis
exiguorum vasorũ. Ex dictis habemus causas profluuij sanguinis
in genere, ac proinde eius, quod per nares fit, de quo presenti capite.

Sanguinis profluuium.] Sanguinis per nares profluuiũ aut est
criticum, aut symptomaticũ. Criticũ prauideri potest signis traditis
ab Hippocr. 3. prog. sent. 33. Primũ est dolor capitis, nõ quilibet, sed
gravis, pulsans, & calidus, potissimũ si perseueret circa frontẽ, & tẽ-
pora com. 11. eiusdẽ lib. Secundũ visio hebes à copia sanguinis im-
pedido transitu spiritu animalis ad oculos. Tertiũ fulgoris motus
circa oculos, ex splendore sanguinis proueniẽs. Quartũ tẽsio in hypo-
chondrio sine dolore. Quintũ. colli dolor, & tẽporum grauitas. Sextũ
rubor oculorũ, maxillarũ, & narium: Septimum lachryma oculorũ
quo

quorum signorū rationem lib. 3. criseon habemus explicatam. Symptomaticum profluvium cognoscitur ex eo, quod non soluit morbum, matius & precedente cruditate eueniat. Criticum profluvium non est sistendum, quia in eo inutile expellitur, & fit proinde cum commodo animalium: symptomaticum verò sistere oportet, quod fit à natura irritata, & cum incommodo.

Secundò auertentibus.] Symptoma hoc, quod in excretis toto Symptogenere præter naturam consistit, cum urgeat, ad se trahit curam curatione: quod præstabimus, à naribus auertentes sanguinē: primò sāratur. guinis missione, qua ex cephalica, basilica, aut si magis volumus reuellere, ex vena pedis fieri potest: cū enim nullus sit affectus particularis euacuationē postulans, non seruamus rectitudinē, sed loci distantiam. Inde colliges, non rectē auctore in solo sanguinis profluvio, quod sit ex retentis mensibus, aut hamorrhoidibus, secare venā auctoris. pedis. Neque hoc etiā in loco animaduersionis Hollierij, & Rondeletij Animadlocum habet, qua præcipiunt in profluvio sanguinis in vena exiguā sectionē faciendā esse, tunc enim tenuiori sanguinis portione Rondo- euacuata exigua fieret reuulsio, qua in sectione magna cōmodè letij & præstabitur tota massa euacuata: nunquā enim fiet optima reuulsio Hollierij sine sanguinis motu. Sanguine misso cucurbitulis utemur affixis non ad- hypochondrio, quod rectitudinē seruet cū nare, à qua fluit sanguis, mitti- ita ut si ex nare dextra fluat, supra iecur, si ex sinistra supra lie- tur. nem apponantur. Causam huius rei intelligemus ex duplici recti- Cucur- tudine: una enim est natura, seu loci, quam partes dextra cū dex- bitula tris, & sinistra cū sinistris admittunt, qua natura dicitur, quia supra eā semper cū comodo animalis videmus naturā seruare, ita ut si hypocon- affecta sit pars dextra per dextrā, & si sinistra, per sinistrā rē mo- drium, lestā euacuet. Aliqua rectitudo vasorū, est, qua nō ex parte eo modo & cur, quo diximus, sed ex vena, qua cum loco affecto se aperit, desumitur: qua ratione utramque basilicā cum iecore rectitudinē habere dici- mus. Ex his facile causā habebis, ob quā in profluvio sanguinis per nares, hypochondrio supradictō cucurbitula applicāda sit, causa enim est duplex, rectitudo, qua tunc seruatur. Avertit etiam auctor san- Aduerte guinem frigida aqua inspersa in faciem agri incogitantis, tu etiā de medi- agrote sciente poteris uti hoc remedio, quia aqua sua frigide camen- operatur, & non propter animi pathema. tis toto

Tertiò sistentibus.] Qua de medicamentis toto tēperamento tēpera- sanguinem sistentibus scribit, non laudo, quia morbus, ex quo pro- mento fluit sanguis, ratione cognoscitur, & proinde curabitur remediis cientibus ratione etiam inuestigatis. Si obiicias Gal. qui l. 9. simpl. c. 8. scribit sangui- lapidē reperiri contactu solo sanguinē cohibentē: respondeo illū lapi- nem. dē sistere solū illud sanguinis profluvium, quod à causa nobis oc- culta excitatū fuit, quale est illud, quod hamorrhoids serpens inducit.

DE CVRAND. MORB.

*Hisflo-
ria.
Aduer-
te.*

maculas eruit, faciémque formosam efficit. Idem præstat aqua ex floribus fabarum, stercus columborum cum acetosi, in forma vnguenti factum fuerit, faciem emaculat, quo nobilis quædam scœmina septem diebus, curata fuit. Hæc aqua est optima, & fermè diuina ad maculas faciei: imò etiam ad vestigia exanthematum & papularum remouenda. ℞. florum fabarum ꝑ. iij. stercoreis columborum ℥. j. aceti ℥. iij. aquæ vitæ ℥. iij. sanguinis leporis ad pondus omnium, misce, ex his fiat aqua instrumento vitreo, & igne paruo. Hæc aqua similiter omnes maculas faciei tergit, etiam illas, quæ dicuntur panis, & barro vulgo. ℞. florum fabarum ℔. ℥. terebinthinæ optimæ decies lotæ ℥. j. aloës ℥. j. lactis caprarum ℔. j. misce, & fiat aqua igne paruo, & instrumento vitreo: adde in fine extra ignem chrysocolliæ ℥. ij. camphoræ ℥. j. sed postea sæpe moue vas.

Ad tergendos tumores paruos faciei, qui dicuntur Latinis vari, nobis barros, manè & vesperè laua faciem mixtura ex albumine oui, & aqua rosarum benè mixtis, & post ad cutem defendendam vngue eam adipe hœdi parato more Valentino.

Habet similem facultatem hæc aqua. ℞. centupedes, animalcula sunt, quæ dicuntur porcelletes à Valentinis nu. 12. sacchari candi ℥. ij. succi limonum ℔. j. ex his fiat aqua, quæ est optima in hoc. Hæc aqua similiter multam efficientiam habet, & experta est quemadmodum & aliæ. ℞. cucurbitulam vnā absque cortice diuisam in partes minimas, xij. oua sine vitellis, & cum corticibus, boracis, sacchari candi an. ℥. j. lactis capræ ℔. ℥. terebinthinæ abietis decies lotæ. ℥. ij. ex his fiat aqua instrumento vitreo, & igne paruo. Inter aliâ maximè laudata medicamenta hanc aquam probabis in hac re. Oleum myrrhæ est optimum & expertum ad omnes faciei maculas abstergendas, sit hoc modo: Accipe myrrham in puluerem redactam positam in vase terreo, & sæpe iuxta ignem moue illud vas, & à myrrha egredietur oleum compressa panno lineo, quemadmodum fit oleum amygdalarum, aut sesaminum. Hæc aqua faciém candidissimam, & pulcherrimam efficit sine detrimento vlllo, & ea sæpe nobiles scœminæ Valentinæ suas abluunt facies. ℞. sublimati pellucidi puluerizati ℥. ℥. aquæ fluuiatilis ℔. iij. in vase vitreo, & diu violento motu misce, & postea addè tria albumina ouorum benè prius agitata, ita vt ab eis spuma separetur, & deinde omnia sæpe moue, sicque post tres dies hæc aqua vtare.

De dolore dentium, & de ipsis denigratis, & mobilibus. CAP. XXIII.

De

Dentium dolores partim à causis externis excitantur, par- *Causa.*
 tum ab internis. Externæ causæ sunt casus, percussio, &
 vsus rerum immoderatè calidarum, vel frigidarum. Res etiam
 duras & contumaces vel mandillæ, vel dentibus diuissæ, & in
 vniuersum, id omne, quod eos, aut alterare potest, aut com-
 mouere. Internæ autem causæ erunt intemperies aliqua, vel nu-
 da, vel cum humore, aut frigido, aut calido: abscessus porro
 existens vel in ipsismet dentibus, vel in neruo, qui illorum ra-
 dici inferitur: vel in gingiuis, propter quas etiam contingit
 dentes dolere. Sæpe ab stomacho malum ascendit propter su-
 blatos vapores: frequentissimè tamen prouenit propter hu-
 morum defluxum (quem rheuma appellant.) Imbibitus enim
 ille humor calidus nonnunquam, nonnunquam frigidus, sæpe
 etiam salus, vel in gingiuis, vel in neruo, vel in ipsis dentibus
 dolores, & vehementes parit. Signa causarum externarum ex *Nota.*
 sermonibus ægri sunt petenda. Internarum verò hæc sunt, si
 intemperies fuerit nuda, quæ in capite fit, & per consensum
 dentes afficiant, non est dolor aggrauans, quemadmodum esse
 solet, vbi humor quoque infestat. Quod si fuerit calida in-
 temperies, acutior est dolor, quàm si frigida. Si abscessus fue-
 rit, in dente ipso dolor sentitur, quo etiam auulso sedatur do-
 lor. Si in neruo, in intimis partibus dolor discruciat. Si in gin-
 giuis, circa ipsas erit, & præter id, tumor quoque in ipsis cer-
 nitur. Si fuerit fluxus humoris à capite per frontem, & tempo-
 ra sentiente ægroto, in mandibulas, & dentes humor descendit,
 qui si sanguis fuerit pulsatio quædam adest, tumor ac calor. Si
 bilis, acutus est dolor, ac pungens, ac vix tolerabilis. Si pituita,
 dolor est remissus, & candicant in ore partes omnes, & multa
 insuper est saluæ copia. Si melancholia, liuent & gingiuæ, &
 dentes: nec dolor tantum infestat, & aliquando duræ apparent
 gingiuæ. Porro si à ventriculo dolor hic nascatur, quod fieri
 posse diximus, prius in ipso & dolor, & quædam conturbatio
 sentiuntur.

Dentium dolor, si sit à sola intemperie profectus, alteranti- *Curatio.*
 bus contrariis absque euacuatione curatur, de quibus dicemus
 vbi de curatione doloris, qui fit à materia post illius euacua-
 tionem agendum erit. Cùm est à sanguine, curatur. Primò vi- *Victus.*
 ctu refrigerante, & abstinentia vini, carnum, & ouorum, &
 omnium quæ nocent dentibus in omni ferè causa, vt potus
 actu frigidus, præsertim à cibo, vel potu actu calido, lac, da-
 ctyli, & ventriculi cruditas.

Secundò, sanguinis missione per sectionem mediæ venæ *Remed.*
 eiusdem partis, si sit plenitudo in toto corpore, & dolor in *sio.*

DE CVRAND. MORB.

altera parte dentium: si verò in omnibus, scindatur media dextra: cum verò non est plenitudo, humeralis est secanda ita ut sanguinis copia respondeat ex æquo naturæ ægroti, & morbi.

Præparatio.

Tertiò, parantibus bilem, ut syrupo rosarum, endiviæ S. granatorum, & similibus cum aquis, aut decocto cichoreæ, endiviæ, lactucæ & portulacæ.

Purgatio.

Quartò, purgantibus bilem per medicamenta cholagoga, ut sunt rhabarbarum, myrobalani citræ, cassiæ fistullæ, electuarius diaprunis solutivi, & de succo rosarum, pilulæ de rhabarbaro, & similia, quorum formulæ notæ sunt ex dictis præcipuè c. i.

Quintò refrigerantibus moderatè, quia frigidum omne inimicum est ossibus, ex Hippocr. v. aph. ut decocto hordei, lacte humano, aut ovino, aut caprino parum calidis, aut lacte amygdalarum dulcium, aut aqua rosarum, aut mirtyllorum, & similibus.

Alteratio.

Si sit à bile dolor dentium, similis est fermè facienda medicina ei, quæ cephalalgia biliosa adhibebatur. Si verò à pituita, curatio fermè talis erit, qualis pituitosæ cephalalgia, non secus fiet, si sit ab atra bile.

Si verò dolor dentium fuerit ab inflammatione gingivarum curatur ut phrenitis, aut angina.

A calore.

Cùm est dolor dentium à distillatione humoris à capite, observa quæ dicenda sunt cap. xxv. quia hæc curatio similis est illi: in omni tamen quæ fit à causa calida per distillationem post vacationem, & corroborationem partis primò affectæ, à qua fuit humor, est optimum hoc auxilium: ℞. balaustriarum, rosarum, mirtyllorum, sanguinis draconis, mastichis, sandaracæ Arabum, hypocistidos, spodij an. ʒ. iij. fiat decoctum in lib. ij. aquæ ad dimidium, de quo percolato accipe ʒ. ix. cui adde syrupi rosarum ʒ. iij. rhodomellis & oxysaccharæ S. an. ʒ. j. misce, & fiat mixtura, qua sæpè abluantur os, & dentes.

A vermibus.

Quando dolor est à vermibus, curatur rebus amaris, & acris quæ habent facultatem interficiendi ipsos, qualia sunt absinthium, myrrha, aloë, lupini, colocynthis, & tithymalus.

Vermes necantia.

Ex his fiat decoctum, quo lava sæpè os. Suffitus ex semine porri, & iusquiami ipsos enecat, & etiam sensum omnem eripiendo dolorem curat: hoc tamen & alia narcotica (ut philonium) non sunt admouenda, nisi in maximis doloribus, & cum alia non iuuerint. Si dolor fiat à corruptione dentium, ipsorum extractio est necessaria, & sufficiens cura, quæ ab experto viro fiet instrumentis ad hoc necessariis, & sine magno dolore. Aliqui eos medicamentis euellunt, sed cum maiori dolore, quam

quamuis tithymali lac cum farina mixtum dentes (vt quorundam est opinio) sine dolore extrahit. Quando dolor dentium est ab vlceribus prauis & corrodentibus, cōsule chirurgum doctum, & interim vttere hoc liquore sæpè: ℞. aquarum plantaginis, & foliorum oleastri an. ℥. iiij. syr. acetosi S. ℥. j. rhodomellis ℥. j. aceti scillitici ℥. β. pulueris aluminis vsti ℥. ij. misce. Vlcerata tamen oris parua, & superficiem carnis tantum occupantia (quibus pueri & infantes laborant, dicuntur à Græcis aphitæ, & ab Arabibus alcola) curantur hoc auxilio: ℞. aquæ plantaginis ℥. iiij. aquarum lactucæ, & portulacæ an. ℥. j. β. rhodomellis, & syr. rosarum an. ℥. ij. syr. acetosi S. ℥. j. misce.

Vnum hoc est maximè animaduertendum, exuuias, seu senectam serpentis omnem dentium dolorem curare à tota substantia, siue per suffitum, siue alio modo. Quare in dolore dentium infantium, cum oriuntur, solent multi fieri tunc morbi, autore Hippocrat. 3. Aphorism. videlicet febris, ventris profluvium, & conuulsio: hæc enim curantur aut prohibentur fieri, si gingiua theriaca magna perfricetur, aut lacte canis, aut puluere cerebri leporis. Suffitus spoliij serpentis est in hoc optimus & lotio facta illius decocto: hæc enim facilem efficiunt exitum dentium, & sine magno dolore. Si dentes liueant, aut nigrescant, corpore euacuato sæpè perfricentur hoc puluere: ℞. salis ℥. j. pulueris ossis sapiæ & punicis an. ℥. β. misce, & fiat puluis, adde pulueris aluminis ℥. ij. Aqua vitæ dentes candidos reddit si sæpè ea os abluatur, excreuerunt pituitosa purgat, & gingiuas corroborat. Rhodomel etiam tergit dentes, & decoctum lupinorum, myrrhæ & mastichis cum melle ad modum mulsæ est optimum. Puluis hic est optimum dentifricium ad mobiles dentes fulciendos, gingiuarum carnem augendam: ℞. mastichis, sanguinis draconis, thuris, sandaracæ Arabum, ossium omnium myrobalanorum, nucum cupressi an. ℥. iiij. santalorum omnium, succi liquiritiæ an. ℥. ij. feminis portulacæ, rosarum, coralli rubri præparati an. ℥. j. β. foliorum myrti, baccharum myrti, psidii an. ℥. j. spodij, cinnamomi, caryophyllorum, nucis muscatæ an. ℥. β. boli Armenici aqua rosarum abluti, amydi, gummi Arabici, dragaganti an. ℥. j. grani tinctorum ℥. v. lapidis hæmatitis ℥. β. misce, & fiat puluis, quo sæpè fricentur dentes. Vinum album decoctionis rerum astringentium, qualia sunt superius dicta, & similia, est præstantissimum dentifricium.

*Dolores
dentium
sedan-
tia.*

*Cura in
motu de-
tium.*

*Quando
liuent
& mouen-
tur.*

*Denti-
fricium.*

DEntium dolores.] Dolor dentium symptoma est, quod sequitur solutam vitiatem: hac aut est occulta, aut manifesta: occulta ab intemperie calida, aut frigida; siue sit nuda, siue cum affluxu humoris, manifesta vero à rebus vlcus generantibus, ortum habet. Curabimus ergo hunc dolorem, si urgeat narcoticis medicamentis, si non urgeat, iis quæ causa contraria sunt, omittentes ea medicamenta, quæ ab auctore, & aliis toto temperamento hunc dolorem curantia describuntur, non enim extant.

De Angina. CAP. XXIV.

Descri-
ptio.

Genera.

Synanche, vel cynanche (quam Latini Anginam vocant) auctore Gal. 4. de locis affectis, nil aliud est, quam spirandi difficultas, nullo existente vitio, neque in pectore, neque in pulmone: unde omnes affectus, qui gutturi accidunt, quos spirandi difficultas comitatur, Hippocrates, atque alij veteres anginæ nomine appellabant, ut ex 3. Prognosticorum est colligere. Definitur etiam angina à Galeno 4. de ratione vitus in morbis acutis, partium, quæ in gutture sunt, phlegmone. Cuius quatuor traduntur genera ab eodem 4. de locis affectis cap. 5. his verbis; Atque hæc sunt quatuor earum genera, primum vbi fauces inflammantur, fauces voco internum oris locum, ad quem simul conueniunt & gulæ, & gutturis partes extremæ. Alterum, cum neque reliquit oris partes, neque etiam externarum partium vlla inflammata videtur: laborans tamen suffocationis periculum in gutture sentit. Tertium, vbi extrinsecus circa fauces inflammatio apparet. Quartum, vbi gutturis partes tum externæ, tum internæ similiter affectæ sunt: hæc tenus Galen. Quem locum si paulò inferius legas, quintum etiam genus videbis positum ex vertebrarum ceruicis luxatione. Recentiores medici inter quos Aëtius & Paulus nominantur, sic de Anginæ differentiis disputant, ut multum interesse putent inter synanchen, & parasyanchen, & cynanchen, & paracynanchen: sic enim de illis sentit Paulus lib. 3. Inflammatis faucium interioribus musculis ea oris affectio fit quæ Græcis synanche dicitur: exterioribus verò phlegmone infestatis, parasyanche. Pari quoque modo & in gutture, cuius inflammantis interioribus quidem musculis, cynanche, exterioribus verò, paracynanche nascitur. Quæ

sanè nominum curiosa distinctio, tametsi aliàs non videatur esse improbanda, vt 4. aphor. commentò 34. apertè tamen à Galeno damnatur. 3. Prognost. comm. 18. & 4. de locis affect. cap. 5. quippe (vt eo loco dicit Galenus) tunc primùm homines res ipsas neglexerunt, cùm nimio studio nomina quærere inciperent. Oritur hic morbus propter nimiam sanguinis aut copiam, aut efferuescentiam, qui in partes iam dictas impetu ruit, & oborta inflammatione respirandi angustiam parit. Omnibus ferè, vt ait Paulus, eadem euenta sunt: verbi gratia non nisi recta ceruice, & difficulter spirant, dolor adest, & aliquando febris, ruborque semper tum vultus, tum colli, arque tumor quoque. Quibusdam os perpetuò hiat diductumque est, & deglutire omninò sic affecti non possunt, atque dolore afficiuntur, idque præcipuè, cum potus eis per nares effluit.

*Causa.**Nota.*

Angina, quia morbus acutissimus est statim initio antequam absoluta fiat, sex generibus remediorum curatur. Primò, victu tenui & refrigerante prohibente phlegmonem augeri: vt aëre frigido, & inedia vnius vel duorum dierum, si vires poterunt ferre, vel saltem sola prisana hordei, vel amylo lacte amygdalarum parato, aut lacte amygdalarum, aut iulep rosarum, aut succo malorum granatorum, aut cichorea cocta, aut cucurbita saccharo condita, aut tydoneis tostis, aut pyris: liquida tamen faciliùs deglutiuntur. Potus sit aqua hordei: vini enim, ouorum & carnum abstinencia est summè necessaria: quia hæc sanguinem augent, & calefaciunt.

*Curatio
Vitus.*

Secundò, auertentibus imperum sanguinis fluentis ad partem affectam, & prohibentibus augmentum inflammationis: vt sanguinis missione usque ad animi deliquium, si vires ferunt: eam tamen partiri est tutius. Secatur cephalica statim propter necessitatem subitam euacuationis, etiam magister meus Falco doctor Monspeffulanus, vir magnæ doctrinæ, & experientiæ id faciebat: & hæc aliquando bis, & ter est secanda, dum fluit humor. Si vires, & ætas non ferunt sanguinis missionem per sectionem venæ, auersio fiet per cucurbitulas cum scarificatione inter scapulas: cùm verò sistit fluxio, vena sub lingua scinditur. Auertunt etiam purgationes per clementia medicamenta factæ, cum sanguis est deprauatus qualitate aliqua, aut in alios humores est conuersus vt hoc medicamento, aut simili: ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ, & medullæ ramarindorum an. ʒ. ss. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia. ʒ. iiij. syr violarum ʒ. j. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus. Auertimus

*Reuul-
sio.**Cucur-
bitula.**Deriva-
tio.**Purga-
tio.**Auersio*

DE CVRAND. MORB.

tinus quoque clysteribus clementioribus, cum est inflammatio sanguine, aut bile: si verò fuerit à pituita, valentioribus. Reucllunt etiam cucurbitulae scapulis affixae. Frictiones & ligaturae partium extremarum quoque auertunt, & foci earundem ex aqua calida.

*Repellē-
tia sum-
pta &
admotā.*

Tertiò, repellentibus materiam & prohibentibus cynanchen augeri, qualia sunt frigida, & astringentia leuiter gargarizata, relicta, donec incalescant in vltimis faucibus: hæc enim partem affectam roborando, & vias per quas materia fluit contrahendo optimè inflammationibus huius incrementum prohibent. Quorum aliqua sunt simplicia, & alia composita, vt aqua, & succi rosarum, plantaginis, & portulacæ, lactucæ, acetosæ, solani, granatorum, nucum viridium, mororum, & acetum. Ex his & similibus fieri possunt multa composita medicamenta: vt ℞. hordei decorticati, & lentium an. p. j. plantaginis, lactucæ, & solani an. m. j. fiat decoctum, de quo accipe lib. j. dianucum, & diamoron an. ʒ. ij. oxysaccharæ rosarum an. ʒ. j. ss. misce, & fiat gargarisina hoc, & simile.

*Indica-
tio à tē-
poribus
morbi
sumēda.*

Absolutè repellentibus vti oportet initio, vbi verò habenda ratio etiam est materiæ, quæ fluxit simul, & fluentis, miscenda sunt medicamenta dissipantia, & resoluenda, cum repellentibus, eorum tamen vis æqualis, aut inæqualis respondere debet proportioni materiæ delapsæ, & fluentis: vbi tamen intentio repellendi excedit dissipandi necessitatem duplo, fiat hic, aut similis gargarismus: ℞. hordei decorticati p. j. lactucæ, & plantaginis an. m. ij. liquiritiæ rasæ ʒ. ss. ficus numero x: camomillæ, p. ss. fiat decoctum, de quo colo transfuso accipe ʒ. x. diamoron, & dianucum an. ʒ. ij. rhodomellis ʒ. ij. ss. syrup. de liquiritia, & oxysacchara S. an. ʒ. j. misce, & fiat gargarismus.

*Præpa-
ratio.*

Quartò, apparantibus pituitam, aut materiam mixtam, vt melle rosato colato, oxymelle S. syr. de liquiritia, & de hyssopo cum decocto, aut aqua liquiritiæ, absinthij, & similium,

*Purga-
tio.*

Quintò, vacuantibus materiam hanc per medicamenta mixta, vt est diaphænicon, pilulæ aggregatiuæ, & similia, aut hoc potu: ℞. diacatholicon. ʒ. ss. agarici trochiscati ʒ. j. diaphænicon. ʒ. iij. rhodomellis ʒ. j. aquæ buglossæ, quod satis est, misce, & fiat potus.

*Resolū-
tia.*

*Exter-
na.*

Sextò, dissipantibus & resoluentibus materiam externis, & internis: vt oleo camomillæ, amygdalarum dulcium, sesamino, de semine lini de lilio, laurino, rutæ, & similibus. Hoc medicamentum, seu cataplasma collo admotum potentissimè, & optimè resoluit: ℞. farinæ fœnugræci, seminis lini, &

& camomillæ an. p. j. pulueris vnius nidi hirundinum: omnia simul cum sapa decoquantur, & in fine adde olei de lilio, & anethi an. ʒ. j. ʒ. croci puluerizati ʒ. j. misce, & fiat cataplasma. Filum laneum purpura tinctum, & quo postea vipera est strangulata, collo appensum curat anginam. Cataplasma ex farina hordei, & de succo apij potenter dissipat, & resoluit materiam anginæ: expertum à multis, & à me est. Hic gargarismus dissipat, & resoluit materiam satis: ʒ. camomillæ. p. j. dactylorum, vuarum passarum ana. p. j. ʒ. fœnugræci. p. j. ʒ. ficus. x. numero, fiat decoctum, de quo colo transfuso accipe ʒ. viij. diamorum ex maturis moris, & sapæ an. ʒ. j. rhodomellis, & oxymellis comp. an. ʒ. j. ʒ. misce, & fiat gargarismus. Stercus canis album cribratum cum melle mixtum instar lochi, si deglutitur, est præstantissimum remedium ad resoluendum. Eandem, aut similem habet vim puluis hirundinum vstarum solum, aut cum melle. Hæc, & similia in vigore, aut declinatione tantum conferunt. Si verò angina nequeat resolui, quæ curandi ratio aptior est, sed in suppurationem tendit, quod febris & doloris intensio demonstrant, suppurantibus curatur, ut gargarismo, & emplastro ex rebus, quæ pus gignunt: qualia sunt fœnugræcum, semen lini, malua, radix althææ, radix lilij, olea- ginea & pingua. Facto pure abscessus rumpatur instrumento ferreo, si videri possit, aut manso deglutino pane duriori, vel digito altius immisso, aut candela: caput tamen inclinetur, ne pus descendat in thoracem. Deinde vlcus est abstergendum rhodomelle, & decocto hordei, & similibus: postremò verò est glutinandum mastiche, thurè, bolo armeno, sanguine draconis, & similibus.

Internæ.

A tem-
pore.

Curatio

angina

suppu-

randa.

Ruptio

absces-

sus.

Scholium.

Synanche. vel Cynanche.] De nomine, differentiis, & causis Angina Angina, lege auctorem: aduerte tamen Anginam esse morbum morbus acutam, ex quo imminet periculum, non ob partis, quæ leditur, præstantiam, sed ob situm, quia huius partis tumor statim respirationem ledit. Dices, cur in angina maiorem dolorem sentimus deglutientes res liquidas, & pauca, quàm solidas, & maiores? Respondet, id prouenit ex maiori musculorum contractione.

Secundò, auctentibus.] In Angina qua est tumor præternaturalis à quocunque humore procedens duplex est morbus: unus intempéries, & alter tumoris magnitudo deglutione, & aëris ingressu impediens. Curabitur ea ratione, qua alij tumores in principio sanguinis missione, ut ruellamus, & excephalica, ut simul euacuemus ex parte affecta.

DE CVRAND. MORB.

affecta. Neque hoc in loco rectè præcipit Vega, in Angina ex suppressis mensibus secandam esse venam malleoli: cum enim Angina sit affectus urgens, ab ea incipienda est curatio, & deinde ventriculum est ad menses mouendos, adde reuulsionem non esse faciendam ex loco, à quo fluit humor, sed à loco, ad quem fluit. Quæ dicit auctor de purgatione, an vera sint, inferiùs videbis.

Repellentia.

In Angina usus extergentium.

Tertiò, repellentibus.] Humor extra venas effusus, faciens tumorem præter naturam in faucibus, statim in principio, cum adhuc seruet suam naturam, euacuandus est, non calidis, quia hæc magis attrahunt, sed aliis remediis, quorum vnum fuit sanguinis missio, qua euacuans venas partis, causam dedit, ut humores iterum remigrarent ad venas. Alium verò est frigidum, & adstringens, interius gargarizatum, quod humores ad venas repellit. Aduerte tamen neque ad morbi declinationem semper esse miscendum extergens aliquod, sicut in omnibus inflammationibus, quæ reguntur cute tenui, per quam semper aliquid resudat. In principio ergo uteris decocto hordei cum cortice, & aceto, & similibus. In augmenti principio, cum extergentibus, & adstringentibus pauca digerentia miscebis, decoquens cum hordeo paucum glycirizæ, addito deinde aceto, aut diamorone. In incrementi secunda parte, quæ primam partem flatus comprehendit, extergentia cum æquali quantitate digerentium, & adstringentium permiscenda sunt. Decoquemus ergo croci & myrrhæ an. ʒ. j. in lb. j. aqua ad medietatis consumptionem, ei addentes diamoronis ʒ. vj. In declinatione verò solis utere digerentibus, decocto glycirizæ, aut hyssopi, & similibus. Semper tamen aduerte, repellentia maiora, aut minora esse permiscenda pro affectu maiori aut minori.

Purgatio.

Quæ applicanda parti externe.

Medicamentum ex nido hirundinum.

Quartò, apparantibus.] In Angina non est, quod utamur medicamento purganti, eius enim nulla est occasio, nisi sit cacochimia, ex qua fluat humor ad partem affectam.

Sextò, dissipantibus & resoluentibus.] Parti externe in collo non sunt applicanda repellentia sola, neque cum calidis mixta, ne humor ad interiora recurrens affectum augeat, & idèò medicamentum ex nido hirundinum compositum omittatur, quia etsi in eo sit stercus digerens, est tamen terra repellens: neque tempus conteras in mentum medicamenti collo appensis, quæ tota substantia operari creduntur, ex nido non enim reperiuntur ob causam multoties repetitam: uteris ergo hirundi- externis calidis, quæ vim habent leuiter digerendi, & attrahendi, nū reii- oleo comarini, aut camomelino, & lana succida. Atque hæc est curatio Anginæ, quæ resolutione terminatur: est enim altera illius, quæ coctione finitur suppurato humore, de qua legè auctorem.

De coriza, catarrho, raucedine, & tussi.

C A P.

CAPVT XXV.

COrizæ, catarrhi, raucedinis, ac tussis eadem propè est natura: omnes enim hæ affectiones fiunt ab humore excrementoso à capite in subiectas partes descendente: qui quidem humor, si in nares fuerit distillatus, atque eas aggrauet, coriza Græcis malum dicitur, Latinis grauedo. Si verò humor fluat in os, palatum, & fauces, catarrhus simpliciter appellatur: quæ sanè vox Latinis distillationem sonat. Si verò idem humor descendens, in fauces, & guttur, & asperam arteriam cadat, & interiorē eius membranā asperiorē, atque inæqualem reddat, raucam tunc vocem fieri necesse est, & morbus nascitur branchus Græcorum idiomate, dictus, raucedo verò Latine. Ex his etiam colligere possumus, raucedinem esse catarrhum, non tamen grauedinem, quod Galenus 3. de symptomatum causis cap. 11. & 2. Prognosticorum commentario 49. docet. Idem Paulus confirmat 2. lib. cap. 28. & Aëtius serm. 8. cap. 5;. Quare decipitur doctissimus Brassauolus, credens catarrhum esse vocabulum commune ad omnes defluxus humorum, quod barbari medici rheumati tribuunt, iuxta illud.

Descriptio.

Divisio.
Grauedo
ad nares.

Catarrhus
ad fauces

Raucedo
ad asperam arteriam.

Brassauolus.

Si fluit ad pectus, dicetur rheuma catarrhus.

Ad fauces branchus, ad nares dico corizam.

Porro eius humoris, qui sic à capite descendit, causa est cerebrum, seu quòd à frigore in frigidam intemperiem deductum sit, seu quòd ab æstu calefiat, atque repleatur. Vinum quoque, si ultra modum haustum sit, caput replet, & balnea calidiora, & largior perfusio capitis ex aqua calida, maxime si aliàs calidius caput existat, & cibus sanè, qui in ventre incoctus per inferiorem partem non excernitur, in caput impetum facit: quod sic repletum in partes se inferiores comodo, quo dictum est, demittit excrementa. Atque hæ sunt generales harum affectionum causæ, particulares verò multæ sunt. Et coriza sanè non ob aliam causam videtur fieri, quàm ob humoris descensum: raucedo verò non ob hanc solam causam, sed à vehementioris quandoque, atque altioris vociferationis conatu, & è gelidi aëris, spiritusve ingressu. Tussis autem multæ sunt causæ, quas Paulus Ægineta lib. 3. sic colligit. Ceterum ex aliis quoque occasionibus tussis fit, sæpius quidem ex distemperantia, quandoque calidiori, cœu in febribus, nonnunquam frigidiori, quemadmodum in tempestatibus Aquilonis, quæ aridior est plerumque. Quin & tussis aliorum sæpenuerò morborum symptoma est, morbi scilicet

DE CVRAND. MORB.

scilicet lateralis, peripneumoniæ, inflammationis iecinoris, phtisis, & aliorum similium.

Nota.

Notæ hæ sunt, quicunque aliqua ex dictis affectionibus laborant, si à calore ea nascatur, hi circum partes affectas caloris nonnihil sentiunt, fluxio quædam acrium humorum, ac tenuium cum per nares, tum maxime per os defluit. Rubor partes faciei namque inficit. Quibus contra ex frigore, partium circa caput, & frontem fit distentio, meatuumque, quia à percolandi adminiculo isthmoides vocantur, obturatio, ita ut resonare vox deorsum per nares nequeat.

Longiore illis tempore permanent, & accidunt tusses, pituitæque excretiones, nunc quidem crudæ, nunc verò liquidæ, interdum virides. Nonnullis febris oboritur nihil eos iuvans, qui ab æstu inuaduntur: eos autem, qui ab algore, plurimum, cum ad concoctionem promoueat.

Quando tussis aliorum morborum symptoma est, ex aliis capitibus notæ sunt petendæ: omnis tamen distillatio, siue ad nares, siue ad os & eius partes, est à materia calida, aut frigida, aut mixta ex iis, & vtrique cum causa effectrice simili, aut dissimili, ut cum materia est calida, à frigore comprimente distillans, aut frigida materia à calore liquante. Cum ambæ causæ sunt similes, eadem remedia requirunt: si verò causæ sint contrariæ, remedia postulant contraria: sed maior habenda est ratio urgentioris causæ, altera tamen non neglecta.

*Curatio
distilla-
tionis à
causa
frigida.
Prepa-
ratio.
Consi-
lium.*

Distillatio à capite ad nares, aut os à materia frigida, quæ sæpius fit, & aëre frigido facta, sex remediorum generibus curatur: Primò victu calfacientie moderatæ: ea tamen, quæ caput offendunt, nocent, ut vinum, sinapis, allia, cæpe, coitus, & somnus diurnus, præsertim à cibo, & similia.

Secundò, materiam frigidam apparantibus, ut rhodomelle, syr. de liquiritia, syr. capillorum veneris, de hyssopo, & ozymelle S. cum aquis, aut decocti liquiritiæ, hyssopi, passularum, fœniculi, & similium: oportet tamen miscere quæ motum, & fluxum humoris impediunt, ut est syrupus rosarum, & decoctum coriandri: quamvis in materia calida frictionibus uti oportet, ut est syrupus de papauere.

*Purga-
tio.*

Tertiò, purgantibus materiam pituitosam, ut agarico, turbit, pilulis de agarico, diaphænicon, electuario indo mai. pilulis cochiis, & similibus. Sed quia morbus hic aliquando est diuturnus, multis egens vacationibus, post primam his pilulis uti poterit: ℞. Agarici trochiscati 3: j. pilularum assaiaret & cochiarium an. 3. ss. optimi diagridij. ḡ. xij. cum aqua stachados, fiant pilulæ quindecim. Utatur his. Dosis erunt

tices

tres quaque hebdomada.

Quartò, auertentibus; vt ligaturis, frictionibus extremorum, & fotibus, cucurbitulis in naribus, & scapulis, & clysteribus acribus, vacuatione per loca propinqua, videlicet per nares, si humor ad partes oris fluat, errhinis & sternutamentis clementioribus; de quibus capite de apoplexia. Si verò ad nares distillat humor per palatum, & os, facienda est vacuatio reuulsoria, vt mastiche, aqua mellis cum puluere hyssopi, & aliis clementioribus apophlegmatissimis. In diuturna & assueta distillatione, præcipuè à materia calida, filum ceruici traieci-
tum est optimum remedium ad auertendum: de quo auxilio cap. 16. & 17, dictum est. Multi vtuntur, & benè, ad reuellendum, cauterio in sutura coronali, aut post aures; per vlcus enim à cauterio factum materia diu, & salubriter euacuatur.

Quintò, sistentibus fluxum, vt mastiche de glutina, & thure, spica, gummi iuniperi succo, liquiritiæ, & similibus: hoc tamen genus auxiliorum magis confert distillationi, quæ fit à materia calida mobili: hæc enim indiget incrassatione, vt bolo armeno, saccharo rosato, syrupo rosarum, syr. de papauere, & aliis etiam narcoticis, vt trochiscis de spodido, de carabe, & de terra sigillata, ne fiat vlcus in naribus, aut in partibus oris, & aspera arteria, & tandem in thorace. Vltimò vtendum est pilulis de cynoglossa Mes. cum alia non sufficiunt, & distillatio est maxima.

Sextò, corroborantibus caput, quæ est pars primò affecta, & à qua materia descendit, vt puluere ex coriandro, caryophyllis, mastiche, & similibus: aut hoc sacculo: ℞. coriandri preparati ʒ. iij. rosarum, mastichis, thuris, caryophyllorum anihos, stachados, & macis, an. ʒ. j. fiat ex his saccus ad magnitudinem manus, qui capite raso coronali commissuræ admoueatur. Capitis lotio ex decocto rerum capitalium laudatur in hoc genere. Diamuscis dulcis, theriaca magna, mithridatum, electuarium aromaticum rosatum, & similia cum aqua, decocto, aut syrupo capitali valenter corroborant caput, & dissipant materiam eius.

Distillatio, quæ fit à materia, & causa omninò calida, sex etiam remediorum generibus curatur contrariis, vltimo tamen genere oportet aliquando curare vlcera narium, & oris, quæ solent succedere: in his tamen curandis consule dictum chirurgum.

Tussis, multas habet causas, vt diximus, aut fit à sola intemperie, aut ab vlcere, vt in tibia, aut à tumore ventris, vt in hydrope, aut à morbo laterali, aut inflammatione iecoris, aut à mate

Auerfio.

Deriuatio.

Sistentia fluxum.

Admonitio.

Corroboratio, & resolutio.

Externa & topica.

Interna.

A causa calida.

Tussis causa.

DE CVRAND. MORB.

à materia frigida , quæ à capite distillat, à qua sæpè fieri solet. Quare de curatione huius in præsentia agam. Huic sex remedium generibus mederi possumus: Primò, victu calefaciente, & exsiccante , de quo dictum initio huius capitis : sal , & acetum maximè nocent huic , quia mouent tullim , quamuis cum melle , aut saccharo sit vtile , & necessarium ad purgandum pectus , & attenuandam materiam crassam.

*Curatio
tussis à
causa
frigida.
Victus.*

*Prepara-
ratio.*

Secundò , apparantibus materiam ad fluendum paratam crassam attenuantibus , & lentam incenditibus & tergentibus , vt rhodomelle , oxymelite S. syr. capillorum veneris , de liquiritia , de hyssopo , de prassio ; & oxymelite compos. cum decocto pectorali , simul & capitali.

*Purga-
tio.*

*Pilule.
Confe-
ctio.*

Tertiò , vacuantibus materiam hanc frigidam , pilulis de agarico , cochiis , de benedicta, hiera composita, electuario indo maiori : sed quia hic affectus diuturnus aliquando est , & eget post primam euacuationem aliis , vsus harum pilularum est vtilis & necessarius : ℞. pilularum de hiera simplici, & cochiarum an. ʒ. ʒ. pilularum de Agarico ʒ. j. cum aliqua hyssopi fiant pilulæ duodecim. Tres pro dosi qualibet hebdomada. Si à pilulis alienus est , hoc medicamenro vacuatio facienda est. ℞. diacatholicon. ʒ. j. ʒ. diaphænicon, & electuarij indi maioris an. ʒ. ʒ. agarici trochiscati ʒ. ij. rhodomellis, quod satis misce , & fiat confectio. Dosis singulis hebdomadis à cochleario vno vsque ad duo.

Auersio.

Quartò, auertentibus omnibus dictis superiùs hoc capite, vbi de curatione distillationis ad nares , aut os agebamus quarto genere remedium.

*Eductio
materia.*

Loch.

Quintò , conceptam pulmonibus materiam facilem ad expuendum reddentibus , in quo pars præcipua curationis consistit , vt eclegmate , seu loch sano & experto , aut de pino, aut de pulmone vulpis , aut electuario Diairis : syrupis pectoralibus , aut hoc loch : ℞. loch sani & experti , loch de caulibus an. ʒ. j. pulueris Diairis ʒ. ʒ. sacchari candi , & penidiarum an. ʒ. j. succi liquiritiæ ʒ. ij. syr. de hyssopo quod satis est, misce , & fiat loch : adde ad corroborandum pulmones , pulueris pulmonis vulpis ʒ. ij. quo & aliis omnibus vtendum est sæpè , & omni hora paulatim deglutiendo , vt ab vna via in aliam medicamentum possit per poros penetrare. In hoc genere confert multum foris ad mouere emplastrum filij Zachariæ , & de meliloto an. æquales partes super alutam ad formam & magnitudinem thoracis , vel bis in die hoc vnguento illinere , ℞. olei sesamini, & amygdalarum dulcium, & de lilio an. ʒ. j. mucilaginis foenugraci ʒ. ʒ. croci puluerizati ʒ. j. ceræ. q. s.

Topica.

q. s. misce , & fiat vnguentum.

Sextò, materiam reliquam resoluentibus, & digerentibus, vt Resolu-
suffitu sulphuris, & trochiscorum & aliorum, de quibus cap. se- tio.
quenti de asthmate , & etiam omnibus auxiliis dictis sexto ge-
nere remediorum distillationis, de quo superius.

Scholium.

COrizæ catarrhi.] Catarrhos Græcis, fluxio est Latinis, cum à Catar-
capite ad subiecta membra excrementū descendit. Hæc fluxio, rhos.
vt auter est Galen. 3. de caus. symp. cap. 4. aliquando habet proprium
nomen, aliquando eo caret. Proprium habet nomen ea, quæ ad na- Nomina
res, os (quæ nomen generis seruat) fauces, gurgulionem, & ad oris eius.
glandulas fertur. Proprio caret nomine ea quæ sit ad ventriculum,
& asperam arteriam, quæ multorum malorum causa est: quia ex
ventriculi fluxione, vitata eius concoctione, crudi humores generā-
tur, ex quibus obstructions sine febre, & aliquando cum febre, apo-
plexia, & alij cerebri frigidi morbi oriri solent. Sicut ex ea distilla-
tione, quæ asperam occupat arteriam, aliquando asthma, cum excre-
mentum crassum est, & aliquando phthisis, si tenue & calidum sit. Noxa ex
Distillatio symptoma est in excretis. Morbus ad quem sequitur, aut distilla-
est similis aut instrumentarius. Similis intemperies calida, aut tione ad
culum,
frigida cerebri, diuerso tamen modo hæc distillationem generant: nã & aspe-
ram ar-
calida intemperies attrahendo, aut fundendo humorem eam effi-
cit. Frigida verò refrigerando cerebrum, & hac ratione multa coa-
ceruando excrementa, aut ipsum comprimendo, eo modo, quo nos ma-
nibus spongiam. Morbus instrumentarius est repletio venarum, & Distilla-
tio quis
ventriculorum cerebri, quæ solet etiam fieri à toto corpore: hæc ta-
men repletio, exigua cum sit, neque carum, neque apoplexiam, ne-
que epilepsiam efficere potest. Signa pete ex auctore. affectus
sit.

Tussis, etiam si in vniuersum fiat ab his, quæ intercipiunt respira-
tione, hæc tamen omnia ad quinque causas reducere possumus cum
Galeno. Prima est humor distillans à capite. Secunda humor colle-
ctus in aspera arteria, in pleuritide, & peripneumonia. Tertia com-
pressio septi transversæ. Quarta magna asperitas faucium. Quinta
intemperies frigida inæqualis partium respirationi seruientium.

Secundò, materiam frigidam apparantibus.] Hinc discas quam Tussis
male curant hi, qui temporas: hæc est doctrinam Auicennæ conse-
quuti sunt: auctor enim iam secundo preparat humorem ad pur-
gandum, non sollicitus de symptomate. Proinde eius curatione omis-
sa, hæc ratione curabis. Si distillatio, hæc est fluxio excrementi vr-
geat, quod continget, si ad ventriculum, asperam arteriam, aut par-
tem principem firmitur) tunc relicto morbo, ei proficiendum est: tione.

DE CVRAND. MORB.

primò sanguinē mittentes, secundo medicamentis per os assumptis, & capiti applicatis, fluxionem sedantes, & ea sedata morbo prospicientes, quæ omnia ea ratione, quæ dicemus, prestabis.

Sanguinis mis-
sio.

Quartò auertentibus.] In distillatione facta ab intemperie frigida cerebri non audent practici venam secare, opus autem est, ut audaces fiant, potissimū in remedio adeò utili. Mittendus ergo sanguis est, ut reuellamus humorem ad partem fluentem, & simul ex cerebro aliquid excrementi euacuemus: quod commodè prestabimus secta communi vena in brachio, quæ caput, & partes inferiores respicit. Auertes etiā modis ab auctore propositis: quod si diuturna sit distillatio, duo cauteria, vnum in singulo brachio utiliter experieris.

Sisten-
tia flu-
xum.

Quintò, sistentibus fluxum.] Siue humor à cerebro distillans à causa calida proueniat, siue à frigida, sistendus est statim si urgeat. Quod prestabimus ore tenentes medicamentum, quod incrasset humorem, & eum ineptum ad fluxionem reddat, quale est hoc.

Cerati
ex tha-
psia
dua for-
ma.

℞. mastichis ʒ. ij. picebri ʒ. j. cum mucilagine tragacanthi, fiāt trochisci ad magnitudinem lupini quorum vnum teneat in ore. Eo etiam tempore, quo ager dormire voluerit, assumat ʒ. iij. electuarij de papauere cum paucis syrupo papaucri. Capiti etiam, ut dolore attrahatur humor ad cutim, ceratum ex thapsia utilissimè apponetur, siue fiat in forma solida, siue in liquida. In formā solida paratur hoc modo. ℞. cera ʒ. viij. terebenthina q. s. misce ad ignem, donec ad emplastri substantiā perueniant, in fine misce pulueris radicis thapsie si recens sit ʒ. iij. si inueterata ʒ. iiij. cuius cerati sufficientem accipe quantitatem, & super alutam extende ad formam mediæ cucule, quam bregmati raso appone. Liquidū fiet ceratum in forma unguenti, liquantes ʒ. v. cera cum oleo, quoad formam unguenti accipiant, & deinde miscentes ʒ. ij. pulueris ex thapsia. Quo unguento unges bregma, quo utendum est, quia melius, & citiù vesiculas in cute excitat, quā ceratū solidū, quod multoties usus sum cum magno usu. Aduerte tamen, apparentibus vesiculis in cute, cessandū esse ab unctione, ne ob dolorem fiat attractio sanguinis, phlegmon. Quod si ceratum non potes efficere, sinapismum construes ea ratione, quæ docent Paulus, & Actius.

Saccu-
lus bre-
gmati
appli-
candus.

Sextò, corroborantibus caput.] In hac distillatione sedato symptomate ad morbum deueniendum est, nempe ad intemperiem frigidam cerebri, quam auferre debemus, & simul excrementa cerebri frigida digerere, bregmati, ubi multa sunt sutura, hoc medicamentum applicantes. ℞. pul. rosarum & coriandri preparati ana. ʒ. j. gummi iuniperi. ʒ. iij. salis rosti ʒ. ij. gariophyllorum ʒ. j. ʒ. fiat omnium puluis, ex quo fiat sacculus ad trianguli figuram. Et si in corpore sit pituitosa cacochymia, ea preparata purganda erit.

Distillatio, quæ fit à materia.] Si à causa calida distillatio proueniat,

ueniat, sanguinem mittes, fluxionem inhibebis, assumptis per os: non enim applicare oportet ceratū ex thapsia, ne argeamus intemperie. Deinde curabis morbum, nempe intemperiem calidam, lauās caput aqua tepida, permiscens cum ea parum aceti, ut penetret: & postea unge bregma oleo omphacino, rosaceo, aut alio quod frigidum sit.

Tussis multas habet causas.] Tussis symptoma est in motu de- Curatio
prauato facultatis expultricis: hæc à diuersis morbis ortum habet, tussis.
ac proinde non uno modo, sed variis curanda erit. Si à distillatione
oriatur, curabitur ea ratione, qua docuimus. Si à secunda causa
eueniat, medicamentis attenuantibus, & inscindentibus. Si à ter-
tia curare oportebit schirrum, aut iecoris inflammationem, aut hy-
dropem, si ex ea pendeat. Si tandem à quinta procedat causa, cobi-
bita respiratione sedabitur.

De Orthopnæa, Asthmate, Dyspnæa.

CAPITULUM XXVI.

TRia sunt nomina apud Græcos, quæ eandem rem feruè
significare videntur, videlicet dyspnæa, asthma, & ortho-
pnæa, quæ omnia suspiriosos, & anhelosos significant, de quibus
Celsus lib. 4. cap. 4. abundè egit. Propriè à Græcis dicitur dy-
spnæa difficultas anhelitus modica, quamuis Paulus. 3. lib. cap.
26. velit esse difficultatem spiritus & animæ, & commune acci-
dens alia plurima præter hæc comitans. Asthma Græcis est dif-
ficultas anhelitus vehementior, & cum æger non potest spira-
re sine anhelatione. Orthopnæa verò est, cum respirare non
potest, nisi recta ceruice spiritus trahatur: fiunt hæ affectiones
(ut inquit Ætius) cum aut crassiorum & tenuium humorum
multitudo pulmonis bronchia obstruxit, aut tumor quispiam
abscessui similis in ipso consistit. Similiter autem difficulter Causa.
spirant, quibus aspera arteria multa distillatione madet, re-
pletâque est. Ab aliis quoque fit causis, ut ab ulcere pulmo-
num: quæ omnia sic docet distinguere Æt. Distillatio etiam Nota.
sanis ex manifesta causa repetente accidit, in totum verò citra
febrem comitantibus etiam propriis distillationis signis. Si
verò tumor abscessui similis in pulmone fiat, necessariò febris
sequitur, neque ita post inflammationem, in pus conuersa,
pus reiecitur cum tussi. Qui autem propriè orthopnoici, & dif- Cura-
tic.
ficulter spirantes appellantur, in totum febrem non ferunt,
grauitatis autem sensus eis contingit, neque quippiam puru-
lentum per sputum reiectant. Cum igitur asthma fieri possit à
sanguine extra venas, eius curatio cap. 28. de sanguinis sputo
describetur, aut ab inflammatione pulmonum, de qua cap. 17.
de peripneumonia: aut ab ulcere pulmonum, de qua cap. 26.

DE CVRAND. MORB.

de phtisi, aut à luxatis vertebrae spinæ, cuius ratio in reductione eius in proprium situm consistit: aut fit à materia crassa pituitosa pulmones obstruente, & ab hac vltima causa ferè sem-

Curatio per pendet. Quare in præsentia de curatione eius agendum est; à pitui- prius tamen oportet scire, an æger sit in ipsa accessione, an in
ta in ac- quiete. Quia morbus hic, quemadmodum comitialis, & arti-
cessione cularis, habet accessiones aliquando ordinatas, aliquando
per re- inordinatas. In ipsa accessione curatio fit per solas frictions, ligaturas & cucurbitulas extremorum ad reuellendum, ne subito suffocetur æger, qui ceruice erecta vigilet, & dormiat
uellen- parum, & non in die, quies summè necessaria. Quare tunc
tia. vacuatio per medicamenta purgantia, & per sanguinis missionem maximè nocet, mouens humores, & augens fluxum
Sectio ad pulmones & trachæas arterias. Si tamen ipsa accessio fuerit
vena, & nisi longa magna & longa, subitam suffocationem indicans, indiget
purgatio sit accessio. vacuatione per clysteres acres, & per sanguinis missionem
noceat secta vena, aut per cucurbitulas inter scapulas. In tempore
nisi longa quietis curatur asthma pituitosum sex remediorum generibus: Primò victu calido & sicco, vt aëre æstatis, aut arte parato, rore marino, saluia, stæchade, & aliis calidis medicamentis, vt cibo, pane scilicet furfuraceo, & salito, & bene
Curatio fermentato: carnibus auium montanarum, & animalium concoctu facili, & non humidorum, assis, aut tostis, non
extra nervosis, nec pinguibus: vt potu parco in pastu, & post pastum
accessio- nullo, qui sit aqua cinnamomi, vel decoctionis anisi, vel seminis fœniculi: eorum tamen sitis vehemens est ob calorem
nem. cordis refrigeratum minùs quam res exigit: tunc enim lauos ægri lacte caprino, vel ex amygdalis dulcibus expressio sine saccharo, aut aqua frigida, aut mucagine seminis psyllij, vel cydoniorum. Sed quia potus comprimit septum transversum ventriculo distento & difficultatem respirandi auget, quoniam ventriculus concoquit cibum, donec ab eo egressus sit potus, maximè nocet.

Præparatio. Secundò apparantibus materiam collectam in cerebro, pulmone, vel aliis partibus transmittentibus, qualia sunt calefacientia, incidentia, tenuantia, & tergentia: initio clementiora, ne resolutio tenui crassum ineptum expuitioni relinquatur. Conueniunt primò syrupus de liquiritia, syr. capillorum Vene. oxymel. S. cum decocto pectorali, aut aquis capillorum Ve. & liquiritiæ. Secundò post primam vacuationem concedunt syrupus de hyssopo, de prassio, & oxymel compositum cum aquis, aut decocto hyssopi, prassij, fœniculi, dactylorum, & vuarum passarum. Tertiò post secundam vacuationem profunt
Syrupi ad
clemen-
tes.
Syrupi
veh. mē-
tiores.

ad concoquendum syr. de quinque radicibus cum oxymelle compos. & scillitico cum decocto aut aquis prasilij, hyssopi, radicis lilij siccae: quia succus eius valenter purgat in parua quantitate: inter has tamen coctiones & purgationes interiaccant dies aliquot, vt natura quiescat. Et quia hic affectus chronicus est, necessaria medicamentorum omnium ferme frequens permutatio, ne natura longa consuetudine iis similis fiat, ac proinde reluctetur, aut ab eis nihil patiatur. Præterea ob occultam quandam proprietatem, seu familiarem quasi amicitiam quædam magis amat nostrum corpus, & alia refugit propter inimicitiam, quod sola experientia demonstrare potest.

Tertiò, purgantibus materiã, si multa est in pulmonibus aut etiam non multa in toto. Nam si pauca fuerit in pulmonibus vt per sputa expelli possit, non opus est purgatione. Prima ergo purgatio fiet per 3. j. pilularum de agarico, aut per potum 3. j. diacatholiconis, & 3. j. agarici trochiscati cum decocto pectorali, aut aqua capillorum Veneris. Secunda purgatio fiet per has pilulas. ℞. pilularum cochiarum, & de agarico an. 3. ss. diagridij ḡ. iij. cum aqua hyssopi. fiant pilulæ vij. & aurentur si opus fuerit: vel fiat per hunc potum. ℞. diaphæniconis 3. iij. electuarij indi maioris 3. ij. agarici, trochiscati. 3. j. diacatholiconis 3. v. rhodomellis. 3. j. decocti pectoralis. q. s. misce, & fiat potus. Tertiò, si opus fuerit, fiat purgatio per 3. j. pilularum cochiarum, aut foetidarum, aut de sarcocolla, vel per hunc potum: ℞. electuarij indi maioris 3. iij. agarici trochiscati, & turbit electi an. 3. ss. rhodomel. 3. j. aquæ hyssopi. q. s. misce, & fiat potus. Si opus fuerit, quia morbus est chronicus, vtatur his pilulis semel vel bis in mense: ℞. pilularum de hiera compos. & de agarico an. 3. j. ss. agarici optimi, & turbit electi an. 3. j. salis gemmæ ʒ. j. zinzib. ʒ. ss. cum aqua hyssopi. fiat massa, cuius dosis quinque pilulæ ponderis ʒ. ij. Si verò non possit pilulas transglutire, quæ magis huic morbo conueniunt, quàm purgantia liquida, quia priora diutius in ventriculo detinentur, ideoque magis & à partibus longinquiorebus, melius purgant: hac mixtura fiet purgatio ad vsum: ℞. diacatholiconis 3. ij. electuarij indi maioris 3. j. agarici trochiscati 3. ij. turbit gummosi 3. j. syrupi capillorum ve. q. s. misce. & fiat confectio. Dosìs cochlearium vnum.

Quartò auertentibus auxiliis, vt iis quæ per nares & palatum purgant, errhinis scilicet apophlegmatismis, & aliis multis, de quibus cap. 25. præcedenti, quales sunt clysteres,

*Vehementi-
tissimi
syr.*

*Consi-
lium.*

*Purga-
tio.*

Prima.

Secunda.

Tertia.

*Pilule
laudantur in
hoc morbo.*

*Detra-
tio.*

DE CVRAND. MORB.

& glandes acres, & cauteria in capite.

- Promo-* Quinto, promouentibus sputa, hoc est, incidentibus, dila-
nentia tantibus asperam arteriam, & roborantibus pulmones: ho-
sputū & rum quædam sunt simplicia, vt capillus ve. liquiritia, vna
roboran- prassæ, crocus, ficus, iniubæ, hyssopus, scabiosa, aristolochia,
tia pul- folia & semen vrticæ, enula campana, pulmo omnis, præcipuè
mones. tamen vulpis, dulcia omnia, salsa, amara, & acria simul. Ex
Syrupi. his sunt decocta, syrapi, loch, & electuarium, vt syrapi.
Loch. capillorum Vè. de liquiritia, oxymel S. syrapius de hyssopo,
Electua de prassio, oximel compos. oximel scilliticum, loch sanum &
ria. expertum, loch caulium, loch de pulmone vulpis, loch de pi-
no, electuarium Diarisi, hæc & similia detineantur in ore, &
sensim transglutiantur, vt à gula in asperam arteriam per po-
ros penetrare possint, aut saltem eorum vis. Hæc mixtura,
seu confectio est optima in hoc genere quinto: ℞. succi li-
quiritiæ, hyssopi, scillæ radicis lilij an. ʒ. viij. capillorum Ve.
ficcorum ʒ. vij. seminis vrticæ, cardamoni, piperis, aristolo-
chiae rotundæ, nasturtij, borac, carui, amygdalarum amara-
rum an. ʒ. v. fiat ex his cum melle sufficienti confectio, cuius
sumat cochlearium vnum, dosis sit manè & vespèri, cum vinciis,
tribus sequentis liquoris: ℞. caricarum, dactylorum an. num. x.
radicis liquiritiæ, hyssopi, calamenti, prassij, capillorum Ve.
an. ʒ. j. radicis apij, fœniculi, & seminis eorum, seminis vrti-
cæ, & fœnugræci an. ʒ. ʒ. fiat decoctum in ℥. xij. aquæ donec
tertia pars consumatur, percoletur, & cum ℥. duabus mel-
lis fiat instar mulsæ. Hæc aqua in hoc genere remediorum
est vtilissima: ℞. pulmonum hirci castrati in paruas partes
diuisi num. iij. pulmonem vnum vulpis, si nancisci possumus,
capilli Ve. m. vj. hyssopi, m. ij. radicis ari, seu serpanteriæ
conculæ ʒ. ij. liquiritiæ recentis, si licet aliunde parari ʒ. iij.
fiat ex his aqua instrumento vitreo, & igne paucò: eius dosis
ʒ. iiij. cum paucò saccharo cando, aut saccharo comuni.
- Aqua* Aqua ligni guaiaci, seu indi cum medicamentis pectoralibus
stillati- facta, est etiam optima, & experta à me in hoc genere re-
ua. mediorum. Ius galli gallinacei veteris, medicamentis pe-
Ius gal- ctoralibus factum, est ab omnibus laudatum, & expertum.
li vete- Thoraci sunt admouenda medicamenta, quæ in hoc genere
ris. conferunt, vt faciliùs & citiùs medicamenta pectoralia spu-
tum promoucant, vt ℞. olei amygdalarum dulcium, & sesa-
mini an. ʒ. j. olei de lilio ʒ. ʒ. croci puluerisati ʒ. j. axungiae
gallinæ ʒ. ij. ceræ, quòd satis est, misce, & fiat vnguentum, vel:
℞. emplastri filij Zachariæ, & de meliloto an. æquas partes, ex-
tendantur super alutam ad formam & magnitudinem pectoris.

Sexto,

Sexto, reliquias materiæ siccantibus, & dissipantibus, ut
 mitridato, theriaca magna, diamusco dolci, & amaro, pliris ar-
 coticon, & suffitu cum thure, & sulphure: quamuis sulphur in-
 terius cum melle, aut ouo, aut syrupo pectorali conferat huic
 morbo. Ab aliquibus laudatur suffitus ex arsenico, ego tamen
 non laudo, etsi sit aquis cardiacis castigatum. Nonnulli in vl-
 timo genere præbent pilulas ex myrta, costo, aristolochia, cas-
 sia lignea, croco & arsenico: ego semper damno hæc medica-
 menta, & his similia, quanquam arsenici sit parum. Cauterium
 in furcula superiori thoracis in hoc genere remediorum à
 multis doctissimis medicis maximè laudatur.

Resolu-
tio.Aduer-
te.Cautè-
rij laus.

Scholium.

TRia sunt nomina apud Græcos.] *Dispnaa* nomen Græcum
 Latine sonat vitium in respiratione, aut læsio respirationis:
 qua ratione sub se comprehendendi respirationem frequentem, celerem,
 interceptam, anhelosam, & rectam. In hac cōmuni significatione lo-
 quitur Gal. de diff. respi. c. 2. Et cum varia sunt læsiones respira-
 tionis, illæ quæ exigua sunt, appellantur aliquando à Gal. nomine
 generis, difficiles respirationes: & cum exigua læsio variè possit com-
 parari, varia etiam habebit nomina. Si enim comparemus quāli-
 bet noxam respirationis cum abolita respiratione, omnes læsiones
 respirationis erunt exigua, & ideo seruabunt nomen generis, qua
 ratione Gal. 4. de loc. affe. c. 7. *aphnaam*, hoc est, abolitam res-
 pirationem separauit à *dispnaa*: omnes alias respirationū læsiones
 illi, quæ maxima est, oppones. Si verò omittentes ablatam respira-
 tionem, unam læsam, respirationis læsionem cum alia comparemus: il-
 la, quæ exigua est, hoc est densa, dicetur difficilis respiratio, nomen
 generis huic tantū diff. *dispnaa* accommodantes, & hac ratione loqui-
 tur Gal. 3. de diff. resp. c. ult. & 6. epid. par. 3. com. 9. Ex quibus
 omnibus hanc ultimā respirationis læsionem assumētes, tanquā unā
 differentiā, tres statuemus in vniuersā difficilis respirationis diffe-
 rentias. Prima erit illa paulò ante dicta, quæ seruat nomen generis,
 & nil aliud est, quā densa respiratio. Secunda dicitur *asthma*, &
 tertia *orthopnea*. *Asthma* est densa respiratio sine febre, qualis ap-
 paret in his, qui diu accurrerūt, quæ ut colligitur ex septimo de cō.
 pos. secundū locos capite sexto duo habet symptomata cōiuncta, unū
 est arctatio thoracis sensibilis, secundū est *orthopnea*, id est recta
 spiratio. Unde apparet error practicorum separantium ab *asthma*-
 te *orthopneam*. Dices, nonne in hanc tertiam difficilis respirationis
 differentiam ab aliis distinctam statuisti? Respondeo verum hoc es-
 se, quia aliquando *orthopnea* reperitur sine *astmate* in sup-
 puratis peripneumonicis, & aliis, in quibus recta spiratio cum non

Dispnaa
nomē cō-
mune.Tres dif-
ferentia
difficilis
respira-
tionis.Asthma
quid.Practi-
corum
error.

DE CVRAND. MORB.

Causa sit sine febre, neque fiat ab obstructione, sed compressione, non dici-
difficilis tur asthma. Difficilis respiratio causam habet humorem frigidum,
respira- parū obstruentē: asthma tuberculū, & eundem humore, sed obstruē-
tionis. tē magis arterias asperas, quæ in pulmone habentur. Inde intelli-
ges, deceptū fuisse Iacorium existimantē Monachū collegij de Arras
asthmate mortuū integris pulmonibus solū abscessū in vena ar-
teriali existēte. Qua enim ratione ex illo abscessū possit ladi respi-
ratio, non video. Occipitur etiam idē sentiens ex resiccatione, ut in
chymistis aurificibus, fabris ferrariis & aliis, fieri asthma: nam cū
aspera arteria magnum habeant meatū, nunquā in his siccitas po-
terit asthmatis esse causa. Verum est hos aliquantulū asthmaticos
apparere ob vaporem crassum obstruentum prædictas arterias. Ex
unctione autem morbi gallici, si asthma contingat, proveniet à
crasso humore, ab argento viuo ad asperas arterias expulso. Orthop-
nea fit ab obstructione in asthmate, aut à cōpressionē asperarū ar-
teriarum pulmonis in suppuratis peripneumonicis, & his, qui multo
humore corpus pulmonis habent imbutū. In hoc capite adverte au-
Ani- ctore solū tradere curationē prædictorū affectuum, qui sine febre
maduer- sunt, & sequentur morbum in via, nēpè obstructionem asperarum
sio. articularū ab humore crasso factam. In curatione asthmatis aduer-
te medicamenta inscindentia, quæ utilia sunt, assumenda esse non
simplicia, sed cum medicamento aliquo humido permixta, quod est
Gal. præceptum 5. simpl. cap. 12. in affectibus thoracis, & pulmo-
nis, ratio est, quia humor in pectore non debet siccari: at cū ama-
ra sicca sint, ideo cum re liquida & humida permiscenda sunt, ut
penetrando inscindant humorem, & siccitate non ledant.

De Peripneumonia, & Pleuritide.

C A P. XXIIII

Defini- **Q**uia Peripneumonia, quæ est pulmonum inflammatio
tio. & pleuritis, seu lateralis morbus, quæ est inflammatio
membranz costas succingentis, vel musculorum ei propin-
quorum, (autore Galen. 5. de loc. affect.) iisdem fermè reme-
diis curantur: hoc capite de his duobus affectibus non im-
Causa. meritò agere statuimus. Fiunt ab iisdem propè causis, quam-
vis peripneumonia à sanguine magis pituitoso, & pleuritis
à bilioso, ut docet Galenus commentario. 33. libr. 6. Aphor.
Pleuri- utriusque tamen affectus causa externa calida per se, &
tis con- frigida per accidens comprimendo esse potest. Peripneumo-
tagiosa. nia quoque fit ab angina, à pleuritide & capitis distillatio-
ne: nonnunquam verò (ut ait Paulus) eius origo est sola inflam-
matio. Lateralis morbus aliquando est epididymialis, sique
per

fitque per contagionem, quemadmodum pestis. Peripneumonia (vt vult Gal. 2. de locis affect. cap. 3.) deprehenditur ex tanta respirandi difficultate, & angustia, vt suffocari laborantes videantur, ac recti sedere cogantur, quem affectum orthopnæam nominant: Aërius tamen sexto serm. cap. 66. omnes peripneumonix notas depingit longo satis sermone, nimirum febrem acutam, grauitatem thoracis absque dolore, inflammatis tamen pelliculis thoracis sentitur dolor, faciem rubicundā, præcipuè malas, nasum in summo simum, appetentiam læsam, linguæ siccitatem, aquæ frigidæ maiusque etiam aëris desiderium, tussim siccam, vel si expuant, spumofum id est.

Accidentia inseparabilia pleuritidis (si Galeno & veritati credimus) sunt febris acuta, dolor perinde ac si locus vel intendatur, vel pungatur, respiratio frequens & exigua, pulsus paruus arteriam duram, & quodammodo tensam indicans, tussis magna ex parte cum sputis coloratis, nonnunquam verò sine his. has incoctas pleuritides appellat Galenus loco superiùs citato. 5. scilicet de locis affect. cap. 1. quæ vel celeriter hominem rapiunt: vel longo temporis spatio finiuntur, quo in loco multas doloris lateris species proponit.

Curatur vera pleuritis sex generibus remediorum: Primò, ratione victus tenuis vsque ad quartum diem, cum vires ferre possunt, vt lacte amygdalarum dulcium sine pane, ptisana hordei colata, vel non colata, à quarto vsque ad septimum pane loto & lacte amygdalarum cum saccharo, & radice buglossæ condita saccharo, post septimum iure pulli refrigerato, cremore hordei, semper tamen ægri natura & consuetudo est consideranda. Bibat aquam hordei, aut saccharatam, aut ex decocto liquiritiæ remissè calidam, vinum nullo modo bibendum est, nisi vires sint admodum imbecillæ: tunc enim vinum dilutum, & ius gallinæ, aut aqua eiusdem per distillationem conuenient, aut in declinatione. Dormiat supra affectam partem, talis enim incubatio minorem dolorem infert, augeturque calor partis affectæ, & magis resoluit materiam phlegmonis.

*Curatio
Pleuriti-
dis.
Vitus.*

Alius sit facilis, vt minimū semel in die. Animi perturbationes, quæ augere possunt inflammationem, tollantur, vt ira, timor, & similes.

Secundò, auertentibus materiam, quæ augere possit inflammationem, vt sectione venæ internæ cubiti, quam vocant hepaticam, eiusdem partis, seruata semper rectitudine, vt duplex scopus propositus sit, alter ad reuellendum: alter ad vacuandū: quod fieri non potest per sectionem venæ partis oppositæ. Si non apparet vena interna cubiti, communis secan-

*Reuulsio
per va-
cuatiofi-
mul.*

DE CVRAND. MORB.

da est, aut humeralis, si duæ aliæ non appareant: semper tamen sanguinis copia respondeat morbi magnitudini, naturæ ægri, viribus, regioni & consuetudini. Si morbus semper augeatur post primam sanguinis missionem fiat secunda, & tertia, si opus fuerit, & vires patiantur: semper tamen ab eadem vena, posteaquam ex diuersis fieri non potest: quemadmodum in inflammationibus & tumoribus aliarum partium, in quibus, cum fluit humor, facienda est sanguinis missio ex parte lōginqua per reuulsionem, cum iam fluxit ex parte eadem, aut propinqua, vt in angina diximus. Si vires deficient, & ætas non sit florida, sanguis mittatur per cucurbitulas cum scarificatione inter scapulas, si non sit plenitudo, & in natibus, si fuerit plenitudo. In quacunque parte fuerit dolor, etiam si infestet partes, quæ sunt sub septo transuerso, vt docet Galen. comment. 11. secundi de ratione victus in morbis acutis, quamuis vacationem per medicamenta purgantia Hippocrates tum eligat, sequens aphorismum 22. primi libri, quæ ducere oportet: sed ego cum Galeno semper ad reuellendum & euacuandum simul magis laudo eius sententiam, quia inflammationibus internis, & febribus ardentibus medicamenta purgantia, præcipuè Græcorum sunt satis calida, & valenter mouent iacōque timenda. Præterea alui profluuium in pleuritide, & peripneumonia, si adueniat malum, vt Hippocrates 6. libr. Aphorif. 16. scribit. Quare in his duobus morbis benedictis medicamentis & salubribus purgabis suo tempore, quarto videlicet genere remediorum. Auertunt quoque frictiones, ligaturæ partium extremarum, & clysteres.

Auersio.

Præparatio.

Tertiò, materiam apparantibus (quæ si fuerit turgida absque coctione vacuanda est) vt syrupo violarum, syr. endiuicæ S. cum aquis endiuicæ, cichoreæ, & borraginis, aut cum decocto hordei sine cortice, violarum, & liquiritiæ: idque cum materia est biliosa, quæ si fuerit admodum tenuis, syrupo, nenupharis & de papauere est incrassanda: crassa verò aut mixta cum crassa syrupo capillorum Vene: de liquiritia, de hyssopo, cum oxymellite S. & decocto pectorali, est concoquenda.

Purgatio.

Quartò, purgantibus non valentioribus, qualia sunt Græcorum, sed clementioribus, & salubribus, quæ Arabes & nostra ætas cognouerunt, exceptis stipticis, & astringentem substantiam habentibus, vt est rhabarbarum, & mirobalani, præcipuè in tota substantia: eorum tamen infusio est probata, & laudata, & aliquando scammoniaca correctæ, quando salubria non sufficiunt, vt in electuario de succo rosarum, & diaprunis solutiui, & in parua quantitate; & mixta aliis salubribus:

bus : vt ℥. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ʒ. viij. medullæ tamarindorum (quum est ardentissima febris) ʒ. iij. (nec timeas acetositatem tamarindorum) infusionis rhabarbari per noctem in aqua endiuix factæ ℥. iij. syr. violarum ʒ. j. decocti florū cordialiū. q. s. misce, & fiat potus. Si copia bilis fuerit magna, adde ʒ. ij. diaprunis solutiui: & si crassa & mixta cum pituita, adde ʒ. ss. agarici trochiscati vel ℥. ij. aut si amat magis pilulas, quæ minus in hoc morbo cōferūt, has accipiat hora idonea: ℥. pilularū de rhabarbaro, & agarici trochiscati an. ʒ. ss. fiāt pilulæ septem cum aqua endiuix, & aurentur, si non est pauper.

Quintò, sputum materiæ pleuritidis, quæ in pulmonem & thoracem exudat facile, & fluidum reddētibus in omni tempore phlegmones, & omni hora dici, aliis atque aliis medicamentis, vt syrupo violaceo, de iuiubis, capillorum vene. de liquiritia, syrupo acetoso S. & oxymelle S. pilulis bechichis, saccharo cando, violato, electuario diatragacanto frigido, & similibus, & hoc eclegmate, seu loch: ℥. penidiarum, sacchari candi, violati an. ʒ. j. pulueris diatragacanti frigidi ʒ. ss. succi liquiritiæ, & pulmonis vulpis an. ʒ. ij. gummi crani ʒ. j. syrupi violarum ʒ. ij. ss. syrupi acetosi S. ʒ. j. misce, & fiat loch. Hæc omnia quæ sputum promouent, retineantur ore, & sensim deglutiantur. Hic liquor seu sirupus non perfectè decoctus sputum promouet: ℥. capillorum veneris, violarum an. m. ij. iuiubas num. x. vuarum passarum sine granis p. ij. liquiritiæ ʒ. ij. fiat decoctum, de quo percolato accipe libras duas, post parum ferueant. Foris ad sputum excitandum confert hoc vnguentū: ℥. olei sesamini, & amygdalarum dulcium an. ʒ. j. ss. emplastri filii Zachariæ loco ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum: vel ℥. emplastri filij Zachariæ q. s. extendatur super alutam ad formam mediij folij papyri. Quidam in hac inflammatione parti affectæ admovent repellentia medicamenta, & malè, quia augent inflammationem.

Sextò, reliquam materiam resoluentibus, & dissipantibus, vt vnguentis, emplastris, cataplasmatibus, & fotu per spongiam ex decocto camomillæ, meliloti, seminis lini, fœnugræci, furfuris, vel per vesicam plenam simili decocto. Saccus ex millio. sale, & fursure bene tostis est optimus in hoc genere remedium. Hæc tamen omnia: & similia initio veræ pleuritidis maximè noceāt, & in augmento: valenter enim augent inflammationem. Quare errant multi indocti medici, qui inconsideratè fomentis & calefactoriis vtuntur. Solet enim (Gale- no autore comment. 3. i. sexti lib. Aphor.) in his fomentum aliquantū mollire dolorem, sed alteram fluxionem aduocare: experientiæ tamen gratia ad cognoscendum qualis sit affectio

*Spiritu
iuuan-
tia.*

Loch.

Liquor.

Topica.

*Obser-
uatio.*

*Resolu-
tio.
Vesica.
Saccu-
lus.*

*Error
inducto-
rum.*

affectio

DE CVRAND. MORB.

Curatio affectio Hippocrates & Galen. medici sapientissimi, & prae-
teritina dentissimi iis vti sunt. In non vera pleuritide ad flatum dissipā-
vulgò dum optima sunt, & iis, vbi dubitat medicus an sit vera, an non
dicta. vti oportet: semper tamen cautè, ne attrahatur humor ad labo-
 rantem locum, & ne ex non vera fiat vera, vel si vera fuerit ne
 augeatur. Si autem pleuritis suppuretur, à qua pauci liberantur,
 natura non est impedienda, sed potius eam ars imitari ferè

Medica- semper conatur, vt hoc medicamento interno: ℞. maluae, bis
mentum maluae an. m. j. ficuum. p. j. seminis lini, & foenugraeci an. p. β. fiat
internū decoctum, de quo percolato, accipe libras tres, cui adde butyri
pus effi- recentis ℥. j. olei amygdalarum dulcium ℥. iij. misce, & saepe in
ciens. die transglutiat paulatim parum huius medicamenti. Foris
Cata- admoueatut hoc cataplasma, ℞. foliorum maluarum. m. j. radi-
plasma cis althaeae m. j. caricarum, seminis lini. an. p. j. omnia decoquan-
ad idem. tur, & postea cum vnciis duabus farinae foenugraeci, & cum
 ℥. ij. & β. olei sisamini, & ℥. j. butyri, addendo ℥. β. axungiae gal-
 linæ ℥. β. croci, & duos vitellos ouorum, misce, & fiat cataplas-
 ma: quod parti affectae admoueatut.

Qua ab- Confecto pure rumpatur abscessus frequenti tussi, & vocife-
scissum ratione, vomitu, & sternutamentis, & corporis vehementi con-
rumpit cussione. Deinde abstergetur vlcus aqua hordei cum cortice
Abster- saccharata, & si non suffecerit ipsa, cum hydromelle ex deco-
sio. cto furfuris, & cicerum, praesertim si non sit febris. Vltimò verò
Gluti- vlcus glutinabunt terra sigillata, bolus Armenus & alia quae di-
nantia. centur capite de Phtisi, sed in hoc, similibusque vlceribus con-
 sule doctum chirurgum.

Scholium.

Perip- **Q**uia Peripneumonia.] Peripneumonia est inflammatio pul-
neumo- monis, vbi inflammatio tumorem praeter naturam significat,
nia quid. potest enim fieri peripneumonia à quocunque humore, vt plurimum
Causa. tamen contingit ab humore pituitoso, & crasso, quia in substantia
Signa. laxa (qualè habet pulmo) melius moram facit. Signa eius sunt febris
 acuta, dolor grauis, difficilis respiratio, rubedo malarum, & pulsus
 mollis. Febris acuta (quae acutior est, quàm in pleuritide, etsi fiat à
 causa calida, & peripneumonia à frigida) contingit à duabus cau-
 sis, prima à vicinia cordis, secunda à vasorum cum corde comuni-
 catione. Dolor grauis fit, quia pulmo paucos & exiguos habet ner-
 uos, & ideo in eo dolor ratione membrana usum ambientis sentiri
 debet. Difficilis respiratio cum orthopnea contingit, quia pulmo est
 instrumentum respirationis, ac proinde peripneumonia est affectus
 acutissimus, à quocunque humore fiat: perniciosissimus tamen, si fiat
 à

à sanguine bilioso, quia habet maiorem febrem, ob quam ita auge-
tur usus, ut non possit ei respiratio sufficere. Rubedo malarum non
apparet in hoc affectu statim in principio, sed postea à vaporibus ascē-
dentibus, & in malis detentis, exhalāt enim ab humore crasso, quod
non contingit in pleuritide, quæ ut plurimum fit à bile, cui citò dis-
sipari proprium est. Pulsus mollis euenit in hoc affectu, ut autor, est
Gal. lib. de pul. ad Tiro. propter raritatem pulmonis, & irrigationē
arteriæ à pituita: quamuis enim ratione inflammationis debuerit esse
durus, pituita tamen, & partis natura id impediunt, & occultant
exiguam arteriæ tensionem. Pleuritis nomen est æquiuocum, nam Pleuri-
primò significat quemlibet lateris dolorem, etsi sit citra inflamma-
tionem: & hunc affectū nominare solemus lateris dolorem, aut pleu-
ritidem spuriam. Secundo propriè significat inflammationem mem-
brana pleura, quæ multis donatur venis. Vnde errat Iacotius pleu-
ritidem etiam in periostio collocans: in eo enim pauca & exiles ve-
næ, inflammationi non suppeditabunt materiam. Pleuritis propria Pleuritis
rursus diuiditur in exquisitam, & non exquisitam. Exquisita dici-
tur, cum membrana primū inflammatur. Non exquisita, cum mē-
brana secundariò, hoc est ad inflammationem musculorum inter-
tur.
sternorum intercostalium afficitur: cum enim pleura his musculis ad-
harcat, & sit veluti tegumentum eorum, proinde fieri non potest, ut
illi muscoli inflammentur, quin pleura quoque inflammetur, &
contra: sicut in tenui meninge: & cerebro euenire c. de phrenitide
diximus. Has duas pleuritides ex Gal. 5. de locis affectis c. 2. distin-
gues ex pulsu, quæ in exquisita magis durus est. Signa Pathognomo-
nica pleuritidis, sunt febris cōtinua, & acuta: dolor punctorius, pul-
sus serratilis & durus, difficilis & frequens respiratio, & tandem
tussis. Febris hunc affectum comitatur, quia inflammatio propinqua
est ipsi cordi & eius inuolucro. Dolor propter tensionem soluta cōti-
nuitate, punctorius verò, qui est tensio in membrana, quæ acutū ha-
bet sensum: dicitur autem punctorius, quia agroti habent talē sen-
sum, qualis solet sentiri in acus pūctura. Et cum membrana ex sua
natura sint extensa, & inflammatio tendat membranam, proinde
etiam vicinæ partes inflammationis etiam tendi solent, & hac ra-
tione dolor sere per totam membranam extenditur: unde prouexit,
ut dolor aliquando ad iugulū ascendat, & aliquando in hypochon-
driis sentiatur. Pulsus est durus in pleuritide non propriè, sed appa-
rentia, quia tensa est arteria: serratilis verò, quia inæqualiter arte-
ria mouetur, ob eius inæqualitatem in duritie. Fit autem respiratio
frequens, quia magna respiratio, quæ calor cordis actus requirit,
exerceri non potest ob dolorem à distentione thoracis excitatum, &
ideo frequentia motus defectū distentionis supplet. Tussis à natura
excitatur, ut tumorem, qui ei molestus est, & humorem resudantem
ex-

DE CVRAND. MORB.

Lupij ex eo expellat. Præter hæc signa, alia in pleuritide reperiri solent,
Lapsus. quæ mox apparentia dicuntur. Hæc aliquando contingunt, & ali-
quando non: inter quæ est aphonia, quam vocis priuationem ait Lu-
peius euenire per consensum affectis nervis vocalibus. Qui maximè
decipitur, nervi enim vocē efficientes in pleuritide non afficiuntur:
sed fuit aliquādo pleuritici aphony deficiente materia vocis quod in
magna pleuritide experimur, in qua ob inflammationis magnitu-
dinem, non potest attrahi aer ad vocem necessarius. Vallesius libro
Controuersia. septimo cpyd. com. 13. ex Hipp. sententia motus, suscitatur quæstionem,
olim à barbaris medicis agitari solitam: quæ queritur, cuius lateris
pleuritidis sit periculosior. Aliqui pleuritidē sinistri lateris periculo-
siorē esse sentiunt: quia hæc pars nobilior est ob cordis situm. Alij
cōtrariam defendunt sententiā, adducti etiam ex nobilitate dextri
lateris, quam colligunt ex caliditate maiori proueniente ex maiori
latitudine arteriarū, quæ per ipsam disseminantur: & ad argumē-
tum de situ cordis respondent, cor in medio thoracis pendere, & non
Vallesij in sinistra parte. Vallesius in hanc secundam declinans sententiam
senten- sic explicat controuersiam. Pleuritis tres exitus habet: primus est re-
tia. solutio, in qua sensim euacuatio humore breui intra morbi constitu-
tionē liberantur agri: secundus est corruptio, qua breui moriuntur,
humore vincente naturam: tertius est suppuratio, in qua magna ex
parte moriuntur etiam agri sensim tabescentes, aliquando verò li-
berantur. Ex his optandus est exitus qui resolutione fit, timendus qui
corruptione: ille verò, qui suppuratione contingit, timendus etiā sed
minus. Iam pleuritis lateris dextri maior erit, & acutior, si partis
naturam consideremus, quæ calidior, & sanguinolentior est, & sic
parata ad calidas & acutas inflammationes, unde pleuritis huius
lateris, erit parata ad citā salutem, aut mortē, per resolutionem, aut
corruptionem (acutior enim est hoc) sinistra sapius in suppurationem
abibit, vide utrum eligas. Facta verò suppuratione (quæ in utroque
latere fieri potest) deterior est haud dubiè dextri lateris, quia non
poterit fieri, nisi ea parte multum debilitata: debilitatam autē esse
partē, alioqui fortem, grauius est, quàm debile: accedit, quòd sinistra
pars, ut ignobilior opportunior est curationi, quia cū minori periculo
Quæ se- secatur, & vritur. Hæc Vallesius. Ex quo hæc omnia colligimus: pri-
quatur mum est, pleuritidis tres habere exitus: secundum dextrū latus esse
ad Val- calidius sinistro, & plus sanguinis continere eo quòd arteriæ per
lesij sen- ipsam disseminatae sunt maiores, quàm in sinistro: tertium, ex dextri
tentiam. lateris maiori calore sequi in eo maiores inflammationes. Quartum,
Valle- in parte sinistra sapius fieri suppurationem, in dextra verò sapius
sus re- resolutionem, & corruptionem. Quintum, suppurationem dextri late-
prehen- ris esse peiorem, eò quòd pars debilitata robustior erat, tū quia ma-
ditur. iori cū periculo vritur & secatur. Hæc si examinemus, inueniemus
primum

primū verū esse, alia verò omnia esse falsa: innituntur enim falso supposito, quod est partē dextrā esse calidorem, quia habet arterias maiores, hactenus enim nullus anatomicorū id animaduertit. Imò si dissecans corpus attēte id aspicias, arterias dextra partis equalis magnitudinis cū arteriis sinistra reperies, hac enim est natura iustitia, quā in duobus oculis & auribus experieris. Imò si arterias spectemus sinistrū latus erit calidius, cū arteria magna versus ipsum declinare videatur, si hoc ita est, non ergo dextrū latus erit calidius sinistro, neque plus sanguinis cōtinebit, & inde sequetur nō esse robustius, neque in eo plures & maiores fieri inflammationes, neque plures resolutiones, & corruptiones, neque erit peior suppuratio in eo, quā in sinistro, neque sectio, & vltio sinistri lateris minori cū periculo fiet, sed cū equali, cū aequales partes, & praelātes aequē vulnerētur. Sedabitur ergo cōtrouersia breuiter hoc modo. Si cetera sint

*Sedatio
contro-
uersia.*

Curatur vera pleuritis.] Ratio victus in pleuritide, & aliis internis inflammationibus, distincta est ab ea, quam tradit Gal. 11. meth. in febribus in quibus cum tota materia ad unam expulsionem seruetur, in principio crassiori (ut perdurent vires) in flatu verò tenuiori victu (ne impediamus naturā) utendum est. Contrā in pleuritide & aliis internis inflammationibus, in principio tenuem adhibere oportet victū, ut fluxionem minuamus, at in flatu fluxioni, quando coctio apparet, crassum, ut vires roborentur ad sputum educendum: quod ex Hippocrate primò acut. sen. 23. colliges: si os, inquit, madescat, & quae expuuntur ex pulmone talia sint, qualia esse oportet, sorbitionis quantitate auge.

*Ratio
victus.*

Aquam libant cum liquiritia, aut capitl. veneris, aut pauco cinnamomo decoctam, & sit tepida, ut humor inscidatur, & attenuetur, qui ab aqua frigida solet incrassari. Vinum paucum solum concedere ob consuetudinem.

Potus.

Secundò auertentibus.] Cū pleuritis sit tumor praeter naturā, in principio postulat remissionem, & euacuationē simul seruata rectitudine, non solius naturae ut voluit Rondoletius, sed naturae simul & vasorū. Scilicet ergo basilicā eiusdē partis: quae ex parte affecta magis & citius euacuat, quā alterius partis: & hoc propter illā venā, quae ex axillari orta, & sub osse pectoris delata, cōmunicationē cum vena azigos ramis habet. Dices non semper esse venā secundam in principio pleuritidis, quia ex Hippo. 2. de ratione vi-

Curatio

*Venā
sectio.*

ctus

DE CVRAND. MORB.

Obiectio *Etus in acut. sent. 11. in pleuritide, qua habet dolorem vergentem ad hypochondria, purgandum est. Respondeo pleuritidem omnem, etiamsi habeat dolorem vergentem ad hypochondria, in principio postulare sanguinis missionem, quoniam hoc solum remedium potest ex parte affecta reuellere, & euacuare, neque Hippoc. in supradicta sententia contrarium docuit. Quod si dixit, esse purgandū, id fecit, ut nos doceret, id quod habet proprium illa pleuritis, in qua dolor ad hypochondrium vergit, in qua, cum post sanguinis missionem & coctione apparente videamus inclinare humorem ad venas inferiores, per ipsas purgatione educemus ipsum: hoc autē communem rationem curandi pleuritidem non tollit, quae cum sit inflammatio, sectionem vena statim requirit. Quem locum (ignoscant mihi eius manes) Galenus non rectē explicauit.*

Duo aut- *Tertiò, materiam apparantibus.] Bis peccat autor primò in pleuritide turgentia statuens, cum in ea humor in una parte firmatus sit, secundo purgans. Si enim humor peccans in thorace lapsus continetur, per sputum est educendus, & non purgatione, natura enim ut in plurimum per hanc partem eum expellit. Addo ut in plurimum, quia aliquando cum exigua est pleuritis, per alium eum expellere solet. 6. aphor. com. 16. aliquando etiam per urinā, quod rarò etiam contingit, ac proinde in hoc eum non imitamur.*

Quintò, *sputu materiae.] Facta reuulsione, & aliqua humoris euacuatione ex parte affecta, quod ex accidentibus remissis intelliges, opus erit humorē resudantē ex inflammatione euacuare. Quod aliqui ut prestare possint, sic distinguūt: si humor in thorace contentus sit crassus, debet inscindi: si verò tenuis, incrassari, ne aëri cedens in thorace remaneat. Hi tamen decipiuntur, quia etsi illud semper verum sit in humore, qui distillans à capite in asperis pulmonis sunt in arteriis recipitur, in pleuritide tamen falsū est, in ea enim, cum humor ex cavitare pectoris debeat asperas pulmonis arterias ingredi per poros, membrana pulmonem ambientis, attenuantia medicamentis sēper desiderantur, quod elegantissimè docet Gal. 13. method.*

Modus *c. 18. Vbi aduerte hæc medicamenta attenuantia, lambendo, & supino homine, sensim esse deglutienda, ut asperam petant arteriam. Utendi* *Quæ autē medicamenta exterius applicanda sint, ex humoris natura, & loco colligemus: si enim humor sit tenuis, qualis ut in plurimū solet esse in pleuritide, leuiter digerendū est, potissimū si sit in musculis inflāmatio, hoc cōmodè prestabit emplastrū filij Zachariae. Si autem humor sit crassus, & in pleura mēbrana, augēda erūt digere-* *gentia, qualia sunt emplastrū de meliloto, puluis iridis, & ciclad-* *minis. Repellentibus nunquam utaris, ne ex venis exiguis pulsus*

Lapsus *humor augeat affectum, tum ne partes vicina noxam suscipiant. auctoris. Sextò, reliquam materiam.] Pleuritis signis supra positis de-*

prehenditur, habet etiam pleura sua signa: unde id quod auctor dicit de curatione pleuritidis tentatiua, non potest constare: reuera enim Hippo. fomenta calida applicat, non ut tentando discat, sed ob vnā ex duabus causis. Prima est, ut curet affectum, aliquando enim inflammatio exigua est, & exigua fluxio, qua ex Gal. 6. epy. par. 3. com. ult. sine sanguinis missione curari possunt, degerentibus medicamentis dissipatis humoribus. Secunda verò causa ob quam fomenta calida applicat, est, ut leuato aliquantulum dolore non fluat sanguis ad affectum locum. Atque hac de pleuritide.

Peripneumonia, cum sit acutissimus morbus, & non possint agri Curatio cum illa lesione respirationis multum perdurare, in principio sanguinis missionem postulat copiosam, non enim semel, sed bis, ter, & quater eadem die sanguinem mittemus, ex basilica cuiusvis brachij, quoad ex remissione accidentium, cognouerimus fluxionē sisti. Et cum propter acuticm hic morbus quarto die veniat ad statum, tenuissimo victu utendum erit, assumentes mulsam cum decocto liquiritia, capil. ven. aut hordei cum cortice, decocto etiam cicerum uti possumus, aut iure pulli gallinacei, in quo cicera, & petroselinum decocta sint. Educemus id, quod resudat in inflammatione, sylliquiritia, capil. ven. & oxymelite simplici, cum decocto rerum attenuantium. Aduertere tamen oportebit, an sputum sit coctum, necne. Si sit coctum, augebis victum, ius gallina exhibens: si sit crudum, thoraci digerentia, & concoquentia appones, vehementiora tamen, quam in pleuritide, cum profundiori loco contineatur affectus, sic emplastro diachilonis magni, & filij Zacharia, addes puluerem iridis, aut aristolochia, aut ceroto ex thapsia uti poteris: hec. n. inscindunt humores & eos ad externa attrahunt. Si inflammatio suppuretur, periculum certò crescit.

De sanguinis sputo. CAP. XXVIII.

OMnes sanguinis expulsionēs (autore Gal. lib. 6. cap. 2. de Species. causis symptomatum) toto genere præter naturam censentur, excepto sanguinis profluvio, quod mulieribus ab utero defluit: sanguinis tamen deiectio per os & cruentum sputum aliis est deterius, præsertim quando ex pulmonibus emanat, quia Causa. tabem efficere solet. Hoc accidit nonnunquam à causa exter- Nota na, & aliquando ab interna, quas omnes cap. 21. de sanguinis è omnium naribus fluxu scripsimus: eas tamen ex Gal. sensu longius cruentum, ditè colligit Aëtius serm. 8. cap. 59. Causæ externæ ex serm. 8. par- tibus agri, aut assistentium cognoscuntur: internæ verò per tium à hæc indicia, quæ omnia ferè Aëtius loco superius adnotato quibus demonstrat. Si enim ob sanguinis plenitudinem accidat, ante sanguis reiectionem sentitur grauitas & post melius, leuiusque habet. fluit.

DE CVRAND. MORB.

Si propter oris , venarumque apertionem , calidus victus , & morbus calidus præcessit. Si ob venarum erosionem , cruentum apparet sputum, non subito, sed paulatim sanguis cum tussi expuitur, & semper peius habet. In magna tamen erosione confertim sanguis cum tussi expuitur sine casu, & æterna violēta causa. Quando est ex pulmone, sanguis educitur spumofus, subalbidus, atque ex intervallo cum tussi sine dolore prodit : si verò cum leuiori tussi absque spuma pituitosus sit , ex aspera arteria educitur: si niger, & in grumum concretus sanguis cum tussi, & dolore partis affectæ reieicitur, ex thorace est ; si verò ex locis, quæ sunt circa fauces, & palatum , ex orēne, an è gingiuis sanguis feratur, ex sensu deprehendes. Nonnunquam propter hircundinem deuoratā alicui parti inhærentem per palatum sanguis tenuis & serofus educitur, si tamen à capite sanguis deferatur, titillatio palati adest, & frequens excretio: aliquando cum tussi, & præcedēti capitis colore, aut pondere. In colore, sanguis niger, aliquando pituitosus, & aliquando mixtus cum pure. Si ex ventriculo , parua copia sanguinis vomitu educitur. Si ex hepate, aut splene, colore & dolore partis affectæ percipitur.

Curatio.

Victus.

Sputum sanguinis curatur quinque auxiliorum generibus. Primò victu refrigerante, & astringente, vt aëre, in æstate sparsis humi herbis, floribus, & aquis frigidis, & aceto rosato, vt cibo tenui saltem primis diebus, & glutinoso, vt hordei farina, succus agrestæ , aut acetosæ , aut malorum granatorum acidulcium solus, aut cum aliis est, optimum alimentum. Post primos dies præsertim cū est necessaria instauratio maior , succus gallinæ, aut perdicis cum iure pedum arietinorum, aut vitulinorum citò & multum nutrit, & sanguinem crassiores reddit. Farina orizæ cum lacte benè cocta , aut cum iure pedum, est optima. Denique omnia , quæ sanguinem incrassant , & venarum ora obturant, huic morbo vtilia sunt, vt caseus recens, lentes, pyra, mala cydonja, portulaca, & similia. Potus sit aqua chalybeata, nisi ventriculi, aut totius imbecillitas vino egeat : sit tamen id rubrum , & benè aqua chalybeata dilutum, qua omnia alimenta sunt coquenda. Quies animi & corporis, silentium, & somnus fluxus omnes cohibent.

Reuulsio.

Auertentia.

Secundò, auertentibus à rupta vena, vel aperta , vt sectione venæ internæ cubiti frequenter , vt sexta quaque hora, si opus fuerit , pauco tamen misso sanguine , cum multus per sputum reiectus fuerit: si verò paucus & æger sit pletoricus , largiori. In mensibus aut hæmorrhoidibus suppressis sanguis mittatur per sectionem venarum pedum, aut tibiarum. Auertunt quoque cucurbitulæ coxis, natibus , & inguinibus affixæ, & ligaturæ, & frictio

frictiones dolorificæ, & fœtus ex aqua calida partium infernarum. Calor enim, & dolor trahunt ad se, & hac ratione auertunt à parte affecta.

Tertiò, æquantibus sanguinem & ipsum reducentibus ad *Renoc-*
iustam proportionem quatuor humorum, quibus constitutus *io san-*
est sanguis ipse, vt tenui victu parum nutriente, si fuerit lar- *guinis*
gior sanguis, si acer, biliosus ac mordax, syrupo rosarum, myr- *ad pro-*
tillorum, endiuix S. cydoniorum, & similibus, cum duplo *portionē.*
aquarum, aut decocti, aut succi acetosæ, endiuix, rosarum,
portulacæ, & plantaginis: vt ℞. syrupi rosarum, & acetosi-
tatis citri an. ʒ. iiij. Item ℞. aquarum endiuix, portulacæ, &
acetosæ, an. ʒ. iiij. misce: sumptis his, aut similibus tribus die-
bus, aut quatuor, vacuanda est bilis non scammoniatis, ne-
que aliis valentibus & acris medicamentis purgantibus, sed
astringentibus: vt ℞. medullæ cassiæ fist. recens extractæ ʒ. j.
corticum myrobalanorum citrinorum, & rhabarbari electi in-
fusi per noctem in aqua endiuix an. ʒ. j. syrupi rosarum ʒ. j.
aquæ portulacæ. q. s. misce, & fiat potus. Si pituita fuerit sangui-
ni mixta, rhodomelle, & aqua absinthij fiat concoctio eius, &
euacuatio per myrobalanos, cepulas, vel rhabarbarum, vel tur-
bit siue zinzibere: vt ℞. corticum myrobalanorum, cepula-
rum, & rhabarbari elect. an. ʒ. j. Turbit electi ʒ. ʒ. rhodomellis
ʒ. j. aquæ absinthij ʒ. ij. misce, & fiat potus: quod si malit pilulas:
℞. corticum myrobalanorum, cepularum, & agarici trochisca-
ti an. ʒ. ʒ. cum aqua fœniculi, fiant pilulæ viij. & aurentur, si non
est pauper. Quartò, glutinantibus vlcus, & contrahentibus *Restri-*
oris hiatum, & tandem sistentibus sanguinem: hoc tamen ge- *lio san-*
nere auxiliorum semper est vtendum, & statim cum æger visi- *guinis,*
tur, ne sanguis immodicè fluat: vt portulaca mansa, & ore *aut ve-*
retenta, lapide hæmatite, corallo albo vsto, bolo armeno, *na obtu-*
terra lemina, balaustiis, semine myrtillorum, dragaganto, *ratio.*
gummi Arabico, mastiche, & similibus simplicibus. Sunt quo-
que composita, quæ eadem, aut simili facultate valent, & vasis
hiatum opplent, vt trochisci ex terra sigillata, & trochisci de
karabe, & de spodio: horum singulorum, siue simplicium, si-
ue compositorum ʒ. j. cum aquis, aut syrupus astringentibus
ex dictis potenter astringit, & glutinat: asininum stercus re-
cens odoratum, vel potum, quodcunque sanguinis proflu-
uium sistit. ℞. succi stercoris asinini ʒ. ij. syrupi myrtillorum *Admo-*
ʒ. j. aquæ portulacæ ʒ. ij. misce, & fiat potus: quem bibat *nitio.*
actu frigidum, & omnia alia medicamenta, & etiam alimenta
omnia, si fieri possit. Narcotica medicamenta huic mor-
bo sunt necessaria, etiam in initio, ne subitò pereat æger;

DE CVRAND. MORB.

aut ne fiat tabes, si breui tempore non consolidetur vena: ideoque in hoc sanguinis profluvio Galenus audacter iis vti-
tur, præter tamen trochiscos superius in hoc genere lauda-
tos, qui sunt narcotici, quamvis parum opij sulcipiant, præ-
ter etiam requiem magnam, & athanasiam, quæ sunt narco-

*Narcoti-
ca.*

*Aduer-
te.*

tica composita clementia, cum prædicta non sufficiunt, vten-
dum est philonio Romano, aut Persico, aut Tharsensi ab ℥.j.
vsque ad 3. j. semper tamen his narcoticis, aut similibus non
egent, qui calidum innatum imbecillum habent, ne ab iis
admodum frigidis omninò extinguatur, vt multis contingit,
qui perpetuò dormierunt ex potu narcoticorum; sed trochisci,
qui sequuntur, sunt optimi, & à multis experti in hoc morbo.

℥. acaciæ, balaustiarum, nucis cupressis, gallarum, hypocysti-
dos, nucleorum vix sylvestris, caudæ equinæ, corrigiolæ, myr-
ti, sumac an. 3. ij. thuris, mastichis, myrrhæ, lapidis hæmatitis,
carabæ, santalorum, coralli rubri, sanguinis draconis, terræ sigil-
latæ, boli armenici, aluminis fossi an. 3. v. stercoris asinini sicci,
capræ & leporis, spongiæ combustæ, centaureæ minoris, cornu
cerui vsti, spodij, cupullorum rosarum rubrarum, bedeguar,
rhabarbari tosti an. ℥. iiij. seminis papaveris albi, seminis ius-
quiami albi an. 3. j. corticum mandragoræ, opij castorei, ca-
siæ lignæ an. ℥. ij. croci, camphoræ an. ℥. j. fiant trochisci cum
succis, aut aquâ plantaginis, & portulacæ. Dosis 3. j. cum 3.
ij. aquæ, aut succi portulacæ, aut plantaginis, aut sanguina-
riæ: sed iis non est vtendum, nisi post tres menses, vt mini-

*Obser-
ua.*

mum. In vfu tamen horum, & aliorum medicamentorum, quæ
sanguinem à pectore fluentem sistunt, semper sunt permiscen-
da quæ pulmones & thoracem iuuant, vt electuarium diadra-
gantum frigidum, syrupus de liquiritia, & succus eius, & simi-
lia. Quare hoc medicamentum est huic affectui summiè vtile.

℥. conseruæ rosarum antiquæ 3. ij. gummi dragaganti, gum-
mi Arabici, & cerasi an. 3. iiij. (dissoluantur in aquis portulacæ,
& plantaginis) succi liquiritiæ, boli armenici præparati, terræ
sigillatæ, lapidis hæmatitis, corali præparati, sanguinis dra-
conis, mastichis, thuris an. 3. j. Karabæ 3. iiij. β. syrupi papa-
veris, & myrtilorum an. æquas partes, & quæ satis sint con-
fectioni faciendæ ad modum loch, cuius cochlearium vnum
frequenter teneat æger ore, & sensim transglutiat. Thoraci
admoventur medicamenta actu, & potestate frigida, & re-
pellentia, atque astringentia, eaque sæpe, quales sunt succi,
aut aqua plantaginis, portulacæ, rosarum, solatri, & similes
cum paucis aceto & bolo armeno. Vnguenta frigida, vt cerotum
santalatum est bonum.

Topica.

Quintò, corrigentibus symptomata, præcipuè sanguinis *Grumos* concretionem: ut oxymellitæ S. & compos. dosis sunt ʒ. ij. huic *sanguis* symptomati confert coagulum hœdi, vel leporis ab ʒ. j. vsque *his dis-* ad ʒ. j. cum vino albo. ʒ. j. theriacæ magnæ, aut diacurcumæ *soluen-* cum aqua hyssopi, aut scabiosæ, est etiam optimum auxilium *tia; &* huic symptomati: hoc medicamentum est expertum. ʒ. amy- *expur-* di ʒ. ij. ꝑ. farinæ fabarum, seminum melonum, & malux an. *gantia* ʒ. iij. ꝑ. boli armenici, seminum, cydoniorum an. ʒ. ij. fari- *pectus.* næ hordei sine furfure ʒ. v. gummi Arabici, dragaganti an. ʒ. j. ꝑ. oxymellis S. quod iussit, misce, & fiat confectio ad mo- dum loch, qua sæpè vtatur.

Scholium.

OMnes sanguinis expuitiones.] *Ea quæ in hoc cap. habentur, intelliges ex his, quæ cap. de sanguinis è naribus profluvio diximus. In spuito sanguinis primum curabis symptoma, nèpe eua-* *Quid sit* *primò* *curan-* *dum.* cuationem sanguinis, eo quod urget, & potissimum, si sit ex pectore, tunc enim statim debet sedari, antequàm fiat inflammatio id præstabis sanguinis missione, & victu incrassante, simili etiam medicamento, quale est hoc. ʒ. trochiscorum de karabe, & terra sigillata, an. ʒ. j. ꝑ. lapidis hematitis ʒ. j. conserva rosarum ʒ. j. aqua plantaginis, & capillorum veneris (ut faciat penetrare), q. s. misce, & fiat confectio, cuius assumat ager quantitatem unius nucis cum aqua plantaginis, & capillorum ven. Vltimò, si hac & similia non prosint ad narcotica devenies. Symptomate curato morbo prospicies, siue sit *ulcus, siue ruptio, siue anostomosis.*

Quintò corrigentibus.] Sanguinem concretum *in* *inscin-* *dentia.* *posca*, hoc est aqua & aceto mixtis, & per os assumptis, mulsam *nem cõ-* *etiam & oxymelite, unde non est, quod viaris coagulatis ab auctore* *cretum* *propositis.*

De Empyemate, id est, suppuratione, & tabe.

C A P V T XXIX.

Empyema Græcis, Latinis suppuratio, est affectio pecto- *Descri-* *ptio.* ris eorum, quibus in succingente costas interiùs membrana abscessus, aut in aliqua alia pectoris pellicula factus, acervatim ruptus est, & in vacuum pectoris locum effusus inter pulmonem & membranam costas succingentem. Vnde constat ex non curata pleuritide hanc affectionem *Causa.* maiori ex parte nasci, quod Aph. viij. sect. v. vetustissimus

1 3 Hippo.

DE CVRAND. MORB.

Nota.

*Descri-
ptio &
causa
phthisis.
Nota.*

Hippocrates docuit. Interdū tamen & ex sanguinis eruptione hoc malum oritur, disrupto scilicet vase aliquo in thorace, & ad cicatricem non perducto. Iam & propter confluxum à capite per mutatam anginam in pulmone sæpè fit iuxta aphorismum decimum sectionis quintæ. Ex causis quoque procatarteticis fieri potest, sed rarò. Suppurati sic deprehenduntur, si inflammatio præcesserit, deinde vehementes febres quieverint, & ex magna parte quoque dolor, grauitatis autem sensus remanserit intus in lateribus in profundo thoracis, simulque transfluere aliquid appareat iuxta multiplices reclinacionis permutationes, & maximè cū ab vno latere in alterum decumbunt, tunc sanè multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus sæpè sensibiliter in reclinacionibus ipsorum auditur. Cognoscitur itaque suppuratio facta tum ex prædictis, tum quòd nihil relatu dignum reiecerunt in eo, qui præcesserit vehementi lateris dolore. Sed quoniam vicina admodum affectio huic morbo phthisis est (autore Hippocr. 5. lect. Aphor. 10.) non iniuria de vtraque affectione vno capite ageretur. Dicamus ergo de phthisi aliquid, ut deinceps curationem aggrediamur. Phthisis, pulmonis exulceratio ab omnibus censetur, ex empyemate (ut dictum est) nata, nonnunquam verò & ex defluxu humoris acris, atque erodentis oritur. His autem notis cognoscitur, totius corporis summa adest extenuatio, nares acutæ sunt, tempora collapsa, oculi concaui, scapulæ alarum more prominentes, ad hæc tussunt qui sic affecti sunt, & quod expuitur, foetidum est, & febri corripiuntur hectica, quam insequuntur ea omnia, quæ à Galen. numerantur 1. de differentiis febrium cap. 11. quæ si probè consulas: præter hæc etiam, quæ ab Hippocr. dicuntur Aphorif. 11. 12. & 14. sect. 5. plenam habebis signorum cognitionem ad hanc affectionem dignoscendam. Suppuratio hæc diligenter est curanda, ne fiat vlcus in pulmonibus, & tandem insanabilis morbus ob motum perpetuum pulmonum, eorumque substantiam raram, hecticam febrem coniunctam: quæ sola est incurabilis, si fuerit confirmata. Magis etiam insanabilis est, si sit coniuncta cum vlcere pulmonum, quod indiget mundificatione, & exsiccatione: hectica verò instauratione, & humectatione, quamuis quis tabe laborans agnoscat medicamentum, quo curatur.

*Curatio
suppu-
rationis.*

Curatur suppuratio hæc medicamentis purgantibus pus iam dictis capite de pleuritide in fine, cū terminatur per suppurationem post ruptum abcessum: aliquando tamen vbi magna

magna est copia puris , incisio est faciènda secundùm longitudinem costarum , inter quartam & quintam thoracis mendosas , facta priùs experientia fili actu humidi admoti supra locum, si exsiccat. Sed aduerte , ne totum pus, vel illius magna quantitas extrahatur semel , sed multis purgationibus, quamuis citò & cautè in habitione calida propter conseruationem caloris innati & spiritus. Nostri enim temporibus fuit integræ sanitati restitutus hac curatione quidam nomine Lupus, qui ex vulnere magno parris superioris thoracis in supurationem peruenerat magnam cum febre acuta & maxima difficultate respirationis educto pure per nouam incisionem partis inferioris thoracis non vno die , sed multis , ne vires deficerent.

Observatio.

Historia.

Phthisis , si curari possit , quinque generibus remediorum curatur: Primò, victu refrigerante , & humectante habita ratione hecticæ: si verò spectes vlcus , febris causam (quod priùs & magis curandum esse volunt autores) calido & sicco victu curabis. Sit ergo in actiuis qualitatibus temperatus victus, sed siccior vlceris gratia . ob id Galen. quinto methodi phthisicos ad Tabias mittebat , vbi erat aër siccior , & sanabantur. Sint cibi faciles concoctu , boni & multi sanguinis : quia calor est imbecillus , & corpus macrum : sint etiam tenues & liquidi ob eorum vias siccitas , & contractas , & causâ febris refrigerent parum , & propter vlcus sint apti ad detergendum. Ab his etiam ad consolidandum & glutinandum , quæ omnia insunt lacti , & saccharo rosato. Lac enim facile concoquitur , ac maximè nutrit butyro & caseo , optimi est succi, liquidum quoque est, & subfrigidum , tergit acrimonia feri , & sapore dulci substantiæ butyrosæ alit , glutinat caseo: facultates tamen variæ lactis augentur , vel minuuntur diuersa ratione victus. Refrigerans facultas augetur lactuca , cichorea , endiuia , portulaca , & similibus. Tergens verò vis augetur hordeo , adianto , fœniculo , & hyssopo. Natura glutinosa crescit rubo , lentisco , salice , & similibus. Humanum lac est omnium præstantissimum , omnium tamen tenuissimum est lac camelorum , deinde equarum , post asinarum. Cprarum lac est temperatum , sed vaccarum lac & ouium magis nutrit: Humano tamen lacte nobiliori omnibus, & magis familiari est nutriendus hoc morbo laborans , fugâtque ipsum ab vberibus, dummodo sit sana, & iuuenis lactans, nec candida admodum aut nigra. Bonis quoque nutriatur cibis, fugiat venerem tanquam pestem. Si verò non possit, vt infans lac à mammis sugeret, summo studio ipsum bibat actu

Curatio phthisis. Victus.

Lactis facultas.

Qualia sint omnia fere lactis generum.

*Modus
sumendi
lactis.*

*Lac dis-
suaden-
tia.*

*Lege Ga-
lenum
lib. de
faculta-
alim. de
lacte.*

*Lac asi-
ninum.*

*Sumpto
lacte non
est dor-
miendū.*

*Aqua
prestan-
tissima.*

calidum, calore naturali, quod fiet ingenio astantium in aë-
re temperatè calido. Primò bibat unciam vnam, deinde sen-
sim progrediatur ad 3. vj. vel octo, parum sacchari addendo,
ne coalescat in ventriculo, alij addunt parum mellis, aut salis,
sed ego magis laudo saccharum, dummodò non adsit ven-
tris profluuium, quod prohibet lactis vsum, quemadmodum
& alia multa, vt distillatio à capite, dolor capitis, febris pu-
trida, praesertim ardens, suspensa hypochondria & murmu-
rantia, inimicitia & discordia inter ipsum & aegrum: vbi ta-
men illius vi & ope maximè eget aegrotus, quibusdam dissen-
tientibus oportet eum nutriri, praecedenti tamen aliqua cor-
rectione, vt in ventris profluuiò lac fiat acidum per sex ho-
ras, aut per noctem eductis partibus butyrosis, facta eius com-
motione in vase vitreo, aut terreo quibusdam virgulis & spu-
ma saepè extracta, erit illud lac adstringens, & refrigerans: quem-
admodum est lac, in quo extinguitur quinquies ferrum igni-
tum aut calybs, quo nutriatur sine saccharo. Asininum lac
post humanum eligatur tanquam tenuius, & facilè concoctu,
deinde caprinum, praecipuè ad refrigerandum & tergendum-
quia est serosius. Quinum & vaccæ valentiùs glutinat, & ma-
gis (vt diximus) nutrit: quia butyrum & caseum imitatur. Hu-
manum tamen ad omnia est praestantissimum, si esset eius co-
pia. Non est dormiendum aegro hausto lacte, sed quiescen-
dum, ne lac crudum in corpus trahatur. Quare tunc frictio
cutis maximè noceret, saccharum rosarum his omnibus fa-
cultatibus praeditum est, quamvis recens magis tergat, anti-
quum verò conglutinet, sed de eo in quarto genere remedio-
rum loquemur. Nutrimentum gallinarum iuuenum, capo-
num, perdicum attaginis, hædi, turturis, coturnicis est opti-
mum, & ius eorum cum hordeo, & ciceribus cum amydo, &
cum lacte amygdalarum dulcium, & quatuor seminum fri-
gidorum maiorum, canceri fluuiatiles bene praeparati, simi-
liter limaces, saltem eorum aqua, aut ius bene nutriunt, hu-
midumque gignunt nutrimentum, glutinosum, & tardè disso-
lubile. Testudines, & ranæ degentes in aquis salubribus ma-
ximè laudantur ab omnibus, horum tamen mentio fiet capi-
te de curatione hecticæ lib. secundo. Hæc aqua est optima &
omnibus melior, & huic morbo utilior, omnibusque facul-
tatibus necessariis praedita est. ℞. foliorum lactucæ. m. iij. ca-
pillorum veneris m. j. hyssopi. m. j. liquiritiæ recentis si fieri
possit 3. iij. pulmones duos hirci, aut vituli, pulmonem vnum
vulpis, si reperiatur, carnis cancrorum secundum artem pa-
rata (quam obseruabis cap. de curatione hecticæ secundo
lib.

libro) ℥. iiii. carnis testudinis nemoralis , carnis limacis bene paratæ ana. ℥b. s. carnis ranarum bonarum ℥. iiii. sacchari cãdi ℥. viij. pulueris diadragati frigidi ℥. iij. boli armenici præparati ℥. ij. fiat ex his omnibus aqua instrumento vitreo, & igne paucis: quolibet die summo manè bibat ℥. iiii. illius cū paucis saccharo. Potus sit aqua hordei , & vinum album tenue bene dilutum auctore Rhase , inter Arabes viro multæ experientia. Quidam laborantes tabe persanati sunt solius lactis potu , & si ferrum , aut chalybs , aut lapilli candentes in eo fuerint extincti, erit præstantius, sed ego non laudo permixtionem lactis cum aliis alimentis.

Secundò, abigentibus causas phthisis, quæ si fuerit distillatio, *Causa* curatur , vt diximus capite 25. Si verò vas ruptum , curetur *remotio.* vt diximus præcedenti capite : si humor in pulmonibus erodens , appareatur & vacuetur , vt diximus capite de catharro.

Tertiò , tergentibus vlcus pulmonis dulcibus & amaris *Deter* vt rhodomelle, syr. de liquiritia , syr. capillorum veneris , de *gētia vl-* hyssopo , de prasio , & decocto pectorali , & cicerum solo *cus.* cum saccharo , aut aliquo ex prædictis syrupis. Dosis vnciæ tres , quamvis frequenter & omni hora sensim transglutiendo sit vtile , & necessarium aliquod ex supradictis medicamentis.

Quartò , implentibus carne vlcus , & glutinantibus , hæc tamen propria sunt opera naturæ præcipuè præcedenti debita terfione , vt bolo Armeno , sanguine draconis , & similibus cum syrupo pectorali. Saccharum tamen rosatum : antiquum potenter glutinat ratione substantiæ rosarum , quamvis recens tergat magis , vtrumque tamen nutrit ratione sacchari , Quare recenti opus est, cum vlcus est sordidum , & vetusto, vbi fuerit tersum : hoc multis iam morti proximis fuit sanitas restituta , præcipuè si semper etiam in prandio & cœna eo nutriantur ægroti. Aliqua sunt quæ totius substantiæ proprietate profunt huic morbo , vt pulmo vulpis , pulmo ericij siccatus , ex his & aliis fiat loch , vt ℥. pulueris pulmonis vulpis , & ericij. an. ℥. iiii. pulueris diadraganti frigidi ℥. j. sacchari rosati ℥. vj. gummi cerasi, & Arabici an. ℥. ij. syr. de liquiritia. q. s. misce & fiat confectio , ad modum loch. Est etiam herba quædam nobis incognita , qua ovis curatur , ipsamque naturali cognitione inquit, & amat , vt autoritate Democriti aliqui scribunt.

Sarcotica, vel carne vlcus implentia.

Quintò , corrigentibus symptomata , vt alui profluvium, *Corre* de quo capitibus 36. 37. & 38. dicemus. Fit tamen hoc sym- *ptio sym-* ptom *ptomati.*

ptoma ab imbecillitate facultatis retentricis, & concoctricis ventriculi, & aliarum partium: pulvis diarhodonis Abbatis est optimus, & in vsufrequenti, emaciationem laborantium phthisi corrigunt aqua carnis, iura optima, dicta primo genere remediorum, & alia, quæ dicemus capite de hectica, libro secundo. Si verò fuerit confirmata & antiqua phthisis, insana- bilis est, blandè tamen tractanda, & callus excitandus per sic-

Historia cantia. Vixit enim quænam furnaria phthisica viginti octo an-
annota- nis, inspirato sæpè aëre sicco furni.
da.

Scholium.

Dua em **E** Mpyema Græcis.] Empyema à Latinis suppuratio dicitur:
pyematis hac duobus modis sumitur, ex 7. aphor. commun. 44. primo pro
signifi- mutatione in pus, in qualibet contingit parte, quæ ratione Hippocr.
cationes. libr. prædicto sent. 45. hepar suppuratum appellat, & primo pro-
 gnost. sent. 36. suppuraciones foras urgentes, bonas, contrarias ma-
 las scribit. De his etiam suppuratis intelligenda sunt signa, quæ 2.
 progn. sent. 60. ab Hippocrate traduntur. Secundo modo sumitur
 suppuratio propriè, pro ea collectione puris, quæ fit in thoracis ca-
 vitate, & pulmonis asperis arteriis. Altomarius ex Gal. libr. 5.
 aphor. commun. 8. & 2. progn. commun. 60. tertiâ significationē scribit sup-
 purationis, quæ suppuratio dicitur mutatio in pus earum tantū in-
 flāmatum, quæ in pectore continetur. Nos tamen rē consideran-
 tes, ex illis Galeni locis diuinas tantū suppuracionis significationes

Altoma- scripsimus, & sic non est hac in parte sequendus Altomarius. Hac
rius re- puris collectio solet fieri ex pleuritide, & peripneumonia, cum ad
prehen- suppuracionem veniunt, & rumpitur abscessus: tum ex distilla-
ditur. tione pituita à cerebro, in qua reuerà pituita non venit ad suppu-
 rationē, cū nec possit nutrire, nisi prius mutetur in sāguinē, mutatur
 tamen in similē puri substantiā, ut patet ex Galeno 7. aph. commun. 30.

Phthisis Phthisis (quæ à Græcis Atheniensibus dicitur ptōis à verbo
unde di- phtheiro, dicitur, quod est corrumpo, aut absumo, & proinde à Lati-
catur. nis dicitur Tabes, quæ consumptionem significat. Inde duplex
 phthisis significatio exorta est, quam scribit Gal primo epid. par. 2.
 commun. 13. una & prima significat quamlibet corporis extenuatio-
 nem, siue ex defectu alimenti quæ atrophia dicitur) siue ex febre
 hectica, siue ex pure in thorace contento, aut ex quavis alia causa
 ecunda exsiccante contingat. Secunda propriè tabes significat eam corporis
 abis si- extenuationem, quæ sequitur ad insanabilia ulcera pulmonis. Un-
 de mira- de mirandum est de Altomario, & aliis, cathechiam Tabis spe-
 ti- ciem facientibus, cum homines cathectici non sint extenuati, nu-
 Quid sit. triuntur etenim, quamuis malè. Quod si Hippocrates in epid.

miis aliquos natia tabe laborasse scribit, per tabem nullā ex dictis natia intelligit, sed tantum inclinationem ad ipsam, quæ repetitur in his, tabes. qui caput habent languidum, ita ut facile impleatur, & ad pulmonem fluxiones mittat, primo epyd. part. 1. com. 18. tum & in his, qui angusto constant pectore, non quia habent pulmones languidos, & qui facile corrumpuntur, ut malè voluit Fernelius: sed quia humores, in loco angusto inclusi non rectè diffiantur, & sic facile putrēt.

Curatur suppuratio hæc.] Empyema morbus est in numero addito, est enim in thorace addita pars toto genere præter naturam, nõ necessaria ad actionem, imò quæ causa est actionis læsa. Debet ergo morbus auferri, hoc est, pus debet euacuari tussi, ut locus, in quo continetur, sit nobis indicat: assumi tamen debent medicamenta, quæ ipsum attenuant. Et ideo summo mane assumere poterit ager mel despumatum, aut puluerē iridis cum mulsæ, aut sequentia duo medicamentata. Primum ℞. syrupi de hyssopo ℥. iij. syrupi violarum & oxymellis scillitici ℥. ss. misce. Secundum ℞. loch caulium, loch sanum & expertum ana. ℥. j. succi liquiritiæ ℥. iij. pul. diairis & diappendionis an. ℥. j. ss. conscrua capillorum veneris ℥. iij. cum oxymelle scillitico, & syr. violarum, quod sat est, misce, & fiat loch. Quod si pus ex inflammatione rupta sit, quod continetur in thorace, post puris expurgationem cicatricem inducemus exiccantibus, qualia sunt. 3. j. sulphuris cum melle, aut miscebis cum ouo, aut decocto scordij sulphur, aut eiusdem scordij puluerem. Aut bolum armenum cum melle, vel decocto scordij mixtum exhibebis. Suffumigium etiam facere oportet ex sandaracæ arabum, thure, & mastiche, aut ex tussilagine, quæ est ungula caballina officinarum. Si pus prædictis medicamentis non expurgatur, ad sectionem deuenies: quamuis ferè hi omnes moriantur.

Phthisis si curari possit.] Pulmonis vlcus tunc curari potest, quando cum non habet inflammationem coniunctam, ea enim præsentem, im- possibile est ipsum curare, ob causam à Gal. propositam s. method. c. 8. in quo etiam capite habes curationem vlcus pulmonis. Fre- quenter autem solet euenire corporis extenuatio ex materia, & tho- race in puris similitudinem mutata, & à capite distillante, quam tabem improprie appellamus. Cognosces autem hanc materiam non esse pus, quia in his hominibus neque inflammatio interna, neque profluvium sanguinis præcessit. Oportet autem hanc diligenter curare quia febrem excitat putrem, in qua moriuntur agri: hac tabe mortuus fuit Antiphonis filius 7. epyd. sent. 27. Curabitur prius distillatione prospiciendo illis, quæ c. de catharro diximus: extenuanti etiam victu, & medicamentis, quæ inscindunt humorem crassum. Purgabimus etiam pituitosum excrementum pilulis de agarico, & aliis.

De Palpitatione cordis, & syncope.

CAPVT XXX.

*Descri-
ptio.
Causa.*

Palpitatione cordis, seu tremor (quam recentiores medici male cardiacam appellant, motus cordis deprauatus est, nimirum dilatatio eius præter naturam. Fit palpitatione propter inclusum vaporem crassum, ac multum. Hæc enim est generalis causa omnium palpitationum, cuiuscunque fuerint loci, ut docet Gal. 5. de symptomatum causis: quamvis quinto de locis affectis scribens causas affectuum præter naturam cordis, & ventriculi de huius affectus causis, porro inquit utriusque partis, tum oris ventriculi, tum cordis dispositiones aut forti duntaxat intemperie, aut venenoso humore, nonnunquam ab erisipelate, aut inflammatione, aut aliquo præter naturam tumore fieri solent.

*De syn-
cope, eius-
que de-
scriptio-
ne, &
causis.
Nota
palpita-
tionis
cordis.*

Ab iisdem causis, sed maioribus fit syncope: quæ est (autore Galeno lib. 12. method. præceptis virium lapsus, qui sæpè à causis externis accidit, ut à dolore, timore, ira, & terrore, & vacationibus maximis, vigiliis, & inedia, & aliis multis, quæ vires dissolvere valent. Deprehenduntur hæ affectiones, palpitatione quidem, ex agroto euidenter sentiente hoc malum, & ex pulsu, qui in causa calida velox est, & aliquando cum febre: in frigida, contrarium apparet. Si ab humore intra pericardion collecto palpitatione cordis fuerit, pulsus est mollis, & languidus.

*Nota
synopes.*

Cognoscemus syncopen ex pulsu maximè languido, & deficienti: ex frigore extremorum, & colore faciei albo, & exanguio, ex sudore frigido, & priuatione sermonis & motus totius. Quando per consensum ventriculi fit syncope, sentitur prius dolor in ipso ventriculo, & grauitas, & sæpè nauica, ac vomitus cum angustia præcedit, de quo capitibus sequentibus agemus.

*Curatio
palpita-
tionis.*

Curatur palpitatione cordis quinque remediorum generibus. Primò, victu, si causa calida est, refrigerante, ut aëre refrigerato rosas, santalis, aceto, violis, nenuphare, myrro, addito vino, & ambra, ut frigida promptius penetrent ad cor. A causa verò frigida, calfaciente, ut aëre commutato, & alterato rore marino, maiorana, basilicone, saluia, moscho, ambra, melissa, & similibus. In his cordis morbis ratio aëris præcipua est habenda. Mox enim penetrat ad cor inspiratus aër. Cibi sint boni succi, & faciles concoctu, refrigerati in calida, acetosa, aceto, agresta, succo malorum medicorum (vulgò naranjas vocant) limonum, & citrorum: & in frigida causa, maiorana calefacti, basilicone, rore marino, fœniculo, & simili

Victus.

humilibus. Vinum in hoc est optimum, sed in calida vitetur, præcipue generosum, & vaporosum: dilatum tamen aqua hordei, aut rosarum vel alia refrigerante confert, in omni tamen causa, si ventriculus sit imbecillus, bibat vinum, aut aquam cinnamomi.

Secundò, sanguinis missione, præsertim si fuerit à sanguine, *Renul-*
& æger carnosus, per sectionem iccorariæ dextræ, non vnā *sio.*
tantum, sed plures, si non fuerit senex. Si verò fiat à flatu im-
plente ventriculum sinistrum cordis, secunda est basilica fini-
stra, & parè sanguis mittendus.

Tertiò, apparantibus materiam crassam tenuantibus, & ca- *Prepa-*
lidam frigidis, eius acrimoniam remittentibus: sed tam cali- *ratio.*
dis, quàm frigidis moderatis: ne offendatur cor pars princeps, *Consi-*
& fons vitæ. Quare in causa calida medicamentis frigidis *lium.*
aliqua aromata calida sunt miscenda, vt eorum frigiditas im-
modica reprimatur: & vix etiam frigida mista calido medi-
camento promptius (vt dixi) ducatur ad cor. Optimè igitur
trochiscis de camphora additur crocus, & alia quædam ca-
lida secundum quosdam: quamuis calida sit officinarum cam-
phora. Calida ergo materia apparatus per duos aut tres dies sy- *Cāpho-*
rupo violato, rosato, endiuix simplicis & comp. & in magna ca- *ra nostra*
lidityte syrupo acetositis limonum, aut citri cum aquis aut de- *calida*
cocto rosarum, endiuix, portulacæ, lactucæ, plantaginis, ne- *est.*
nupharis, & similibus. Frigidam verò, & pituitosam incidunt,
& tenuant mel rosatum colatum, syrupus de hyssopo, oxymel
S. & com. syrupus de duabus & de quinque radicibus cum aquis
sceniculi, melissæ, betonicæ, scabiosæ. Hæc materia eget ma- *Aduer-*
iori concoctione, quæ non fiet tribus tantum diebus, nec for- *te.*
san sex: quamuis ob loci nobilitatem vacuatio sit facienda ali-
quando non expectata concoctione. Materiam melancholi-
cam concoquere valent ea, quæ diximus i. cap. vt sunt syrupus
borraginis, buglossæ, fumaricæ S. de pomis, de epithymo, &
syrupus fumaricæ compos. cum aquis buglossæ borraginis, me-
lissæ, & sero caprino. Sed hæc terrestris materia eget magna
concoctione.

Quartò, vacuantibus materiam calidam medicamentis *Purga-*
cholagogis, de quibus diximus cap. i. sed in hoc affectu sem- *tio.*
per sunt miscenda cardiaca, & raro conueniunt scammonia-
ta, quia nocent cordi, nisi benè correcta: & quando clemen- *Obser-*
tia non sufficiunt: vt ℞. rhabarbari electi infusi per noctem *ua.*
in aqua endiuix ℞. iij. medullæ cassiæ silt. recens extractæ,
aut mannæ electæ ℞. j. syr. borraginis ℞. j. decocti florum cor- *Calida*
dialium. q. s. misce, & fiat potus. Si sit materia pituitosa, hoc *causa.*
aut

DE CVRAND. MORB.

*Melan-
cholia
materia.* aut simili medicamento vacuabitur: ℞. agarici trochiscati ℥. iiij. corticum myrobalanorum chebulorum 3. j. diacatholiconis 3. vj. rhodomellis 3. j. β. aquæ fœniculi, q. s. misce, & fiat potus. Si verò sit materia melancholica, hoc aut simili medicamento vacuetur: ℞. corticum myrobalanorum indorum 3. j. β. pulueris epithymi 3. j. seri caprini 3. iiij. misce, & fiat potus. Quandoque necessarium est, laborantem cardiaca biliosa vacuare 3. iiij. diaprunis solutiui cum aliis iam dictis, & laborantem pituitosa 3. iiij. electuarij indi maioris: & melancholica cardiaca. 3. iiij. confectiōis medicamenti hamec cum cassia aut manna, quando humores redundarint.

Auersio. Quintò, auertentibus materiam à corde ad partes ignobiles. præsertim vrgentibus symptomatis, & in ipsa accessione, vt secta vena malleoli, præsertim in mensibus detentis, aut hæmorrhoidibus, & vinculis dolorificis; & foribus partium extremarum, clysteribus, & cucurbitulis.

*Corro-
boratio,
& alte-
ratio.* Sextò, corroborantibus cor, & ipsius intemperiem corrigentibus, sumptis, vel admotis. In calida sumantur ex simplicibus, spodium rosæ, violæ, nenuphar, acetum, corallus, succus limonum, succus citri. Ex compositis electuarium diarhodonis Abbatis, diatrium santalorum, diamargaritonis frigidi, confectio de hyacintho, confectio Gentilis cordialis contra melancholiam, conseruæ acetosæ rosarum, & violarum. Sæpè enim his & similibus vti debet multis diebus summo mane: accipiat 3. iiij. electuarij diarhodonis Abbatis, aut diamargaritonis frigidi cum 3. iiij. aquæ acetosæ, aut syrupi rosarum, aut alio ex prædictis liquidioribus. Accipiat si diues sit omni hora in hac cardiaca cochlearium vnum huius confectiōis cum pauca aqua rosarum aut acetosæ, aut alia simili. ℞. conseruæ rosarum, & acetosæ an. 3. j. confectiōis de hyacintho, & Gentilis cordialis contra melancholiam an. 3. β. pulueris diarhodonis Abbatis, & diamargaritonis frigidi an. 3. ij. margaritarum electarum, & ossium de corde cerui an. 3. j. foliorum auri numero ij. syrupi acetositis citri. q. s. misce, & fiat confectio: adde musci & ambræ an. ʒ. iiij. Cordi ad-
*Sumēda
S. & cō-
pos. re-
frigerā-
tia.* moneatur sæpe hoc epithyma, aut simile, in hyeme actu calidum, & in æstate aut frigidum, aut remissè calidum: ℞. aquæ rosarum 3. liij. aquæ acetosæ 3. ij. aquæ melissæ, & vini albi odoriferi an. 3. j. pulueris diamargaritonis frigidi, & trochiscorum de camphora an. 3. j. croci puluerizati ℥. β. misce, & fiat epithyma. Sacculus hic cordi semper adinotus, est optimus in hac calida cardiaca. ℞. florum nenupharis, rosarum, violarum, & buglossæ an. 3. ij. pulueris diamargaritonis
*Admo-
nenda
refrige-
rantia.
Epithy-
ma.*

Diuiti. Sacculus hic cordi semper adinotus, est optimus in hac calida cardiaca. ℞. florum nenupharis, rosarum, violarum, & buglossæ an. 3. ij. pulueris diamargaritonis
*Saccu-
lus.* frigi

frigidi 3. j. ꝑ santalorum omnium an. ʒ. j. musci , & ambræ an. ʒ. v. fiat sacculus ad formam cordis, seu scuti cum sindone coccinea. Si tamen fuerit pauper, epithyma ex sola aqua rosarum *Pauperi.* cum aceto & croco, erit optimum ad corroborandum. Simili- *Odorife-* ter in omni palpitatione cordis odor succi pomorum, aquæ *ra pro-* rosarum, & nymphæ cum paucis vino albo & musco simul *sunt.* cum ambra potenter corroborat cor. In frigida sumantur cali- *Sumen-* da simplicia cardiaca, & composita, vt buglossa, melissa, ze- *da cale-* doaria, doricum, cortex citri, crocus, moscus, ambra, & *faciētia.* similia composita, vt diamoschus dulcis, & amarus, electua- rium de gemmis, diamargaritonis calidi, confectio Alkermes, & similia: multis diebus ventriculo vacuo accipiat 3. iiij. ele- ctuarij diamargaritonis calidi, aut electuarij de gemmis cum ʒ. ij. aquæ melissæ, aut basiliconis, aut alia similia. Omni hora accipiat cochlearium huius aut similis confectionis. ʒ. the- riacæ de citro, & diamusci dulcis an. ʒ. j. confectionis Alker- mes 3. iiij. conseruæ buglossæ ʒ. ꝑ. pulueris diamargaritonis calidi, & electuarij de gemmis an. 3. ij. margaritarum electa- rum 3. j. foliorum auri numero iiij. syrupi buglossæ. q. s. misce & fiat confectio. Hoc epithyma in hac frigida cardiaca est optimum: ʒ. aquæ melissæ, & buglossæ an. ʒ. iiij. vini albi odoriferi ʒ. j. pulueris vtriusque diamargaritonis an. 3. croci puluerizati, & coralli rubri præparati an. 3. ꝑ. musci & ambræ an. ʒ. iiij. misce, & fiat epithyma. Hic sacculus, aut similis est optimus in hac cardiaca ʒ. florum buglossæ, citranguli, & coriandri præparati an. 3. ij. corticis citri, caryophyllorum, cin- namomi, zedoariæ, doricæ, basiliconis an. 3. j. ꝑ. rosarum 3. j. musci, & ambræ ʒ. v. fiat ex his puluerizatis sacculus ad for- mam cordis cum sindone coccinea. Si fuerit hæc palpitatione à vermibus, capite 51. dicemus de ea. Si autem à veneno, oportet scire per proprias notas veneni speciem, & naturam, vt propria medicamenta cardiaca exhibeantur. Sed hæc ab Italis & Romanis tractantur frequentius, cum apud eos multi vene- no pereant. Lege tamen librum de venenis doctoris Santes & Ordenies. Lege etiam Alexipharmaca Nicandri, & eiusdem antiquissimi medici, & poetæ librum quoque de theriaca vti- lissimum, quem noster ciuis & amicus doctor Petrus Iacobus Steue fidelissimè interpretatus est, doctissimisque expositioni- bus illustrauit.

*Confectio
Admo-
uenda.*

*Epithy-
ma.*

*Saccu-
lus.*

*Sifuerit
à vene-
no pal-
pitatio.*

Syncope curatur primò per asperisionem faciei, & aliarum nudarum partium aquæ frigidæ, præsertim rosatæ. Prohibet enim hoc remedium spiritus resolutionem, dummodò non proueniat syncope à causa frigida, vel alui profluuium: tunc

*Curatio
syncopes
Admo-
uenda.
maxi-*

DE CVRAND. MORB.

maximè noceret aquæ frigidaë inspersio, sed cum est ab æstu, aut febris incendio spiritibus resolutis, saluberrima est aqua frigida, aut rosata sola, aut aceto faciem ægri aspergere, & nutrire spiritus bonis odoribus naribus admoris, nisi sit syncope ab vteri præfocatione: quia tunc odora naribus admota nocerent, ut dicemus capite de vteri præfocatione. Spiritus tamen intus in corde quasi conculcati, quod sæpè contingit in hoc morbo, reuocandi sunt ad partes externas frictionibus, & ligaturis partium extremarum, & cucurbitulis, & euellendo pilos, & naribus auribusque dolorem inferendo, ne fiat subita strangulatio. Si syncope fiat ob spiritus resolutionem post sanguinis vacuationem, aut alui fluorem, aut aliam euacuationem, nocent maximè, quæ dolorem inferunt, & quæ reuocant spiritum ad partes externas: odora tamen omnia sunt optima & necessaria: auctore enim Gal. com. 11. secundi libri Aphor. quæ citò nutriunt, sunt liquida, vinum citiùs, & omnium maximè & celerrimè sunt odores, ut hæc optima mixtura: ℞. aquæ rosatæ ℥.iiij. aquæ florum aranciorum ℥.ij. vini optimi albi, & succi pomorum redolentium an. ℥.j. musci, & ambræ an. ḡ. vij. misce, & sæpè naribus & faciei admoueatur parum huius mixturæ. Nutriatur aqua carnis gallinæ iuuenis, aut capri, & perdicis, & arietis, quàm nostri Valentini Destillat appellant. Hæc enim celeriter nutrit, ac subitò fermè in sanguinem & spiritum transmutatur: ideòque à multis laudatur, tanquam vltimum & maximum alimentum ad cordis & totius corporis imbecillitatem. Quæ cor corroborant, spiritumque vitalem instaurant, vel saltem perfectiorem efficiunt, multa sunt, de quibus dictum est superius hoc capite. Curatio syncopes, quæ ab aliis fit causis tradita est à Galen. 12. methodi, & 1. de arte curatiua ad Glauconem, & nos in curatione aliorum morborum eam trademus.

Victus.

Admonitio.

Scholium.

Palpitatio cordis. **P**alpitatione cordis.] Palpitatio cordis est dilatatio eius, & compressio præter naturā. Hic autē motus non fit à facultate, quia pulsus diceretur. Sed à flatu exitum quarente. Vnde est symptoma, quod refertur ad actionem læsam, est enim motus deprauatus. Hinc apparet error Hollerij in suo lib. de curandis morbis c. 27. & Iacotij Iacotius scholio: existimantium palpitationē cordis fieri ab excretice facultate cordis, conantes expellere id, quod molestum est: hac enim ratione palpitatione nō esset motus à solo morbo factus, quod falsum esse intelli-

intelliget, qui c. 2. de symp. causis perlegerit. Quod motus, pal-
 pitationis, qui violentus est, & partis causa, simul & mollis, fiat ab
 spiritu, celeritas dilationis eius, & compressionis ostendit: cuius hu- Causa
 mor causa esse non potest. Palpitatio cordis fit ab spiritu crasso, in palpita-
 eius sinu contento, & exitum quarente. Hic aut ibi generatur, aut tionis.
 aliunde ascendit. Si ibi generatur, palpitationem (qua est affectus
 proprius) generat. Si aliunde ascendit, ex utero, ventre, aut alia
 parte, fit palpitatio per consensum. Dices, nonne est tertia palpi-
 tatio, qua fit ab humore in pericardio contento, quam Gal. 5. de loc.
 affect. c. 1. palpitationem cum significatione appellat? Respondeo,
 hanc esse palpitationem propriam, cum in ea, ab spiritu genito in
 pericardio (quod à corde non distinguitur) cor dilatetur. Dicitur au-
 tem cum significatione fieri, qui fit cum Typo, hoc est, cum signo ma-
 nifesto, ab humore enim in pericardio incluso cor comprimitur, ita
 ut in principio palpitationis sentiant agri compressionem, quā nos
 etiā ex pulsu deprehendere possumus. Quacunque ergo ratione cō-
 tingat palpitatio cordis, semper fit ab spiritu flatulento, in corde de-
 tento: qui paucus non est, nā in viscere calido statim discuteretur,
 sed multus, ita ut aliquādo suffocationē ferē inducat caloris, & sic
 animi deliquiū, & syncopē, & aliquando omninō, suffocato calore,
 mortē. Quod cū cōsideraret Gal. lib. 5. de loc. affect. Omnes hos ante
 quinquagesimū annū mori scribit. Cū palpitatio omnis ab spiritu
 fiat Gal. 2. de cau. symp. c. 2. omnē partē palpitantem esse refrige-
 ratā colligit. Si enim multū calida est, vaporē excitabit, & discu- Morbus
 tict, si multū frigida non eluabit vaporē: debet ergo esse frigida, in pal-
 sed parū. Ex his habebis palpitationē cordis sequi morbū similarē, pitatio-
 nēpe intēperiem frigidā. Hæc in palpitatione, qua est proprius cor- ne.
 dis affectus, in ipsomet corde consistit, ac in ea, qua est per consensū,
 in parte humorē generante. Aduerte tamen, cor refrigerari, aut in
 propria essentia, aut (quod ut in plurimū contingit, aggrauatione
 caloris, facta à multo humore, tunc enim calor cordis, comparatio-
 ne facta ad illum humorē, dicitur diminutus, ita ut non possit va-
 pores ex exco elenatos discutere. Flatus autem materia est humor
 potissimū crassus, qualis est in melancholicis. Ut syncopes essentia Primū
 intelligatur, aliqua oportebit supponere maximē necessaria. Pri- supposi-
 mū est, vires nostri corporis esse positas in natura partium solidarum tum ad
 carnosarū, & spirituosarū: ita ut partes carnosæ, & solidæ, sint syncopes
 actionū principia, at spiritus, instrumenta. Secundum est, prædicta- essentiā.
 rum partium naturam postulare quantitatem, seu molem elemen- Secun-
 torum, & debium qualitatum temperamentum, si vires debent esse dum.
 valide, & actiones firmæ. Tertium suppositum est, etsi vires in Tertiū.
 natura omnium corporis partium, posita sint potissimū, tamen in tri-
 bus, quæ principes dicuntur (corde, cerebro, & iecore) consistunt: ab his

m. enim

enim corpus gubernatur. Quod quamvis ita sit, præcipuè vitam in corde collocamus, quia in eo generatur materia (nempe spiritus sanguis à qua calidum innatum, quod est vita instrumentum in toto corpore conseruatur: & idè nemo potest mori quin cor cesset agere. Ex his, quod quarimus, facile inuentum erit. Si enim vita in quantitate, & qualitate partium præcipuarum, & maximè cordis sedem habet, tunc labentur vires, cum aliquas ex dictis partibus (& potissimum cor, quantitate deficiet, aut qualitate alterabitur. Animi igitur deliquium, & syncope, nil aliud sunt quàm virium lapsus. Quod si inter hac est aliquod discrimen, leue tamen positum in ratione maioris & minoris: ita ut animi deliquium via sit ad synco-

Quid pem. In animi enim deliquio sentiunt agrotantes vires deficere (& syncope, hic est eius terminus) non autem in syncope: in ea enim cum maior & animi affectus, nec sentiunt, nec mouetur: quamvis possit esse syncope sine animi deliquio præcedente. Obiiciet quis, si animi deliquium, & syncope, sunt passionis cordis, qua ratione affectus eos ex actionibus factis animalis distinguimus, in animi deliquio sentientes defectum sensus, & motus voluntarij, non autem in syncope? Respondco aliorum sententias emittens, reuerà animi deliquium, & syncope, affectiones esse cordis, consentire autem ad eas cerebrum, ex defectu enim spiritus vitalis generari non potest animalis, & hac ratione eam cecidere, qua cum habeat actiones nobis manifestas, proinde ex illis affectiones cordis colligimus. Qua cum ita sint, eadem ergo erunt syncope, utriusque affectionis (animi deliquij, & syncope) causa, consistentes & animi in illis rebus, quæ dissipant substantiam partium, aut spirituum, aut mi deliquij. earum euertunt temperamentum: toto temperamento operantia, ut venena, aut qualitate manifesta, ut qua calore, frigiditate, humiditate, aut siccitate agunt. Hac ratione in cholera morbo, diarrhæa, dysenteria, lyenteria, muliebri profluvio, sudore, animi pathematis, in quibus sanguis ad externa mouetur magna medicamenti purgantis euacuatione, & similibus, ob substantiæ spiritus dissipationem fit animi deliquium, sicut in marasmo, ob dissipationem substantiæ solidæ. In cruditate ventriculi fit animi deliquium, ab intemperie calida cordis per consensum genita, sicut in bulimo à frigida: in apoplexia verò, antequàm præhendat, in principiis accessionum, in magnis inflammationibus viscerum, gangræna, & in illis animi pathematis, quæ habent motum ad interna, animi deliquium ab intemperie frigida ex suffocatione caloris orta prouenit. In balneo auctoris, & sole, animi deliquium ex intemperie & dissipatione spiritus & aliorum ortum habet. Atque hæc sunt alterationes manifesta prædictum generum præstantes affectum. Præter quas, in venenum, quod qualitate occulta, elicitur. hoc est toto temperamento alterando animi defectum inducere solet.

Curatur palpitatio cordis.] Nescio quid in mentem venerit auctori,

auctori, & aliis practicis, in curatione palpitationis distinguuntibus, videtur in an fiat palpitatione à causa calida, an à frigida: quia siue loquatur hoc affectu à causa efficiente, siue materiali, semper est frigida ut diximus. Ac etiam. proinde ipsis omissis, perpetuò vitus rationem attenuantem hoc affectu administrabis ex aqua humores tenues generantur: & semper fugies alimenta melancholica.

Secundò, sanguinis missione.] Hoc in loco distinguere videtur Labitur auctor palpitationem à flatu ab ea, quæ à phlegmone fit: quasi sit auctor. palpitatione sine flatu. In palpitatione ergo omni sanguinem mittes. Sanguis. Si causa eius sit plethora grauens, ut euacuemus, si cacochimia ob nis mixtum sanguinis, cum quo multa cacochimia portio educi solet, & sic. sic reuelli à loco affecto. Obiicies eam palpitationem, quæ ex humore in pericardio contento ortum habet, in qua non debemus sanguinem mittere, ut euacuemus, quia non fit à plethora: neque ut reuellamus, quia non fit à cacochimia venarum. Respondeo esse sanguinem mittendum in ea, ut euacuemus, nam cum illa aqua exciderit à venis, poterit iterum ad eas remigrare: vel possumus dicere, sanguinem mitti ob reuulsionem, quia vacuato humore ex venis, non descendet ad pericardion. Si fiat sanguinis missio, ut reuellamus, & euacuemus, ex brachio aut saphena. Quod si sint suppressi menses, non est tunc eorum habenda cura, quia palpitatione urget.

Tertiò apparantibus.] Materia palpitationis, cum ut plurimum Syrupi. crassa sit, melancholia scilicet, postulat attenuantia, qualia sunt Syrupus de bizantiis, endiua compositio, oximel, rhodomel, cum decocto melisse, thimi, & similibus. Vnde distinctio auctoris de causa calida aut frigida omittenda est, nunquã enim fit à materia calida.

Quartò vacuantibus materiam.] Malè auctor in palpitatione Aucto- cordis utitur medicamento purgante bilem, cum hac non sit causa ris lap- palpitationis. Purganda ergo erit pituita, aut melancholia. sus.

Sextò, corroborantibus cor.] Cum palpitatione cordis à flatu Dissipã- fiat, ut diximus exteriùs, & interiùs, ea quæ ipsum dissipare pos- tia fla- sunt, utilia erunt. Exteriùs, thoraci ea parte, quæ respicit cor, ap- tum. plicandi sunt sacculi parati ex rebus calidis, qualia sunt cinna- momum, camemelum, cariophylli, & similia, quæ extenuandi ha- bent vim. Hoc medicamentum optimum est. ℞. foliorum roris mari- ni, thimi. & saturæ an. ʒ. j. melissæ. ʒ. j. s. cinnamomi, & cario- phyllorum an. ʒ. j. rosarum siccarum ʒ. iij. musci, ambra an. ʒ. iij. fiat ex omnibus pil. tenuissimus, ex quo fiat sacculus. Per os simili- ter confectio Gentilis contra melancholiam, & alia flatum discu- tientia, assumenda sunt. Ex his presenti loco multos auctoris erro- res animaduertes, primum, cum exteriùs, & interiùs iubet assumi, & applicari medicamenta quæ frigida sunt, sentiens cum multis aliis palpitationem cordis geri ab eius seruire. Secundò construens

DE CVRAND. MORB.

Nota illas cardiacas cofectiones ex margaritis, ossibus, gemmis, pulueribus multos frigidis & aliis, quæ augent materiã flatibus, & eiusdem dissolutionem impediunt. Tertium, palpitationẽ quandam à vermibus factã auctoris nobis vendens, cum talis non extet, sicut nec palpitatio à veneno. errores.

Syncope curatur primò.] Syncopem curamus aut in accessione, aut extra accessionem. Cùm in accessione eam curamus, tunc solius symptomatis habemus rationem, quo tẽpore cum calor sit in partibus internis inculcatus, modis omnibus nitimur eum exterius euocare leuiter fricantes, & maxime eam, quæ est in ore ventriculi, quia veram hac iucunda frictione calor natiuus excitatur. Nares etiã compri- curatio- mimus, quia tunc ob usum respirationis excitatur facultas, & calor nem. roboratur. Oderare etiam facimus vinum, ut spiritus reficiantur, propter quam etiam causam inspergimus frigidã aquam supra faciem, hæc enim excitat facultates naturales sopitas in syncope. Cùm extra accessionẽ syncopem curamus, tunc non symptomati prospici- mus: sed morbo, à quo pendet, quæ ratione prauimus syncopem. Si ergo syncope omni spiritu dissipato, ipsum reficiemus vini potu, qui celerrimẽ id præstat, si non sit interna inflammatio, delirium, capitis dolor, aut febris cum cruditate ventriculi. Vinum autẽ in regione, ætate, & tempore frigidis calidum, in contrariis frigidum exhiben- dum est, remedia etiam adhibenda sunt causa, quæ dissipat spiritus. Si syncope euenit, ex substantiæ solida euacuatione, alimentis boni succi, & facilis concoctionis impeditur. Si intemperies eius est causa, contraria intemperies, si venenum, alexipharmacum medica- mentum proderit. Quod si intemperies syncopem generans à mul- titudine fiat, sanguinem mittemus. Atque hæc sunt medicamenta Quæ me- dicamẽ- ta car- diaca. cardiacæ verè, non illa quæ à barbaris medicis, & eorum sequaci- bus cordialia appellantur, ex auro, argento, gemmis, terra, lapidibus, & ossibus indiscriminatim in omni morbo constructa.

De imbecillitate ventriculi, & de dolore
& inflammatione eiusdem.

CAPVT XXXI.

Q Vanquam quælibet ventriculi læsio imbecillitatem gi- gnit, ea tamen, quæ in coctione est, etiam si valida sit appetentia, dicitur ventriculi imbecillitas. Quo affectu labo- rantes stomachicos appellant medici, quemadmodum & he- paticos Gal. nominat 6. de symptomatum causis eos, qui im- becilla coctione iecinoris infestantur. Hæc coctio, ut quæli- bet alia actio, tripliciter læditur, ut diximus, Gal. autore 3. de symp. diffe. cap. 80. artis medicinalis: quia vix, aut quia vi- tiöse, aut quia nullo modo: vltimum symptoma dicitur a Græ- cis,

cis, Apepsia, & Latinis cruditas: duo priora dicuntur homonymos, mala scilicet concoctio ventriculi: quæ si tarda sit, cruditas quoque dicitur, ita ut cibi vix propriam suscipiant transformationem, & hæc à Græcis dicitur bradypepsia, de qua in præsentia agimus. Si verò omninò corrumpatur cibi, ut nullam bonam coctionem admittere possint, sub mala & vitiosa coctione comprehenditur, quamvis nullum proprium habeat nomen: Tarda concoctio fit, quia cibi difficulter concoquuntur, ut quòd *Causa.* potentia illos non superat, vel quòd somnus breuior fuit, quàm ut eos vincere posset, vel quia immodica copia sumpta sit, vel quòd concoctioni repugnent, vel quòd inordinate sumantur: Quòd si præter hæc acrem aliquam, aut alienam habeant qualitatem, non tam imbecillam concoctionem, quàm corruptam patiunt, potentia illos non superat, aut quia per essentiam læsa sit, aut propter aliquem morbum instrumentorum, ut cunque tamen fiat, imbecilla reddita est. Per assentiam verò læditur ventriculus, cum intemperie aliqua primarum qualitatum laborat vel simplici, vel coniugata: nuda, vel cum humore. Per instrumentorum verò morbos, ut sunt erysipelata, ædemata, phlegmones, scirrhii, abscessus, atque alij huiusmodi morbi. Deprehenditur hoc malum. Si culpa quidem ciborum fuerit, & potus, ab ægro, & aliis scies: liberalioris tamen potus indicium est fluctuatio, cibi verò, grauitas in ventriculo percepta. Deinde num. ingesti cibi fuerint concoctu difficiles, ut panis in clibanò non benè coctus, vel fermenti expertus (quem azymum appellant) aut carnes bubulæ, suillæ: hircinæ, asininæ, atque camelinæ, nam his ultimis Alexandria homines vescuntur. Deinde imbecillitas ventriculi, quæ cibos superare non potest, cognoscitur: si ab intemperie nuda proueniat per ructus. Nidorem enim referentes calidam arguunt intemperiem, acidi verò frigidam: Præterea ubi calor infestat, sitis adest, secus ubi frigus: si humor quoque cum intemperie affuerit,prehenditur & ex grauitate, & ex ructibus, & ex iis, quæ foris emittuntur, aut deorsum per secessum, aut sursum per vomitum. Tumores verò præter naturam, ut erysipelata, ædemata, & reliqui propriis signis cognoscuntur, & qui his tumoribus laborant, contrariis non in totum iuuantur. Ab iisdem his causis, quæ supra numeratæ sunt, duæ quoque affectiones fiunt, dolor scilicet ventriculi & inflammatio: dolor ab intemperie sola fit, aut ab humoribus calidis & frigidis sine putredine. Inflammatio verò ab influxu humoris calidi, & sanguinei putridi, dolor per se manifestus est: *Causa doloris, & inflammatio.* Inflammatioprehenditur, quia in ventriculo dolor adest im-

DE CVRAND. MORB.

potest: præterea tumor, æstus, qui tactu diiudicari queat, febris grauitas, & nausea.

Hæc ventriculi imbecillitas nullam propriam habet curationem, cum à multis causis (vt diximus) fieri possit: sed cessat morbus eius causa profligata.

*Curatio
imbecil-
litas-
renales-
centium
per robo-
rantia.*

Sæpè tamen recalescentibus à diuturno, aut magno morbo adest imbecillitas ventriculi, quæ curatur roborantibus qualitate tum manifesta, tum occulta: de quibus in vltimo genere remediorum dicemus: neque verò in ventriculo imbecillo sunt vtilia calida, sicca, & astringentia: præsertim cum est ab intemperie calida, vt docet Galen. 7. method. contra suos præceptores: imò in frigida causa calida medicamenta prudenter sunt admouenda, & exhibenda, ne ex accidenti resoluatur naturalis calor. Sed quia frequentius fit hoc symptoma à morbo frigido, cum materia, illius curationem in præsentia ponimus & describimus.

*Curatio
intempe-
riæ fri-
gidæ cum
humore.
Victus.*

Curatur ergo hæc quinque generibus remediorum: primò, victu calfaciente, & exciccante, & cibis facilibus concoctu, vt sunt perdices, coturnices, turtures, & similes. Ius arietis cum menta aut fœniculo, aut saluia, aut petroselino est vtile. Exercitatio moderata ante cibum confert. Coitus maximè nocet, & animi perturbationes. Bibat vinum rubrum Saguntinum, aut simile benè dilutum, aut aquam cinnamomi, aut decoctum seminis fœn. vel anisi. Omnia pituitosa alimenta nocent, vt pisces, legumina, & herbæ frigide.

*Præpa-
ratio.*

Secundò, curantur apparantibus pituitam, vt rhodomelle, syrupo de absinthio, syrupo de menta, oxymelle S: & compos. cum decocto, aut aquis fœniculi, seminis anisi, mentæ, absinthij, maioranæ, & similium. Concocta pituita per sex, aut octo dies.

*Tempus
cōstio-
nis.*

Tertiò, vacuantibus ipsam pituitam myrobalanis, chebulis, qui simul purgant & corroborant ventriculū, eorum enim vsus continuus est optimus, & expertus aloë, agarico, turbit, pilulis

*Purga-
tio.*

de Hiera S. quæ magis purgat, quam sicca, autore Gal. 7. methodi. Errant ergo Arabes dicētes ipsam cum melle minori vi præ-

*Error A-
rabum.*

ditam esse. Pilulis elephanginis, pilulis stomachicis, electuario diaphænicon, & similibus, quæ non attrahunt ab aliis partibus

*Hiera
commē-
datio.*

longinquis ad ventriculum. Hiera tamen S. obtinet principatū in morbis ventriculi curandis. Quare ʒ. j. eius cum rhodomelle, & decocto fœniculi purgat clementer ventriculum, si semel in

*Elatus
discutiē-
tia &*

hebdomada capiatur, vel ʒ. iiij. pilularum hieræ S. aut elephan-

*alteran-
tia.*

ginarum erit fœlix in huius morbi curatione successus. Quartò, dissipantibus flatum, & intemperiem frigidam corrigentibus, vt puluere diarhodon Abbatis, & rosatæ nouellæ simul, aut aromatico rosato, si maiori calore indige-

mus,

mus, aut diacymino, aut diagalanga, aut diatriompiperon 3. j. aut duæ. Ex his cum aqua absinthij, aut mentæ, aut fœniculi pondere vnciarum duarum quolibet die ventriculo vacuo valdè dissipant flatum, & curant intemperiem frigidam, aut grana sex, septem, vel octo piperis integri deuorata hora ante cibum, aut drachma vna theriacæ magnæ, aut mithridati manè sumpta in septimana. Vinum ex absinthio est optimum in hoc genere. Hoc medicamentum est optimum, si æger fuerit senex, & morbus antiquus: ℞. pulueris diagalangæ, pulueris diatriompiperon an. 3. iij. pulueris aromatici rosati, & rosatæ nouellæ an. 3. iij. pulueris diacymini 3. j. conferuæ anthos 3. ss. diamusci dulcis 3. j. mellis myrobalanorum chebulorum, aut communis. q. s. misce, & fiat confectio: Dosis cochleariū vnū, aut duo cū vino optimo, aut aqua fœniculi, aut melissæ. Supra ventriculū pellis vulturis est optima in hoc genere. similiter vnguentū hoc: ℞. olei absinthij, anethi & de lilio an. 3. j. pulueris mentæ, caryophyllorū, & cinnamomi an. 3. j. ceræ q. s. misce, & fiat vnguentū, quod bis in die actu calidum ventriculo admoueatur tam parti posteriori, quàm anteriori: quia posterior pars est propinquior ventriculo: vel ℞. emplastri stomatici. q. s. extendatur super alutam ad formā scuti, seu ventriculi: fiat duplicatū vt tã pars anterior, quàm posterior defendantur ab externis, & melius dissipetur flatus, & intemperies frigida corrigatur: vel fiant duo sacculi ex absinthio sicco, menta camomilla, aniso, semine fœniculi, carui, cymino, cinnamomo, gariophyllo, cortice citri, & similibus.

Quintò corroborantibus, ventriculum internis, & externis qualitate tam manifesta, quàm à proprietate, seu tota substantia: quales sunt ventriculorum gallinarum pelliculæ interiores. Syluius tamen cum Gal. has pelliculas, & mergi, & struthiocameli damnat. Gal. 3: de aliment. facultatibus cap. de differentia, quæ est in partibus animalium volatiliū, ventriculum mergi, & struthiocameli tantū damnat: at 1. 1. de facultatibus simplicium medicamentorum improbat gallinæ & mergi pelliculam internam ventriculi, contra quosdam antiquos. Dioscorides tamen lib. 2. cap. 41. ventriculi inquit, galli pelliculam internam siccata, & trita cum vino in potu conferre stomachicis. Puluis hic ante cibum sumptus quantitate vnus cochlearij cum vino, aut iure corroborat ventriculum: ℞. coriandri præparati 3. ij. seminis anisi fœniculi, cinnamomi electi an. 3. iij. pellicularum internarum ventriculorum gallinarum secundum artem præparatorum 3. ij. corticis citri, ligni aloës an. 3. j. ss. coralli rubri præparati

*Topica.
Lege cō-
siliū
undeci-
mum
Ioannis
Baptiste
Monta-
ni Vere-
nensis.*

*Corrobo-
ratio per
sumen-
da &
admonē-
da,
Sumēda*

Puluis.

DE CVRAND. MORB.

Admo- uenda. 3. j. lactari optimi 3. vj. misce, & fiat pulvis. In longis mor- bis præsertim calidis pulvis solus diarhodon Abbatis summo manè & ante paslum cum paucis iure ventriculum vehementer corroborat. Corallus si tangat regionem ventriculi diu, cor- roborat ipsum: eandem habet vim lapis smaragdus, pulegium montanum, & betonica quoque corroborat ventriculum. Ma- nus sana, & iuuenis alicuius sæpè detenta supra vētriculum suo naturali calore eum confirmat: eodem modo si aliquod animal viuum, vt canis admoueat ventriculo.

Doloris ab intē- perie nuda curatio. Dolor ventriculi, si sit à sola intempērie, curatur contra- riis ei, vt si à flatu, & frigida intemperie fiat, mederi illi debe- mus per ea, quæ diximus quarto genere remediorum hoc ca- pite, etiam per frequentem fotum, saltem quolibet die bis vacuo ventriculo hoc decocto spongiis madidis, vel philtro: *Ab in- tempe- rie cum affluxu humo- ris.* ℞. absinthij, mentæ, camomillæ, calendulæ, anathos an. m. j. galangæ, corticis citri, spicæ, caryophyllorum, nucis muscatæ, cinnamomi, zingiberis an. 3. ij. feminis fceniculi: anisi carui, & cymini an. 3. iij. rosarum, coriandri præparati an. 3. j. vi- ni optimi rubri ℥b. iij. aquæ chalybeatæ ℥b. ij. fiat ex his deco- ctum ad consumptionem tertiæ partis. Si à calida intemperie, per frigida curatur: si cum materia, per illius euacuationem, per sanguinis missionem, si ætas, & facultas adsint, & æger sit carnosus: quamuis in omni vehementi dolore, habita ratio- ne ipsius sit necessaria sanguinis missio ex sententia omnium. Si verò alii humores abundauerint, illorum euacuatio per me- dicamenta purgantia est necessaria. Aliquando tamen hoc sym- toma eget curatione coacta per narcotica, & non per causæ ablationem, si fuerit vehemens, & non expectans, propriam cu- rationem, de quibus cap. de colico dolore: quamuis propter ventriculi maximum sensum solet hic sæpè esse fortis. In vsu horum semper sunt considerata, & mente tenenda, quæ di- ximus capite de phrenitide, de facultate ægri, & de fermenta- tione medicamenti narcotici, quia ante sex menses non pos- sumus eo vti. In vehementi igitur ventriculi dolore accipiat hunc potum: ℞. philonij Romani 3. ss. syrupi de absinthio, & aquæ melissæ an. 3. j. misce. Tutior est athanasia, & requies magna tutiora etiam sunt externa, in primis temperatè calida, deinde narcotica regioni ventriculi admota, & mica panis cum cortice papaueris, lacte & croco: vel absinthium cum foliis mandragoræ coctum oleo rosarum, vel menta, & absinthium & folia mandragoræ decocta cum oleo papaueris, addendo parum croci.

Sectio vena. Purga- tio.

De vsu narcoti- corum.

Quæ tu- tiora sint.

Topica.

Inflam- matio.

Inflammatiō ventriculi curatur, vt hepatis phlegmone &

& phrenitis, videlicet primò, victu tenui, & refrigerante: *se-* *tionis*
 cundò, sanguinis missione ex basilica ad reuellendum, hanc *curatio.*
 quoque reuulsionem faciunt clysteres, frictiones, ligaturæ, & *Victus.*
 foci extremorum. Tertiò: repellentibus externis, de quibus *Reuul-*
 capite de cura phrenitidis, & internis, vt syrupo rosarum, myr- *sio.*
 tillorum & cydoniorum cum aquis plantaginis, portulacæ, la- *Repellē-*
 ctuæ, & similium sæpè sumptis, & omni hora, in æstate, & *tia ex-*
 iuuenē, actu frigidis, in hyeme, & senibus, tepidis. Quartò, in *terna*
 augmento repellentibus, & digerentibus, seu resoluentibus, vt *interna.*
 syrupo rosarum, & de absinthio simul, aut rhodomelle cum *Indica-*
 decocto hordei, & camomillæ: in statu resoluentibus solis, vt *tio à tē-*
 syrupo de absinthio, rhodomelle, & decocto camomillæ. *Quin-* *poribus*
 tò, intemperiem calidam relictam alterantibus, & corroborā- *morbi.*
 tibus partem affectam, vt syrupo rosarum, & decocto semi- *Altera-*
 nis psyllij, & cidoniorum, & similibus. Si verò in suppuratio- *tio, &*
 nē terminetur, curatur per ea, quæ diximus in fine cap. 27. de *corrobo-*
 de curatione pleuritis. *ratio.*

Scholium.

Q Vanquam quælibet.] *En qua auctor docet in hoc capite, Ancto-*
vera sunt: solum aduertere oportet eum, & alios errare, ris & a-
cum scribunt esse medicamenta toto temperamento roborantia liorum
ventriculum. Solum enim corroboratur cum languidus est medi- *error.*
camentis intemperiem eius oppugnantibus, adstringentibus etiam,
qua densantia ipsam virtutem uniunt, & substantia dissipatio-
nem impediunt.

De singultu. CAP. XXXII.

Singultus velut quædam ventriculi conuulsio est, non ta- *Descri-*
 men vera censetur, cum in musculis non fiat, quod ad *prio.*
 conuulsionis essentiam requiritur. Ventriculi verò mus-
 culus non est, neque eius hostiolum, vt apertè Galenus de-
 monstrat lib. 6. de morbo & symptomate, cap. 2. Vtcumque
 tamen res habeat, motus est ventriculi, quo ad expulsionem
 rerum molestiarum, aut quantitate, aut qualitate mouetur. In
 hoc differt à vomitione, quòd (vt ait Galenus) per vomitio- *Causa.*
 nes ea, quæ in spatio continentur, eiiciantur: per singultum
 verò ea, quæ ventriculi corpus impleuerunt. Fit generaliter
 (vt autor est Hippocrates 6. sect. Aphor. 39.) aut à plenitudi-
 ne, aut inanitione: & præter has causas etiam ab humoribus

DE CVRAND. MORB.

Nota.

Curatio

Si ab in-

temperie

nuda,

per alte-

rantia

contra-

ria.

Si ab af-

fluxu

humoris

pituitosi

per ea-

que di-

cta sunt.

Laus.

Rhasa.

Si ab

acrimo-

nia, &

morda-

citare.

Vacua-

tio.

Ante-

cedat

prepa-

ratio.

Vomi-

us uti-

litas.

Alter-

atio.

Sedan-

zia sin-

gultum.

vellicantibus, & rebus acri facultate præditis: item quoties quispiam affatim deuorauerit. calidum aliquod medicamentum, deinde calidam potionem biberit, & ex cruditate, etiam præsertim in pueris. Morbus per se patet, causæ partim ex ægri dictis, partim ex his quæ supra cap. de conuulsione dicta sunt percipi poterunt.

Singultus, qui ab inanitione fit, rarò curationem suscipit, similis tamen est curationi conuulsionis ex inanitione, de qua cap. 14. dictum est, & hæcticæ diurnæ capite octauo, secundi libri dicemus. Si à sola intemperie fit, per alterantia contraria curatur, plerunque tamen fit à plenitudine humoris pituitosi, cuius curatio similis omninò est curationi imbecillitatis ventriculi, quæ fit ab humore frigido pituitoso, de qua capite præcedenti abundè diximus. Si vis tamen hunc & alios affectus præter naturam ventriculi rectè curare, lege octauum lib. Galeni de compos. medicamentorum secundum locos, & quintum continentis Rhasis, qui inter Arabes primas tenet: fuit enim vir magnæ experientiæ, & in omnibus Galenum magis, quàm alij omnes Arabes amplectitur. Si fiat à rebus acris, & mordacibus, ut à piperibus, præsertim sumpro vino, & aqua calida, super id, ut Galen. docet octauo de compositione secundum locos & comment. 40. sexti Aphorismorum: tunc necessaria est vacuatio per rhabarbarum & myrobalanos citrinos, cum manna electa, aut cassia fistulari: & si opus fuerit, ubi materia est fixa nimis, multa, adde drachmas tres, aut quatuor electuarij diaphænicon, præcedenti leui præparatione per syrupum rosarum & acetosum S. cum decocto hordei. In omni tamen materiali singultu est utilis vomitus, præsertim si materia non fuerit fixa, & non penetrauit tunicas ventriculi. In hac, quæ fit à causa calida, post vacationem electuarium diarhodon Abbatis est optimum, & potus solius aquæ frigidæ: quæ omnem ferè singultum curat, aliquem per se, & aliquem per accidens, quemadmodum & animi perturbationes, ut ira, tristitia, timor, & gaudium, si subito acciderint, sternutatio, cohibitus anhelitus, frictiones, & vincula extremorum, cucurbitula magna, & similia singultum curant. Si verò fiat ab inflammatione, ipsa curata curabitur & singultus. In antiquo tamen singultu, qui fit à materia frigida, præter ea quæ dicta sunt capite præcedenti, hoc medicamentum est optimum & expertum: ℞. squinantij, calami aromatici, anisi, marathri foliorum metæ, & absinthij, costi an. 3. j. croci, ligni aloës, ambræ, caryophyllorum, aloës Alexandrinæ an. 3. ij. apij, corian-

dri præparati, seminis papaueris albi, cassiæ lignæ an. ʒ. j. conferuæ aranciorum ʒ. ij. sacchari. q. s. misce, & fiat confectio, vel in hyeme cum melle, cuius vncia semis cum decocto fœniculi, aut alio simili huic summo manè per aliquot dies curat singultum indubitato. Similiter post vacuationem curatur singultus, si ventriculo admoueatur castoreum cum oleo rosato, aut si accipiat æger ʒ. ij. seminis rutæ cum paucō vino, aut decocto fœniculi in singultu magno: & ubi alia non contulerint, præsertim cū sit à maximo ventriculi sensu, ʒ. ʒ. usque ad ʒ. j. philonij Romani cum syrupo papaucris, & aqua absinthij, aut mentæ, est vltimum, & probatum remedium.

*Vltimū**remediū*

De appetentia immodica, quam caninam appellant.

C A P V T XXXIII.

Appetentia immodica, quam caninam appellant, tunc fit, cum ventriculus ea comedendi rabie vexatur, ut satiari, qui sic affecti sunt, non possint, nec post ingestos ad nauseam usque cibos: quos cū citra noxam ferre nequeant, eorum plenitudine velut intolerabili quadam sarcina grauati ad vomitum, quod vltimum est remedium, confugiunt, ut per eum à tam graui pondere liberentur. Verū cū inexplēbilis sit eorum appetitus, denuō ad cibos famelici conuertuntur, & in similem priori necessitatem detrusi, iterum vomere coguntur: quod eo usque perseuerat, donec velut canes (vnde etiam morbo nomen inditum est) in edendo, atque euomendo toti: quo fit, ut quæ dum inchoabat, vomendi erat necessitas, consuetudo inualecente morbo efficiatur. Causæ à Galeno sic breuiter explicantur quarto de morbo & symptomate, cap. 7. Caninæ igitur appetentiæ causa vna est acidorum humorum vitium, altera verò (ut dictum est) plurima totius corporis inanitio, siue ipsa caloris vim, siue retentricis facultatis imbecillitatem sequatur. Porro acidorum humorum vitium erosionem, quæ suctioni proportionē respondet, inducit, appetentiāque (ut inquit Gal.) haud aliter quā naturale pathema excitat. Cognoscitur eorum, quæ ingesta fuerunt, deiectione si multa simul & liquida fuerit, & ructu insuper acorem referente, corporis verò inanitio, quæ (ut inquit Aëtius) ob plurimi caloris vehementiam fit, qui instar ignis cibos consumit, cutem rarefacit, & exhalationem mouet, sic deprehenditur,

*Descriptio.**Causa.**Nota.**ventris*

ventris egestionem longè pauciores prædunt, quàm pro eorum, quæ ingeruntur, modo, & proportionem: & stercus insuper quod egeritur, siccus est. Quod si propter retentricis facultatis imbecillitatem, quæ cibis dominari non potest, corporis facta sit dissipatio: tunc multus est deiectionum proventus.

Curatio. Si fiat hæc immodica appetentia ab inanitione, ut in convalescentibus, curatur cibo boni succi, facili concoctu, & sæpè sumpto, non tamen multo. Alimenta pingua semper laxant ventriculum, excitant nauseam, & appetitum deiciunt, quam-

Ab imbecillitate. uis sint difficilia concoctu, Si fiat à ventriculi imbecillitate, illa semota cessabit affectus. Si à iecoris calore, similiter sublata causa tollitur & effectus. Si à vermibus, ipsis eductis sanabitur, ut cuidam puellæ contingit quæ fame canina laborans à verme duodecim cubitorum, sanitati restituta fuit, verme illo magno

A calore hepatis. purgato. Si ob succum melancholicum à liene ad ventriculi os largius transmissum fiat, ut Arabibus placet, quod non repugnat Galeno volenti retentricem facultatem corroborari melan-

A vermibus. cholia, cum per accidens ipsa contrahendo, & comprimendo inanitionem faciat, & appetitum augeat: ideoque melancholica

Historia. alimenta augent appetitum præcipuè sale condita, horum tamen omnium curatio suis locis referenda. Si à pituita im-

A succo melancholico. dica, frigida, acida, os ventriculi infestante, à qua sæpius fit, curatur quinque remediorum generibus, primò, victu calido, &

A pituita acida. sicco communi omnibus pituitosis affectibus, demptis acerbis, ut sunt cæpe, allia, porra, sinapi, & acida, quæ excitant appetentiam, & ob id nocet huic affectui; quanquam aliis pituitosis

Victus. affectibus sint salubria, quia incidunt, tenuant, & tergunt pituitam: menta tamen, & salvia, petroselinum, fœniculus, cicera, & similia sunt salutaria cocta cum carne arietina, aut hœdina. Potus sit vinum vetus mediocriter dilutum, vel aqua decoctionis fœniculi.

Præparatio. Secundò, apparantibus materiam hanc medicamentis iam sæpè dictis, præsertim primo capite, & 3. de curatione imbecillitatis ventriculi: vnum tamen iterum scire oportet, syrup-

Observatio. acidus non convenire huic affectui, ut est oxymel S. & compositum, & similia: ne excitent appetentiam, nisi pauca quantitas

Purgatio. ipsorum sumatur, & sint aliis mixta.

Diaphœnicon quale sit. Tertiò, vacuantibus materiam pituitosam, medicamentis frequenter dictis præsertim 1. cap. & 3. huius libri. Inter composita tamen diaphœnicon est utile, & quantitate 3. iiij. vsque ad 3. vj. quia eius vis non transit hepar, & purgat materiam mixtam ventriculi.

Quartò,

Quartò, resoluentibus reliquias materie medicamen- *Resolu-*
 tis sæpe descriptis, maximè cap. 31. quarto genere remedio- *rio.*
 rum: vt theriaca magna, mithridato, diagalanga, electuario
 rosatæ nouellæ, & aromatico rosato, cum aqua aut deco- *Sumen-*
 cto fœniculi, anisi, aut petroselini, & similium. Vinum quo- *da.*
 que generosum post cibos pingues, & oleaginosos statim *Vini ge-*
 famem caninam sedat, autore Gal. comment. 21. secundi *nerosi*
 aphor. non tamen eam, quæ fit ex longa inedia, vel alui pro- *facul-*
 fluio aut fluxu sanguinis, aut aliqua alia vacuatione. Nam qui *tas.*
 huiusmodi aliqua causa esuriunt, plurimùm offenduntur, vi-
 ni potu in eo comment. Galenus distinguit bulimon à fame
 canina.

Quintò, prosternentibus appetitum, & laxantibus ventricu- *Appeti-*
 lum: qualia sunt cibaria & iura omnia pingua, vt oriza cocta cū *tus ab-*
 pinguibus rebus, & hoc medicamentum, aut huic simile: ℞. de- *latio.*
 cocti maluarum, & seminis lini. an. ℥. iij. olei sesamini, & butyri *Ab in-*
 recentis an. ℥. j. misce, & fiat potus. Si ab intemperie calida ven- *tēperie*
 tricoli fames canina oriatur, quæ autore Galeno. 4. de sympto- *calida.*
 matum causis appetentiam prosternit per accidens, meo qui-
 dem iudicio quemadmodum & fames augetur à frigore per ac- *Victus.*
 cidens, curatur alimentis coctu difficilibus, vt sunt castanæ, ca-
 ro bubula, suilla, panis azimus, & similia.

Scholium.

Appetentia immodica.] Calidum innatum perpetuò dissipat Nutri-
 substantiam triplicem corporis, solidam, humidam, & spiri- *tionis ne-*
 tuosam, insensibiliter tamen per occulta cutis spiramenta, indeque cessitas.
 orta est nutritionis necessitas, nisi enim loco substantia dissipata,
 altera substitueretur similis, breui animalia perirent: propterea
 natura indidit animalibus appetitum alimenti, aut sue conserva-
 tionis, quod idem est, qui appetitus fames dicitur, hac duplex est, vna Fames
 naturalis, omnibus corporis partibus communis, quæ alimentum duplex.
 appetunt nullo præcedenti sensu rei deficientis, eo enim non egerunt,
 quia alimento coniuncta sunt, sicut & planta cum quibus hoc ap- Fames
 petitu communicat. Est fames altera, quæ dicitur animalis, eò quòd anima-
 fiat cum sensu. est enim appetentia alimenti, quæ suctionis sensum lis.
 sequitur, hanc solùm in orificio ventriculi sentimus, ob multos & Vallesij.
 magnos nervos ibi disseminatos. Quæ fit eo modo, quo docet Gal. lib. Vallerio-
 2. de causis symp. partibus circa cutem attrahentibus ex vicinis, la, & a-
 & his ex aliis, quo ad vsque suctionis perueniat ad orificium ventri- *liorum*
 culi, & in eo molestiam indicat. Inde colliges errorem Vallesij error.
 Valleriola, & aliorum sentientium melancholiam ex liene ad ven-
 trem

DE CVRAND. MORB.

trem expurgari, ut excitare famem. Hac enim non erit secundum naturam cum à partium suctione non fiat, imò erit canina, cum

Fames *melancholia perpetuò in illis venis contenta sensum suctionis faceret. Appetentia animalis necessaria est animalibus, ut excitet ipsa*

ex me- *ad querendum alimentum, quoniam ipsis non est coniunctum. Ne-*

lancho- *que hac appetentia est facultas, ut malè aliqui existimarunt, sed fi-*

lia non *est natu-*

est natu- *ralis. mùm attractricem, & proinde ad ipsam refertur, quia ita ei adha-*

Appetē- *ret, ut pro modo appetentia attrahat ventriculus. In hac appetētia*

tia non *tria sunt symptomata, cum non sit, cum imbecilliter sit. & cum ma-*

est fa- *lè sit. Rursus appetentia, qua malè sit, quam depravatam appella-*

cultas. *mus, duplex est: una ratione motus, qua canina dicitur, in qua im-*

Sympto- *modicè appetimus alimenta. Altera in qua alimenta prava quali-*

mata in *tatis appetuntur, per pravam qualitatem aliena alimenta, & ea,*

appeti- *qua non sunt alimenta (qualia sunt testæ, & carbonæ) intelligētes.*

ti. *Hoc capite auctor solùm agit de canina appetentia. Hac à duabus*

Canina *causis ortum habet. Prima est frigiditas orificij ventriculi, qua vel*

appeten- *est nuda, cuius meminit Gal. 2. aph. com. 21. vel cum humore acido,*

tia cau- *de qua loquitur eodem loco, & 2. de causis symp. Secunda est immo-*

sa. *dica corporis dissipatio. Curationem lege apud auctorem. Solùm*

Duo ad- *adverte duo, primum est, famem caninam ab intemperie frigida*

uertē- *nudè factam, curari calidis, ut potu vini, dummodo non sit auste-*

da. *rum. Secundum, famem caninam curari pinguibus, quoniam hac*

dissoluendo ventriculum auferunt sensum suctioni similem.

De cibi fastidio. CAP. XXXIV.

Cur ap- *P*petentiam nobis omnibus prouida natura indidit, ne eius,
petentia *sine quo constare animantium vita non potest, per negli-*
est neces- *gentiam obliuisceremur, ea in hunc modum fit. Cùm quodlibet*
saria. *animal in ambientem aërem per cutem dissipetur, principio*
partes cui subditæ inanes redduntur, hæ verò, quia talis est na-
tiva earum facultas, à vicinis partibus ad se alliciunt alimentum,
ut id quod fuit exinanitum, repleatur: mox illæ rursus ex sibi vi-
cinis, atque eodem modo aliæ ex aliis sibi proximis, donec ad
ventriculum deuentum sit: & ab ipso suction fiat, reliquis omni-
bus partibus ante ipsum per eam suctionem iam euacuatis.
Quam quidem suctionem cùm venter ferre non possit, sed in-
de veluti deuellatur, huiusmodi molestiæ remedium cibum ex-
quirat: atque inde tum fames, tum appetentia nascuntur. Est
enim fames suctionis sensus, appetentia verò implendi deside-
rium, ut copiosius Galenus docet lib. 4. de causis symp. cap. 7.
Porro cùm trifariam appetentia lædatur, perinde ac omnes cor-

poris

poris functiones vnus læsionis eius modus est, cùm animal nihil appetit: contraria sanè canino appetitui affectato, norexia Græcis, Latinis appetentiæ amissio, aut abolita appetentia, nobis verò cibi fastidium appellata. Hæc fit (vt loco citato ait Galenus) vel quia suctionis sensus perit, vel quia suction non fit, vel quia corpus non inanitur. Præter has causas etiam alias recenset Aëtius lib. 9. cap. 21. in hunc modum. Contingit autem sæpè ob immoderatam ventris, & intestinorum fluxionem, & ob biliosum humorem in ventrem delatum, tenacis & acris, ac porri speciem referentem, & ob pharmaci portionem, & sanguinis immoderatam detractionem, & in continuis ac vehementibus febribus, stomachi, ac ventris inflammationem, item hepatis, vesicæ, ac vuluæ. Contingit etiam in cholica & voluulosa affectione. Maxima autem, quod quis non esuriat, causa, caliditas existit: quæ solidat corpora laxando dissoluit, & ad attractionem imbecilliora reddit: humida autem diffundit, atque amplius extendit. A pluribus etiam aliis causis appetitus perit, quas facillè quiuvis inueniet. Notæ, cùm à fluxu ventris hæc passio fit, manifestæ sunt. Si à biliosis humoribus, ventriculi morsus adest, nausæaque, & sitis vehemens: si ab humoribus putridis, etiam interdum febris adest: at quibus crassi, lentique humores fastidium cibi pariunt, ij nec rosionem ventriculi, nec sitim patiuntur. Communiter autem omnibus superuenit nausea. Indicia verò, quibus calida intemperies dignoscatur, quæ huic morbo occasionem præbuit, sæpè in aliis capitibus dicta sunt.

*Causa.**Nota.*

In omni tamen cibi fastidio nocent pinguia, & oleaginea, & crocus, cùm ipsis augent appetitum, odorifera omnia alimēta, præsertim si habuerint naturam contrariam causæ, acris etiam, vt cæpe, allia, porrum, piper, sinapi, cinnamomum gariophyllus, nux muscata, & similia: pari modo stiptica omnia vt menta, absinthium, pyra, cidonia. Acida quoque omnia, vt acetosa, agresta, acetum, succi granatorum, citri, limonum, & aranciorum. Salita omnia, quoque mouent appetitum, vt caseus, oliuæ, capparis, caro suilla, & similia. Seruetur tamen modus præscriptus 9. cap. huius lib. obseruata semper natura infirmi. Nam sunt inimicitia quædam inter nonnulla alimenta, & singularem hominem: quemadmodum & esse potest amicitia magna, & familiaris, quæ solo experimento cognoscenda est. Deinde materia est præparanda, si calida fuerit & biliosa per syrupum acetosum S. & rosarum, cum decocto hordei: si frigida per rhodomel, & oxymel S. per syr. de absinthio, de menta, cum decocto fœniculi, & si-

*Curatio**Vi. tus.**Appetē-
tia au-
gentia.**Præpa-
ratio**materia
calide**& frigi-
mili*

DE CVRAND. MORB.

*Purga-
tio cali-
da.*

*Purga-
tio fri-
gida.*

*Materia
mysta.*

*Resolu-
tio, &
corrobo-
ratio.*

*Empla-
strum.*

*Vnguen-
tum.*

milibus, de quibus 1. cap. Deinde vacuanda est materia cali-
da, rhabarbaro, myrobalanis citrinis, hiera S. & non medi-
camentis, quæ attrahunt ab aliis partibus ad ventriculum:
vt ℞. rhabarbari optimi intusi per noctem in aqua endiuivæ
cum paucis vino albo, & corticum myrobalanorum citrino-
rum an. 3. j. pulueris hieræ S. ʒ. ij. syr. violarum ʒ. j. aquæ
buglossæ q. s. misce, & fiat potus aut ℞. pilularum de hiera
S. & rhabarbari electi an. 3. ʒ. cum syr. rosarum Alexandri-
narum fiant pilulæ viij. & aurentur, si non est pauper. Si ma-
teria fuerit pituitosa, vacuanda est agarico trochiscato cum
hiera simplici, & myrobalanis chebulis: vt ℞. agarici tro-
chiscati, & corticum myrobalanorum chebulorum an. 3. j.
pulueris hieræ S. ʒ. j. ʒ. rhodomellis ʒ. aquæ fœniculi ʒ. ij.
misce, & fiat potus. Si materia mixtam habuerit pituitam, &
bilem 3. iiij. diaphænicon vacuanda est, aut 3. j. pilularum ag-
gregatiuarum. Postremò, curatur resoluentibus, & corrobo-
rantibus ventriculum, vt in causa calida pulvere diarhodon
Abbatis quolibet desumpto quantitate 3. ʒ. vsque ad 3. j. cum
3. j. syr. rosarum. In frigida, syrupo de absynthio cum aqua
hordei cum cortice, mastiche, interiùs & exteriùs, & simi-
libus, vt carne cydoniorum in calida cum saccharo condita, &
in frigida cum melle, in aqua electuarium rosatæ nouellæ, &
magis pulvis conducit, & aromaticum rosatûm cum aqua aut
decocto absynthij, mentæ, alia similia. Theriaca magna, mi-
thridatum, aut diamusculus dulcis, aut diambra resoluunt, &
corroborant ventriculum, si sæpè magnitudine drachmæ
vnius capiantur cum liquore aliquo calido, vt est decoctum
cinamomi, corticis citri, coriandri, fœniculi, anisi, & simi-
lium. Hoc ventriculo admodum tam posteriori parte, quàm
anteriori resoluit, & corroborat: ℞. emplastri stomatichonis
partes, mastichis partem vnâ, extendatur super alutam
ad formam scuti: aut ℞. olei nardini, absinthij & de lilio
an. 3. j. pulueris rosatæ nouellæ, cinnamomi, gariophyllorum,
mentæ & corticis citri an. 3. ʒ. ceræ q. s. misce, & fiat vnguen-
tum, quod manè, & vespere ante cœnam actu calidum ven-
triculo admoveatur.

Scholium.

*Auctoris
lappus.*

Appetentiam nobis.] In hoc capite solùm aduerte, non rectè
auctorem in appetentiam à causa frigida fieri scripsisse, hæc
enim potius appetitum inducit, comprimendo orificium ventricu-
li, & hac ratione sensum suctioni similem efficiendo.

De

De Cholera. CAP. XXXV.

Quam barbari cholicam, & cholicam passionem appellant, hanc tum Græci, tum etiam Latini choleram dicunt, quæ (autore Paulo lib. 3. cap. 39.) immoderata est ventris perturbatio, quæ multo bilis fluxu, & supernè per vomitum, & infernè per alui deiectiones fit. Contingit ob multam cruditatem, quæ nonnunquam prauorum admodum alimentorum (vt docet Gal. 2. de alimentorum facultatibus, capite de peponibus, & libello de cibis boni & mali succi, vbi, ex boletis, inquit, non benè coctis cholera excitatur) interdum verò vitiosorum succorum culpâ oritur. Malum sic deprehenditur, per superiora, & inferiora excretio fit. Vtroque enim ostiolo ad expulsionem ventriculus utitur, & eò quòd ad gulam superius, & eò, quòd ad pylorum, id est, ianitorem, vt testatur Gal. 6. de morbo & symptomate, cap. 2. Sitiunt præterea qui hoc morbo laborant, & copioso sudore madent, pulsusque habent concisum, & in musculis manuum ac pedum, maximèque surarum contractionem, ac tensionem quandam sentiunt. Quæ per vomitum redduntur, aut acescunt, aut amara planè sunt. Deiectiones vel pituitosæ, vel melancholicæ, vel biliosæ, nonnunquam etiam carniū recenter cæsarum lotioni simillimæ excernuntur. Facies sæpenumerò, qualem, Hippo. describit 1. Prognostic. conspicitur, & color non dissimilis ei, qui in iam morituris cernitur, nec immeritò. Frequenter enim hanc affectionem mors insequitur, nisi celeriter medicus opem tulerit: denique & in ventriculo, & intestinis summus adest dolor, angustia, & vellicatio.

*Descriptio.**Causa.**Nota.*

Primò, victus debita ratio instituenda est, parum frigida. Calor enim humores mouet, & frigus si immodicum sit (quamuis immobiles ipsos efficiat, spiritum & colorem natium resolui prohibeat) nocet, humores ipsos subito ad intestina reuocans. Alimenta sint boni succi, & facilia concoctu, parum & sæpè sumpta, præsertim deficientibus viribus. Nam sæpius utilis est abstinentia, vt reddantur cæteræ partes quasi auaræ. Ius ergo ex gallina tenera, & perdicibus, ex animalium, quæ bonum succum gignunt, extremitatibus est bonum, melior succus eorum, & optima aqua per distillationem expressa, præsertim si parum aquæ rosarum, aut florum myrtyllorum, aut malorum cydoniorum misceatur cum cinnamomo, antequàm fiat aqua. Si fuerit ciborum magnum fastidium, vna pensilis erit utilis, oua sorbilia, testiculi gallorum, & sedata gallina

*Curatio
Victus.**In causa
frigida.*

DE CVRAND: MORB.

- In calida.* gallinarum sunt salutaria, & alia dicta cap. superiori. Potus in causa frigida sit vinum generosum aqua dilutum, iuxta consuetudinem ægri, aut aqua cinnamomi, aut seminis fœniculi. In calida verò aqua hordei, aut aqua decoctionis coriandri præparati, aut vinum granatorum. Animi perturbationes maxime nocent, præsertim quæ ad interiora reuocant, ut timor & tristitia.
- Vomitibus.* Secundò, si materia & causa fuerit in ventriculo, vomitu curatur aqua tepida cum pauco aceto & saccharo, aut decocto seminis raphani cum syrupo acetoso S. Si verò fuerit multa materia, & aliunde venerit ad ventriculum & intestina, apparatus syr. rosarum, syrupo de agresta, oxysacchara S. syrupo de endiuia S. & similibus, cum aquis rosarum, plantaginis, portulacæ, & aliis eiusdem naturæ.
- Purgatio materia pituitosa.* Tertiò, vacuantibus cum corroboratione, ut rhabarbaro, myrobalanis citrinis, & chebulis, si fuerit materia pituitosa: ut ℞. rhabarbari electi parum tosti ꝑ. j. corticum myrobalanorum citrinorum parum tostorum ꝑ. iiij. syr. rosarum. ʒ. j. aquæ portulacæ ʒ. ij. misce, & fiat potus. In repletionem tamen ex cruditate sola hiera S. bene purgat, aut ʒ. j. pilularum stomachicarum, aut ʒ. j. agarici trochiscati, aut ʒ. iiij. diaphanicon.
- Si repletio sit ex cruditate.* Amatus Lusitanus centuria 2. curatione 44. & alij iuniores ante ipsum malè rhabarbarum assatum, & myrobalanos in hoc, & in aliis ventris profluviiis damnant, cum hæc duplicem habeant substantiam, vnam tenuem, igneam, & aëream, alteram verò terrestrem, crassam, & astringentem. Prima purgans, mundificans, & abstergens per modicam assationem, & torrefactionem amittitur, crassa verò & astringens sola summè necessaria est quando materiam & causam profluvij cum corroboratione & astrictione, & absque acrimonia clementissimè educere volumus. Credunt iuniores medici idem esse assationem, adustionem, incinerationem, & calcinationem, quod falsum est.
- Error iuniorum medicorum super assatione rhabarbari.* Quartò, reuellentibus, & trahentibus ad cutem: ut balneo, quo rarò est utendum propter facultatis imbecillitatem, frictionibus, & ligaturis extremorum, & cucurbitulis.
- Reuulsio & resolutio.* Quintò, roborantibus ventriculum, & intestina, & prohibentibus motum humorum, & symptomata quædam, ut potu solius aquæ rosatæ tepidæ, quantitate vnciarum quatuor, maxime cum sit à sola bile: est à me expertum remedium, & laudatum à grauissimis medicis ℞: ʒ. j. pulueris diarhodon Abbatis, cum ʒ. j. syr. de agresta, aut alio simili, est in hoc genere

genere optimum remedium. Similiter rob de agreſta, de cydoniis, miua cydoniorum non aromatizata, niſi cauſa cholerae eſſet cruditas, tunc etiam aromarizata eſſe debet: & ſyrupus de menta, de abſinthio puluis roſatae nouellae, & electuarium eiufdem, puluis ſeu electuarium aromaticum roſarum Gabiellae, & ſimilia calida medicamenta ſtomachica interna, & externa, de quibus cap. 31. de imbecillitate ventriculi abunde dictum eſt. Haec quoque mixtura eſt optima in hoc genere, in calida cauſa & venenofa. ℞. conſervae roſarum antiquae ℥. iij. conſervae acetofae ℥. j. coralli rubri praeparati, & boli Armenici praeparati an. ʒ. j. margaritarum electarum, pulueris cryſtalli praeparati an. ʒ. j. ꝑ. ſacchari optimi. q. ſ. miſce, & fiat conditum auro coopertum. Doſis eſt cochlearium vnum mane, & quacunque hora cum aqua acetofae, aut portulacae, aut calybeata aqua. Ventriculo, & toti etiam ventri admouenda ſunt adſtringentia, & corroborantia, vt oleum maſtichinum, roſarum, myrtillorum, cydoniorum, nardinum, de abſinthio cum pulueribus aſtringentibus: vnguenta ex iis fieri poſſunt: vt ℞. olei de abſinthio, myrtillorum, & cydoniorum an. ʒ. j. pulueris maſtichis, thuris, trochiſcorum de ſpodio an. ʒ. j. cerae q. ſ. miſce, & fiat vnguentum: aut ℞. farinae hordei lib. j. pulueris ſpodij ℥. iij. albuminum ouorum numero iij. ſucci plantaginis, aut burſae paſtoris, aut caudae equinae quod ſ. miſce, & fiat cataplaſma: adde parum aceti calybeati, & ſemel in die ventri admoueatur actu frigidum, vel parum calidum: aut ℞. micæ panis toſti. ꝑ. j. carnis cydoniorum melle conditae ℥. ij. mentae, abſinthij an. m. j. vini rubri, aut aceti calybeati, ſi eſt cauſa vehementer calida, quod ſ. miſce, & fiat cataplaſma: adde pulueris caryophyllorum, cinna-
Conditum.
Admo- uenda.
Vnguentum.
Cataplaſma.
Cucurbitula vomitiū & deiectionem cohibet.

momii, ligni aloës, maſtichis, ſpicæ an. ʒ. ij. Magna cucurbitula ventriculo & vmbilico adnota detinet vomitum, & deiectionem. Multi in hoc genere remediorum laudant aquae frigidae ſubitam irrotationem ſupra crura, & pedes, & teſtes: ſed hoc faciendum in agro robuſto. Aliquando neceſſaria ſunt narcotica, vt requies magna, micleta, athanaſia, & alia valentiora, vbi alia non profunt, ſeruatis iis, quae diximus ſuperius capite de phrenitide, & capite de ſanguinis profluuiio è naribus, & quae dicuntur capite de ventris profluuiio ſequenti. Si adſit initium vlcerationum inteſtinorum, curabitur per ea, quae dicimus cap. 38. de curatione diſſenteriae.

Scholium.

Quam barlari cholericam.] Cholera eſt ventris perturbatio, quae tam moleſtantiſſimè ſuperne per os, & inferne per anum expellit. *Cholera morius.*

DE CVRAND. MORB.

pellit. Vnde pars affecta erit ventriculus, ut ex 3. de caus. symp. c. 2. colligimus: ita ut in eo facultas expultrix irritata immodicè m-
Valle- uatur. Neque video qua ratione adductus Vall. 3. lib. epy. com. 10.
sus ta- hoc symptoma etiam ad retentricem ventriculi referat, cum fiat ab
xatur. irritatione, & veteres in eius definitione solius excreticis faculta-
An du- tis meminerint. Prater eà ex definitione prædicta colliges, de essentia
plex eua cholera esse utramque euacuationē, sic Eutychides l. 5. epy. sent. 75.
cuatio sit in principio morbi vomitu affectus, & non deiectione, cholera non
de essen- laborabat: nisi in quarto die, in quo non solum vomuit, sed & per
ria cho- aluum deiecit. Quod si antè deiectionē choleram vocatum morbum
lera. habuisse scriptum sit, in illa sententia, dicendum est, librum nō esse
Hippocr. Et quamvis utraque euacuatio propriè cholera conveniat,
aliquando tamen post dictas euacuationes solet vomitus cessare ob
imbecillitatem facultatis expultrix, quo tempore hunc affectum
choleram esse non possumus negare, sicut neque quando declinante
affectu, vomitus cessat. Causa cholera in genere est quicquid totum
Causa ventriculū molestat: hoc autem ex omnium medicorū sententia vel
cholera ex aliis. est alimētum corruptum, vel bilis acris à venis expulsa ad ventri-
Propria culum. Ego tamen existimo choleram morbum semper fieri ab una
senten- causa, nempe à fluxione humoris biliosi, & acris à toto corpore ad
tia. ventrem: quod confirmo, primū ex nomine, nam idē hic affectus
cholera dicitur, quia in eo cholera, id est, bilis euacuatur: secundo ex
Gal. 3. de nat. fac. c. 13. ubi in choleris per venas, quæ ad intestinum,
& ventrē pertinent, totum corpus euacuari scribit. Tertiò ex imbe-
cillitate, quæ in choleris in toto corpore sentitur, quæ non sequetur ad
solam humoris corrupti in vētriculo euacuationē. Dices, nonne Gal.
li. 2. de alim. fac. cap. de peponibus, ex vitioso succo ex peponibus ge-
nito choleram morbū fieri dicit? Respondco, eo loco Gal. vitiosum suc-
cum non in ventriculo, sed in venis coacervatum cholera efficiere nos
docuisse: quod si aliquando corruptum cibū cholera causam statuatur,
intelligendum est, illum irritando id efficere, quod manifestè colliges
ex lib. 4. de rat. vic. in morbis acutis com. 103. ubi sic habet. Nempe
eà cholraceorum eduliorum communis est malitia, cū & humida
& acris fuerint. Talia siquidē similiter corrumpunt, suāque acri-
monia vasorum eorum, quæ ad ventrem decumbunt, ora remordēt,
atque fluxionum earum, quæ ex toto corpore in eum fiunt, causa ef-
ficiuntur. Hæc Gal. Ex quibus videat Valles. qua ratione possit fieri
Repre- henditur cholera ex redundātia immodica, ut ipse scribit: hoc in loco aduerte,
Valle- ea quæ superius diximus de cholera simpliciter dicta, intelligi, nam
sus. est altera, cuius meminit Hip. 4. de ratio. vict. in acut. sent. 109. quæ
cholera sicca appellatur, quam Valles. 7. epyd. com. 81. siccam appel-
lari sentit, quia in ea non excernitur humor, sed quia habet solam
irritationem ad euacuationes, quæ per os, & aluum fiunt: existimat
enim

enim choleram siccam & humidam nasci eisdem causis ea ratione, quia nausea & vomitus. Cuius viri sententia quàm falsa sit, intelliges ex com. supradicta sententia, in quo Galenus choleram siccam appellat eam, in qua non humor, sed flatus acrimoniam habens per os, & aluum emittitur, qua ratione Hippoc. hydropem tympanitem, hydropem siccam appellare solet, quia ab spiritu fit. Ex supradictis intelliges etiam, quàm malè auctor inter signa cholera simpliciter dicta deiectiones pituitosas, aut melancholicas enumeret.

Primò, victus debita ratio. } Qui in choleris statim in principio victum adstringentem imperant detento humore acri, mortis sunt auctores. Oportet ergo in principio istius affectus victu refrigerante uti, quia, ut diximus, cholera à causa calida ortum habet, & ita multoties curant choleram potu solo aqua niue refrigerata. Quòd si alimentis utamur tēperatis, erunt alteranda rebus frigidis. Ces-
sante autem vomitu & remissa molestia, aut quando iam alimen-
tum incipit detineri, tunc adstringentibus, qua roborare possunt vē-
triculū, utemur: aut si his nolumus uti (quod melius erit) sufficiet so-
la victus ratio cōueniens. Ea alimenta qua in causa frigida ab au-
ctore cōceduntur, emittēda sunt, quia cholera à frigida causa nō sit.

Tertiò vacuantibus. } Si natura rectè humorem ex ventre eua-
cuet, nil oportet nos mouere. Si euacuet, sed aliquantulū diminutè rio in
(quod ex molestia colliges) tūc vomitoriis ab auctore paulò superius cholera:
descriptis utere poteris tamen uti eo, quod paratur ex aqua tepida
decoctionis hordei cum cortice, aceto, & pauco saccharo, hoc enim vo-
mitum mouet, & simul extergit, & retundit acrimoniam humoris.
Quòd si natura ita diminutè irritantem humorem expellat, ut ex
eius copia anxietas, & excrementorum frigiditas sequantur, tunc
cum hoc medicamento educemus: ℞. cassia preparata ʒ. vj. pulueris
hiera picra ʒ. iij. decocti hordei cum cortice, q. s. misce, & fiat potio:
quam qualibet hora diei assumere poterit. Qua in parte errat au-
ctor, & cum eo Vallesius, purgantes humorem, & simul corroboran-
tes ventrem: cū solū intendamus illum tam molestum educere
humorem, post cuius purgationem, si euacuatio remittat, opportunè
roborantibus utemur.

Quintò roborantibus ventrem. } Hoc in loco remedia tan-
tū sunt ea qua frigida cū sint, constringendo roborant ven-
trem. Id, quod auctor dicit de medicamentis calidis choleram ex ventrē,
cruditate curantibus, falsum est, cū ex humere semicocto non fiat
cholera. Conditum etiam auro coopertum omittatur, quia prater
expensam, non est gratum. Pratercā ea omnia, qua docet facienda, Autho-
r ut vomitum compeſcamus, inutilia sunt: quia si vomitus multus ris lap-
est, & nos humorem ita prauum violenter detineamus, certā in-
ducemus moriem.

*Descri-
ptio.* **D**iarrhæam Barbari corrupto vocabulo diarriam appellant.
Diuisio. Est autē ac si diceret simpliciter alui profluuium, cū si-
*Criticū
quod nō
est cōhi-
bendum.* ne exulceratione & inflammatione fit. Cuius variae sunt spe-
cies ac differentiae, quas sigillatim recensēbimus causas simul
ac notas cuiusque breui perstringentes. Alui ergo profluuium,
scu à toto corpore, scu ab aliqua eius parte oriatur, aliquan-
do quidem fit natura per indicationes (quas crises appel-
lant) humores inutiles expellente : aliquando verò vi sym-
ptomatum. Magnoperè tamen diiudicare oportet, an hoc vel
illo modo alui fluor contingat. Si enim crisis naturæ fiat, cu-
ratione non indiget iuxta Hippocratis præceptum aphorismo
vigesimo sectionis primæ, quæ iudicantur, & iudicata sunt
integrè, neque nouare aliquid siue medicamentis, siue aliter
irritando, sed sinere oportet. Porro num per naturæ crises se-
quutus sit alui fluor, consulere oportet ea, quæ ab Hippocr.
dicta sunt libr. 2. prognosticorum prognostico 14. & à Galen.
ibidem in cōmentario, & libr. 3. de crisis: maximū tamen si-
gnū est, si confert, & ægri tolerant. Quod si symptomaticū fue-
rit, & non à natura vincente factū, curationē requirit, & de hu-
iusmodi alui profluuiō hoc loco agitur : cuius vna differentia
est, quoties ab hepate nascitur ob multitudinē bilis ad aluum
defluentis, quæ irritat ad excretionē, vnde ventriculus & inte-
stina, non expectata in totū concoctione, chylosā substantiam
expellunt, & huius alui profluuij meminit Galen. aphor. 20. se-
ctionis secundæ. Deprehenditur, quia in deiectionibus cōmix-
tus bilioso humori chylus apparet, & quia iuuenibus tempera-
mēto biliosis accidit & æstiuo tēpore, & noctu magis, & citissi-
mè in dyssenteria degenerat. Prouenit etiam nonnunquam ob-
turatis mesenterij uenis, quibus hepar velut manibus utitur, dū
alimentū ad se trahit. Notæ sunt, quòd in deiectionibus nihil
præter chylū cernitur, & in dextro hypochondrio grauitas quæ-
dā sentitur, & antea vita, quæ humores crassos generaret, ex-
titit: verū animaduertere oportet, sæpè prædictas venas ob-
turari propter abcessum aliquem in ipsis existentem : quod
cognoscitur, quia febris adest, calor, ac dolor dextri hypo-
chondrij : lienis quoque vitio accidit, quod sic dignoscitur,
egestiones nigrae sunt, sinistrum hypochondrium dolet, id est
in eo grauitas & cætera melancholix signa cernuntur, iam &
ventriculus huius mali origo est, vel quia eius expultrix fa-
cultas fortior est, vel quia retentrix imbecillior, vel quia in-
tempe

temperie aliqua laborat, & concoquere cibos non potest. Consideranda verò sunt ad id deprehendendum, quæ supra de vetriculi affectionibus sunt dicta, & quod cibus semicoctus protruditur, & in ventriculo dolor, & grauitas sentiuntur. Multis à *Ex capite* capite alui profluuium prouenit: cognoscitur verò, quia distillatione aliqua laborant, & dolor, & grauitas capitis præcesserunt. *re.* quod ea quæ deiciuntur, spumosa sunt iuxta Hippocr. septima sectione, aphor. 29. sunt & aliæ differentiæ, quæ à nobis prætermittuntur, quod illorum in aliis capitibus mentio fiat.

Diarrhæa curatur, primò: victu refrigerante, & astringente, vt *Curatio* aëre arte parato, aceto, aqua rosarum, & similibus, quem, si e- *Victus.* pidemalis fuerit vt anno 1450. Ferrariæ omnibus fermè omnibus accidi) omninò oportet relinquere; & saluberrimum quærere, si fieri tamen non possit, considera quæ dicuntur cap. 9. secundi libri, semper tamen necessaria sunt, quæ simul restringunt, & veneno resistunt.

Cibus, sit paucus, & parum nutriens, præsertim initio, & *Cibus.* facilis concoctu, vt reliquæ corporis partes quasi auaræ redantur, propriumque retineant alimentum. Tunc enim pyra, & cydonea tosta satis nutrent, aut ius pulli gallinæ aqua calybeata factum, & eius caro tosta. Vbi diuturna fuerit diarrhæa, aut facultas imbecilla, nutriatur hepate gallinæ, ouis sorbilibus, testibus pullorum gallinæ, iucco carnis gallinæ, aut perdicis, aut arietis, iure pedum arietinorum, *In diuturna.* suillorum, & similium, amido, aut oriza assata, aut pane biscocto, & cum iure optimi nutrimenti & aqua calybeata facto: perdix tam assata, quàm elixa restringit. Si facultas fuerit admodum imbecilla, nutriatur aqua carniū gallinæ, perdicis, & arietis quæ sit per distillationem, vase vitreo apposito supra aliud vas semiplenum aqua efferuescente, miscendo ante illius distillationem aquam malorum cydoneorum, aut *Noxia* myrtillorum, semper tamen ante cibum comedat offam *& uti-* parum assatam immersam miua cydoneorum, aut rob cydoneorum, aut de agresta. Acria omnia nocent, quemadmodum *Admo-* glutinosa, & astringentia ieuant. Toties & tantum cibi sumendum, quoties, & quantum consueuerat capere, licet parum & sæpè sint alendi. qui facultatem habent imbecillam. *nitio.* Potus sit aqua chalybeata, aut pluuialis, si tamen fuerit ventriculo imbecillo, aut si solitus vinum bibere, sit rubrum & astringens, quale est Saguntinū, benè aqua chalybeata dilutum. *Potus.* Tandem quiete animi & corporis utatur, & somnò magis, *Si sit ab* quàm vigilia. Quando ventris profluuium sit à medicamento *hyperca-* immodicè purgante, acrimonia obtunditur quatuor aut *tharji.*

DE CVRAND. MORB.

sex vnciis aquæ calidæ , aut decocti hordei cum ℥. j. sacchari, vel hoc potu. ℥. mucaginis seminis psyllij , & cydoneorum an. 3. ij. decocti hordei ℥. iij. misce. Hæc tamen inmodica purgatio multis curatur modis , causis eius abscissis , primo per ea , quæ vim medicamento purgantis frangunt , incrassant, & à corpore expellunt compingendo , vt sunt mucagines supradictæ , aut per ea quæ canales , & partes seruientes expulsionis roborant , & constringunt, vt est mastix , & similia : aut per ea, quæ ad contrarium vacuant , & trahunt, qualia sunt vomitus, balneum , frictiones & cucurbitulæ : aut per ea , quæ laboriosum motum sedant per quietem scilicet , & somnum,

Si ab hæmorrhoidibus.

& per ea , quæ cor corroborant, & animum oblectant. Si quis tamen hanc rem perfectè cognoscere cupit , legat caput Mesuæ de medicamento inmodicè vacuante Theoremate tertio,

Si à suppressis mensibus.

Canone primo. Sanguinea diarrhæa , si sit ab hæmorrhoidibus , curabitur cap. 52. huius libri. Si à mensibus suppressis nascatur , cap. 56. Si citrica , vt in synocha , nulla eget curatione , nisi modum excedat : tunc curatur sanguinis missione,

Curatio critica.

per sectionem venæ cubiti internæ , extracto pauco sanguine: maior tamen copia sanguinis est educenda, cum diarrhæa sanguinea est à mutilatione membri. In vtraque tamen præcedenti sanguinis missione vtile , & necessarium est hoc , aut simile medicamentum: ℥. confervæ rosarum antiquæ ℥. ij. micetæ ℥. j. lapidis hæmatitis , coralli rubri præparati , Karabæ,

Confectio

mastichis , boli Armenici præparati an. 3. ij. syrupi myrtillorum , quod satis est misce , fiat confectio. Dosis manè , & omni hora cochlearium vnum cum aqua caudæ equinæ , aut sanguinariæ. Diarrhæa biliosa , præcedenti victu prædicto initio huius capitis , curatur vacuatione bilis per medicamenta

Curatio biliosa.

stiptica : vt ℥. rhabarbari parum assati & corticum myrobalanorum parum assatorum an. 3. j. syrupi rosarum ex infusione siccarum ℥. j. aquæ portulacæ ℥. ij. misce, & fiat potus. Aliquando initio , vbi materia fuerit multa , ante purgationem

Observa

necessarius est , vsus syruporum de agresta , cydoneorum, rosarum ex infusione siccarum , & similium , cum dupla quantitate aquarum , aut decocti portulacæ , plantaginis & similium : tunc fiet vacuatio per rhabarbarum non tostum , &

Curatio pituitosa

per mirobalanos non tostos. Diarrhæa pituitosa curatur. si materia fuerit multa , per vacuationem factam myrobalanis chebulis eodem modo paratis , & aliquando addendo scrupulum vnum agarici trochiscati , præcedenti concoctione facta per rhodomel , per decoctum , & syrupum de absinthio.

Melæcho

Diarrhæa melancholico curatur per vacuationem factam myro

myrobalanis indis, & epithymo, præcedenti concoctione per
 syrupos, & medicamenta dicta capite primo: quamuis ali-
 quando si fuerit ob obstructionem lienis, hæc diarrhæa egeat
 propria curatione, de qua capite 45. huius libri loquemur
 copiosè. Deinde auertentibus curatur. vt vomitu, autore Hip-
 lib. de locis in homine, quo libro docet vomitum curari vo-
 mitu, & ventris profluuium ventris profluuium. Sanguinis mis-
 sione, si sint signa sanguinis & robur virium. Mouentibus
 sudorem & vrinam cientibus, præsertim si simul ventrem re-
 stringant, & vrinam prouocent: vt cydonea, frictione ex-
 terna totius corporis, demptis infernis partibus. Postea cura-
 tur per ea, quæ intestina lauant, & simul corroborant, do-
 lorémque sedant, ac defendunt illæ ab vlcere, vt clystere hoc
 pauca quantitatatis. ℞. decocti hordei ℥. vj. sacchari ℥. ij.
 misce, adde lutea duo ouorum. Ex solis vnciis octo lactis (in
 quo lapides marini extincti fuerint, aut chalybs ignitus) cly-
 ster est optimus, & vltissimus huic profluuium ventris: in dy-
 senteria tamen sunt maioris momenti clysteres, & magis ad
 multa necessarij. Deinde curatur incrassantibus, meatus con-
 stipantibus & corroborantibus retentricem facultatem, vt thu-
 re, cymino assato, & aceto infuso, aniso tosto, semine na-
 sturtij assato: hæc tamen calida magis prosunt, si sit profectus
 morbus à causa frigida, quamuis in calida sint vtilia, præci-
 puè si misceantur his syrupi aut aquæ astringentes frigida,
 vt syrupus myrtillorum, rosarum ex infusione siccarum, sy-
 rupus de agresta, cydoneorum & similium. Simplicia tamen
 & composita medicamenta huic profluuium necessaria sunt,
 omnia fermè frigida, quamuis mastix calida obtineat prin-
 cipatum in omni profluuium, quare ea perpetuò vtendum est
 etiam loco salis in cibis. Oriza etiam assata est optima, adeps
 quoque caprinus, quo multi diarrhæa laborantes, etiam inue-
 terata sanati sunt, mixta cum pane facto in modum dictum
 ab Hispanis migas. Drachma vna casei antiqui in aqua ca-
 lybeata per diem infusi, deinde decies, eadem aut simili
 aqua loti, si sæpè cum cibis, aut syrupo, aut liquore aliquo
 astringente comedatur, curat omne ventris profluuium. Simi-
 liter ℥. j. virgæ cerui in puluerem redactæ. Coagulum hædi
 ab scrupulo vno vsque ad ℥. j. cum ℥. ij. aut iij. aquæ planta-
 ginis, aut portulacæ, aut alia simili adstringente, potissimè
 curatur hoc profluuium, incrassantur eo humores, ac coales-
 cunt. Sed hoc auxilio & antiquo caseo non est vtendum, nisi
 post alia remedia clementiora, vt sunt omnia simplicia astring-
 gentia, vt balaustia, spodium, hypocystis, sanguinis dra-

lica cu-
ratio.Præpa-
ratio &
euacua-
tio.Reuul-
sio.Sectio
vena.Sudoris
& vri-na pro-
uocatio.Clyster
lauans.Consti-
patio, &corrobo-
ratio.Aduerte
Masti-ches cõ-
menda-

tio.

Adeps
capri-

nus. i. capra,

aut ca-
pri ca-

strati.

Virga

cerui,

coagu-

lum hæ-
di.

Tempus

vtendi.

Simpli-

cia.

DE CVRAND. MORB.

Composita astringētia. conis, thus, sandaraca Arabum, nux cupressi, myrtillorum bac-
cæ, & similia. Composita etiam vtilia sunt multa huic pro-
fluio, vt syrupus rosarum ex infusione siccarum, syrupus cy-
doneorum, syrupus myrtillorum, syrupus de Ribes, syrupus
de agresta, miua cydoneorum, rob de agresta, aut cydoneo-
rum, conserua rosarum, vetus, conserua cydoneorum, ca-
ro cydoneorum saccharo condita. Hæc composita summu

**Ante ci-
bum su-
menda
esse Mi-
cleta.** mane sumpta sola, vel cum aqua calybeata conferunt, & etiam
tempore sitis. In prandio tamen, & cœna semper in fine no-
cent, quia impellunt cibum, idcōque initio mensæ ossa to-
sta & madefacta aliquo ex supradictis syrupis, aut rob sumen-
da est. Micleta omne ventris profluuium curat, siue per os,
siue per clysterem iniecta, est ab omnibus, & à me probata
diligenter. Sunt multa alia medicamenta composita à variis
doctoribus scripta, & longa experientia probata, lege Anti-

**Qui au-
tores le-
gendi in
hoc.** dotarium Mesuræ, Nicolai, & Arnaldi de Vilanova, in qui-
bus medicamenta omnia composita inuenire licet: quamuis
nostris temporibus extet opus diuinum Nicolai Mirepsij, à
Leonardo Fuchsio Latinitate donatum. Hoc medicamentum

**Cōfectio
causa ca-
lida pro-
batissi-
ma.** est à me, & à multis expertum in hoc profluio, præcipuè à
causa calida: ℞. granorum myrti, spodij, sumach, santalo-
rum omnium, gummi Arabici an. ʒ. j. ꝑ. ossium myrobala-
norum omnium assatorum ʒ. viij. coriandri præparati tosti ʒ.
iiij. seminis acetosæ, seminis plantaginis, seminis rosarum
an. ʒ. omnia in puluerem reducta infunduntur cum succis
plantaginis, agrestæ, & acetosæ, per diem, deinde exsiccata,
& cum sufficienti quantitate miuæ cydoneorum fiat confectio
ad modum opiatæ. Dosis ʒ. iiij. cum aqua, aut succo aliquo
astringente.

**Causa
frigida.** In causa frigida hoc medicamentum est expertum: ℞. li-
gni aloës, spicæ, galliæ muscatæ, cyperi, calami aromatici an.
ʒ. j. cymini infusi per diem in aceto, deinde tosti seminis por-
ri tosti an. ʒ. ij. ꝑ. seminis nasturtij tosti ʒ. iiij granorum myr-
ti ʒ. viij. balaustia, conchularum tostarum, thuris, fructus lê-
tisci an. ʒ. j. ameos, ʒ. j. ꝑ. omnia benè puluerizata infundan-
tur in vinum rubrum Saguntinum, aut simile per diem, de-
inde exsiccantur, & iterum infundantur in aquam cydoneo-
rum, aut aliam similem, & cum siccata fuerint omnia cum
sufficienti quantitate miuæ aromaticæ fiat confectio. Dosis ʒ.

**Deliquij
curatio
quad.
sym.** iiij. cum ʒ. ij aquæ, aut succi, aut syrupi ex superiùs dictis
alicuius. Quando laborans ventris profluio afficitur animi
deliquio à materia venenosa, hoc remedium est optimum:
℞. censuræ rosarum antiquæ, & micletæ ana. ʒ. j. confectio-

nis de hiacintho , & confectionis Gentilis cordialis contra *promis*
melancoliam ana. ʒ. ʒ. coralli rubri præparati , margarita- *est.*
rum electarum , seminis portulacæ an. ʒ. ij. lapidis smaragdi *Confe-*
ʒ. j. syrupi cydoneorum , quod satis est, misce , & fiat confe- *ctio.*
ctio cordialis. Dosis cochlearium vnum omni hora cum aqua *Aqua*
cydoneorum. Lapis smaragdus curat profluvium ventris ve- *smarag-*
nenosum auctore sene Auenzoar. Nostri enim temporibus *di fa-*
curatus fuit hoc lapide illustris Ioannes de Mendoça post *cultas.*
multa alia auxilia. Quare hac in re non est audiendus Alo- *Histo-*
sius Mundella , qui sua prima epistola damnat vsum lapidis *ria Ara-*
smaragdi contra Arabes , à quibus certè aliqua scripta sunt *bum,*
partim à Græcia prætermissa , partim ignorata , vt docet An- *defensio*
dreas Turinus nostræ ætatis doctissimus medicus. Postea, imò *contra*
semper vacuata causa ventri sunt admouenda vnguenta , em- *Aloisii*
plastra , cataplasinata astringentia , præcipuè si præcedat fo- *Mundel-*
tus hoc , aut simili liquore factus : ℞. aceti calybeati partem *lam.*
vnam , aquæ calybeatæ (præsertim si fuerit in qua extinguan- *Turinus*
tur enses , pugiones , & gladij igniti) partes duas , foliorum *Arabii*
& fructuum myrti , cydoneorum , mespillorum , sorborum *Topica.*
an. m. ij. nucum cupressi num. x. fiat ex his decoctum ad *Fotus.*
medietatem , & reseruetur ad fotum. Bis in die admoueat
ventri hæc mixtura : ℞. mastichis , & emplastri stomaticho- *Empla-*
nis ana. æquas partes , extendatur super alutam ad formam *strum.*
scuti , & magnitudinem ventris. Hoc quoque vnguentum, *Vnguen-*
si bis , aut ter , in die admoueat, est optimum : ℞. olei ma- *tum.*
stichis , cydoneorum , & myrtillorum an. ʒ. j. pulueris san- *Cata-*
guinis draconis , thuris , & gummi draganti ana. ʒ. j. ceræ *plasma*
quod s. misce , & fiat vnguentum. Hoc cataplasma , aut si- *optimum.*
mile, si quolibet die semel ventri admoueat, ventris hoc pro-
fluvium curabit : ℞. micæ panis tostæ & infusæ in aceto
calybeatum , carnis cydoneorum cum melle condita ana. par-
tes æquas , decoquantur cum oleo mastichino , & vino rubro
addendo pulueris mastichis , thuris , sanguinis draconis an.
ʒ. ij. misce, & fiat cataplasma. Emplastrum diaphanicon Me- *Empla-*
sue ex Alexandro Tralliano, & est secundæ descriptionis (Syl- *strum*
uius non credit esse Alexandri) omne ventris profluvium sine *diaphe-*
dubio curat , ventriculumque corroborat , est à me sæpè pro- *nicon.*
batum. Fetus rerum astringentium, vt sunt folia & fructus di-
cta) per annum confert non parum huic morbo. Similis est *Fotus.*
& expertus fetus pini habentis nodos igniti , & postea extin-
cti vino rubro.

Postremò curatur hoc profluvium quemadmodum a- *Narco-*
lia omnia immodica profluvia narcoticis medicamentis: *tica.*
quia

Somni vis. quia somnus omnes vacuationes detinet præter sudorem, iis tamen non est vtendum, nisi cùm alia non contulerint, & præsentia aliqua constantia viriam: multi namque his medicamentis perierunt extincto calore nativo. Quare doctus & prudens medicus primò iis externis adnotis vtatur, minùs enim hæc no-

Quidca- nendum sit docto medico. cent, & à medico, & ab assistantibus amoueri possunt & debent somno iam incepto: ne nobis contingat quod multis medicis

Suppositoria, aut clysteres. cruditis Italis, præcipientibus famulis, vt statim ab incepto somno amouerent narcotica fronti, aut ægrorum capiti adnota, quibus præceptis oblitis, multi perierunt perpetuò dormientes. Secundò, si hæc externa non suffecerint, parti inferiori sunt ad-

Topica efficacissima ad somnum inducendum. mouenda narcotica in forma suppositorij, aut clysteris. Tertiò, & in maxima fermè necessitate opiatas interiùs deuoratis vtendum est. Primò igitur fronti & naribus admoueat parũ huius mixturæ: ℥. vnguenti populeonis, & olei papaueris an. ʒ. j. Thebaici grana v. misce, solum tamen vnguentum populeon aliquando somnum inducit. Hoc etiam medicamentum laudatur in hoc genere: ℥. lactis fœminei. ʒ. ij. Thebaici ḡ. v. misce, vel ℥. olei violarum & papaueris an. ʒ. j. Thebaici ḡ. v. misce.

Clyster ad somnum. Secundò, si externa non suffecerint, hic clyster, aut similis somnum affert: ℥. lactis caprini, aut ouini ʒ. viij. olei papaueris ʒ. ij. philonij Romani ʒ. β. misce, & fiat clyster: vel ℥. philonij Romani, & micletæ an. ʒ. j. pinguedinis caprinæ, aut ceræ. q. s. misce, & fiant duo suppositoria cum philo magno bombicis, aut lini.

Narcotica sumenda. Tertiò, & vltimò, laudantur interna narcotica, quoque ataxia, & requies magna sunt tutiora. Dosis horum duorum à drachma semis vsque ad ʒ. j.

Potentiora. Postea potentiora, vt sunt trochisci de Karabe, de spodio, de terra sigillata, Dosis est ab scrupulo vno vsque ad ʒ. ij. aut drachmam vnam. Pilulæ Nicolai contra fluxum sunt probatæ in hoc numero. Dosis est quarta pars vnius drachmæ, fiant ad magnitudinem grani Orobi. Valentiora sunt philonium Romanum, Tarsense, & Persicum ad scrupulos semis vsque ad drachmam semis, vel drachmam vnam. His tamen narcoticis

Narcotica vetustiora laudantur. non est vtendum, nisi post sex menses, & quantò vetustiora sunt, tantò tutiora, vt sæpè diximus cum Gal. 12. method. Theriaca recens à drachma semis vsque ad drachmam vnam inter narcotica adnumeratur. Hoc quoque medicamentum in genere remediorum narcoticorum recensetur: ℥. micletæ ʒ. j. confusæ rosarum antiquæ ʒ. β. trochiscorum de karabe, de spodio, & de terra sigillata an. ʒ. ij. pilularum. Nicolai contra flu-

zum. 3. j. requiei magnæ. 3. ij. ss. syrup. mytillorum. q. s. misce, & fiat confectio, Dosis semel in die drachmæ duæ cum aqua, aut syrupo astringente venterculo vacuo. Pilula hæc sumpta hora vndecima noctis omne ventris profluuium curat, experta à me, & à multis medicis. Valentinis, eius author, fuit doctor Tortella: ℞. opij ḡ. j. parci ponderis, cinnamomi, cassiæ lignæ, Pilula croci an. ḡ. iiij. cum glutine, dragagati fiat pilula vna. Composita doctoris tamen narcotica post sex menses, & post annum sunt tutiora, Tortella vt diximus cum Gal. quia vis opij, & forma corrupta est sal- Quando tem maiori ex parte, quod in theriaca fermentata demonstra- sunt tu- tut, quæ calida est in fine secundi ordinis. tiora narcoti- ca.

Scholium.

Diarrhæam barbari.] Diarrhæa, quam Latini alui profluuiū Diar- appellant, est immodica per aluum excretio alicuius humoris, r hæa. siue hic sit pituita, siue bilis, siue melancholia, siue corruptus humor in ventriculo, cuius excretionem diarrhæam ventralem appellare solent, siue etiam fiat cum crisi, siue sine crisi, siue cum febre, siue sine febre: quamvis diarrhæa raro fiat ex toto corpore sine febre. Humor hic, qui in diarrhæa euacuatur, aut generatur in ventriculo, aut aliunde fluit. Si in ventriculo, aut generatur culpa ventriculi, quando intemperatus est, aut prauum humorem in cauitate continet, aut culpa alimenti cum peccat quantitate, aut qualitate. Si humor aliunde ad ventriculum confluat, aut id contingit ex toto corpore, vt in febribus, cholera, morbo, & super purgationibus: aut ex vna tantum parte, hepate, liene, capite aut alia, quam ex signis eius partis affectu cognosces.

Si diarrhæa ventriculi culpa contingat, curabitur eius intemper- Error riem corrigendo: si sit humor in eius cauitate, ipsum euacuando. Si auctoris. verò alimentum eius sit causa, diminuemus eius quantitatem, aut aliud mutabimus.

Diarrhæa curatur primò.] Diarrhæa benè potest esse epyde- Alius mialis, & sine veneno, & proinde non est, quod semper cum adstrin- error. gentibus conseruamus, quæ veneno resistunt.

Sanguinea diarrhæa.] Excretio sanguinis per aluum non dicitur diarrhæa, sed dysenteria, & ideo non erat, quod hoc in loco eius faceret mentionem.

Diarrhæa biliosa.] Biliosa diarrhæa, quæ frequenter molestare Curatio solet, aut est critica, aut symptomatrica. Critica in febribus post co- diar- rtionem apparet, quæ non est sistenda, quia in ea solus humor pec- rhæa. cans excernitur, sed solum intestinorum habenda est ratio, ne exulcerentur ex acrimonia humoris, ac tepidum infundentes. Sympto- matrica

DE CURAND. MORB.

Diarrhaea symptomatica. *matica verò, quæ in principiis februm accidit, fit à natura irritata ab acrimonia humoris, aut à calore, quod idem est, quæ, velit nolit Vallesius, semper est mala, quia cum utilis humor cum inutili mixtus in ea euacuetur, fit cum incòmodo animalis. Neque ratio eius aliquid probat, quia etiamsi videamus aliquos homines robustos ferre hanc euacuationem, non proinde colligemus eam esse bonam, reuerà enim debilitauit agrum, qui ob robur eam potuit ferre noxam, & ex accidenti iuuari multo humore inutili euacuato. Hanc ergo euacuationem in principiis morborum factam sistemus, non sanguinis missione, quia ex Hipp. fluente aluo sanguinem non detrahes, sed temperabimus bilis acrimoniam syrupo rosarum, acetositis, citri, & similibus, cum decocto endiuie & borraginis: deinde purgabimus bilem ea ratione, qua purgat auctor. Vbi aduerte nos parum torrefacere mirobalanos, & rhabarbarum, ut minuatur in eis vis purgans, & augeatur vis corroborans, ut ea ventriculus roboratus non ita facile recipiat humorem. Cibus & potus debet refrigerare, & adstringere: & ita ante assumptionem alimentum iuniorum cum paucis panis torrefacto utilis erit. Quod si perseveret affectus, manè per aliquot dies cochlearium unum nicotæ conueniet, vel pilulas ex ea construemus hoc modo, ℞. specierum confectiois nicotæ ʒ. j. cum syrupo rosarum siccatum, fiant pilule nouem, quas una vice accipiat ager. Quæ si non sumenda prosint, ad pilulas Nicolai contra fluxum deueniendum est. Ex ʒ. j. facientes pilulas xxx. & assumentes ix. hora decima, aut undecima noctis, quam quantitatem, poteris pro robore, & imbecillitate agrotantis augere, aut minuire. Haec enim pilula ratione medicamentorum adstringentium roborant ventrem, & incrassant humorem, propter opium verò somnum conciliant, & sic sistere faciunt diarrheam, quia Per aluum somnus omnes euacuationes cohibet, quæ egent ope facultatis animalis. Inferre per aluum infundes lac, in quo lapides igniti extincti sint, Regionem hepatis illines unguento refrigerante, quale est rosatum, sandalatum, mixtum (ut penetret) cum paucis aceto aut cerato refrigerante Gal. ex 10. meth. Quamuis enim ex uniuerso corpore bilis fluat, in iecore tamen focus est putredinis, & per ipsum transit bilis, antequam ad intestina proueniat. Si in februm accessionibus bile deliquium descendente ad ventriculum fiat cardialgia, tunc propina vinum aquam in acrescens dilutum, aqua enim refrigerat ventrem, & vinum etiam facit humore fione febris distributionem. Præcauebis autem in sequenti accessione animi deliquium, si antequam præhendat, panem vino madefactum, aut syrupum adstringentem assumat. Si biliosa hæc diarrhaea citra febrem accidat, prædicta curatione aluum firmato: si ex toto corpore fluit bilis, eam purgabis: si ex una parte, eam corroborabis, & causam generationis bilis submouebis. Roborabimus etiam ventriculum, qui est pars recipiens, medicamentis exterius applicatis quæ adstringentia*

finis

sint, quale est emplastrum factum ex malo cotoneo, in vino austero decocto, puluerizato cum cinnamomo, mastiche, & myrtillis. Quod si biliosa hac alui fluxio ex acri medicamento euenerit, curabitur medicamentis acrimoniā temperantibus, succo agreste, aut granatorū, sorbitione ex alica (pro qua nostra similagine utemur.) Enematis etiā emplasticis ex lacte calybeato, & amylo paratis ut c. i. diximus.

Diarrhæa ex acri medicamento.

Diarrhæa pituitosa curatur.] Si in hac diarrhæa pituitosa in vētriculo generatur copiosa, aut vētricus multas generet cruditates inedia, & abstinencia, potu (ut coquatur humor) utemur, purgabimus & roborabimus ventrē, & optima imperabimus alimenta. Si à capite descendat pituita, ipsi prospiciemus ea ratione, qua capite de distillatione diximus. Purgabimus pituitā ex ventre, & ultimo corroborantibus utemur, capite de imbecillitate vētriculi descriptis.

Curatio diarrhæa pituitosa.

Diarrhæa melancholica. Si diarrhæa sit ab humore melancholico, & critica, sinenda crit, si symptomatica, sistenda, purgantes humore corticibus myrobalanorum indorum parum correfactis & deinde adstringentibus, & aliis superius propositis utentes. Si sit ex atrabile, & critica precedentibus signis coctionis, optima erit. Si symptomatica, lethalis, nihilominus tamen in ea idem prestabimus, ac in superiori ex melancholico humore orta.

Melancholica curatio.

De lyenteria, id est, læuitate intestinorum.

C A P. XXXVII.

LYENTERIAM, quam Latini læuitatem intestinorum nominant, Galen. aphor. sect. 6. tum carentiam concoctionis dicit esse, cum scilicet neque secundum consistentiam, neque colorem, vel odorem in ventriculo facta fuerit mutatio ciborum; tum velocem exitum eorum, quæ comeduntur, & bibuntur, quæ talia deiciuntur, qualia fuerant deuorata. Veteres medici, qui primi lyenteriae nomen huic affectioni indiderunt, id voluere significare, tale quippiam per hanc affectionem intestinis euenire, quale extrinsecus in corporis cuticula ex cicatricibus contingere solet: existimant enim fieri ipsam propter internæ superficiei intestinorum læuitatem, ob quam cibos in eis contentos non amplius retinent, ut cum suam, & sibi à naturā inditam asperitatem seruarent, retinebant. Si quidem graui aliqua dysenteria præcedente, intestina ab erodentibus humoribus altè exulcerantur, deinde cicatricibus densis & læuibus succedentibus ipsa tum densa, tum læuia redduntur: vnde propter densitatem ciborum per corpus distributio fieri non potest, cum ora vasorum sint velut obturata, vasorum inquam, quæ ali-

Descriptio.

men

DE CVRAND. MORB.

mentum ex intestinis ad se attrahunt : propter læuitatem verò, cibus antequam plenè concoquatur, nullo retinente delabitur, atque sic de lyenteria sentiunt : quos Galenus non probat.

*Diuisio
ex Pau-
lo.*

Quam rem (vt puto) animaduertens Paulus Ægineta lib. 3. cap. 40. duplex lyenteriz genus facit , alterum quidem quod ex intestinorum exulcerationibus , & eorum cicatricibus ori-
tur, quod mali genus intestinorum tormina plerumque sequi-
tur. Aut ex aliis distillationibus rheumatísque inducitur. Alte-
rum verò, quod ex infirmitate languoréque facultatis, quæ ali-
mentum in stomacho retinet, prouenit : hac enim languente
ac imbicilla , cibi neque concoquuntur , concoctiue distri-
buuntur, sed crudi, humidi , & nihil immutati excernuntur

Causa.

continuo fluxu tentata aluo. Ex his quæ dicta sunt , constare
potest à quibus causis hoc malum proueniat : fit enim vel ab
exulcerationibus , & cicatricibus intestinorum , vel à faculta-

Signa.

tis imbecillitate. Interdum & post voluulosa tormina, & post
alui ingens profluuium sequitur. Aliquando etiam & aqua in-
ter cutem per ventrem euacuata contingit. Signa sic ab Aëtio
adnotantur libr. 6. cap. 51. Ex quacunque igitur causa lyente-
ria orta sit ægri cibum non sentiunt, & malum corporis habi-
tum acquirunt, quod vtrumque malum inemendabile est: suc-
cedit enim ægri assidua excretio cruda, colore subalbida , inæ-
qualis , & aquosissima citra sanguinis ac bilis complexum.
Adest autem simul & ardor per tota præcordia se dilatans, quem
cibi fastidium comitatur. Videtur autem bonum & amicum
signum in eis ructus acidus esse , indicat enim iucundi quip-
piam factum esse , & ventrem ac intestina non velut inania
cibum sinere pertransire : hætenus Aëtius. Verùm hoc vlti-
mum confirmat etiam aphorismus suprà citatus primus sectio-
nis sextæ in longis læuitatibus intestinorum , si acidus ructus

*Curatio
lyente-
ria ex
acrimo-
nia.*

fiat , qui priùs non erat , signum bonum , & quæ à Galeno in
commento dicuntur. Præcedenti cap. multa scripsimus non
solum diarrhææ utilia , & necessaria , sed lyenteriz & omni
ventris profluuiio : ideóque paucis curationem hanc expedie-
mus.

Victus.

Si intestinorum & ventriculi læuitas fuerit à re acri irri-
tante expultricem facultatem , & retentricem imbecillam
efficiente , curatur primò ratione victus conueniente , de qua

*Deroga-
tio.*

superiori capite. Secundò , vacuatione materiæ calidæ per
rhabarbarum tostum facta , & per myrobalanos, citrinas simi-

*Corrobo-
ratio.*

liter tostas. Deinde per frigida stipica corroborantia , vt sunt
electuarium diarhodon Abbatis , syrupus de agresta , syrupus
rosarum ex infusione siccarum , & similia. Si fuerit ab vlceri-

*Curatio
ex vlec-
ribus.*

bus

bus ventriculi & intestionum (quod per excrementa cognoscitur, & per dolorem, quo tempore sumendus est cibus, praesertim acer, & expellenda excrementa) curatur per abstergentia, mundificantia, & consolidantia, de quibus cap. de pleuritide & suppuratione dictum est. Si fiat à materia multa ventriculo affixa (à qua saepius fit) curatur. Primò, victu tenuante incidente, tergente, ut rebus salis parum amaris, & parum acribus. Secundò paretur pituita rhodomelle, syrupo de absinthio & oxymellite. Si, cum decocto, aut aquis absinthij, foeniculi, mentae, & similibus. Tertiò vacuetur vomitu aut deiectione facta per vnciam seminis diaphænicon, aut per 3. j. pilularum elephanginarum, aut stomachicarum, aut per 3. j. agarici trochiscati. Postremò corroboratione facultatis concoctricis, & retentricis medicari poterimus per ea, quae diximus cap. 31. de curatione imbecillitatis ventriculi. Hoc cataplasma est in hoc genere bonum. ℞. mentae siccae, balaustiae, myrti, corticis mali granati, anteræ, florum rosis marini an. 3. j. myrrhae, mastice, gummi Arabici an. 3. ij. vini rubri & succi cydoneorum an. æquas partes & sufficientes pro cataplasmate. Hoc medicamentum est in hoc expertum. ℞. pulueris caudæ equinae, balaustiae, mentae, mastichis an. 3. ss. foliorum myrti, seminis lini tosti an. 3. iij. syrapi myrtillorum. q. s. misce, & fiat confectio, Dosis drachmæ duæ sunt mane & vespere cum syrupo, & aqua aliqua adstringente. Hoc cataplasma ventriculo & ventri saepe admotum est optimum in hoc genere. ℞. acaciae, psidiae, gypsi, granorum vuarum, boli Armenici, hypocistidos, balaustiae, galbani, myrti, mastichis an. 3. ss. cariophyllorum, cincamomi an. 3. ij. vini rubri optimi, & succi cydoneorum an. æquas partes, & sufficientes pro cataplasmate. Semper ante cibum comedat æger duo, vel tria cochlearia miuae aromaticæ, aut duas offas tostas & madefactas prædicta miua, desuper addendo parum coriandri præparati, & cinnamomi. vel parum pulueris scripti capite 31. Ius carnis perdicis elixæ aqua calybeata, & prius plenæ cera noua, pinguedine hirci castrati & cydoneis, mespilique curat hoc, & quodcunque aliud ventris profluvium.

Curatio
lyenteria
materia
affixa
ventriculo
Victus.
Preparatio.
Vacuatio.
Corroboratio.
Topica.
Cataplasma.

Confectio
sumenda.
Cataplasma
optimum.

Ius perdicis.

Scholium.

LYENTERIAM, quam Latini.] *Lyenteria est affectus praeter naturam, in quo celeriter ea, quae comeduntur talia deijciuntur, qualia deuorata fuerunt. 4. aph. com. 12. vel ex 6. aph. com. 10. breuius, est coctionis carētia. Qua in parte errat Hieremias existimans*

Lyenteria
quid

mans

mans in ea tenuem alimenti partem concoqui, si enim non retine-
tur, quomodo cōcoquitur? Hic affectus est symptoma in his qua im-
modicè exernuntur, sequens etiā aliquando aliud symptoma, nēpe
debilē actionem facultatis retentricis. Praterēa hic affectus solet
sequi morbos instrumentorum omnium, qua ad aluum pertinent,
qualia sunt ventriculus & intestina. 4. aph. com. 12. sic Hippocr.

Obiectio. pradiſti commentarij sententia sic habet. Quorum alui lauitate in-
testinorum laborant, &c. Vnde cū Galenus lib. 6. aph. com. 1.
agens de Lyenteria solius ventriculi meminit, adde intestina, aut
ea nomine ventriculi intellige. Dicit quis, si ventriculus est in-
strumentum concoſtionis, & in lyenteria alimentum crudum ma-
net, qua ratione lyenteriam etiam in intestinis collocamus? Respo-
des intestina etiam cōcoquere, et si leuiter, cū habeant cōmunē tu-
nicā cum ventriculo, ac proinde si alimentū in ipsis morā faceret,
concoqueretur. in lyenteria verò cū crudū omnino excernatur si-
gnum est ipsum neque in ventriculo, neque in intestinis detineri,
& lyenteria esse affectionem ventriculi & intestinorum. Morbi
ad quos sequitur lyenteria, duo sunt. Vnus est intemperies quali-
bet debilem reddens retentricem facultatem, & potissimū fri-
gida, & humida, quia hac molles reddit fibras, qua robur postu-
lant ad retentionem. Rursus hac intemperies frigida & humida.
aut est nuda, aut quod ut in plurimū contingit ortū habet ab hu-
more pituitoso in ventriculo generato, aut aliunde fluente. Atque
hac est lyenteria, qua non sequitur immediatē morbum, sed aliud
symptoma, quod est actio abolita facultatis retentricis. Secundus
morbus lyenteria efficiens est soluta continuitas partis interna vē-
triculi, & intestinorum, qua fit ab acri humore: in hac enim parte
aliquādo contingunt exulcerationes multa proportionem habentes
cum aphthiis, qua ratione, existimo in variolis, & morbillis lyenteria
fieri: & idcō esse lethale, & postulare eā curationem, qua roborā-
tis partibus internis humores ad externas expelluntur, ut libro
secūdo videbimus. Fit ergo in hoc secundo morbo lyenteria, eò quòd
alimentū in ulcusculis dolore excitās expellitur à facultate, & sic
noxa refertur ad irritatā expultricē. Præctici sequuti Paulum
& Cornelium Celsū tertium morū in lyenteria addunt, quod est le-
uitas ventriculi à magna cicatrice inducta. Quorū sententiā non
probo, non enim potest tanta viuēte animali soluta continuitas in
vētriculo incidere, ut eā cicatriē inducat, ex qua sequatur lynte-
ria, ab exigua enim non fiet. Lyenteria acutissimus est affectus,
cū enim partes non nutriantur, atrophia patientur. Neque pu-
gnat, quod Hippocr. dicit 6. aphor. In longis lauitatibus intestino-
rum, quia cū ha sequantur diarrhaeas, potissimum ventrales, si
tempus deiectionis consideremus longa erunt.

Si intestinorum & ventriculi.] Si causas lyenteria, hoc est mor- Error.
 bos ad quos sequitur, consideres, intelliges malè auctorem curare auctoris.
 lyenteriam à re acri irritante factam, cum talis non detur: sicut Curatio
 neque illa, quam à multo alimento oriri scribit. Curabitur ergo lyente-
 hac ratione: si ortum habeat ab intemperie nuda, contraria alte- ria.
 rantia conuenient: si cum affluxu pituita, si affluxus multus est,
 corticibus myrobalanorum chebulorum torrefactis cum hiera, aut
 decocto eorum cum hiera & agarico, ut ventriculus purgetur si-
 mul, & roboretur. Si autem humor contentus in ventriculi cavi-
 tate multus sit, fluxusque non sit magnus, tunc abstergentem in-
 tendemus facultatem, miscentes aloëm cum hiera, idque non unica
 vice prestabimus, hac enim neque totum humorem euacuabit, ne-
 que ventriculi facultatem (qua multum laesa est) corroborare pote-
 rit. Possumus etiam his peractis exterius applicatis ventriculo ro-
 bur addere. Hoc unguentum id commodè prestabit. ℞. olei cotoneo-
 rum, mastichini, & myrtillorum an. 3. j. pul. sanguinis draconis,
 mastichis, gummi dragaganti an. 3. j. cera. q. s. misce, & fiat unguen-
 tum. Vtemur etiam emplastro stomaticho confortatiuo, per os: syru-
 pus de absinthio roborabit ventrem. Si post euacuationem ventricu-
 li & eius corroborationem, ructus acidus apparuerit, bonum est,
 quia melius est coctionem esse immunitam.

De Dysenteria. CAP. XXXVIII.

CVM quatuor sint dysenteriae differentiae, ut apud Galenum Descri-
 videre est sexto de morbo & symptomate cap. 2. ad finem, ptio.
 de vltima nobis agendum est, quam describentes, & solam dy-
 senteriae nomine dignantes dicimus, esse vlcus intestinorum:
 Galenus verò citato loco suprà eius notas simul enumerans de
 hac, hunc in modum loquitur. Per quartam verò, scilicet dysen- Notæ
 teriae differentiam, paulatim, & breuib. interuallis deiectio
 fieri solet, nonnunquam grumosi, cum quo interdum puris quo-
 que nonnihil excerni conspicitur, itidem & ramenta (Græci vo-
 cant ephelcidas) & partes quædam intestinorum membranis
 similes, sæpenumero densum quoque stercus excernitur cruen- Causæ.
 tis guttis respersum. Porro Latini hanc affectionem tormina
 appellant, ob id conicere licet, quòd intestina ulcerationis
 dolore admodum torqueantur: vnde hoc malo affecti tormi-
 nosi perinde ac Græcè dysenterici dicuntur. Prouenit autem
 Aëtio capit. 43. lib. 9. ab externis causis veluti frigiditate, ar-
 dore, perniciosorum medicamentorum potu, ut scammonij
 & colocynthidis. Item à cruditatibus, & ciborum acrimum sum-
 ptione: Galenus verò libr. 1. de loc. affect. mordax humor
 dysente

DE CVRAND. MORB.

dysenteriae causa statuitur, ut qui ab initio & abstergat, & abra-
dat: deinde temporis interuallo ulceret intestinum. Nonnun-
quam à tenesmo incipit hoc malum, sæpè etiam per se. Si à
causis exterioribus accidat, interrogandus æger erit, sin minùs
per traditas sæpè methòdos internæ causæ sunt inuestigandæ.
Signa verò quibus morbus cognoscitur, iam suprà à Gal. tacta
sunt, quibus alia quoque addit Aëtius, sed dicta satis sunt. At cum
aliquando contingat tenuia, aliquando verò crassa intestina in
hoc morbo ulcerari, breuiter Paulus in hunc modum docet di-
stinguere. Si cum stercore mixta exulcerationis signa cum la-
bore, & circa umbilicum torminibus excernantur, in gracilibus
intestinis exulcerationem esse cognoscēs. Si verò absque vilius
rei communiōe immixtum stercus egeratur, in crassioribus,
Hæc multò fusiùs ab Aëtio, & à Gal. 5. de loc. affec. c. 5. tractan-
tur. Cæterum tam grauis est hæc ægrotudo, & curatu difficilis, ut
quamuis eius curatio nunquam sit expectanda, maiori tamen
ex parte desperatur, maximè in iis, de quibus Aphor. 3. sect. 6.
scriptum est in longis difficultatibus intestinorum, cibi fasti-
dium malum est, & cum febre peius: & 23. sect. 7. à deiectione
syncera difficultas intestinorū malum: & Aphorismo 24. sect. 4,
difficultas intestinum si ab atra bile inceperit, lethalis est, cui
aphorismo consonare videntur, quæ dicuntur sectionis 6. aph. 43.
Quicumque lienosi à difficultate intestinum capiuntur, iis su-
peruenientem longam difficultatem intestinum aqua inter-
cutem, aut læuitas intestinum excipit, & moriuntur.

**Chara-
tio.** Quatuor itaque remediorum generibus mederi dysenteriae
Victus, possumus: Primò, victu refrigerante, & astringente, si sit cau-
sa calida (à qua sæpiùs fit.) Ut cibis parum acidis ad excitan-
dam appetentiam, paucis & facilibus concoctu, & bonum san-
guinem gignentibus, quales sunt testes gallorum gallinacco-
rum, oua sorbilia, hepata gallinarum, succus, aut aqua galli-
næ, vel perdicis cum succo agrestæ, aut acetosæ. Vitentur ace-
**Qua no-
ceant.** tum, salsa, acria, quia ulceribus nocent, mordacia. In hoc
genere, quæ scripta sunt cap. 36, de curatione diarrhææ, con-
ueniunt.

**Vacua-
tio.** Secundò, materiam vacuantibus biliosam (à qua fit crebrius)
ut myrobalanis citrinis parum tostis, rhabarbaro etiam tosto: ut
℞. corticum myrobalanorum citrinorum, parum assatorum,
**Potio bi-
liosa.** rhabarbari parum tosti an. ℥. ij. syrupi rosarum 3. j. aquæ por-
tulacæ 3. ij. misce, & fiat potio. Si à pituita salsa sit dysenteria,
hac portione, vel huic alia simili vacuabitur. ℞. corticum myro-
**Pituito-
sa.** balanorum citrinorum, & chebulorum parum tostorum an. 3. ss.
agarici trochiscati ℥. j. syrupi rosarum 3. j. aquæ plantaginis 3.
ij. misce,

ij. misce, & fiat potio. Si fuerit ab atra bile, myrobalanis indis parum tostis vacuabitur.

In fine 3. generis capit. 35. docuimus purgationem in omni *Melan-*
 ventris profluuiis esse faciendam per medicamenta astringen- *cholice*
 tia, & quæ omni carent acrimonia, & facultate ignea, quales
 rhabarbarum parum assatum, & myrobalani modicè assati. Qua-
 re dicitur Amatus Lusitanus Centuria 2. curatione 44. credens
 lotionem & infusionem solam in aqua plantaginis, aut alia si-
 mili posse acrimoniam, & vim purgatoriam tollere, cum sub-
 stantia horum sit terrestis, & densa, à qua sola decoctio, aut assa-
 tio potest rectè acrem, & purgantem facultatem separare, rema-
 nente sola astringente, & parum purgante, & vlcera curante, quæ
 indigenus in ventris profluuiis, præsertim in dysenteria, cui
 maximè nocet mel, cum autore Gal. 5. de facultatibus alimento-
 rum cap. 39. mel sit tenuium partium habens acrimoniæ quip-
 piam, quæ præterquàm quòd aluum ad excretionem excitat, vl-
 ceribus multum nocet. Est quoque calidum, & siccum secundo
 ordine, vertiturque in bilem in iuuenibus & biliosis, & non po-
 test materiam huius, & alterius profluuij purgare. Neque con-
 trarium sentit Galen. 2. de facultatibus simplicium medicamen-
 torum cap. 12. & 14. docens prius esse educendos humores fa-
 cientes morsiones, & postea, quæ morsiones acrimoniam tol-
 lunt datæ per os, & per inferiora in aluum infundere. Purgat Ga-
 lenus humores facientes morsiones melle, quo nunquam Ga-
 lenus in dysenteria vsus fuit, nisi iniecto per clysterem ad lauan-
 da, & tergenda vlcera, vel per os sumpto ad purgationem mixto
 cum aqua plantaginis, aut alia, & paucò decocto. Pari modo lac
 siue asininum, siue caprinum iniectum per inferna vtilissimum
 est, præsertim si in eo lapides igniti extincti fuerint: per os verò
 sumptum nocet huic morbo, maximè, si æger fuerit biliosus la-
 boratque febre putrida.

Tertiò, sanantibus vlcera, primò lotis intestinis à muco, & *Deter-*
 à materia mordaci hoc, aut simili clystere. ℞. decocti hor- *gentia*
 dei lb. j. sacchari rubri ʒ. ij. misce. Si vlcera sint in superio- *vlcus.*
 ribus intestinis, bibat vncias quatuor, aut sex superioris liquo-
 ris. Cum maiori egent lotione intestina, hoc aut simili clyste-
 re vttere. ℞. decocti hordei cicerum nigrorum, & furfuris ʒ. x.
 oxymellis simp. & rhodomellis an. ʒ. j. misce: aut bibat ʒ. v. si vl-
 cera sint in intestinis superioribus. Si vlcera fuerint sordida,
 maiori egent lotione, decocto scilicet lupinorum, myrrhæ & *Lactis*
 absinthij, & oxymelle simp. & compos. Sed hæc & similia vlcera *calybe-*
 rarò curantur, etiam si sit in intestinis inferioribus, Lac caly- *ti lausi.*
 beatum, vel in quo extincti fuerint lapides marini igniti, siue
 per

DE CVRAND. MORB.

*Sarcoti-
ca.*

*Clyster
fit mi-
nor lb. j.
Anti-
qua cu-
ratio.*

per os , siue per clysterem infundatur , lauat , moderatè re-
frigerat , & dolorem sedat , quare eo sæpè vtendum est:
præcipuè iniectio per clysterem , quando intestina inferiora
affecta sunt vlceribus. Lotis intestinis, & eorum vlceribus mū-
dificatis, necessaria est incarnatio, glutinatio , & consolidatio
addendo quæ internam superficiem tegant & muniant, vt sunt
pinguedines, cera, & similia, quod his clysteribus perfectè fiet:
℞. succi plantaginis , & portulacæ an. iiii. albuminis duorum
ouorum, pulueris mastichis, sanguinis draconis, gummi draga-
ganti an. 3 j. β. ceræ, pinguedinis caprinæ an. 3. ij. misce, & fiat
clyster, vel ℞. iuris pedum, in quo sint decocta folia sanguina-
riæ, plantaginis portulacæ, & caudæ equinæ 3. viij. pulueris ma-
stichis, sanguinis draconis, & boli Armenici an. 3. ij. ceræ, pin-
guedinis caprinæ an. 3. β. misce, & fiat clyster: vel ℞. lentium
rostarum, orizæ assatæ , rosarum , balaustiarum , sanguinariæ,
caudæ equinæ an. m. j. fiat decoctum, de quo accipe vncias octo,
micletæ 3. β. trochiscorum de karabe 3. j. vitella ouorum ace-
to elixorum numero duo, misce & fiat clyster. In hoc profluui-
o ventris, & in quocunque alio quantitas clysteris sit minor vna
libra, ne suo pondere noceat. Aliquando in antiqua dysenteria,
vbi alia non sufficiunt, necessaria sunt narcotica, primò externa
secundò iniecta per inferiorem partem , tertio per os sumpta,
obseruando semper, quæ diximus cap. 36. præsertim virium ro-
bur, cū in hoc morbo semper ferè sit facultas imbecilla.

Scholium.

*Dysen-
teria.*

*Dysen-
teria cō-
ditiones.
Vnde or-
ta fuit
varia
dysente-
ria si-
gnifica-
tio.*

CUm quatuor sint.] Dysenteria propriè à veteribus appella-
tur sanguinis euacuatio per sedem cum torminibus ex vlcere
intestinorum procedens. Vnde tres habet conditiones , prima, vt in
ea sanguis profluat, secunda, vt profluat cum torminibus, tertia ve-
ditio. rō, vt ex vlcere intestinorum. Inde factum est, vt nomen dysenteria
Vnde or- variè accipiatur : nam aliquando euacuatio qualibet per aluum,
ta fuit dummodò sanguinis sit , dicitur dysenteria , vt in hepatica , &
varia cruenta videre est. Aliquādo etiam qualibet euacuatio per aluum
dysente- cuiuscunque humoris , dummodò dolorem & mordicationem exci-
tia si- tet , dysenteria gaudet nomine. Hac ratione 3. de causis sympto-
gnifica- matum c. 2. sanguinis nigri ex iecore excretio dicitur dysenteria:
tio. de hac etiam loquitur Hippocrates 7. Aphor. sent 5. cū scri-
bit : à furore dysenteriam bonum esse , vbi dysenteria significat
mordicationem in intestinis ab humoris translatione factam. Ea-
dem ratione 6. aph. sent. 43. & 48. intelligendū est, cū in lienosis
dysen

disenteriam, euenientē bonum esse docet, in his enim ab humore melancholico, qui exulcerare non potest, per intestina transeunt, flatus excitantur, à quibus fit dolor. Neque enim est, quod cum Hieremia hūc dolorē à parte humoris putrefacta fieri concedamus: nam hac ratione lienosi habuissent febrē. Dysenteria illa, in qua sanguis excernitur, quā sanguineā appellamus, quatuor habet differentias lib. 3. de caus. sympt. cap. 2. à Gal. explicatas nomine cruenti excrementi. Prima est cū optimus sanguis ex toto excernitur corpore, ob mutilatum insigne membrum, aut amissum validum aliquod exercitium, aut suppressam consuetā euacuationē, seruato eodem vitia. Cruentorum deiectionum 4. differentia.

Alia, neque sanguine arte euacuato sanguinis missione, aut alia ratione. Secunda, cū excernitur aquosus sanguis, ex imbecilla conditione iecoris proueniens. Tertia, cū per aluum deiicitur sanguis niger, & splendens, quā dicitur, dysenteria hepatica. Vltima est deiectio cruenta ex ulcere intestinorum nata, quā propriē dicitur dysenteria, in qua sanguis paulatim, & breuibus interuallis excernitur: paulatim, quia fluit ex ulcere, & non ex cavitatē veni per breuia interualla, ob irritationem. Hac aut est siens, aut facta. Siens (in qua iā est dolor) tunc dicitur, cū pinguis (hoc est mucosus humor tunicis intestinorum hærrens, & pinguedo) excernuntur. Facta verò, cum ramenta, aut carunculis similia. Hanc dysenteriam à frigidityte etiam posse fieri scribit Vallesius, adductus ex Hippocrate lib. 2. epy. sec. 1. cōmen. 4. ubi frigiditatem ulcerare sētit. De- bui tamen Vallesius considerasse ex placiti absurditate illum librū Vallesius non esse Hippocratis, aut debuit legere unā cum Petro Iacobo Steue taxatur. Lauda- ciue nostro medico Valentino, in doctissimis in eum librum cōmen- tariis, non ut frigus ulceraret, sed ut ager frigus attraheret. Quā tur Pe- lectio contextui magis quadrat, ut ibi videre poteris. Errat etiam Iaco- hac in parte Vallesius, existimans Hippocratem agere in prædicta bus Ste- sententia de dysenteria, cū de diarrhæa loquatur. In hac dysente- ria (de qua auctor agit in hoc capite) aut est ulcus in intestinis te- Vicus in- nuibus, aut in crassis: quod distingues ea ratione, quā contextus do- quo inte- cet. Si dysenteria in tenuibus intestinis appareat, difficile curatur. fino sit

Primò ob situm, quia eò alimenta iā mutata perueniunt. Secundo distin- ex natura propria, quia sunt membranosa, & sicciora, quā crassa guandū. Cause propriē dysenteria sunt res acres, siue sint humoris biliosi, a- Cause trabiliarii, aut pituitosi, dummodò pituita salsa sit, aut m. d. amē- proprie- tum acre. Ut in plurimum tamen ab humoribus biliosis oriri solet. dysente-

Secundò, materiā vacuantibus biliosā.] Bilē purgamus, ut rie. prohibeamus, ne ulcus maius fiat. Exhibemus verò medicamenta pur- torrefacta, ut roborentur intestina, ne recipiant fluxionem. Quā si genus consideraſſent Amatus, Hollerius, & Rödelcius, non prohibuissent bilem, & eorum usum præsertim cū adducti sint leui ratione torrefactio. n. medica- exigua

mentis exigua non relinquit empirreumā, sed magna, ita ut mutet spe
 torrefa- ciem res, ut in bile vitellina, porracea, atrabile, calce, videre pote-
 ris. His medicamentis purgantibus pluribus vicibus uti oportet.
 Aliquo- quia una eorū exhibitio nō sufficit. Tantāq; est necessitas istius pur-
 rum re- gationis (quā fortasse veteres aloē, aut hiera adstringente exerce-
 prehē- bāt) ut, nisi timeremus phlegmonē, praece-deret sanguinis missionem.
 sio. Qua in parte mirandum est Valles. 2. epy. sec. 6. com. 27. tantū pur-
 Valle. gare in maligna dysenteria, qua non potuit adstringentibus & ex-
 senten- tergentibus curari. Si enim sit dysenteria ex bile acri, qua ratione
 tia non adstringes non euacuata causa? tum cum adstringentibus ute-
 proba- ris, aut perseverat fluxio, aut non: si perseverat, augetur vlcus, si nō
 zur. perseverat, nōne humor ille sua acrimonia irritans detētus noxis-
 Sangui- simi mali, & peioris fortē erit occasio? Si ergo causa agentis affe-
 nis mis- ctuū ratio est habenda, in qualibet dysenteria euacuare oportebit.
 sio. Tertiō, sanantibus vlcerā.] Ante curationē vlcis opus est sē-
 per in dysenteria, dūmodō vires constant, sanguinē mittere, ob affe-
 ctū postulantē euacuationē, qui est phlegmon: qui futurus timetur
 ob dolorē. Et idcō malē Rondolet. existimat, in dysenteria, cū mole-
 stia scari venā. Secta vena vlcus curabis, extergens prius, & dein-
 de agglutinans, quod rectē prestabis, si distinguas locum affectū, an
 Cur lo- scilicet vlcus sit in tenuibus, aut in crassis intestinis, nā si sit in
 cus affe- tenuibus, quae iuxta ventriculū sita sunt, remediis per os assumptis
 ctus di- utemur, sicut in crassis per clysterē immisissis. Et idcō nescio, qua du-
 stinguen- ctus ratone Valles. 2. epy. sec. 3. com. 4. in dysenteria siue malū sit
 dus. in superioribus intestinis, siue in humilibus, in cibis, & potibus, &
 medicamentis ore assumptis curationis spē collocet, ec. n. quae per os
 assumuntur, integris viribus ad intestina crassa nunquā perveniēt,
 bene tamen per clysterē infusa. Si ergo vlcus tenuia occupet inte-
 stina, ipsū exterges per os assumens decoctū hordei, aut cicerū cum
 saccharo, aut ℥. xx. aqua mulsā: quod si lenire etiā velis dolorē, la-
 ste cū amygd. meris. Expurgato vlcere ad astringentia descendes,
 Conglu- qua vim habent conglutinandi, qualia sunt bolus armenus cū aqua
 tinantia plantaginis, syr. etiā de agresta, myrtillorū, & rosarū siccarū, cum
 Exterjo decocto rosarum siccarum, & hordei. Vlcus verò crassorū intestino-
 vlcus rū extergemus sine acrimonia, clystere infuso ex mulsā, aut ex ℥b.
 crasso- j. decocti hordei cū cortice, & mellis rosati ℥. j. poteris etiā saccha-
 rum in- rū, aut mel cū predicto decocto miscere: quod si volueris addere oleū
 testino- rosaceū, benē licebit ob dolorē. Si vlcus sordidū facit, ad ea, quae
 rum. fortius abstergunt, devenies ad decoctum hordei cū melle centaurii
 In vlce- aut cura predicto decocto miscebis ℥. j. unguent. apostolorum,
 re sordi- aut ℥. ss. unguenti aegyptiaci, aut ℥. j. pulu. Ioannis Vigenis. Quod
 do exter si vlcus sit in intestino recto, predictis unguentis intinges
 gentia. flammulam, & immittes. Si his non curetur, deveniendum erit
 cū

cum vlcus est putridum, & serpens, ad caustica, quibus crusta inducimus. Assumentes pastillorū Andronis, aut Pasionis. 3. ij. rī succo plantaginis, aut decocto myrtillorū, ex quibus etiā possumus unguentū construere ad iniungendam flammulam in ulcere intestini recti. Atramentariis etiam mysi, calcantho, seri, & aliis cum succo plantaginis uti poteris. Expurgato ulcere, quod cognosces ex paucitate saniei, & ex sanguine puro egrediente, cicatricem induces adstringentibus medicamentis, permiscens cum his qua acrimoniam bilis temperent. Præterea cum hac affectio vigilias, & dolorem inducat, eis prospicere oportet, quia vires deiciunt. Vigiliis medebimur ea ratione qua cap. de phrenitide diximus: hæc autem potio in hoc affectu est utilis qua bilem temperat, adstringit, & somnum conciliat: ℞. Syrupi de papauere 3. j. ℞. Syrupi myrtillorum 3. j. diamargaritonis frigidi 3. ℞. boli 3. ℞. aquarum plantaginis, & cauda equina an. 3. ij. capiat dormiturus aut poteris exhibere pilulas Nicolai contra fluxum. Dolorem sedabis anodinis propriè, sauo anserino cum rosaceo, aut decocto capitis arietis, vel gallinæ cum rosaceo. Quibus si non sedatur, narcotica proderunt, aut supra partem dolentem unguentū comitissa applicabis: in quo grana tria opij sint dissoluta.

Si sit putridū & serpens.
Cicatricem inducentia in dysenteria.
Ad vigilias, ad dolorem.

De Tenesmo. CAP. XXXIX.

Tenesmus vehemens, & inanis est deiiciendi appetitus cum paucō sanguine, lenta, & mucosa eiectione. Quæ definitio placuit Paulo libr. 3. cap. 41. & Aëtio libr. 9. cap. 43. Hic affectus quamuis Celso, autore libr. 4. ca. 18. neque acutus neque longus sit, cum faciliè tollatur, ut ipse inquit, & nunquā per se iugulet (molestus tamen est omnibus, & vterū gerentibus molestior. Nam (sene & sapientissimo Hip. autore 7. libr. aph. 27.) mulieri, vterū gerenti si tēsis superuenerit, facit abortum: qui aphorism. licet quinquagesimus in antiqua Constantini translatione cum commen. Galeni reperiatur 5. lib. in quo Philotheus exponit sic aphorismum. Tenesmus, inquit, est continuus, & violentus motus, & secretio pituitosarum, atque pinguium materialium, cum paucō stercore, & breui sanguine allecto, in antiquo tamen, & Aldino contextu hic aphorismus non reperitur in 5. libr. & propterea Theodorus, Leonicens, Musa, Hieremias, Fuchsius, & alij docti scriptores tantū in 7. libr. collocant hunc aphorismum, qui siue semel in aphorismis ab Hippocrate scribatur, siue bis, ut multi alij, nimirum si qualia oportet purgare, &c. & ille vterum gerentes, si conuenit purgare a quarto vsque ad septimum, &c.

Molestus vterū gerentibus hic affectus.

DE CVRAND. MORB.

Verus est vt Galenus in commentario demonstrat , dicens, ob talem igitur tensionem atque molestiam , & totum aliud corpus laborat, sed præ cæteris, matris, quæ cognata est recto intestino : nihil enim mirum, si propter vehementes, atque crebras exurrectiones foetus abortitur, quando ex aliis omnibus fortibus motibus, atque doloribus mulieres grauidæ solent abortire. Fit hoc malum aliquando ab vlcere intestini recti, quamuis Gal. initio commentarij dicti , 27. visus sit sentire, ab hac causa semper fieri Tenesmus , vt in difficultate intestinorum sit vlcus , in intestinis, quæ superius sunt. Neque audiendus est Erasistratus qui (vt ait Gal. com. 16. lib. aph.) tres esse species læuitatis intestinorum voluit, difficultatem videlicet intestinorum, læuitatem propriè dictam, & tenesmus. Nonnunquam fit à frigidityte externa aut ab inflatione recti intestini, aut à falsa pituita, aut ab humoribus serosis , acris , & biliosis. Aliquando (vt scribit Aëtius loco superius annotato) obstructio sterco ris coacti in intestino cæco efficere potest Tenesmus. Frigidam causam externam ex ægro deprehendes. Humores & excrementa ex iis, quæ cernuntur, dignosces. Vlcus ex pure, & sanæuine minimo sterco ri immixto inflammationem ex dolore grauante, & ex febre significat. Stercoris multitudinem cognosces ex graui sensu, & distentione circa ventrem imum , & ex priuata deiectione. Pro varia causarum ratione variè etiam medicinam facere consueuimus: curatur tamen. Primò, victu iam dicto tribus superioribus capitibus, vel saltem contrario causæ. Deinde si ab vlcere fiat , curabitur , vt diximus cap. præcedenti de dysenteria. Si ab aliis causis per ordinem curabis. Si ab inflammatione sit, sequenti capite curationem demonstrabo. Si corpus bile redundet, vacuabitur per drachmam vnam rhabarbari , aut per drachmam semis corticum myrobalanorum citrinorum , deinde per clysterem lauantes : vt ℥ decocti hordei ℥. v. succi siclæ ℥. ij. sacchari rubri ℥. j. misce , & fiat clyster , adde vitella ouorum numero duo, olei rosati ℥. ij. β. Si causa sit pituita falsa. ℥. decocti furfuris, & cicerum ℥. v. succi siclæ, & rodomellis an ℥. ij. misce, & fiat clyster. Si à fæcibus induratis fiat ℥. foliorum maluarum , violarum , & mercurialis an. m. j. furfuris, passularum sine granis , prunorum damascenorum an. p. j. fiat decoctum , de quo percolato accipe ℥. vij. diacatholicon, & butyri recentis ana. ℥. j. benedictæ ℥. β. olei sesamini ℥. iij. salis ℥. j. misce , & fiat clyster. Si à causa sit frigida, lignum nucis, aut cupressi benè calidum , & ignitum sedi admotum curabit. Saccus ex camomilla anthos, calendula , vino optimo decoctus sedi admotus est remedium salutare huic tenesmo.

Causa.

Nota.

Curatio.

Victus.

Vacuatio bilis, si redundet.

Clyster lauans.

Pituita.

Fæcibus induratis;

Tapſus barbatus diuiſus in partes paruas: in vino optimo decoctus, ſedi admotus ſæpè eſt non mediocriter remedium, & à me feliciter expertum. Si dolor & appetitus deiiciendi fuerit magnus, & ſuperioribus remediis non curatur, neceſſaria ſunt ſuppoſitoria ex athanaſia, aut philonio cum pinguedine, aut cera noua, & ſilo magno: præſertim ſi ægra fuerit vterum gerens, ne abortum patiat, vt Hipocrates timuit.

Scholium.

Tenesmus vehemens & inanis. } Non rectè meo iudicio *Altoma-*
tomarius, & alii ſemper in tenesmo ulceratum eſſe inteſti- *rius* &
 num rectum ſentire videntur: ſed vt ex 7. aph. com. 27. colli- *alii re-*
 gemus, tenesmus nil aliud eſt, quàm vehemens & inanis conatus prehen-
 ad egerendum. Vbi aduerte nos pro tenſione legere conatum, reue- *duntur*
 rà enim in tenesmo nulla eſt in inteſtino tenſio, ſed conatus mag- *in eſſen-*
 nus, ob quem frequentiffimè exurgunt: & ideò tenesmus eſt mo- *tia te-*
 beſtiſſimus affectus, ex quo abortus ſolet ſequi ob dolorem, quando fit neſmi.
 ab ulcere, ob compreſſionem vteri à muſculis abdominis factà & *Locus*
 ob frequentè motum, ex quo etiam febris diaria oriri ſolet. Causa corripi-
 tenesmi ſunt ea omnia, qua facultatè expultricè inteſtini recti ex- *tur.*
 citant ad vehementem & continuum motum, qualia ſunt qua ir- *Causa*
 ritant, & qua grauunt: irritant, pituita ibi impacta & ulceris tenesmi
 dolor: grauunt faeces immodica. Frigiditatem externam exiſtimo *Curatio*
 nunquam facere tenesmum, bene muſculi reſolutionem. Curatur
 tenesmus ea ratione, qua dyſenteria ex inteſtinis craſſis depēdens.

De Colico dolore, & ileo. CAP. XL.

Dolor, qui in inteſtino laxiore, quòd colō Græcè vocatur, Deſcri-
 accidit, colica à noſtris medicis dicitur, & aliorum etiam *prio.*
 duorum inteſtinorum craſſorum dolor de quo Paul. lib. 3. c.
 43. dicit. Colon cū pars ſit inteſtini craſſi à dextra illorum
 regione procedens ad ſiniſtram, cincturæ modo pertinet. Et
 Ætius lib. 6. cap. 29. & Gal. variis locis, præſertim lib. 2. de loc.
 affec. c. 1. vbi ponēs diſcrimen inter dolorē, qui fit ab humore *Colica.*
 acri, & eū, qui fit à multitudine: porro, inquit, mihi ipſi accidiffe
 dolorē vehementiſſimū, vt mihi videtur in initio ventrē tere-
 bro perforari in eo potiſſimū ſpatio, quod à renibus ad veſi-
 cam per vteres ſcimus extendi. Quo loco docet Gal. hunc
 dolorem ſæpè præcedere dyſenteriam, & aliquas ſcribit huius *Galen.*
 doloris notas, quamuis lib. 6. cap. 2. quomodo medicus hunc
 affectum

DE CVRAND. MORB.

Causa. affectum à nephritide discernere possit, docet. A variis fit causis hoc symptoma, vt videre est apud Galen. Paulum, & Aetium locis suprâ notatis. Sed à quatuor potissimum nascitur, interdum à crassis ac pituitosis humoribus oritur, vt Galen. contingit, qui laborans hoc symptomate excreuit simul cum dolore grauissimo pituitam vitream. Interdum fit à flatulentis spiritibus, aut propter inflammationem molestantem, ac distendentem crassum intestinum, aut ob acres, & erodentes humores prædictum intestinum vehementer affli-

Nota gentes, fieri solet ab stercore indurato, & aliis. Quando crassi hu-
crassi hu- sus & pituitosus humor est causa, per totum abdomen in al-
moris. to, præsertim vbi est coli situs, sentitur dolor perinde, ac si intestinum tunderetur, & perforaretur. Adest nausea, ructus, vomitus pituitæ, maximè si natura ægri, & victus pi-

Spiritus tuitam ament. Qui dolent ex flatulento spiritu, tensionem
flatu- experiuntur, flatum quoque sentiunt, & emittunt. Qui in-
lenti. flammationis causa dolent, febrium sentiunt feruorem, si-

Inflam- tiunt, circa ventrem pulsationem sentiunt, laboriosè urinam
matio- & stercora depellunt, bilem etiam aliquando euomunt, &
nis, hæc colica tanquam grauissima in ileum transire solet. Simi-

Acrium les fermè sunt notæ, quando ab acris humoribus: quam-
humo- uis vrina & deiectiones biliosæ apparent, & earum suppressio
rum. fit maior.

Descri- Ileum malum est tenuium intestinorum, grauissimos & le-
ptio Ilei. thales dolores inferens. De quo symptomate Paul. lib. 3. c. 44. di-
cit ileos cum affectus sit maximus, acutus, & dolorificus, sym-
ptoma quoddam habet periculo grauius: & Aëtius lib. 6. cap. 28.
dicit, voluulus est affectio intestinorum lethalem dolorem in-
ferens, & Gal. com. 10. lib. septimi aph. in quo innuit, in illis ni-
hil descendere ad inferiora, quod est proprium illis, & insepara-
bile. Sed vomitus iis non semper adest, sed quando exitiales
sunt, etsi vehementiùs distorqueantur, stercus eis ascendit, at-
que singultiunt, & alia multa scribit de desipientia, & conuul-
Dubita- sione, quæ in hoc morbo exitialia fiunt. An reperiatur ileum si-
tio. ne vomitu, vt vult Galen. Musa dubitat, cum longa satis expe-

Differe- rientia semper vomere iliosos omnes ipse viderit. Huius sym-
rentia. ptomatis duæ differentia ponuntur à Celso lib. 4. c. 14. Prima
est, cum obstructio est in parte superiori gracilioris intestini, in
qua cibus per vomitum exit: altera, quando obstructio est in
parte inferiori, in qua exit stercus per os. Causæ & notæ simi-
les sunt colicæ causis, quamuis Gal. com. 40. lib. 6. aph. huius, qui-
bus dolor ilium fit absque inflammatione, his febris superueniēs
morbum soluit, causas omnes fermè huius symptom. scribat,
præter

præter illas tamen est illa de veneno sumpto. Nonnunquam verò intestinum vnà cum stercore descendit in scrotum, quos fermè semper mori vidi sine voce.

Curatur primò, victu contrario causis huius symptomatis, *Curatio* semper tamen molliente, præsertim si ex fœcibus, desiccatis *colici* fiat, vt iure pingui, beta, prunis damascenis, passulis sine granis: *doloris.* butyro recenti, oleo sesamino, & oleo amygdalarum dulcium. *Victus* Cibi bonum sanguinem generent, sint faciles concoctu ob dis- *in fœci-* solutionem facultatis, qualia sunt ius gallinæ, oua sorbilia re- *bus de-* centia, testes gallorum gallinaceorum, hepata gallinarum. In *siccatis.* frigida causa misceri oportet parum cinnamomi, gariophyllo- *In cau-* rum, croci, & zingiberis. Alia sunt optima, laudanturque à *sa frigi-* Gal. 12. methodi, neque sitim efficiunt, vt cæpe. Aliquando indi- *da.* get æger inedia, vt si fiat ab inflammatione ex cruditate, & fla- *In phleg-* tu, præcipuè in principio. In calida causa nutriatur iure pullo- *mone.* rum gallinaceorum, ptisana hordeacea, spinachiis, prunis da- *In cali-* mascenis, & similibus. Potus in frigida sit vinum potens mo- *da.* deratè aqua dilutum, vel aqua cinnamomi, vel seminis fœnici- culi, vel anisi, vel mulla. In calida, aqua hordei, aut liquiritiæ, aut aqua sacchari. Deinde curatur abscissione causarum. Sed prius oportet regulas quasdam generales satis obseruare, & eas maximè memoriæ mandare. Prima est quamuis pro- *Regula* pria cuiusque morbi, & symptomatis curatio fiat per causæ *l. dolo-* abscissionem: in vehementi tamen dolore, breui tempore fa- *rem esse* cultatem vitalem, & omnem dissolvente, prius, & subito cu- *sedan-* randus est dolor, per narcotica medicamenta, quæ sensum par- *dum.* tis dolentis potius semouent, quàm causam amoueant. De his nos abundè cap. 4. de cephalalgia, & 36. de diarrhæa, cum *Appen-* Gal. duodecimo methodi diximus, quo lib. Gal. multa satis ne- *dix de* cessaria in vsu narcoticorum scripsit: vbi etiam docuit narco- *vsu nar-* ticorum vsum esse vtiliorem in colico dolore à bile: nam præ- *cotico-* terquàm quòd magna refrigeratio minùs illi nocet, narcotica *rum.* etiam incrassant, & concoquunt bilem, ipsamque immobilem faciunt. Hæc regula desumpta est ex Galen. 12. methodi, quam postea confirmauit Auicennas 4. sen. primi libr. cap. penult. his verbis semibarbaris. Et quandoque est res, in qua fidu- *Auicenn-* cia est, quòd dolor ea remoueatur, sed est tardè operans, ita *na opi-* quòd dolor ille vsque ad horam illam tolerari non potest, si- *nio.* cur euacuatio materiæ dolorem facientis colicæ retentæ in villis intestinorum: aut citò operans, sed ex ea timetur finis vehementer malus, sicut stupefactio membri dolentis in colica, cum medicinis, quæ hoc operari solent, & sit medicus in hoc non rarò ambiguus. Oportet ergo vt apud ipsum sit æsti- *matua*

DE CVRAND. MORB.

matia fortis, ut sciat, quod duorum temporum sit longius, aut tempus fixationis virtutis, aut tempus doloris: & etiam quæ duarum rerum deterior, aut dolor, an malus finis, qui ex stupefactione timetur, vel eligat prætermittere illud, quod magis est conueniens: fortasse enim si dolor remanserit, fortitudine sua & magnitudine interficiet: & stupefactio forsitan non interficiet, licet ex alia parte impediatur, cuius nocumentum fortasse corrigere poteris, & redibit forsitan dolor, & tu curabis medicina conuenienti. Secunda regula, colica, quæ

*Regula
2. de me-
diocriter
calidis
initio in
flatu.*

*Regula
3. de
purgan-
tibus.*

*Discri-
men su-
mendi.*

*Regula
4. Cly-
ster mol-
liens.*

*Clyster
aperiēs.*

*Clyster
acrior.*

fit à materia pituitosa, & flatu, curatur medicamentis me-
diocriter calidis, incidentibus, tenuantibus, coquantibus, &
per os aperientibus, externis & internis: nam si initio non
vacuato humore nimis calidis uteremur, fieret maior attra-
ctio ad partem dolentem, dolorque augeretur, & pars dolens
posset facillimè laborare inflammatione, aut alio tumore
præter naturam. Perpetuò ergo à clementioribus ad valen-
tiora est procedendum, & ultimis utendum post vacationem.
Tertia regula, vacuatio in dolore intestinorum facienda est
per medicamenta clementer purgantia, quæ non attrahant ab
aliis partibus, & longinquis, præsertim si humor tantum in
intestinis fuerit, qualis est hiera simplex, pilulæ elephangi-
næ, & de hiera simplici, agaricus trochiscatus & diaphænicon:
hæc tamen, & similia per clysterem in colico dolore, & per
os in ileo magis conferunt. Quarta regula, in hoc dolore,
semper præcedat vacuatio per clysterem mollientem, & cle-
mentem, vacationem aliam, siue facienda sit per acres cly-
steres, siue per potum, aut pilulas aut alia medicamenta, ut
per hoc, aut simile. ℞. decocti maluarum, bismalux, seminis
lini, fœnugræci, & furfuris ꝑb. j. butyri recentis, dialthææ, &
benedictæ, an. ʒ. j. olei sesaminis, de semine lini. ana. ʒ. ij.
salis ʒ. j. misce, & fiat clyster, quo sumpto decumbat æger in
partem dolentem. Si flatus impediatur ingressum clysteris, instru-
mentum, quo infunditur liquor clysteris, habeat fistulam bi-
forem, ut vna via materiam clysteris iniicias, altera flatus fo-
ras erumpat, sit ita conformatum. His benè consideratis citò
curandus est dolor colicus, quia ob vehementiam vires pro-
sternit. Primùm ergo clysteri superiori, aut hoc vacua, ut viam
aperias, per quam vacuatio facienda est: ℞. foliorum, malua-
rum, betæ, bismalux, an. m. j. seminis lini, fœnugræci, ficuum
siccarum, furfuris an. p. j, fiat decoctum, de quo percolato ac-
cipe uncias decem, cui adde benedictæ, butyri recentis an. ʒ. j.
olei camomillæ, & de semine lini an. ʒ. ij. salis ʒ. j. misce, & fiat
clyster. Si verò ob stercora exsiccata, aut aliam causam non
fiat.

fiat vacuatio, vt sæpè contingit, necessarius erit alter clyster acrior, & aliquando tertius, addendo, cùm sit decoctum, drachmas duas carthami, drachmam vnam hellebori, & drachmam semis colocynthidæ in ligatura, ne substantia colocynthidæ intestinis noceret. Aliquando ad facultatem expultricem irritandam, atque mouendam indiget æger his aut similibus suppositoriis. ℞. pulueris benedictæ, & pulueris hieræ longodionis an. 3. salis gemmæ 3. j. β. mellis q. s. misce, & fiant duo aut tria suppositoria filo appensa. Deinde vacuis intestinis, si materia est in aliis partibus pituitosa (à qua sæpiùs fit) concoquatur rhodomelle, sir. de absynthio, de duabus radicibus, & similibus, & decocto aut aquis fœniculi, petroselinii, melissæ & aliis eiusdem naturæ. Postea vacuerur drachma vna pilularum de Agarico, aut drachma vna pilularum cochiarum, aut hoc simili potu. ℞. diacatholicon. 3. β. agari- ci trochiscati 3. j. electuarii indi ma. 3. iij. rhodomellis 3. j. aquæ fœniculi, q. s. misce, & fiat potus. Si materia fuerit in intestinis fixa, & in partibus propinquis, sola hiera simp. & agarico aut diaphœnicon fiat vacuatio. Die sequenti post euacuationem bibat æger hunc, aut similem potum. ℞. decocti camomillæ 3. iij. theriacæ magnæ aut mithridati 3. j. rhodomellis 3. j. misce. Aut hic clyster aut similis iniiciatur: ℞. decocti hordei, & radicis althææ ℥. j. rhodomellis 3. olei de semine lini, & camomillæ an. 3. ij. misce, & fiat clyster. Deinde curatur dolor clysteribus ex oleo camomillæ, vino primò, & aqua naphæ, aut ex solo oleo rutæ, & camomillæ, aut ex iure intestinorum, & pedum arietinorum (quod dicitur malcozinado) cum oleis camomillæ, de semine lini, & sisamino. Si intestina sunt lupi, maiorem habebunt facultatem, & vim ad corroboranda humana intestina, & eorum dolorem curandum: stercus tamen lupi per superiorem partem sumptum, & per inferiorem iniectum omnem dolorem colicum a proprietate curat, quamuis magis à causa frigida. De quo, & aliis, quæ à proprietate iuuant, in fine huius capitis copiosius dicemus. Si cum colico dolore renalis coniungatur, curatio mixta erit ex hac, quæ nunc traditur, & alia, quæ dicitur capite quadragesimo septimo huius libri, vt est hic clyster: ℞. parietariæ, malux, bismalux, rutæ, an. m. j. camomillæ, seminis lini, fœnugræci, anisi, carui, cymini an. p. β. fiat decoctum: de quo percolato accipe ℥. j. cui adde benedictæ, diacatholicon. an. vnciam semis, butyri recentis, & dialthææ. an. vnciam vnam, olei camomillæ, & de semine lini. an. vnciam vnam semis, olei scorpionum vnciam semis, salis communis drach

Substā-
tia colo-
cynthi-
dis nocet
intesti-
nis.

Supposi-
toria.

Præpa-
ratio.

Purga-
tio.

Decocti.

Clyster.

Sublata
causa cu-
ratio do-
loris se-
quitur.

Intesti-
na lupi
qualia
sint.

Stercus
lupi.

Curatio
mixta do-
loris coli-
 & renū.

Clyster

communis

DE CVRAND. MORB.

Fotus. drachmam, misce, & fiat clyster. Ex prædictis, & similibus decoctis in duabus partibus aquæ, & vna vini fotus frequens, parti dolenti est optimus, vel liquor hic ex clepsydra ab alto ventri affusus, vel potius admotus ex magna spongia expressa, aut in vesica. Aut ex hoc. ℞. foliorum lauri, origani, calamenti, pulegij, saluæ, rutæ, an. m. j. vtriusque stæchadis. camomillæ, meliloti. an. p. j. seminis anisi, anethi, carui, dauci. an. ʒ. ʒ. vini, & aquæ, an. æquas partes. Fotus etiam ex solis oleis benè calidis camomillæ, de semine lini, rutæ, & scorpionum curat hunc dolorem à flatu, & causa frigida factum. Filum ex lixiuio cum cineribus coctum, admotum & benè calidum curat hunc dolorem. Inscissus ventris inferioris per semihoram in balneo ex superioribus medicamentis decocto aliquo apparato adiumento est: mora tamen in hoc balneo vires fractas dolore, vigiliis & inedia nimis affigit: quare bono odore, vino & aliis huiusmodi opus est. Stercus vaccarum, præsertim mense Maio collectum, siue recens, siue antiquum sit, est in hoc optimum solum, & cum aliis. Cucurbitula magna ventri admotæ curat dolorem ex flatu. Clyster hic ex iure galli gallinacei veteris, & aliis obtinet in curando dolore principatum: ℞. seminis anisi, fœniculi, fœnugræci, an. ʒ. ij. thymi, epithymi an. ʒ. j. agarici, colocynthidæ, salis indi an. ʒ. ʒ. sticados, camomillæ an. m. ʒ. carthami. ʒ. ij. his omnibus semipuluerizatis farciatur, & consuatur gallus gallinaceus vetustissimus, ante mortem verberatus, & post decoquatur, donec ossa separentur à carnibus: deinde ex ℥. vna huius iuris fiat clyster. Cui iuri percolato si adderes benedictæ vnciam vnā, olei camomillæ vncias tres, esset clysteri maior, & acrior vis. Huic etiam clysteri magna vis inest in hoc dolore curando: ℞. vrine pueri ℥. j. olei de lilio, & de semine lini. an. ʒ. ij. theriacæ magnæ ʒ. ij. misce, & fiat clyster. Si dolor colicus sit ab inflammatione, curatur primò victu tenui, & refrigerante. Secundò, auertentibus perfectionem iecorariæ. Tertiò, repellentibus internis per os, cum est in superioribus intestinis, & si in inferioribus sit, per clysterem, vt decocto hordei, & oleo rosato, aut solo lacte caprino, aut ouino, aut solo oleo violaceo, aut de papauere, aut succis plantaginis, portulacæ, solani, & similibus. Quartò, & vltimò, dissipantibus, & resoluentibus, vt decocto camomillæ, fœnugræci, radicis althææ, seminis lini & similium. Si à bile fiat colicus dolor: primò vacuata bile, secundò, moderatè frigidis, vt est lac, & oleum rosarum, & similia, curabitur. Si à veneno fiat hic dolor curatur statim vomitu per totum, syrupi acetosi simplicis

cis, cum decocto seminis raphani, aut per infusionem hellebo-
 ri cū raphano, & postea cum oxymelle simp. Secundo, oleo sesa-
 mino, & de semine lini in quantitate vnciarum quatuor. Non
 dormiat veneno sumpto, quia somnus reuocat venenum ad in-
 teriora. Tertiò, curatur iis, quæ à tota substantia, seu proprie-
 tate veneno sumpto repugnant. Theriaca magna, & mytrida-
 tum omnia fermè venena curant. Si vis scire perfectè naturam
 cuiusque veneni, & facultatem medicamentorum contrario-
 rum venenis, lege sextum librum Dioscoridis, & libros de
 facultatibus simplicium medicamentorum Galeni, & libros de
 alexipharmacis, & de theriaca antiquissimi medici, & poetæ
 Nicandri: lege etiam opus de venenis doctoris Santes de Or-
 donyes. Quæ curant omnem dolorem colicum, & iliacum à
 tota substantia, seu proprietate, omni tempore, sunt stercus lu-
 pi per os cum rhodomelle, aut aliquo liquore. Dosis est drach-
 ma vna per clysterem cum conuenientium aliorum medica-
 mentorum drachmis duabus, aut tribus. Si recens fuerit, ven-
 tri admotum ad modum cataplasomatis, curabit hunc dolorem.
 Ossa etiam, quæ reperiuntur in stercore lupi parua quantitate
 sumpta curant dubio procul eum, & ne iterum fiat, prohibent.
 Idem os collo suspensum à multis in hoc laudatur. Lupi in-
 testina, si comedantur, curabunt ipsum dolorem. Radix ius-
 quiami ventri admotà colicum dolorem curat, & qui fieri po-
 test, prohibet. Venterculus anseris assatus, si comedatur, cu-
 rat hunc dolorem. Drachma vna semis cornu cerui tosti libe-
 rat ab hoc symptomate. Vena vmbilisci masculi infantis curat
 colicum dolorem masculi, & foeminae foeminam sanat Deo
 auspice. Virga cerui puluis laudatur à quibusdam in hac cu-
 ratione. Pes lupi collo suspensus ab aliis laudatur, ius cancro-
 rum hunc dolorem leuat. In vehementi dolore deueniendum
 est ad narcotica medicamēta, sēper tamen sunt maximè con-
 sideranda quæ de horum vsu diximus c. 36. de diarrhæa: pri-
 mò parti dolenti admoueaturs hoc cataplasma: ℞. parietariæ,
 foliorum iusquiami an. m. ij. farinæ fœnugræci, seminis lini,
 & camomillæ an. p. fiat decoctum, & ex his benè pistis fiat
 cataplasma, addendo olei de papauere, & de camomilla an. ʒ.
 ij. croci puluerizati drachmam vnā, thebaici scrupulum
 vnum, vitellos ouorum numero iij, aut si fortiori egeat auxilio
 narcotico, & simul purgante: ℞. benedictæ ʒ. ʒ. diaphæ-
 nicon ʒ. iij. philonij, Romani ʒ. j. olei camomillæ, & de
 semine lini an. ʒ. ij. misce, & fiat clyster. Rhazes miscet narco-
 tica cū purgantibus. Aliquādo cogimur in vehementissimo do-
 lore exhibere drachmam vnā athanasia, aut requiei magnæ,
 aut

Vomitum
 Somnus
 vitæ dus.
 Alexi-
 pharma-
 ca.

Qui li-
 brile-
 gendi.

Virum-
 que dolo-
 rem cu-
 rantia
 tota sub-
 stantia.

De nar-
 coticis.

Topica.
 Cata-
 plasma.

Narcoti-
 cum pur-
 gans.

DE CVRAND. MORB.

Ilei cu-
ratio
an eade
sit.

aut Philonij Romani cum vncijs tribus decocti camomillæ, vn-
cia vna syrupi papaueris. Ileus dolor curatur iisdem ferme au-
liis, quanquam valentioribus, iisque magis per os sumptis quam
per clysterem niectis: semper tamen uti oportet clyst. eribus non
tantum mollientibus, sed acribus, yt per loca apta stercora de-
pellantur.

De colico dolore, & ileo. CAP. XXXIX.

Scholium.

Colicus
dolor.

Dolor, qui in intestino.] Dolor colicus ex symptomate &
parte affecta nomen sumpsit, afficitur enim in eo colon secun-
dum ex crassis intestinis, quod incipiens à sede dextri renis, & con-
scendens ad iecoris cauum, hinc secundum ventriculi fundum ad
lienem sedem, & dextrum renem complicatur. Vnde cum dolor secun-
dum ventris longitudinem extenditur, aut ex parte dextra in sini-
stram locum mutat, ut in eo, qui à flatu fit, sine dubio ex situ par-
tis dolorē colicū esse colligimus: cum autem in aliqua parte intestini
fixus manet, tunc opus est alia addere signa, aliter enim decipiemur.

Aliquā-
do ne-
phriticū
dolorem
pro coli-
co assu-
mimus.
Discri-
men do-
loris co-
lici ab
ileo.

Cum enim intestinū hoc attingat duos renes, quando dolet in par-
te reni coniuncta, non est mirū existimare nos dolorē nephriticū esse,
videmus enim hac in re Galen. in seipso deceptum. Neque hic error
est periculosus, cum in principio siue dolor sit nephriticus siue colicus,
eadem remedia applicari oporteat, ea scilicet, quæ seddare possunt
dolorē. Hic dolor colicus distinguitur ab ileo ratione doloris, & ra-
tione situs: ob dolorē, quia dolor ilei maior est. Primò, quia fit à
crassiore substantia magis distendere, nempe stercore indurato: quod
non euenit in colico dolore, quia cum hoc intestinum sit medium
capax, non potest obstrui, ita ut prohibeatur stercoris descensus. Se-
cundo, dolor est maior, quia membranosius est ileon intestinum, quā
colon. Ex situ doloris etiā distinguuntur ij affectus, quia dolor ilei ma-
net semper in regione umbilici, hoc enim intestinum suis anfracti-
bus ilia & sedem undique umbilico subiectam atque conterminam
implet. Dolor colicus distat à nephritico, quia etsi in utroque vom-
itus sequatur (ob debilitatem ventriculi ex defectu spirituum, qui à
dolorē attrahuntur, maior tamen sequitur in colico, ob viciniam &
continuitatem maiorem cum ventriculo. Tum quia in colico dolore
excrementa retinentur aliquando, ita ut neque flatum, neque ru-
tum emittere possint. Tertiò quia à sup̄o cibo exacerbatur dolor
colicus, non autem nephriticus, cum renes longè à ventriculo absint.
Quartò in nephritide dolor est semper fixus, at in dolore colico
aliquando mutat locum. Quintò in nephritide antecedunt vrina
alba,

Discri-
men do-
loris coli-
ci & ne-
phritici.

alba, & perlucida, in quibus deinceps sabulosa subsident, quod in Causa colico dolore non euenit. Dolor colicus aut fit à causis, externis aut colici do-
internis. Externa sunt, alimenta, aër, aut veneni potio, intemperie loris.
frigidam generantes. Interna, intemperies frigida ex vitrea pitui-
ta orta, intemperies calida ex acri humore flatu distendens, libro
de multitudine cupige. 10, aut inflammatio. Si dolor fiat à pitui-
ta, cum hac sit glutinosa, infixus erit, ita ut perforari videatur
intestinum, neque in eo est sitis. Si fiat à bile, erit dolor acutus, si-
tis, oris amaritudo, & præcessit bilis retentio. Si ab inflamma-
tione, febris ostendet. Sicut loci mutatio, distentio eum, qui à
flatu ortum habet. Aliqui, imò omnes dolorem colicum ex ster-
core indurato fieri scribunt: quorum sententia aliquibus non pla-
cet considerantibus intestini amplitudinem.

Ileos affectus est ilei intestini, à quo eorum, quæ per aluum
excernuntur, euacuatio omninò supprimitur. Hac suppressio in a- Ileos
liis duobus intestinis tenuibus non contingit propter bilcm (qua in quid.
his expurgatur) maximè ea intestina irritantem. In intestino verò
ileo, cum ita conformatum sit, ut in suis anfractibus excremen- Ex faci-
ta crassa possint immorari, hanc videmus affectionem contingere, bus retē
non autem in aliquo ex crassis intestinis, ut ex com. 44. libri sex- tis nen
ti aph. colligimus. Quod si Gal. 3. epy. par. 2. com. 6. hunc affe- fit dolor
ctum aliquando ad crassa referat intestina, intelligendum, id est in crasso
de crassiori parte intestini tenuis, quæ crasso intestino adhaeret. Ex intestino
hac varia partium in intestino consideratione Celsus lib. 4. cap. ex Gale-
1 4. Ilei duas differentias scribit. Huius symptomatis cause sunt no.
omnia illa, quæ excrementorum descensum impedire possunt, qua- Ilej dolo
lia sunt magna inflammatio, stercus induratum, & mutatus si- ris causa
tus intestini, qui herniam intestinalē efficit. Aliqui addunt quare Ileos nō
tam causam, crassum scilicet & viscidum humorem, ab eo enim fit à
etiam potest fieri obstructio. Horum sententia non placet Gal. 6. crasso
aph. com. 44. eò quòd (ut existimo) bilis flaua per ipsum descen- humore.
dens humorem exterget. Quæ etiam est causa, ob quam ileos et si
fiat ab stercore indurato, rarò tamen, & cum contingit, id fit ex
esu rerum adstringentium, ut messilorum, aut ex febre adu-
rente, aut ex venenoso pharmaco exsiccante stercus, ut ex auri pig-
mento in socru mea vidit Ludouicus Collado praeceptor. Si obii-
cias, Hippocratem in prædicti cemenarij sententia sentire, ileon Obiectio
posse fieri ab humore crasso & glutinoso. Respondet Gal. in com.
dictum aphor esse suspectum. Signum ileos proprium est, nil per in-
ferna excerni, quòd si exitialis sit, stercus per os educentur. Ex do-
lore etiā, & tumore in regione tenuiū intestinorū ipsū deprehēdes.

Curatur primò, victu contrario.] Dolor colicus à causis exter- Curatio
nis ortus facile curatur: non ita ab internis, & idcò breuiter eius colici do
P. 2. curationem loris.

DE CVRAND. MORB.

Curatio curationē proponimus. Si dolor hic fiat à pituita vitrea, & non vr-
 si fiat à geat, statim non est, quòd discutientibus utamur: quia etsi illa pi-
 pituita tuita sit materia flatus, & hi ex ea eleuati dolorem inducant, ni-
 & fla- hilominus tamen, cum discutientia medicamenta humorem infla-
 tu. tum mutant, augēbunt dolorem, ac proinde ab illis abstinendū erit,
 & utendu prius illis, quæ pituitam euacuāt: quale est clyster fa-
 ctus ex fœniculo, anetho, camemelo, thymo, pulegio, semine lini, cum
 rhodomellis ℥.ij. benedicta & hiera picra ana. ℥. ss. & olei ruta-
 cei ℥. iij. Pituita euacuata, sacculōs parabimus discutientes fla-
 tus, ex fursure, sale & milio. Fomentabimus etiā locum panno im-
 buto in aqua & vino, in quibus fœniculū, polium, aut anethū bul-
 li. rint. Clystere etiā utemur ex oleo cum prædictis herbis decocto
 Si à bi- addita pinguedine gallina, aut anseris. Allia, nisi adsit febris, si edā
 le. tur, flatum discutiunt sicut & cucurbitula supra partē affectā ad-
 mota, quæ ob utilitatis celeritatem incantamenti ritu id videtur
 prestare. Debemus tamen post cucurbitulam clystere acri euacuare
 humorem, si aliquis continetur in intestinis, aliter enim calfaciētes
 partē, aut malo victu statim redibit dolor. Si dolor à bile proce-
 dat, & non urgeat, curabitur alimentis frigidis & humidis. Cly-
 steribus etiam, dummodò non sint acres, ne humoris acrimoniā
 intendant, facultas eorum debet esse abstergens, & refrigerans, cui
 rei decoctum hordei, cum rhodomelle permixtum conueniet. Et cum
 bilis duplicem præstet indicationē, in quantū in colo præter naturā
 detinetur, euacuationem, & in quantū acris, contēperationē, unum
 enim diuersis modis cōsideratū variē indicat: proinde syrupis gra-
 natorum, cydoniorum, & similibus temperata bile, eam purgabi-
 mus, ita, ut si multiā voluerimus educere, utamur hiera parata ex
 aloē non lota si paucā, ex aloē lota. Ex his intelliges malē auctore,
 & alios lupinum stercus, & alia medicamenta toto temperamento
 aut proprietate (ut ipsi dicunt) colicum dolorē curantia, describere:
 talia enim non reperiri ostendit affectus ipse habens manifestam
 causam. Si obiicias Galenum libro 11. simplicium Respondeo
 multoties eum tanquam superstitiosum emittendū in his remediis.

Si dolor colicus fit ab inflammatione.] In dolore colico ab
 Si ab in inflammatione secunda est vena, ut reuellamus, & euacuemus.
 flāma- Vena autem potest esse ea, quæ est in pede, aut brachij basilica, quia
 tione. colon, (sicut & renes) in medio corporis pendet positum intra te-
 stes & iecur. Deinde supra locum affectum repellentia imposita
 sunt ex usu, sicut & alia omnia, quæ ad curationem inflamma-
 tionis applicari solent. Atque hæc est colici doloris, quando non
 Curatio urget, curatio. Quòd si urgeat, & ab humore acri oriatur, eum
 doloris sedabimus narcoticis medicamentis, quæ improprie anodina ap-
 urgentis pellantur à Galeno. Clyster ex decocto hordei, & capitibus pa-
 paueris

paueris parabitur. Per os assumemus philonij maioris 3. j. cum decocto lactuca, & fœniculi: hac enim medicamenta in hoc affectu ex calida causa orto triplici ratione prosunt: Prmo, quia partis sensum auferunt, & ideo dolorem, dolor enim non fit sine sensu: Secundo, quia retundunt acrimoniam humoris: Tertiò, quia incrassant tenuē humorē, ne intra mēbranas intestinorū se insinuet. Si obiciās incōmodum (quod est intēperies frigida) ex stupefacientibus medicamentis sequi solitū, tibi satisfaciet Gal. 12. method. melius esse intēperiem ex illis relictam longo tēpore curare, quā breui viriliter mori. Si dolor urgeat, & fiat à pituita vitrea, cauendum à narcoticis. est, quia duplicem inducunt noxam prima est, densando tunicā intestinorum viā praecludere spiritui: Secunda est humorē incrassare. His ergo si utaris medicamentis, statim sedabis dolorē, attamen si deinceps calefacientibus cures, ex spiritu aucto dolorem de nouo excitabis, ita ut ad narcotica deuenire cogaris, quod tertiò & quartò efficiēs insanabilis affectus auctor eris. Qua omnia docēt hūc dolorē medicū postulare periū, qui sensim extenuet, & cōcoquat humorē.

Ileus dolor curatur eisdem fermē.] Ileus si fit ab inflāma-
 tione) quod cognoscemus ex febre, tumore apparēte in regione inte-
 stinorū, & pulsu) curatur sanguinis missione propter causam sapiūs
 dictam. Exteriūs repellentia, oxirrodinum, & alia, quae applicantur
 permiscēda sunt cū digerentibus, decocto camemeli fœnugraci, & si-
 milibus, quoniā in hoc affectu principiū breuissimum est. Clystere
 nil infundatur, sed per os ob intestini ilei viciniā cū ventriculo, &
 ut iuuent descensum excrementorum assumi debent remedia, quae
 ideò repellere debent, & non adstringere, imò lubricā reddere aluū.
 Huiusmodi sunt decoctū maluarū, lactuca, scariola, solani sepe trui
 syrups rosarum, & violarū. Pisana in cibo assumpta aluum lu-
 bricat, sedat sitim, repellit, humectat, & statim nutrit. Ileus ex ster-
 core indurato emollientia postulat. Partem exteriorē fouebimus ilij dolo-
 decocto lini, maluaui sci, althaa, fœnugraci cū butyro, & axungis, ris ex
 aut oleo solo dulci, aut oleo, in quo semen lini, fœnugracū, aut aliud stercore
 simile cfferueris: Ungemus etiam eandem partē unguentis de al-
 thea, de agrippa, & aliis emolliendi vim habentibus, ex feruesca-
 to etiam semine lini cum radice althaa, & oleo, & pauca cera un-
 guentū construere poteris. Emollito stercore (quod iactū deprehēdes)
 ad eccoprotica medicamenta accedes, quorū vis non transcendit ie-
 cur, ut ad cassiam per euaporationē extractā cū decocto maluarū,
 lini, & fœnugraci. Si hac non proffit, ad maiora deuenies, diacartho-
 licon, cassiam, diaphanicon, diacarthamū, & diaprunis laxatiuum.
 Quod si neque ex his utilitatē animaduertas, colocynthide uti pore-
 ris: ℞. colocynthidis ʒ. iij. cassia ʒ. j. cū decocto superiori. In stercore
 verò indurato à veneno, prater ea, quae diximus, vomitoria medi-
 camenta,

Narcoti-
 ca in do-
 lore à pi-
 tuita vi-
 trea vi-
 tanda.

Curatio
 ilij ab
 inflam-
 matione
 Exteriūs
 Clyster.

Curatio
 ilij dolo-
 ris ex
 stercore
 indurato

Eccopro-
 tica,
 Vchemē-
 ter pur-
 gantia.

DE CVRAND. MORB.

Si fiat à veneno sterco indurante. Si à mutato situ intestini. *Nota remedium.* *camenta, & quæ toto tēperamento veneno aduersantur, conducent.* *Quando mutatus situs intestini à casu, aut flatu ileos generat quod sensu deprehendes) periculosus est affectus, quoniā statim solet inflāmari intestinū. Hoc restituetur supino collocato homine, & digitis comprimentes intestinū. Aër etiam per folles fabrorum per anum immissus sua violentia intestinū in suū locū reponit, quod remediū etiā vtile est in ileo à facibus induratis orto. In ileo à quacunque causa procedat, semper opus est, faces deponere ab intestino recto, ne reliquorum excrementorum euacuatio imped. atur.*

De inflammatione hepatis. CAP. XLI.

Inflam- matio. hoc & causa ab aliis petenda. Nota. *Error Oribasij* **I**Nflammatiō in hepate perinde fit, atque in aliis visceribus & ab iisdem causis. Quare quæ diximus capitibus de phrenitide, de peripneumonia, & de pleuritide iterum inspicere, similiter quæ à Paul. libr. 3. cap. 46. in quo multi alij iccoris affectus demonstrantur. Actius quoque de hoc morbo agit lib. 10. c. 3. & Gal. lib. 5. de locis affect. cap. 6. quo cap. omnes ferme huius affectus notas describit, dolorem scilicet dextri hypochondrij, grauitatēque peruenientem sursum ad iugulum vsque, deorsum verò ad costas spuras: Tumor in eodem dextro hypochondrio est, præsertim si gibba pars fuerit inflammata: Acuta febris adest, tussis sicca, difficultas, spiritus, sitis inextinguita, cibi fastidium. Aliquando hepati inflammato singultus aduenit, vt docet vetustissimus Hippoc. aph. 58. lib. 5. non semper, vt inquit in commentario Gal. sed quando ad maximam attollitur inflammationem. Propter neruorum communicationē singultus hic est per consensū vaporis acris, & etiā *Error Oribasij* Oribasij cōpressio ventriculi ore: errat ergo Oribasius dicens, hūc singultū esse ex inauitione. Aphorismum hunc confirmat. Celsus Latinus, Hippocr. lib. 2. capite 7. dicens frequens singultus & præter consuetudinem continuus iecur esse inflammatum significat. Philotheus exponens finem huius aphor. quod iecore, inquit inflammato fit, non talis, sed singultus, & maximè si sinam partem inflammari contingat, cum in inflammatione caliditas ad se ipsam humiditates, quæ in stomacho sunt, trahit, & consumit, & hinc stomachus exsiccat, & ex siccitate consumitur, ad quam conuulsoriam dispositionem singultus fit. Quo in loco Philotheus visus est sequi Oribasium, sed ipsis repugnat Gal. comm. quoque 17. libr. 7. aph. dicens, per consensum os ventriculi ab hepatis magna inflammatione laborare, atque morderi, & singultire certum est. Scire quando pars sinā inflammata est, quando gibba, & quando musculi,

musculi, Gal. aperte, & longo sermone cap. 6. lib. 5. de locis affectis demonstrat.

Curatur septem remediorum generibus: primò, victu refrigerante, tenui, reddente sanguinem ineptum motui, ut aëre inflama natura frigido, vel arte parato, aquis, herbis, & floribus frigidis, lacte amygdalarum, cremore hordei, succo malorum granatorum, cichorea, & lactuca coctis, pane bene loto, & iure pulli gallinacei, si fuerit imbecilla facultas, abstinentia vini, carnum & ouorum, & cæterarum rerum, quæ sanguinem augent, & calfaciunt.

Secundò, auertentibus, ut sanguinis missione per sectionem iecorariæ dextræ, extrahaturque sanguinis quantitas, & numerus respondens plenitudini, & naturæ infirmi, & magnitudini morbi. Vbi ætas & vires prohibent venæ sectionem, fiat sanguinis missio per cucurbitulas admotas natibus, aut scapulis cum scarificatione. Ligaturæ, frictiones, & focus extremorum satis auertunt.

Tertiò, repellentibus frigidis, & stipticis, internis, & externis mitioribus, & semper admixto aliquo corroborante parum calido, ne conuersa phlegmone in scirrhum, aut facta obstructione inter iecur & vesicam fellis, hydrops, aut mors sequatur, ut sumpto hoc medicamento, aut simili, tertia quaque hora, quantitate duarum vnciarum: ℞. syrupi rosarum ex infusione siccarum ℥. iij. syrupi endiuæ compos. ℥. ij. aquæ endiuæ, & cichoreæ, an. ℥. iij. aquæ eupatorii, aut absinthij. ℥. ij. misce. Hepati sæpè admoueatur vnguentum santalatum, vel cerotum santalatum tepidum: aut liquor hic remissè calidus, ℞. aquæ rosarum, & endiuæ an. ℥. iij. aquæ absinthij, & olei rosati an. ℥. ij. aceti sambucini ℥. ss. misce, & fiat epithema, quod sæpè hepati admoueatur. Hoc vnguentum repellit satis benè: ℞. olei rosarum ℥. ij. olei myrtillorum ℥. j. olei de spica, & de ablinthio an. ℥. ss. santalorum omnium, & trochiscorū de camphora an. ℥. j. ceræ q. s. misce, & fiat vnguentum.

Quartò, concoquentibus materiam mixtam ex pituita, & bile additis semper astringentibus, partem principem roborantibus: ut ℞. rhodomellis vncias iij. syrupi rosarum ℥. ij. misce: & decocti hordei sine cortice, endiuæ, & absinthij ℥. v. si magna fuerit copia pituitæ, syrupo de duabus radicibus, & rhodomelle concoquenda est. Si verò atrabilis mixta fuerit, syrupo de fumoterræ, de buglossa, & similibus.

Quintò, vacuantibus materiam mixtam medicamentis, habentibus mixtam facultatem purgandi bilem, & pituitam, ut ℞. diacatholicon. ℥. v. agarici trochiscati, & rhabarbari

DE CURAND. MORB.

electi infusi per noctem in aqua endiuiae an. 3. j. diaprunis solutiui 3. iiij. syrupi endiuiae simplicis 3. j. aquae borraginis q. s. misce, & fiat potus: aut ℞. pilularū agregatiuarū 3. j. fiant pilulae septē. Ex medicamentis, quae pituitam, & bilē purgant poteris cōponere augendo, vel minuendo, habita ratione humoris dominantis. Si verò atra bilis sit mixta cū pituita, aut flaua bile, quae purgant ipsam, sunt miscenda: semper tamen, quae iecur corroborant, adde, vt sunt omnis endiuia, absinthium & spica.

Curatio gibba partis. Sed si materia fuerit in gibba hepatis parte, mouentibus vrinam vti oportet, vt syrupo capillorum veneris, de liquiritia, de duabus radicibus, & decocto quatuor seminum frigidorum maiorum, & radicum diureticarum in parua quantitate, quia tam purgantia, quàm vrinatoria medicamenta clementi, & benigna egent, vi, & natura.

Resolutio cū astrictione. Sexto, resoluentibus, & digerentibus reliquias materiae sensim, & mixtis stipticis: vt ℞. florum camomillae, meliloti, anethi, althaeae an. p. j. absinthij, m. ʒ. rosarum p. ʒ. spicae, squināti, & mastichis an. 3. iiij. fiat decoctum in ℥. iiij. aquae ad medietatem: quo percolato vttere ad formam foti. Ex his etiam fiat sacculus hepati admouendus, vel oleum camomillae, rosarum & de spica simul calida hepati admoueantur, vel hoc vnguentum: ℞. olei camomillae 3. ij. olei de lilio, de absinthio, & nardini an. 3. ʒ. pulueris squināti, rosatae nouellae & absinthij an. 3. j. cere quod sufficit, misce, & fiat vnguentū, quo iniūgatur hepar.

Fotus. Sacculus Olea. Vnguentum Alteratio. Interna corrigentia. Externa. Suppurantia. Ruptio. Septimò, intemperiem calidam à sanguine, & bile relictam corrigentibus internis, vt electuario diatrium santalorū, diarthodon abbatis, conserua rosata, syrupo rosarum, endiuiae simplici composito, & similibus. Et externis dictis tertio genere remediorū. Si phlegmone suppuratur (quod scies autore Hippocrate aph. 47. lib. 2. ex febris, & doloris intensione) coctio & suppuratio iuuari debent cataplasmate ex decoctis ficibus, maluis, bismalua, semine lini, fœnugræco, vuis passis, oleo amygdalarum dulcium, butyro recenti, vitellis ouorum, & paucō croco. Deinde abcessū motu violēto rūpes, saltu videlicet, tussi, vocibus, sternutamento. Postea tergebis, hoc, aut simili medicamento, si est

Tertia in parte gibba. in gibba parte vlcus: ℞. furfuris cicerum nigrorum, hordei an. p. j. liquiritiae, radicis petroselini an. 3. ʒ. fiat decoctum: de quo percolato accipe ℥. ij. cui adde mellis, & sacchari, an. ℥. ʒ. aceti. 3. j. misce, & fiat ad modum oxymellis. Si verò fuerit in

In parte sima. Glutinantia. sima, tergebis cassia, manna, sero caprino, & succo rosarum in parua quantitate, & aliis aluum deicientibus. Postremò vlcus est glutinandum bolo armeno, terra sigillata, sanguine draconis, thure, & similibus. Si hepar obduruit, emplastro de meliloto, aut filij Zachariae molliatur, aut hoc vnguento:

guento: ℞. olei sesamini, amygdalarum dulcium, & de semine lini. an. ʒ. j. mucilaginis fœnugræci, & de semine lini, aquæ bimaluæ extractæ, an. ʒ. iij. axungia gallinæ, & medullæ cruris vituli an. ʒ. ij. emplastri de meliloto loco ceræ, quod sufficit, misce, & fiat vnguentum: vel ℞. emplastri filij Zachariæ, & de meliloto, an. æquas partes extendantur super alutam ad formam mediæ lunæ, & hepatis admoueat. Vnguentum ad duritiẽ.

De inflammatione iecoris. CAP. XLI.

Scholium.

INflammatione in hepate. [Per iecoris inflammationem intelligimus tumorem præter naturam, siue fiat à sanguine, siue à bile, siue à melancholia, nam à pituita non potest fieri, ut docet Galen. lib. 4. de præf. ex pul. cap. 3. eo quod hæc à iecore concoquitur, & compactam habet viscus substantiam. Quæ ratione fiat inflammatio, ex libro de inæq. intemperie c. 3. & ex 2. de diff. feb. c. de fluxione intelliges. In huius visceris inflammatione, primò distingue, an sit in parte gibba, an in caua, hoc enim maximè conducit ad curationem. Ha varia hepatis partes inflammata aliquid habent commune, & aliquid proprium commune, habent grauitatem in iugulo inducere, ipsum enim deorsum ferunt quasi pressum: quod ex Gal. 2. de loc. affect. cap. 7. ob venæ cava tensionem, magis quàm ob membranas contingit. Vbi si dictionem illam magis, consideremus, intellectum simul habebimus, Gal. non negare ob membranas etiam fieri. Secundò habent communem pulsum durum, qui proprius est inflammationum, à quibus solent arteria distendi: communis etiam ipsis est febris acuta, lingua nigredo, & sitis, sicut & ichores semper ex ipsis resudare. Oportet etiam in his inflammationibus propria hepatis distinguere tempora fluxionis à temporibus concoctionis. Proprium, quod habet inflammatio gibba partis, est iussicula sicca ob septi compressionem orta, si etiam comprimimus iecoris regionem, dolorem excitatum sentiemus. Distingues autem, an inflammatio sit in musculis necne, ex figura partis. Si inflammatio cauam occupet partem, dolor ad intestina verget, ventriculus vomitu bilioso, & multis ichoribus referto, tentabitur, deiectiones erunt cruenta, & singultus aliquando apparebit, quod malum signum est ex Hippocrate, quia inflammationis magnitudinem sequitur.

Curatur septem remediorum generibus.] *Viſus in hoc affe-* Viſus.
 ctu debet esse tenuis, & abstergens, ex cichorea, asparagis, prisana cremore, & oxymelite, omittentes mulsam, quæ detenta bileſcit. Tum alimenta adstringentia, pirum, malum cydonium, & malum punicum, cum in caua parte mutantur in sanguinem in inflammatione

DE CVRAND. MORB.

*gibba partis conceduntur: quæ in sima partis inflammatione la-
dunt constringendo meatus.*

Sanguinis missio. Secundo, auertentibus.] Sanguinis missio non est exercenda propter plenitudinem, ut auctor voluit, quia bene potest esse iecur inflammatum non existente in corpore plenitudine. Cum ergo in inflammatione sit aliquid fiens, & aliquid factum, sanguinem mittimus, ut reuellamus humorem fluentem ad locum affectum, & euacuemus contentum in ipso. Et quamuis utraque basilica secari possit, si solam venarum rectitudinem consideremus: consulamus tamen semper secare basilicam dextram, quia hæc præter dictam rectitudinem, alteram habet, qua natura dicitur.

Repellentia. Tertiò, repellentibus frigidis.] Si inflammatio sit in parte gibba iecoris, repellentibus in parte exteriori utemur, dummodo non sint actu frigida, ne ladant iecur: utemur ergo absinthio cum oleo rosaceo, aut cum aceto. Si inflammatio sit in caua parte, ab his repellentibus abstinendum erit, quia eorum vis eò non penetrat: & apparente concoctione (quod in incremento contingit) per alium oportebit purgare ichores resudantes, ex inflammatione, ut mercuriali: in declinatione verò diacatholicon, & electuario de succo rosarum. In inflammatione verò gibba partis, in incremento per urinam benigna purgantia utilia sunt, eupatorium scilicet, urtica, & fœniculum: In declinatione verò vehementissima, inter quæ est assarum.

Error auctoris. Quarto, concoquentibus.] Hoc loco errat crassissimè auctor purgans in inflammatione iecoris bilem, & pituitam indiscriminatim quasi inflammatio semper ab his humoribus fiat. Quæ autem ratione sit purgandum, paulò superius explicauimus, non enim humorem à toto corpore educere intendimus in hoc affectu, sed ichores ex inflammatione resudantes in cavitates venarum iecoris.

De obstructione hepatis. CAP. XLII.

Quæ partes laborent. Iecoris venæ tam simæ partis, quàm gibbæ obstructionem patiuntur: tametsi priores frequenter: quod ansam (ut reor) Actio dedit, illas tantum memorandi: reuera tamen utraq; in id vitium incidunt, ut obstruantur. Fit autem, ut prioribus id magis contingat, quòd alimentum ad cauam iecoris partem crassum adhuc, atque illaboratum perueniat: quam iniuriam gibba non sentit, & si aliquando sentiat, obturatur similiter: nec ob hanc solùm causam, sed propter alias quoque, quas tam gibba, quàm caua iecoris pars habent communes. Hæ sunt procatarcticum nonnunquam, ut ictus, casus, aut duræ alicuius rei ad dextrum hypochondrium collisio. Præterea singuli, aut alterius cuiuspiam rei arcta constrictio, frigus exterius, & quicquid suo compressu hepatis venas potuit arctare, ita ut quasi

Causa externa.

quasi conuincant, aut saltem doloris sensu per compressionem excitato eam sanguinis molem attrahant, qua venæ ultra modum repletæ in obstructionem incidant. Sæpè verò internæ, quas Gal. lib. de loc. affect. 5. c. 6. binario numero comprehendit. *Internæ* Obstructiones inquit, iecineris fieri vel propter crassos, & viscidos humores, qui à crasso & pituitoso alimento generantur, vel à flatuoso spiritu, cui exitus non patet. Causæ procacitæ ab ægrotante sunt petendæ. Internæ sic deprehenduntur, *Nota.* si à crassis, & viscidis humoribus obstructio fiat, grauitas in hypochondrio dextro sentitur, si à flatuoso spiritu præter grauitatē, tensionis quoque sensus adest: obstructos pallor totius corporis sequitur, tussis & difficultas anhelitus, maximè si exercuerint seipsos, vel in altiore locum ascendere tentauerint: trahitur enim ad inferiora propter hepatis grauitatem septum transuersum, vnde difficulter anhelat. Porro cum multa sint signa *Curatio* tam obstructioni hepatis, quàm inflammationi communia, febris inter alia solius inflammationis proprium signum est.

Hepatis obstructio, quæ fit à frigidis, & crassis humoribus, *Victus.* curatur quinque remediorum generibus: primò, victu tenuante, calido, & aperiente, non immodico, præsertim ante purgationem: cum in quarto genere valentioribus sit vtendum, vt asparagis, iure cicerum nigrorum, radicum petroselini, foliorum raphani, senationum, vel nasturtij aquatici, Hispanis berros, de quo Dioscorides lib. quarto cap. 82. & similium cum carne, & sine carne. Potus sit vinum album aquâ dilutum, vel decoctum capilli Veneris, aut ceterac. *Vitanda.* Vitanda sunt omnia alimenta crassioris succi, balnea, coitus, & exercitationes à cibo.

Secundò, celerrimè quia inueterata obstructio non solum in *Preparatio* iecinore, sed in omni corporis parte putrefactionem parit, febremque accendit, attenuantibus, & incidētibus materia cōco- *lerrima.* quatur, vt ℞. rhodomellis ℥. vj. oxymellis simplicis, & syrupi de absinthio an. ℥. ij. Item ℞. decocti aut aquarum capillorum Veneris, fœniculi, & absinthij an. ℥. vj. misce, parato humore pituitoso his vel aliis similibus medicamentis.

Tertiò, vacuantibus materiam crassam: vt ℞. diacatholicon. *Vacuatio.* ℥. ss. diaphanicon, & electuarij indi maioris an. 3. ij, ss. rhodomellis ℥. j. aquæ fœniculi q. s. misce, & fiat potus: vel ℞. pilularum de agarico 3. j. fiant pilulæ septem. Vacuata pituita, hoc *sectio* aut alio medicamento phlegmagogo, de quibus cap. 1. aliqui *vena.* laudant sectionem basilicæ dextræ, vt per eam partē humores *confert* moti facilius educantur, & viæ melius aperiantur, obstructio- *si agro-* que bene curetur. Hoc non damno, sed aliquando laudo, præ- *tus sit sã*sertim si æger sit sanguineus. *guineus.*

Quartò,

DE CVRAND. MORB.

**Obstru-
ctionem
curan-
tia.**

**Interna
simpli-
cia.**

**Compo-
sita.**

**Confe-
ctio.**

**Syrupus
lauda-
tissimus.**

Topica.

**Corro-
boran-
tia.**

**Confe-
ctio opti-
ma.**

**Vnguen-
tum uti-
lissimu.**

Quartò, curantibus obstructionem hanc internis & externis, ut iecore lupi, fumo terræ, absinthio, eupatorio, nostris agrimonia, camomilla, asaro, radice acori, quinque radicibus diureticis, cassia lignea, spica, capparibus, amygdalis amaris, lupinis. Ex his simplicibus, & aliis similibus fieri solent multa composita. Inter quæ leuant ab hac obstructione præclare citra omnem molestiam syr. de byzantiis, de endiuiâ, comp. de duabus radicibus, & de quinque radicibus, oxymel, comp. diacurcumæ, dialacæ, trochiscus de eupatorio, de rhabarbaro, de absinthio. His ergo multis diebus sumptis curatur obstructio iecoris, præsertim partis gibbæ hoc medicamento vel simili: ℞. diacurcumæ, & dialacæ an. ʒ. j. trochiscorum de rhabarbaro, & de absinthio an. ʒ. ʒ. pulueris diarhodon abbatis ʒ. ij. hepatis lupi præp. ʒ. iij. quatuor seminum frig. maiorum mundatorum, an. ʒ. ʒ. syr. de scolopendria q. s. misce, & fiat confectio. Dosis quolibet die cochlearium vnum cum ʒ. ij. aquæ capillorum Ven. Curat hanc obstructionem ex multorum experientia syrupus hic: ℞. ceterac, capilli Veneris, lapathij, lentis, & rutæ an. m. ʒ. quinque radicum diureticarum, radice acori gladioli, an. ʒ. j. quatuor seminum frigidorum maiorum ʒ. ij. seminis apij, fœniculi, petroselinij Macedonici, an. ʒ. ij. camædreos, camæpyteos, vallerianæ, an. m. j. hordei mundi, p. j. infundantur radices, & semina per noctem in aceto, & postea fiat decoctum in vino albo, & aqua sufficienti, cui percolato adde mellis. q. s. m. & fiat syrup. Dosis quolibet die ʒ. iij. Bis in die post duas primas concoctiones vngatur hoc vnguento: ℞. succorum apij, petroselinij, fœniculi, senationum, endiuiæ & cichoreæ, an. ʒ. j. aceti ʒ. ʒ. olei. ʒ. iij. bulliant omnia ad consumptionem vsque succorum & aceti: deinde adde santalorum omnium & spicæ, an. ʒ. ʒ. ceræ q. s. misce, & fiat vnguentum.

Quintò, corroborantibus iecur: ut theriaca magna, mithridato, & trochiscis de rhabarbaro, puluere diarhodon Abbatis ʒ. j. alicuius medicamenti ex his cum aqua absinthij, & endiuiæ multis diebus sumpta corroborat iecur. Hepar lupi, auellanæ, passulæ, & cichorea, & endiuiâ corroborant iecur. Hæc confectio est optima in hepate corroborando: ℞. trochiscorum de eupatorio ʒ. j. trochiscorum de spondio cum semine acetosæ ʒ. ʒ. seminis endiuiæ, cassiæ lignæ, spicæ, cinnamomi, ameos, hepatis lupi, an. ʒ. j. seminis lentis ʒ. iij. rhabarbari electi puluerizati ʒ. ij. ʒ. sacchari ʒ. ʒ. misce, & fiat confectio. Dosis ʒ. ij. cum aqua absinthij, & endiuiæ. Et hoc vnguentum est maximo auxilio: ℞. ceroti santalini ʒ. j. olei de spica ʒ. ʒ. pulueris absinthij, & rosarum, an. ʒ. j. misce.

De obstructione hepatis. CAP. XLII.

Scholium.

Cur in
iecore

IEcoris venæ tam simæ partis. } Iecur pars est instrumentaria
exercens propriam affectionem nempe sanguificationem ex chy-
lo, tanquam ex materia. Chylus autem non continetur in aliqua
insigni cauitate, quoniam eâ destituitur iecur: sed in venis multis,
à quibus tanquam ex radicibus ortum habet vena porta. Orificia
harum venarum in iecoris extremitate adherent orificiis venarum

frecuen
ter fiat
obstru-
ctio.

gibba partis iecoris, ut sanguis in caua partis venis generatus, &
ab excrementis repurgatus, ad gibbam ascendat partem, & inde
ad venam cauam. Cum ergo anostomosis illa venarum angusta sit,
non est mirum, si inter omnes corporis partes iecur magis sit ob-
structionibus opportunum. Obstructio iecoris, morbus est in via, ha-
bens unicam, tantum causam, nempe humorem crassum fluentem,
ut constat ex 8. de comp. secundum locos cap. 6. & lib. 5. de loc. affec.

Quis af-
fectus
sit.

cap. 6. unde mirandum est de his, qui practicas ediderunt, alteram
causam iecoris obstructionis ad flatum referentibus, & quod ma-
gis est, Alcomarius id probat ex Gal. supradicto loco, cum nec id
somniauerit, & repugnet rei nature. Quod autem hac non sit sen-
tentia Gal. manifestè patebit eum locum legenti, in quo postquam
scripsit iecur pati merbos in intemperie nuda, & cum fluxione, ut
in erysipelate, schirro, & flatuosa distentione, pati etiam obstru-
ctionem à crassis humoribus addit. Signum obstructionis est graui-
tas in dextro hipocondrio, quod si in eo præter grauitatem sit tensio,
una cum humore erit ibi inclusus flatulentus spiritus. Hæc Gal. Ex
quo loco, si animum aduertis, nunquam colliges ipsum existimare
spiritus esse causam obstructionis, sed si cum obstructione sit fla-
tulentus spiritus tensionem sentiri. Dices, cur in obstructione iecoris
non est semper febris coniuncta, cum obstructio sit causa putredinis?

Error
Alcom.
auctoris,
& alio-
rum.

Respondeo in iecore esse multas venas, & idè humores diffusi,
quod si aliqua est putredo exigua tamen, ita, ut vapores ex ea ele-
uati non sufficiant ad generationem febris. Curationem huius affe-
ctus lege apud auctorem, solum animaduertas velim, ictum, ca-
sum, dura alicuius rei ad dextrum hypochondrium collisionem, &
cinguli constrictionem, quæ inter causas externas connumerantur
ab auctore, non esse causas: quia ictus casus, & constrictio, si violen-
ter fiant, & constringant iecur, sanguinem expriment, non autem
obstruent, cum non habeant vim generandi crassos humores, sicut
nec cingulum. Præterea iecur Lupinum permiscet in compositioni-
bus de obstruentibus iecur, existimans toto temperamento operari, re lupi-
Quod non probatur à Gal. lib. 1. v. simpl. e. de iecore lupino. Fortasse no
adductus fuit ex eodem Galen. qui lib. 8. de comp. secun. locos cap. 7. uerte.

Obie-
ctio.Cura-
tio.Auctor
reprehen-
ditur.De ieco-
re lupi-
ad-

iecur

DE CVRAND. MORB.

hec lupinum toto temperamēto hepaticis conuenire scribit, non animaduertens Galenum eo in loco non proponere medicamēta toto temperamento hepaticos iuuantia, sed postquam scripsit multa medicamenta ex Asclepiade ad hepaticos, addit ipsum scripsisse pharmacū ex cochleis tritis cū vino, quod toto temperamento iuuat sicut & lupinum hepar non una aut altera qualitate. Vbi Galenus hac toto temperamento iuuare scribit, quia sunt alimenta, quae eadem ratione paulò supra vias passas visceri secundum totam substantiam familiares esse docuit.

De Ictero. CAP. XLIII.

*Quid
icterus.*

*Error
quorundam.*

*Causa
interna.*

*Icteri
nigri
causa.*

Quotiescunque vniuersi corporis color propter bilis, aut flauæ, aut porraceæ, aut nigræ effusionem immutatur, malum fit, quod Græci icterum appellant, Latini regium, & arquarum, & originem ab iis, quæ tum in morbo, tum in eius curatione accidunt, appellatione sumpta, quod longum esset referre. Porro errant, quicunque vitreo tantum hepatis hanc affectionem putant provenire: sæpè enim nihil patiente iccinore, saltem primaria affectione, icterus oboritur, nonnunquam ex indicio naturæ, quoties in febribus bilis vniuersa ad cutem deferitur. Qui si ante septimum appareat, malum est signum iuxta aph. 62. sect. 6. Si verò post septimum, non perpetuò bonum, præsertim si dextrum hypochondrium obdurescit, vt ex aph. 64. sect. 4. colligitur. Interdum ex venenatorum animalium morfu, vt Imperatoris cuiusdam seruo contigit, qui ex viperæ ictu, quarum viperarum venatio ipsi commissa erat, ictericus est effectus, nimirum colore totius corporis prasinæ, aut si maioris porraceam bilem referente: vt fusius Gal. ait 5. de locis affect. cap. 7. sæpè tamen hepatis occasione fit, vel quia inflammatum fit, aut intemperie calida laboret, aut obstructione. Accidit quandoque ob imbecillitatem (vt ait Aëtius) vesicæ bilem excipientis, quæ biliosum humorem, veluti consuevit, in sese ex hepate non attrahit, ideoque impurum sanguinem relinquit. Fieri etiam potest, vt ipsa nimium repleatur, & propter repletionem multam non euacuetur. Magna tamen ex parte contingit hic morbus ex obturatione, aut debilitatione venarum, quarum ora ex ipsa ad hepar feruntur, aut illius meatus, qui bilem ad intestina effundit. Sed neque illud tacendum erit, quod lien quoque ictericam affectionem parit, illam inquam, in qua tota cutis nigro colore inficitur, quod accidit: aut quia ab ipso liene hepar non benè purgatur, aut seipsum purgare per solitos canales non potest: vtrunque verò, vel propter imbecillitatem aliquam, aut obstructionem fit.

fit Præter iam dictas causas à procatarcticis quoque generatur, *Externa*
 ut ab immoderata exercitatione, rerum calidarum vſu, & aëris
 ambientis calida intemperie. Vnde in Sardinia ex aëris corrup-
 tione ſcribunt quidā, ineunte æſtate, aut in autumnō in hanc
 affectionem incidere indigenas ferè omnes exceptis iis, qui
 propter robur tēperamenti, aut alia de cauſa reſiſtere malō
 poſſunt. Cæterum ſi à cauſis procatarcticis icterus contingat, *Nota.*
 aut, ex veneuatę ferę morſu, interrogare egrū tantū conuenit,
 aut aeris naturā conſiderare. Aliarum cauſarum ſigna nunc do-
 cuimus. Si igitur ex indicio naturę factus ſit arquatus morbus,
 tam vrina, quā alui excrementa à naturali modo non recē-
 dunt ſi ab inflammatione hepatis, febris adeſt, & dextri hypo-
 chondrij, grauitas, & deiectiones ſunt bilioſæ. Si ab intemperie,
 citra grauitatem furor in eſt. Si ab obſtructione citra graui-
 tatem vnā cum grauitatis alicuius ſenſu circa dextrum
 hypochondrion alui excrementa alba deiciuntur. Si ab
 imbecillitate facultatis, vel attractricis, quæ bilem ab hepate
 trahit: vel expultricis, quæ ipſam ad inteſtina expellit citra gra-
 uitatem, & ſtercora alba ſunt, & vrina bilioſiſſima. Denique ſi
 à vitio ſplenis contingat, quod genus icteri atrum appellant: ſit
 enim ab atra bile vnā cū ſanguine ad cutem delata, grauius
 multo afficiuntur, conſequitur enim eos (vt inquit Aetius li.
 x.c. xvij. cuius placet verba referre) triſtitia præter rationem, &
 mordacitas eorum, quæ circa ventrem ſunt, difficultasque ſpi-
 randi. Cibos auerſantur, & nigrum lotium excernunt: Aliquan-
 do autem & per interualla quædam corpora ipſorum repeſcūt,
 ſtercora verò chalcanti colorem referunt, & aluus magis his
 exſiccatur. Cæterum eos, qui ex pallida bile arquatum contra-
 hunt, nulla mordacitas eorum, quæ circa ventrem ſunt, conſe-
 quitur: neque etiam tantum auerſantur cibos, ſed obtuſior ali-
 quando ſit in iis ciborum appetitus. Et ſtercora quidem albida
 egerunt: vrinæ autem crocei coloris, turbatæ tamen, & te-
 nebras referentes permanent. Signa prætereà omnibus icte- *Signa*
 ricis communia ſic Aetius ſcribit. Communiter autem omni- *commu-*
 bus ictericis pigritia ad motum corporis accidit, & à dulcibus *nia.*
 cibis ſunt animo alieno: amaros verò non admodum auerſan-
 tur: & variis imaginationibus vexantur: Pruritus etiam vniuer-
 ſi corporis comitatur, & difficulter exudant, porro alba oculo-
 rum, & partes faciæ temporibus propinquæ, itémque malæ
 pallorem oſtendunt. Venæ etiam ſub lingua repletæ reperiun-
 tur, & abundantem humorem ſignificant.

Curatur icterus criticus quatuor generibus auxiliorum: *Curatio*
 quamuis ſi perfectæ fuerit criſis permutationis, nihilque bilis icteri
 interiùs remaneat, ſola cutis infectio, & intemperies eget *critici*
 curatione.

DE CVRAND. MORB.

curatione. Sed aliquid intus fit, & hepatis & venarum intemperies calida fuerit. Primò, curatur victu refrigerante, & humectante, vt cremore hordei, endiuiæ, cichorea, lactuca, & similibus. Et aqua hordei, aut vino albo benè aqua diluto.

Preparatio.

Secundò, apparantibus bilem: vt syrupis endiuiæ simp. & compos. granatorum, violarum, nenupharis, acetositis limonum, & citri, cum duplo aquarum, vel decocti cichoreæ, endiuiæ, lactucæ, portulacæ.

Vacuatio.

Tertiò, vacuantibus bilem: vt cassia fistula, manna, tamarindis, rhabarbaro, & aliis cholagogis: vt ℞. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ & medullæ tamarindorum an. ʒ. ʒ. infusionis rhabarbari in aqua endiuiæ per noctem factæ. ʒ. iij. cum ʒ. iij. squinanti diaprunis solutiui ʒ. iij. syrupi violarum ʒ. j. aquæ borraginis q. s. misce, & fiat potus, vel, si malit pilulas: ℞. pilularum de

De sectione vena.

rhabarbaro ʒ. j. fiant cum aqua endiuiæ vij. pilulæ. Si toti corpori est communis intemperies, aut æger iuuenis, & carnosus venæ iecorariæ dextræ sectio est necessaria, extrahaturque sanguinis copia respondens naturæ ægri & morbi.

Alteratio.

Quartò, tollentibus intemperiem calidam hepatis internis, & externis medicamentis, dictis tertio, & septimo genere remediorum cap. 41. de curatione inflammationis hepatis.

Curatio icteri ab obstructione crassi humoris.

Si verò icterus est ab obstructione per crassam bilem, aut pituitam, quatuor remediorum generibus curatur. Primò, victu tenuante, aperiente, & calfaciente: minùs si à bile est quàm à pituita, vt alimentis, & aliis iam dictis cap. præced. de hepatis obstructione.

Preparatio.

Secundò, apparantibus materiam, vt syrupis, & aquis, incidentibus, tenuantibus, & aperientibus, primò mitioribus, vt dictum est cap. præced. secundo auxiliorum genere.

Vacuatio.

Tertiò, vacuantibus bilem crassam, & pituitam ei admixtam: vt medicamentis dictis cap. præced. tertio auxiliorum genere.

Sectione vena.

Vena secatur quoque basilica, vel salua tella media inter anularem, & minimum dextræ manus digitum, si fuerit iuuenis aut bilis, vel pituita sanguini mixta per eam humores hepatis fixi agitantur, faciliùsque obediunt medicamentis leuantibus obstructionem.

Aperientia.

Quartò, aperientibus meatibus, vt medicamentis dictis secundo, & quarto genere remediorum capit. præcedent. 42. ʒ. iij. aquæ, vel decocti foliorum raphani, aut eupatorii, aut

Simplificia.

præfij, aut matris syluæ matutinis quinque, vel septem sumptæ sanant icterum: ʒ. j. pulueris lumbricorum terrestrium tribus matutinis sumpta, vel pluribus cum vino albo, & saccharo saporis boni gratia sanat icterum, vel fiant, pilulæ au-

ro interea ex eodem puluere lumbricorum cum syrupo de byzantiis. Idem præstat stercus canis ossibus tantum nutriti, serum capræ nutritæ herbis aperientibus vt fœniculo, apio, petroselino, senationibus & similibus factum cum semine carthami, quantitas carthami ʒ. ʒ. ad lb. iij. lactis. Sanant quoque icterum aperientia hæc, dialacca scilicet diacurcuma à ʒ. ij. ad iij. & trochisci de rhabarbaro, de eupatorio, & de absinthio ad ʒ. j. cum aquis prædictis aperientibus, sæpè mutata remedij forma, & specie, vt in asthma, & cæteris affectibus diuturnis: ne natura vni assuescat. Decoctum caprifolij, scolopendriæ, hepaticæ, capil. Veneris, & quatuor seminū frigidorum maiorum septem matutinis sumptum curat icterum, præsertim si postea sumatur hic potus tribus matutinis. ℞. seri caprini lb. j. rhabarbari electi ʒ. ij. pulpæ coloquintidæ, spicæ nardi ana. ʒ. j. sacchari rosati, & violati ana. ʒ. ʒ. misce, & fiat potus. *Quidam tempore Arnaldi de Villanoua multos laborantes ictero sanauit hoc medicamento, vacuatione per sudorem & vrinam. ℞. stercoris asini recentis pugillum semis, vini albi odoriferi ʒ. iij. misce. Color flauus cutis, & oculorum tollitur mouentibus vrinam prædictis medicamentis aperientibus, & balneo ex decocto camomillæ, meliloti, althææ, & similium aut sulphureo aëre calido, & aliis omnibus aperientibus poros. Conferunt oculis sternutamenta, forus camomillæ & parum croci in aceto, quamuis antequàm appareat icterus, oculis aqua rosacea sit admouenda, vt in variolis & morbillis fieri solet. Si alia remedia & omnia fermè scripta à grauissimis doctoribus scire cupis, lege c. 5. serm. 5. tract. 6. Nicolai Florentini. Si icterus niger est, vt præcedens curatur. sed remediis valentioribus, & melancholiæ debitis, de quibus in affectibus lienis dicemus, c. scilicet 45.*

Composita.

Historia

Color flauus quibus tollatur.

Aqua rosacea oculis admouenda. Icteri nigri curatio.

Scholium.

Quotiescunque vniuersi corporis.] Morbus regius (qui plura habet nomina, & vulgò dicitur aliacra) nil aliud est quàm effusio biliosi humoris per vniuersum corpus. Vbi per bilem non solum flauam intelligas, sed & eam, qua præter naturam est: ex morsu enim animalis solet fieri icteros, bile porracea per corpus effusa, sicut in iudiciis morborum bile vitellina. Morbus regius, icteros à Græcis dictus, symptom. est in affectu corporis, est enim color vitiat, seq. alterum symptoma, nempe vitium exercementi: quod etiam ex altero symptomate dependet, nempe ex actione lesa: *Quis affectus sit.*

Icteros quid.

Quis affectus sit.

qua

DE CVRAND. MORB.

Morbus.
Varia.
icteri
causa.

Qua malè separat, aut non separat bilem: vel ex actione corporis deprauata, cum in toto eo multa bilis generatur. Aliquando tamen icteros non sequitur morbum, sed natura robur, quando in crisi- bus apparet. Morbus ad quem hac actio lesa sequitur, varius est: nam aliquando est instrumentarius, aliquando similis. Hoc intelligemus, si varias icteri causas ex Gal. lib. 5. de loc. affic. cap. 7. in hunc locum transferamus. Prima est natura, qua in crisi- bus ad cutem humorem peccantem expellit. Secunda sanguis ita corruptus, ut mutetur in bilem porraceam: quod contingere solet ex veneno in corpore genito, aut exterius inflicto, ut Imperato- ris seruo ex vipera morsu accidisse scribit Gal. Tertia intemperies calida iecoris multam bilem generans, qua tota, cum non possit expurgari à vesica bilis, una cum sanguine ad partes delata eas colorat. Quarta est intemperies calida totius corporis bilem ex te- nui parte generans. Quinta obstructio iecoris in meatu, qui ex ie- core deferit bilem ad vesicam, aut illius, qui ex vesica eam ad duodenum intestinum expurgat. Sexta inflammatio iecoris. Se- ptima scirrhus iecoris: quae duae causa media obstructione impe- diunt, quominus vesica bilis attrahat bilem. Sunt autem haec cau- sa distinctae ab obstructione, quia sine his obstructio sola potest morbum regiū efficere. Octaua imbecillitas vesica bilis orta ex ali- qua forti intemperie, ob quam non rectè attrahit bilem. Vlti- ma verò causa est immodica quantitas bilis in vesica coacerua- ta, impediens quominus (à magna distentione vesica impedita) possit contrahi: quod in vesica lotij lib. 3. de caus. symp. aliquan- do accidere scribit Gal. Ex his facile intelliges hoc symptoma ictereos appellatum, sequi varios morbos. Quorum unus est intem- peries manifesta, à qua icteros ex imbecillitate vesica, aut ieco- ris & totius corporis calore contingit. Alter est intemperies occul- ta à qua icteros ex veneno fit. Tertius est morbus in via, qui i- cterum ex obstructione, inflammatione, & scirrho generat. Inter hos morbos obstructio, inflammatio & scirrhus mali sunt, non ita intemperies: ac proinde cum ante septimum diem in febribus icteros apparet 4. aph. com. 62. malum significat, hoc est ali- quem ex illis tribus affectibus. Quod si post septimum diem ex a- liquo praedictorum affectuum appareat, etiam malum est. Si ve- rò sine affectu aliquo in febribus post septimū diem in die decreto- rio eueniat, bonum est, ex 4. aph. sent. 64. Si criticè fiat morbus regius, tunc solam euacuare oportet bilem, quae est in habitu cor- poris, & intemperiem calidam (et si morbosam non sit) in ipso corrige- re, quod balneo cōmodè praestabit. Si venenū causa sit, alexiphar- macū exhibebis illi veneno contrarium. In ictero ab intemperie ca- lida aut obstructione orto sanguinē mittes, nam reuelles, & una cum

Curatio.

cum sanguine prauo partem humoris euacuabis, & deinde efficies ea, quæ auctor docet. Si icteros ab inflammatione ortum habeat, lege caput de icteris inflammatione. Si ab scirrho eueniat (quem tactu cognosces) sanguinem mittes, ut sanguinem educas prauum, vteris syrupis inscindentibus, & emollientibus inunctionibus, miscens semper ea quæ robur seruant visceris: quod perpetuò faciendum est in affectibus partium, quæ actionem habent toti corpori necessariam, quales sunt iecur, ventriculus, & lien.

DeHydтопе.

CAP. XLIV.

HYdrops omnis vitiato hepate, & in frigidam intemperiem perducto oritur. Neque enim quod dudum de ictero dictum est: nempe non semper vitiato hepate fieri, id quoque de hydrope dici poterit. Quicumque enim hydrops hepatis vitium causam habet, siue illud per primariam affectionem, siue per consensum aliarum partium nascatur. Negari enim non potest aliarum quoque partium occasione, cum scilicet vehementer fuerint debilitatæ, hydropem oriri: non tamen ob id fateri cogimur intacto hepate tale quippiam contigisse, cum eam affectionem, nisi ipsum in sui consensum illæ vocassent, nunquam potuissent inducere. Sunt autem in vniuersum hydropis, seu aquæ inter cutem tres species, quarum primam Græci Ascitem, secundam Tympanitem, tertiam Anasarcam, hypofarcam, & leucoplegmaticam appellant. Ascites, quam Barbari corrupto vocabulo ascitem nominant, fit ab humore aquoso cum perexiguo spiritu inter peritonæum, & partes sibi subiectas coaceruato: sic dicitur Græcis, quod utrem aqua plenum ea pellicula referre videatur, ascos enim Latine utrem sonat. Tympanites accidit, quoties in prædictis locis multus spiritus flatulentus modico humori commixtus includitur. Sic affectis venter tympani instar sonitum, si percutiatur, edit, vnde malo nomen inditum est. Hypofarca contingit, cum vniuersa corporis moles prætumida est, & spongiæ instar laxa, & madefacta propter frigidum & pituitosum sanguinem per vniuersum quidem corpus diffusum, non tamen unitum. Omnis hydrops, ut supra dictum est, vitio contingit hepatis, aut per primariam affectionem, aut per societatem affecti: per primariam affectionem, vel quia inflammatione, scirrho, aut obstructione laboret, quando per has, aut similes affectiones impensè refrigeratur: per societatem autem aliarum partium, ut lie-

*Quid
hydrops*

*Species
hydropis*

*Ascites
vnde.*

Tympanites.

Anasarca.

DE CVRAND. MORB.

ais, ventriculi intestinorum maximè gracilium, pulmonis, renū, & septi transversī. Ex immodica prætereà hæmorrhoidum euacuatione, aut menstruorum, & eorundem retentione, & ex quocunque alio vteri affectu, si ingens fuerit, hydrops contingit: in omnibus enim his affectionibus ex sola hepatis frigidityte hydrops nascitur non secus, ac solet oriri, quoties ob intempestiuam refrigerationem iecur valde refrigeratur: tunc enim antequam in tumorem scirrhosum attollatur, aqua intercutem sequitur: magna tamen ex parte euenit iis, qui cibum non sentiunt, & malo corporis habitu præditi sunt, & ictero infestantur, aut dysenteria, aut colica affectione. Generaliter omnibus hydropicis spirandi difficultas adest, & tumor, & grauitas, & vitiatu color ex virore, vt inquit Aëtius, albicantibus ægris. Fastidiunt ad hoc cibum, qui sic affecti sunt, potu autem impleri quàm maximè appetunt, præsertim quæ ex ascite laborant. Humor enim, qui intra peritonæum includitur cum & falsus sit, & putris inextinctam sitim excitat, quam febris, vt plurimum sequitur: traditis generibus, his notis distinguere inuicem hydropis species conuenit. Anasarca ab ascite, & tympanite in hoc differt, quod in anasarca tam supernæ, quàm infernæ omnes partes tumidæ apparent. Et si digito comprimantur, caux remanent, in tympanite verò, & ascite superiora omnia gracilia sunt, inferiora autem inflata, & umbilicus eminens. Ascites à tympanite in hoc distinguitur: quod in ascite venter agitato non alium reddit sonum, quam solet vter, vbi aqua semiplenus agitur, in tympanite verò, qualem supra diximus.

*Com-
munia
signa.*

*Diffe-
rentia.*

*Cura-
tio ana-
sarca.*

Anasarca curatur quatuor remediorum generibus. Primò victu calido, & sicco: vt aëre æstiuo natura vel arte parato, fuga frigidi, & humidī, qualis est pluuiālis, & nebulosus: pauco cibo, & raro, facili concoctu ob facultatis naturalis imbecillitatem: & tenui potius quàm crasso, vt pane biscoto, carnibus auium montanarum, & herbis diureticis: vt fœniculo, asparagis, & senationibus, cinnamomo, zingibere, caryophyllis, pipere, aniso, vino albo, & pauco. Si vires valent, exercitatio, quæ sudorem excitet, est saluberrima. Quare semper tergendum, aut vice eius frictio multa, mollis, & mediocris, vigiliæ, & affectus animi exsiccantes vtilēs sunt, nisi deficient vires.

*Præpa-
ratio.*

Secundò, apparantibus pituitam per totum corpus sparsam: vt rhodomelle simp. syrupo de hyssopo, de duabus radicibus, oxymelle composito, & syrupo de quinque radicibus cum aquis aut decocto herbarum calidarum, & quæ pitui-
tam

tam parent. Tertiò, vacuantibus pituitam per medicamenta phlegmagoga, aliquando tamen, utilis est sanguinis missio, si ex mensibus, aut hæmorrhoidibus suppressis fiat, nunquam alias nisi æger esset maxime sanguineus, & iuuenis, sanguis- que pituitæ esset permixtus, sed semper parcè extrahatur sanguis, ne iecur imbecillus reddatur, & cuius imbecillitate fit. In primis duobus affectibus venæ tibiarum, aut pedum sunt secandæ in tertio vena hepatis: sed in hoc affectu cautè sanguis est mittendus. Sint medicamenta purgantia in hac, & omni specie hydropis; benigna, & quæ hepar non lædant: vt agaricus, hiera simp. diaphænicon: vt ℞. diaphænicon. ʒ. iij. agarici trochiscati ʒ. j. β. rhodomellis ʒ. j. aquæ fœniculi quod s. misce, & fiat potus: vel ℞. pilularum de hiera simplici ʒ. ij. agarici trochiscati. ʒ. j. fiant cum aqua absinthij pilulæ viij. vel ℞. hieræ simplicis ʒ. j. frequens vsus & longus simplicis est utilis & necessarius huic, & omni speciei hydropis. Vacuatur quoque materia hæc diureticis, vt syrupo de duabus, radicibus, de quinque radicibus, aqua vel decocto quinque radicum diureticarum, vel prasij. Cantharides à quibusdam laudantur in hac, & ascite, sed vitandæ sunt, quia potenter vesicam vlcérant, & hepati multum nocent. Materiam hanc resoluunt, sol æstius incidens in nudum corpus, aut arenæ calefactæ sole, aut igne, fons ex vino, & rebus calidis, suffitus per lapides ignitos ex decoctis in vino, foliis lauri, camomillæ, ruta, rore marino, origano, salvia, pulegio, & similibus. Balneum salsum, aluminosum, aut sulphureum, naturale & artificiale mirificè prodest.

Quartò, tollentibus dispositionem hepatis, & causam anasarcae, vt obstructionem hepatis, aut duritiem remediis dictis cap. 24. de obstructione hepatis, & contrariis sanantibus intemperiem frigidam simul, & obstructionem, & corroborantibus: vt dialaccâ, diacurcumâ, trochiscis de absinthio, de rhabarbaro, de eupatorio cum puluere rosatæ nouellæ, aut diarrhodon Abbatis, si calida intemperies timeatur. Tympanites curatur quatuor remediorum generibus. Primò, victu calido, & sicco flatus resolvente, & fame, siti, exercitatione, pane biscocto, & cum aniso, & fuga eorum omnium, quæ flatus gignunt: vt sunt legumina herbæ frigidæ, & crudæ, pisces, & similia.

Secundò, apparantibus pituitam, vt rhodomelle, & aliis dictis superius hoc cap. de curatione anasarcae, quamuis in hac specie sit minus necessaria euacuatio, quàm in anasarca, & ascite, in quibus multa est copia humoris, & pauca flatus,

*Vacuatio.
Sectio
vena.*

*Quare
vena se-
cunda.
Purga-
tio.*

*Laus
hiera
simp.
Cantha-
rides im-
proban-
tur.*

Alteratio.

*Curatio
Tympani-
ta.
Victus.*

*Prepara-
tio.*

*Observa-
discrimē*

DE CVRAND. MORB.

in Tympanite verò plùs flatus est, & minùs humoris.

Vacua-
tio. Tertiò, vacuantibus materiam frigidam, vt agarico trochif-
Historia
mira. cato, hiera simp. benedicta, & similibus tam per os sumptis
Resolu-
tio. quàm per clysterem iniectio. Quidam medicus doctus & senex
Pulvis. curauit pilulis mezereon sacerdotem quendam senem tympa-
nite laborantem. Flatum resoluunt balneum sulphureum, sal-
sum, arena calfacta sole, aut igne fofus, & suffitus per lapides
ignitos, & alia dicta tertio genere remediorum superiùs hoc
capite. Pulvis hic optimè resoluit flatum, vt ℥. anisi, ane-
thi, seminis fœniculi, carui, cymini, origani, cinnamomi,
gariophyllorum an. ʒ. iij. sacchari ʒ. 3. misce, & fiat pulvis.
Dosis cochlearium vnum ante cibum cum vino, & summo ma-
ne. Diagalanga, diamofcus, theriaca magna, mithridatum,
diatium piperon, diacyminum, & similia resoluunt & eua-
cuant flatum. Sacculi quoque ex sulphure, sale, milio, camo-
milla, kalendula, origano, pulegio, anthos & similibus ven-
Cucurbi
tula. tri actu calidi admoti dissipant. Cucurbitula magna flammâ
multâ vmbilico affixa valenter resoluit. Hoc cataplasma po-
Cata-
plasma. tentissimè discutit flatum multis diebus ventri admotum: ℥.
stercoris vaccini, columbini, & caprini an. p. j. pulueris cymini,
carui, amcos, baccarum lauri, origani, rutæ syluestris, & anthos,
an. ʒ. ʒ. s. sapæ, q. s. misce, & fiat cataplasma, adde aquæ vitæ
vncias duas.

Alter-
atio & cor
roboatio. Quartò, & vltimò, tollentibus hepatis affectionem, mali cau-
sam per contraria, & corroborantibus hepati, de quibus dictum
est superiùs quarto genere in curatione anasarcae, & de his di-
cemus in curatione ascitæ.

Curatio
ascitæ. Ascites curatur quatuor auxiliorum generibus. Primò, victu
Victus. calido & sicco dicto initio huius capitis. Carnes semper sint
faciles coctu, & boni sanguinis, & magis tostæ, quàm elixæ.

Prepa-
ratio. Secundò, apparantibus humorem aquosum & corruptum.
vt ℥. syrupi endiuixæ compositi, & de scolopendria an. ʒ. ij.
rhodomellis ʒ. iij. misce. Item ℥. decocti, vel aquarum ab-
sinthij, fœniculi, & capillorum veneris an. ʒ. iij. misce parato
humore hoc, vel simili medicamento. Tertiò, vacuantibus a-
Purga-
tio. quis excitantes hydropem, primò purgatoriis non valentibus,
& nocentibus iecori, vt fero lactis caprini, aut ouini, agari-
co, myrobalanis citrinis, & Kebulis simul, puluere hieræ sim-
plicis, vel hiera simplici, succo, aut puluere brasicæ marinæ

Duo ne-
cessaria. (quàm vulgus sedanellam, Arabes cachitam vocant) citra mole-
stiam purgante aquam, & hepar roborante: quæ duo sunt
summè necessaria ad curandum hydropem. Dosis est à ʒ. ij. vs-
que ad ʒ. quatuor, & ego exhibui drachmas septem frequenter
manè

manè laboranti hoc genere hydropis, & foeliciter successit. Aliquando hic morbus ob sui vehementiam eget valentioribus purgantibus, etiamsi ab iis iecur lædatur: inter quæ succus radicis ireos: dempto sedimento ab omnibus laudatur. Dosis à sedrachmis duabus usque ad drachmas tres semel in hebdomada, dummodò inter has vacationes valenter iecur corroboretur pulvere diarrhodon Abbatis, vel trochiscis de rhabarbaro, vel tyrapo de absinthio, vel pulvere hepatis lupi, vel alimento ex vuis passis, ex auellanis, & ex limacibus. Hoc succo ireos multi hydropici deplorati fermè sanati sunt.

Pilulae de serapino, de euphorbio, & mezereon potenter purgant aquam, sed molestè & violenter, quare iis non nisi raro, & exactè utendum est. Dosis est ab scrupulis duobus usque ad drachmam vnam. Succus quoque cucumeris agrestis siccatus, quem elaterium vocant, potentissimè purgat: & omnium maximè durat, autore Plinio, seruatur enim centum annis integer. Sauonarola medicus sua ætate celeberrimus dabat scrupulum semis huius succi siccati mense Augusti, & mixti cum speciebus elephanginis redactis in pilulas cum succo absinthij, & multos curauit hoc medicamento. Syrupus hic ex decocto radicis cucumeris agrestis est efficax in curatione hydropis & ascitæ, & eruditissimus doctor meus Iacobus de Leon Compluti Archiclinum illustris Comitis de Salinas hydropi cum confirmatum curauit. ℞. radicis cucumeris sylvestris ℥. iij. decoquatur in libris duabus aquæ, da dimidium, deinde accipe mellis libras duas, aquæ libras octo, bulliant per se ad dimidij usque consumptionem, cui percolato adde ℥b. j. decocti radicis cucumeris sylvestris percolati quoque, & fiat syrupus, addendo in fine pulueris dragraganti vnciam vnam, cinnamomi electi drachmam vnam: Dosis quolibet mane cochlearium vnum. Medicamentum benè paratum ex cantharidibus in maxima hydrope, tam ascite, quàm anasarca, ex purgat per vrinam valenter aquosum hunc humorem, sed iis non utendum, nisi cum alia non contulerint.

Valescus tamen de Taranta vir doctissimus & magnæ experientiæ hoc medicamento multos laborantes, & Anasarca, & Ascite sanitati restituit. Castigantur cantharides abscissis capitibus, & pedibus, non alis (ut quidam malè docent contra Hippocratem & Plinium, & veritatem) accipe ergo vnam cantharidem absque capite & pedibus, quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorem an. ℥. seminis sacchari candi violati ℥. ij. gummi crassi, vel dragaganti ℥. vj. misce, & fiat ad modum pulueris. Dosis est vncia vna summo mane:

DE CVRAND. MORB.

*Vesica
defensio.
Vis can-
tharidii
quanta
sit.
Purgan-
tia per
vrinam,
& iecur
corrobo-
rantia.
Historia
Alter
non mi-
nus insi-
gnis.
Lac an-
noceat
hydropi-
cis.
Clyste-
res lau-
dantur.
Clyster
optimus.
Pilula.

Seru ca-
prinum,
Maiores
na.
Trasium
Cotur-
nix.
De tym-
panite.
Topica.*

sed defende vesicam adinueniendo ei lac caprinum, vel doleum
 rosatum tepidum : autore enim Aëtio cap. de dolore capitis,
 sexto sermone, cantharides capiti admotæ nocent vesicæ, &
 quod magis incredibile videtur, quidam chirurgus Medio-
 lanensis bis sanguinis profluuium correptus fuit per vrinam so-
 lum, portando cauterium ex cantharidibus in Byrsa. Tria gra-
 na alkekengi in puluerem redacta cum vino albo curant hy-
 dropem, vacuando per vrinam. Quæ per vrinam clementer pur-
 gant, & corroborant iecur, sunt diacurcuma, dialacca, & tro-
 chisci de rhabarbaro, hi enim obtinent principatum in hoc cu-
 rando morbo, quibus curatus fuit excellentissimus Dux Medio-
 lanensis Franciscus: Dosis à drachma vna vsque ad drachmas
 duas. Propter illorum amaritudinem fiant pilulæ cum aqua ab-
 sinthij. Iisdem trochiscis curavi ego magnificam vxorem ma-
 gnifici Francisci Marci, quæ laborauit principio ascite cum
 febre fermè habituali: cui dedi præter hos trochiscos mul-
 tis diebus lac asinæ, quæ pasceretur herbis diureticis, lac enim
 non nocet hydropi, vt multis grauissimis medicis placet, præ-
 sertim, si ab ea animante emulgeatur, quæ pascatur herbis
 diureticis. Ideoque à quibusdam laudatur lac caprarum ara-
 bicarum propter pastum. Clysteres acres purgant hanc aquosi-
 tatem, & flatum. Vacuatio hæc tutior est aliis purgationibus:
 quare frequens illorum vsus est utilis, & necessarius. Hic cly-
 ster, vel huic similis est optimus: ℞. furfuris, camomillæ,
 stichados an. p. j, rutæ, & saluiæ an. m. j. hellebori, agarici,
 & turbit an. ʒ. ij. carthami ʒ. β. roris marini, cyclaminis an.
 m. j. fiat decoctum: de quo percolato accipe ℥b. j. olei de ru-
 ta, & de lilio an. vncias duas, salis drachmam vnā β. mis-
 ce, & fiat clyster. Pilulæ hæc purgant materiam hydropis: ℞.
 cinnamomi, squinanti, cuscutæ, croci, calami aromatici, se-
 minis apiij, fū, prasij, nardi asati, mastichis, mirrhæ an. ʒ.
 β. serapini, agarici, an ʒ. iij. euphorbij, turbit, colocin-
 thidis an. ʒ. j. rhabarbari ʒ. iij. aloës ad pondus omnium, misce,
 & cum succo absinthij, fiant pilulæ. Dosis qualibet hebdoma-
 da drachma vna. Sex vnciæ feri caprini cum drachma vna se-
 mis pulueris pulueris spicæ nardi manè sæpè sumptæ purgant
 clementissime hæc aquositatē. Succus maioranæ cū oxymelle, si
 manè frequenter sumatur, hydropē hanc curat, purgādo aquo-
 sitatē. Idem facit succus prasij desiccatus, & mistus cū vino al-
 bo. Idē præstat sanguis coturnicis; resoluunt vētris aquositatē
 omnia superius dicta in resoluēdo flatu in tympanite: quamuis
 valētioribus egeat ascites cū difficilius vacuetur humor, quā
 flatus posita parilitate. Hoc, aut simile cataplasma est optimum
 in

in resoluendo: ℞. foliorum althææ m. ij. radicum cucumeris *Cata-*
 sylvestris, & ireos an. ʒ. j. ficus siccas numero 20. omnia de- *plasma-*
 coquantur in vino albo, & fiat cataplasma: vel ℞. fellis tauri, *ta resol-*
 nitri, an. partem vnam, piperis puluerizati, partem semis, cum *uentia.*
 melle, fiat ad modum cataplasmati, quod per dimidiæ horæ
 spatium adinoueatur ventri, ne vesica, aut vlcera iatumescant:
 vel ℞. stercoris bubuli, & caprini an. p. j. cineris quercini, &
 vitis an. p. ʒ. salis, sulphuris an. ʒ. ʒ. baccharum lauri, staphila-
 griæ an. ʒ. j. ex his decoctis cum vino fiat cataplasma, cui adde
 vnguenti Aragon, & marciaton an. vncias duas. Cauteria mul- *Caute-*
 ta ventri sæpè admota non profunda purgant hanc materiã & *ria.*
 his curauit quidam Agarenus duos Valentinus nobiles. Idem *Histo-*
 præstant cauteria tibiis infixa, vt per ea materia vacuetur, quia *ria.*
 illarum vlcera in hydrope difficulter curantur, nisi prius hy-
 drops tollatur. Aliqui scroto fetanum immittunt, vt eo multis *Incisio*
 diebus, & sensim vacuetur materia. Postremò, si æger fuerit iu- *pruden-*
 uenis, & satis robustus, incisione ei extrahatur hæc aquositas, *ter fa-*
 non vna eductione, sed multis & sensim ad vires conseruandas *sta.*
 præcedente tamen mortis præsagio, ne nobis ascribatur: nam *Exem-*
 præsentē Sauanarola, & aliis doctissimis medicis Patauij, Ioan- *plum.*
 nes Ludouicus vtriusque iuris doctor eximius, sexagenarius, su-
 bita facta incisione in manibus chirurgorum interiit. Eodem *Alte-*
 tempore quædam mulier quinquaginta annos nata laborauit *rum ex-*
 ascite sex annis, & ex casu in lapidem fuit vulneratus venter *emplum*
 eius, per quod vulnus subito omnis aquositas euacuata fuit, in- *admi-*
 cidit illa quidem in animi deliquium, sed post in xenodochio *radum.*
 Patauino bonis alimentis pristinam recuperauit sanitatem: quæ
 res digna est admiratione: fiat igitur incisio musculi obliqui
 dextri ascendentis, si primò fuerit hepar affectum, & sinistri si
 lien, prius cute deorsum reuulsa, vt post incisionem, & aliquam
 aquæ extractionem locum naturalem repetens foramen obtu-
 ret, ne aqua affluat largior, vel immisso syphone in hiatum.
 Aqua autem quotidie bis, aut ter syphonis operculo ablato mit-
 tatur, tunc æger roboretur cibus optimis.

Quartò, affectionem hepatis causam mali tollentibus per *Altera-*
 contraria & corroborantia hepar, vt puluere diarrhodon Abba- *tio &*
 tis, hepate lupi, & aliis iam dictis superius. *corrobo-*

Scholium.

HYdrops omnis.] *Hydrops nomen ex aqua assumpsit: in om-*
nibus enim hydropis speciebus, aquosus generatur humor. men.

Quod

DE CURAND. MORB.

Hydrops Quod in tympanite, in quo id difficile videtur, etiam verum est, **sympto-** quia in eo humor etsi paucus in abdominis regione coaceruatus ap-
ma est. paret. **Hydrops** symptoma est, tumor scilicet prater naturam ven-
Morbus. tris, aut totius corporis sequens aliud symptoma, quod est actio ieco-
ris deprauata. Morbus, ad quem sequitur, est intemperies frigida
iecoris. Hac vel primam in eo generationem habet, quando à iecoris
scirrho, aut obstructione fit, aut per consensum ei aduenit, ex affe-
ctu lienis, ventriculi, intestinorum, & pulmonis. Hæ enim partes
refrigerata, per venas frigiditatem transmittunt, venis caua aut
gibba partis iecoris, & inde eius carni. Iecur etiam frigiditatem
concepit, ex immodica sanguinis per hamorrhoidas euacuatione,
aut suppressione, sicut ex suppressione mensium, quorum immode-
rata euacuatio, nec hydropem, nec cachexiam efficit, ex Galeni sen-

Immo- tentia, lib. de curand. per sanz. missionem, cap. 19. eò quòd mensua
dica eua euacuatio secundum naturam fieri solet. Frigida iecoris intempe-
cuatio ries in Hydrope, aliquando à causa calida ortum habet: in febribus
mēstrua enim ardentibus (etsi raro) etiam in principio visus est Hydrops,
non fa- Qui malum signum est, ex eo enim colligimus adeò esse intensum
cit hy- calorem, ut vitiata coctione iecoris, aquosa humiditas in eo, pro san-
dropem. guine generetur. Quòd si Lupcius, & alij, sequuti Alexandrum,
Hydrops frigida (quibus hunc Hydropem curari aiunt) post febrem conce-
à causa dant, grauius errabunt: non autem si eis utantur, ut febrem cu-
calida. rent. A causis externis etiam potest hydrops nasci, potu aquæ fri-

Causa gida, aut natatione in ea. Existimo autem aërem frigidum, hydro-
externa pem nunquam effecisse, eius enim vis non potest integris viribus ad
hydro- iecur usque penetrare, præsertim cum eius tenuitas non sinat ipsum
pis. magnam, & perdurantem actionem exercere. Iam cum hydrops, re-
frigerato iecore fiat, inde pro maiori aut minori refrigeratione, tres

Prima hydropis differentia ortum habent. Prima dicitur hydrops tympa-
hydropis nites, in qua in iecore exigua est imbecillitas, ita ut chyli maiorem
 differen- partem, in optimum sanguinem mutet, & alteram, quæ minor est,
tia. in aquam: ex qua in cauitate naturali multum flatum eleuant
partes, adeò ut in ea multus flatus, & paucus humor collectus sit.

Secun- Secunda nominatur Ascites, in qua iecur maiorem habens frigidi-
da. tatem, & imbecillitatem, quam in prima, ex chyla paucum sangui-
nem, etsi optimum generat, & simul multam aquam: quæ cum
sanguine non est multum permixta, eò quòd iecur, ut eam sepa-
ret, aliquod seruat robur. Hac aqua per iecoris carnem in cauita-
tem à peritoneo circumscriptam permeans, eam replet: quod non
contingit aqua ex obstructione renum in venis coaceruata, non quia
est pauca, ut sentit Valles. lib. 5. de loc. affect. cap. 6. sed quia non ge-

Tertia. neratur in iecore, neque ideò moram facit. Tertia differentia hydro-
pis ea est, quam anasarcam, & leucoplegmaticam appellant, in qua
maiores

maïorem habet iecur frigiditatem, quàm in supradictis: ut sanguis non optimus, sicut in duabus primis: sed totus vitiosus generatur, est enim aquosus aut pituitosus potius, quia pituitosa humiditas in iecore præter naturam generata, ob imbecillitatem partis non potuit à sanguine separari. Atque hæc est causa, ob quam omnes partes corporis, malè nutriantur, & humiditate madcant. Qua in parte maxime mirandum est Valles. lib. 4. acutorum, & lib. 4. epyd. com. 42. Valles in anasarca minore habere frigiditatem, quàm alias hydropis differentias, scripsisse. Ex his tribus differentiis, etsi in tympanite minor sit intemperies, est tamen in ea maius periculum, quàm in reliquis non ratione affectus, sed curationis: quia flatum discutientia (quibus curatur) calida cum sint, de nouo flatum generant.

Secundò apparantibus pituitam.] In hac sola hydropis specie, In qua qua dicitur anasarca, licet nobis ante purgationem preparare hu- hydropem morem: quia pituitosus & crassior est. Non autem licet in aliis dif- prepara ferentiis (nisi propter obstructionem id efficiamus) cum ex humore mus hu- aqueo tenui fiant. morem.

Tertiò, vacuantibus pituitam.] Multi sequuti Galen. lib. 4. de An sit rat. vic. in acutis comm. 1, 3. in hydropem anasarca ex suppressione secunda mensium, ex hamorrhoidibus, aut alia plethorica affectione orto, vena in quando incipit venam secant. Quod difficillimum nobis videtur, anasar- imò falsum, quia in eo iecur maxime refrigeratum est, & sangui- ca. nis missio ex accidenti refrigerat. Dices sequitur ex sanguinis mis- sione alia maior utilitas, quæ est mouere suppressam euacuatio- nem, aut minuere plethoricum humorem à quo refrigeratum fuit iecur. Respondeo, non posse tunc opportunè, eo uti remedio, si consi- deremus massam sanguinariam adeò deprauatam, & validam ie- coris intemperiem. Hoc quamuis ita sit, possumus tamen Galenum In ana- (ut par est) excusare, si dixerimus ipsum per principium anasarca sarca o- eachexiam intellexisse. Cum ergo in anasarca, pituitosus humor in mne va- omnibus partibus contineatur, omne vacuationis genus in eo ten- cuatio- tandum est. Infernè per aluum, per urinam radice petroselini, aspa- nis ge- rari, & aliis, diureticis medicamentis. Per cutem etiam frictioni- nus ten- bus cum melle, balneis sulphurei, vel sponte nascentibus aliis, arena tandum. calida, frictione cum oleo trino sub sole, tecto capite, & similibus. Ic- Taxatur cur roborabis, & simul humorem discuties unguento in hac forma auctor. parato: ℞. olei absinthij, & irini an. ℥. ij. utriusque dialthæe ℥. ss. Cantha- cere parum, fiat unguentum. Cantharid. s non probat auctor, timent ridum earum vehementiam quasi eam quantitate, & nixtione, non possi- exhibi- mus minuere & corrigere. Proinde in eo omisso res sic distinguenda tio. est. In hydropem ascite & tympanite, fugiendus est vsus cantharidum, quia humor in cavitate naturali inclusus, non poterit per urinam purgari. Si verò sit anasarca, in qua humor in venis continetur, earum

DE CVRAND. MORB.

earum usus commodus erit, expurgabitur enim per urinam. Non quòd cantharides id præstent (ut malè sentit auctor) sed medicamenta urinam mouentia, cum quibus cantharides miscentur, tantum ut sint vehiculum. Neque est quòd timeamus, totas eas integras assumere, cum Galenum libris simpl. c. de cantharidibus subscriptorem habeamus.

Medica-menta ad hydropicos. Quartò, tollentibus dispositionem.] Hydrops ut in plurimum solet fieri ex obstructione iecoris & lienis: quem post purgationem cum agarico, in eo qui fit ex obstructione iecoris: & cum confectio-
In asci- ne hanc in altero, utere unguentis, capitibus de obstructione ieco-
te aqua ris, & lienis descriptis, & hac confectio: ℞. diacurcuma, & dia-
non est acutorum comment. 113. humor in ascite aquosus est, & tenuis,
prepa- non ergo egebit præparatione: si memor es eorum, qua primo Scho-
randa. lio docuimus.

Varia Tertiò, vacuantibus aqua.] Nonnulli, ut educant aquam in
aqua hydropicis utuntur brasicæ marina, quam vulgo soldanellam ap-
purga- pellant, eam exsiccantes, & ex pulvere assumentes, singulis die-
tio. bus 3. j. usque ad 3. ij. ℞. (si vires constant) cum mulsa & de-
Prima. cocto eupatorij. Alij ex eius succo expresso & percolato, ob eius
Secun- tenacitatem cum melle aut saccharo syrupum parant, cuius 3. j.
da. singulis diebus propinare solent. Alij tithimalum marinum
Tertia. (quem Dioscorides tithimalum paralyon nominat) exsiccant, &
eius pulueris 3. j. ℞. uno quoque die, cum mulsa, aut decocto eupa-
Quarta. torij exhibent. Alij utrosque dictos permiscent, addentes propter
Quinta. suauitatem, semen anisi, carui, & fœniculi. Quæ omnia etsi eua-
cuent humorem aquosum, nihilominus tamen succus radicis iridis
principatum hac in parte habet, cui uni debetur, desiderata aqua
euacuatio: potenter enim eam educit, minúsque prædictis omnibus
molestus est ventriculo. Præcedentibus ergo syrupis (si opus fuerit)
purgare poterit succo iridis, agarico trochiscato, diaphanicone &
aliis. Portionem in hunc modum parare poteris: ℞. succi radicis
ireos 3. ij. aqua mulsa 3. ij. misce. Aut ex eodem succo iridis conser-
uam efficere poteris hoc modo: ℞. radicis iridis rectè excorticata
lib. i. mellis 3. xiv. fiat conserva ea ratione, qua fit caro cydoneorum,

Nota quæ in vase vitreo ponatur, commiscendo semen anisi, fœni-uli &
hanc hy- carui: cuius unum cochlearium singulo mane assumet. Quamvis ve-
dropis rum sit in hydrope, humorem esse euacuandum, magis tamen inten-
curatio- tos esse oportet ad roborandum iecur & lienem: quia ea medicamen-
ta, quæ humorem euacuant, vehementia cum sint imbecillitatem
viscerum

viscerum augment, atque hac est causa, ob quam culpa medicorum, plus ad humerem quàm ad iecur respicientium, agroti in peius semper abeant, & misère moriantur. Curabitur ergo rectè hydrops, sensim euacuantes humorem medicamentis benignis, & simul viscera roborantes: cùmque sit morbus longus, longo tempore oportet assumere medicamenta, potissimum ea, quæ à nobis modò describentur. Tria enim sunt, in quibus tota hydropis curatio reposita est, primum manè sumendum est, secundum noctu, & tertium est unguentum, quo regionem ventris inungemus. Medicamentum, quod manè assumi debet parabitur hac ratione. Noctu ex lacte asinae, aut in eius defectu, ouis, & in huius defectu, capra extrahe ℥.vj. seri, ita ut in eo clauos numero duos, trochiscorum de eupatorio, & de capparibus an. 3. ss. cum paucis cinnamomo apponas. Hoc serum manè assumatur, ita ut ager neque ad prandij horam abstineat à cibo. Est hoc medicamentum clementer purgans, obstruens, & viscera roborans. Aduerte tamen prædictos trochiscos de tertio in tertium diem, recenter esse construendos. Medicamentum noctu assumendum, quatuor horis post cœnam in hora, qua ager dormire vult utile erit: quo tempore (si iecur schirro careat) assumat tria cochlearia, confessionis ab Andromaco descripta, quæ dicitur cypoides, superbibens ℥.vj. vini albi veteris, ut medicamentum ad hepar permeet. Istius compositionis laudes lege apud Galenum lib. 8. de compos. medi. sec. locos. Unguentum hoc est: ℥. unguenti de Althæa ℥.ij. olei nardini & absinthij ana. ℥. iiij. olei laurini ℥.j. ss. unguenti Aragon. ℥. iiij. unguenti marciaton. ℥. iv. misceantur omnia, & cum paucis cera fiat unguentum, quo calida regio ventris inungatur. Atque de curatione istius affectus. Solùm superest, ne cum auctore decipiaris, fugere usum lactis in tympanite propter flatum: in aliis verò, quia non poterit rectè concoqui, & sic acescens intemperiem frigidam augebit.

Medica-
mentum
manè as-
sumen-
dum.

Medica-
mentum
noctu as-
sumen-
dum.

Unguen-
tum.

Taxa-
tur au-
tor in
lactis ex-
hibitio-
ne.

De lienis obstructione. CAP. XLV.

Lien perinde, ac hepar obstructione quoque laborat, quod bifariam contingit, aut obturato eo meatu, per quem humoris melancholici, qui sanguinis velut limus est, ad splenem fit deriuatio, ut hepar purgetur, & sanguis purior reddatur: aut eo, qui eundem humorem ad ventriculum eructat. Causæ cap. de hepatis obstructione dictæ iam sunt. Notæ hæc sunt. In primis Gal. 5. de loc. affect. cap. 7. solo colore cognoscebat hepatis, & splenis affectum nulla audita præteritorum accidentium enarratione: imò (quod grauius est non inuestigato viscerum affectu per tactum: hoc tamen intellige cùm ab hepatis, vel splenis

Descri-
ptio.

Causæ.
Nota.
Galeni
peritia.

vicio

DE CVRAND. MORB.

*Utilitas
succ
melan-
cholici
in ven-
triculū
delati.*

splenis vitio fit icterus. Si obstructio in eo meatu fiat, qui crassum, atrūque sanguinem ad splenem mittit, nullus in splene tumor, aut grauitas sentitur: cutis tamen color, præsertim faciei nigrior euadit adeò, vt ater icterus sæpè oriat-
tur impuro scilicet sanguine per corpus fuso. Quòd si non huius, sed alterius meatus, qui ad ventriculum atram bilem defert, obstructio infestet, & tumor, & grauitas sinistri hypo-
chondrij adsunt, & ventriculus ea commoda non sentit, quæ cum humorem in ipsum delatum sequuntur: hæc sunt constru-
ctio eius atque corroboratio: cuiuscunque tamen meatus ob-
structio sit, qui sic afficiuntur, timorem, atque tristitiam patiun-
tur, spiritus prætereà difficultatem, & somnos turbulentos ha-
bent, & hepar per consensum iis quamprimū læditur, vnde in aquam intercutem sæpè incidunt, præsertim si lien indura-
tus fuerit consentiēte iccore, vt docet Gal. 6. de loc. affect. cap. 1.

*Curatio
obstru-
ctionis.
Indica-
tio ex na-
tura par-
tis.
Topica.
Vnguen-
tum.
Scirrhi
curatio.
Vitus.
Prepa-
ratio.*

Lienis obstructio curatur quinque remediorum generibus, quemadmodum hepatis obstructio, sed valentioribus, propter maiorem distantiam, & partis ignobilitatem. Consideranda sunt ergo, quæ diximus cap. 42. in 4. tamen genere remedio-
rum præcedenti fortu ex aceto, tamarisco, & ceterac simul de-
coctis bis in die ventriculo vacuo vngatur lien hoc vnguen-
to, aut huic simili: ℞. oleorum amygdalarum amararum, &
de capparibus an. ʒ. ij armoniaci dissoluti in aceto ʒ. iij. vn-
guenti Aragon, & dialthææ compositæ ʒ. ʒ. ceræ q. s. misce, &
fiat vnguentū. Scirrhus lienis curatur quinque remediorū ge-
neribus. Primò, victu tenuante, & mediocriter calido, ne parte
tenuiori resoluta augeatur durities. Sint ergo cibi boni succi, &
faciles cōcoctu, & tenuis substātiæ, & humidi, vt iura pingua cū
radice petroselinī vel fœniculi, vel foliis iaphani, & similibus.

*Purga-
tio.*

Secundò, apparantibus materiā terrestre, hac aut simili mix-
tura: ℞. syrupi de scolopendria ʒ. iij. syrupi buglossæ, & rho-
domellis an. ʒ. ij. misce. Item ℞. aquarum aut decoctionis
buglossæ, capilli Veneris, cetarac, & tamarisci an. ʒ. iij. misce.

Potus.

Tertiò, vacuantibus hanc materiam melancholicam, hoc aut
simili potu, ℞. confectionis diasenæ ʒ. ʒ. confectionis me-
dicaminis hamec. ʒ. iij. agarisci trochiscati ʒ. j. syrupi buglos-
sæ ʒ. j. aquæ borraginis, q. s. misce, vel si magis amat pilulas.
℞. pilularum indarum, & de fumo terræ. ʒ. ʒ. diagridij. ʒ. iij.
cum aqua buglossæ fiant pilulæ septem.

*Molliē-
tia.*

Quartò, curantibus duritiem internis, & externis mollien-
tibus: vt ℞. caricæ numero xx. vuarum passarum sine granis

*Sumen-
da.*

p. j. foliorum maluarū, & althææ an. m. j. seminis lini, & fœnu-
græci an. p. fiat decoctū in libris sex aquæ ad dimidium, de
quo

quo percolato accipe ℥. ij. ℞. & cum ℥. j. mellis fiat ad modū
 fyrupi non perfectè decocti. Adde fyrupi de scolopendria
 ℥. vj. Dosis quolibet mane vnciæ quinque. Lien bis ter in die
 vngatur hoc, vel simili vnguento: ℥. olei sesamini, & amygdalarum dulcium an. ℥. j. olei de capparibus ℥. ℞. axungiae
 gallinae, & anatis, medullæ crurum vituli, an. ℥. ij. ℞. dial- *Curatio*
 thææ simplicis & hysopi humidæ an. ℥. iiij. armoniaci disso-
 luti in aceto ℥. ij. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguen-
 tum: ante tamen vñctionem semper lien hoc vel simili fotu,
 præmuniatur. ℥. caricarum vuarum passarum sine granis, se- *Femen-*
 minis lini, & fœnugræci an. p. j. radicis althææ, & tamarisci *tum.*
 an. ℥. j. ℞. aceti albi ℥. iiij. fiat decoctum ad medietatem. Lie-
 ni hoc aut simile emplastrum imponatur. ℥. emplastri de me-
 liloto, & filij Zachariæ loco ceræ quod sufficit, extendatur *Empla-*
 super alutam ad formam linguæ bubulæ, adde armoniaci dis- *strum*
 soluti in aceto ℥. 3. pulueris radicis ireos ℥. j.

Quintò, corroborantibus lienem, vt trochiscis de rhabar- *Corro-*
 baro, & de capparibus simul. & puluere diarrhodon Abbatis *boratur.*
 cum syrupo de scolopendria, & hoc aut simili fotu. ℥. radi- *Fotus.*
 cis scolopendriæ. m. j. radicis capparidis. p. j. rosarum. m. j. aceti
 calybeati ℥. ij. decoctum ad medietatem.

Scholium.

Lien perinde.] In toto hoc capite solum est quod addas san-
 guinis missionem (cuius auctor nullam fecit mentionem) vt
 reuellas ab obstructione sanguinem præurum, nempe melancholicū.
 Quod si non fuerit melancholicus, à sanguinis missione abstinebis.

De suppressione vrinæ: C A P. XLVI.

Suppressionem vrinæ Græci Ischuriam nominant, ea fit, *Descri-*
 quoties lotium in totum supprimitur, ita vt eo ægrotantes *ptio.*
 nihil reddant. Hæc fit nonnunquam propter vesicæ imbecilli-
 tatem, cum id, quod in ipsa continetur comprehendere nō po-
 test, ita, vt exprimat. Interdum etiam obstructio inferiori
 meatu à crassis humoribus, aut ab impacto lapide, aut à pure, *Causæ.*
 aut à caruncula, vel callo ibi genito, aut à sanguinis grumo.
 Aliquando accidit ab inflammatione, aut aliquo alio huius-
 modi tumore præter naturā. Quorum occasione vel angustior
 redditur meatus aut, totum obstruitur. Propter obtusū quoque
 vesicæ sensum suppressam vrinam aliquando vidimus, & Gal.
 de quodam scribit, cui torpente vesicæ sensu ob malè affectos
 nervos vrina fuerat cohibita. Accidit & sanis sæpè, vt ait.
 Ætius, vrinam ipsorum cohiberi, aut ob negotiorum im-
 portu

portunitatem, aut in concionibus, aut foro iudiciario, aut som-
Nota ex nis, si diutiùs continetur lotium. Haftenus de causis, nunc de
imbecil- notis agamus. Si ab imbecillitate vesicæ viina supprimatur, fri-
litate. gidam eius intemperiem considerare oportet, & num ipsa ma-
 nu compressa urinam reddat: si enim hoc contigerit, & insuper
 eam intemperie frigida laborare ex propriis notis coniicimus,
 argumentum certissimum habebimus suppressionis urinæ cau-

Ex ob- sam vesicæ imbecillitatem extitisse. Si obstructus inferior mea-
structio- tus sit à glutinosis humoribus, antea vitam disquiremus,
ne. num in otio educatus sit, (vt inquit Galenus) qui sic affectus est,

Ex cal- multis cibis crassis, viscosisque humores generare valentibus
cult. fuerit vsus. Si à lapide, notas ex sequenti capite desumemus. Si à

Ex pu- pure, inuestigabimus per proprias notas num in renibus, vel in
re. parte aliqua renibus superiori abscessus aliquis fuerit, quo ab-
 rupto pus in renes, & vesicam fuerit transmissum. Præterea num

Ex ca- vesica malo aliquo laborauerit, ex quo ea puris generatio po-
runcu- tuerit prouenire. Si à caruncula, aut callo genito, ex præcedenti-
la. bus vlceris notis colligitur. Si à sanguine in grumum concre-

Ex san- to, præcessit sanguinis per eam partem excretio. Atque in huius-
guine. modi coniecturis maximus est æneæ fistulæ vsus, siue lapidis in-

Ænea terpositio, siue glutinosorum humorum, siue carunculæ, aut
fistula grumosi sanguinis obstructus meatus fuerit, ex eo quod traie-
usus. cto cathetere (sic enim ænea fistula Græcis appellatur) mingitur
 sæpè obstructis rei vestigia apparent. Si oborta inflammatio,
 aut tumor aliquis meatum urinæ angustiores reddat, aut om-
 ninò obstruat, vt in eo accidit, qui vulneratus in ea parte, quæ
 semen appellatur, (est autem spatium anum, & penem interce-
 dens, Græci perineon, dicunt) urinæ passus est suppressionem, vt
 refert Gal. 1. de loc. affect. cap. 1. notæ facillè patent. Reliquas cau-
 sas ex ægrotantis sermone discas.

Curatio Si ab inflammatione renum, vel viarum urinæ fiat, curatur.
suppres- Primò, victu tenui, & simili victui dicto cap. 41. de curatione
sa urina inflammationis hepatis.

ex in- Secundò, auertentibus per sanguinis missionem ex venis ti-
flamma biarum, aut pedum autore Hippocrate aph. 36. sexti libri, & 48.
tione. septimi. Confirmat id Galenus comment. 36. sexti libri aphor.

Reuul- quamuis in libello de curandi ratione per sanguinis missionem
sio. doceat, posse in morbis renum tam venas brachiorum, quàm ti-

Ara- biarum secari, licet Arabes, & plerique alij non contemnendi
humopi- medici tam in initio inflammationis renum, quàm vesicæ primò
nio. secant venas brachiorum, deinde tibiæ, si æger sit multo san-
 guine repletus: ne priùs sectis venis pedum trahatur ad infernas
 partes à toto, augeaturque inflammatio.

Tertiò , vacuantibus bilem , vt rhabarbaro , cassia fistulâ, *Purga-*
 manna , tamarindis , & similibus : vt ℞. medullæ cassiæ re- *tio.*
 cens extractæ 3. vj. infusionis 3. iij. rhabarbari in aqua endi-
 uix per noctem bene factæ , syrupi violarum 3. j. aquæ buglos-
 sæ q. s. misce , & fiat potus.

Quartò, parti affectæ sunt sæpè admouenda non repellen- *Topica,*
 tia stipica, ne claudantur meatus , sed temperatè frigida, vt sunt *medio-*
 lac caprinum, ouinum, oleum rosatum , & similia. *criter*

Vltimò , digerentibus , & resoluentibus, vt oleo camomillæ, *frigida.*
 de semine lini , & decocto radicis althææ, & similitum, de qui- *Resolu-*
 bus actum est cap. 41. *tio,*

Si sola intemperie fiat, curatur contrariis alterantibus. Si à *Subla-*
 vesicæ imbecillitate , corroborantibus , vt fotu vini rubri, & si- *tio alia-*
 milium. Si à lapide renum, aut vesicæ, per illorum abscissionem, *rum*
 de qua capite sequenti loquemur. Si à callo genito in viis vri- *causarū.*
 naris, curatur per recisionem calli, per medicamenta temperatè
 corrodentia imposita callo, seu carni additæ, candelâ cereâ , vel
 tenui ligno petroselini: hæc tamen à prudenti chirurgo sunt ex-
 perta, eligendâque ne vlcus fiat in viis vrinariis. Quidam Lusit-
 anus Romæ nostris temporibus multos curauit laborantes hac *Histo-*
 vrinæ difficultate; & inter alios Valentij curati sunt perfectè no- *ria Va-*
 bilis Gaspar Aguilar , & filius magnifici Ximen Peres de Per- *lentina.*
 tusa. Si fiat à grumis sanguinis , vel à pure implente vias vri- *Curatio*
 narias , curatur. Primò sanguinis missione , si fuerit æger san- *si fiat à*
 guineus, per sectionem basilicæ dextræ , deinde , si opus fuerit, *grumis,*
 purgatione. Postea mollientibus, & aperientibus vias vrinarias, *aut à*
 vt balneis, fotibus, vnguentis, & cataplasmatibus, quæ dicemus ca- *pure.*
 pite sequenti.

Vltimò verò, curatur dissoluentibus , & vacuantibus grumos
 sanguinis medicamentis necessariis, vt theriaca magna , aut mi-
 thridato à drachma semis , vsque ad 3. j. cum 3. ij. aquæ rubæ
 tinctorum, vel milij solis, vel ℞. coaguli hœdi 3. s. aquæ quin-
 que radicum 3. v. syrupi capillorum veneris 3. j. misce, & fiat
 potus. Si fiat à pituita crassâ obruente vias vrinarias, curatur.
 Primò , victu calido attenuante , & aperiente , de quo sequen-
 ti capite loquemur.

Secundò , apparantibus materiam frigidam breui tempore *Si à pi-*
 propter necessitatem , quamuis pituita egeat per se longa, & ma- *uita.*
 gna concoctione , vt ℞. rhodonellis 3. vj. decocti capillorum *Victus.*
 veneris, vel fœniculi 3. ix. misce hoc, vel simili medicamento, *Præpa-*
 supto primo die sumo mane, meridie, & duodecima hora noctis. *ratio*
brenis.

Tertiò , vacuantibus medicamentis phlegmagogis , vt 3. j. *Purga-*
tio.

hic

DE CVRAND. MORB.

- hierz simplicis,** vel drachma vna semis agarici trochiscati, vel saltem vacuetur hoc, aut simili clystere. ℞. foliorum vtriusque
- Clyster.** malux, & parietariæ an. m. j. furfuris, camomillæ, seminis lini, fœnugræci an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ℥. ix. olei sesamini, & amygdalarum dulcium an. ℥. j. ꝑ. butyri recentis, & benedictæ an. ℥. j. salis ℥. misce, & fiat clyster.
- Qua va-** Vacuatio, quæ fit per clysteres, est tutior in his, & similibus
cuatio sit affectionibus præter naturam: tutissima autem, quæ fit per sup-
tutissima positoria, quæ minorem extensionem in intestinis efficiunt, mi-
& sua- nusque comprimunt vias vrinarias.
nissima.
- Vrina** Quartò, prouocantibus vrinam, primùm mitioribus, vt com-
prouoca- pressione imi ventris, glande acri ex sale, aut felle, aut frictione
tio. peritonæi, & pudendi prope ignem, pediculo immisso in pri-
mam virilis membri partem qui motu titillet, & irriter ex-
pulticem facultatem sopitam, aut ægri iacentis supra dorsum
tibiæ, & pedes in altum sæpè, & validè moueantur: quæ si non
sufficiant, pecten illinatur oleo scorpionum, & lilij cum pin-
Vnguen- guedine cuniculi, vel imponantur parietaria frixa, vel apium,
tum. vel hoc vnguentum. ℞. olei scorpionum. ℥. ij. olei sesamini
& axungie cuniculi an. ℥. j. croci puluerizati ℥. j. ceræ. q. s.
misce, & fiat vnguentum. Valentior est focus imi ventris ex
Fokus. sponsia cum camomilla, radice althææ semine lini fœnugræco
Spuma origano, pulegio abrotano, mentastro & similitus: & infusus ex
saponis. decocto prædictorum, & similibum. Spuma saponis vmbilico
Galerus admota vrinam prouocat: sed valentiùs galerus vetus (quo vtun-
fullorū. tur fullones genibus imposito ad lavam oleo imbutam appa-
randam, cum aceto acri, calido, vmbilico admotus. Oleum
amygdalarum dulcium, vel sesaminum cum saccharo vrinam
prouocat, meatusque reddit molliores, & ideò prius his vten-
Qua dum, vel hoc ℞. decocti malux sylvestris ℥. iiij. butyri recentis,
priera & mellis an. ℥. j. misce, & fiat potus: vel ℞. pulueris seminis
esse de- dauci ℥. ꝑ. aquæ millij solis ℥. ij. syrupi de duabus radicibus
beant. ℥. j. misce & fiat potus: vel ℞. pulueris corticum ouorum, è
Potus quibus pulli egressi sunt ℥. j. sacchari candi ℥. ij. vini albi opti-
uarij. mi ℥. ij. misce, & fiat potus, vel valentius. ℞. duo capita allio-
A tem- rum vini albi optimi ℥. vj. decoquantur ad medietatem: cui per-
pore & colato adde theriacæ magnæ ℥. j. In hyeme & senectute tutior est
atate hic potus, vel ℞. corticum limacum parum adustarum ℥. ij. de-
coindi- cocti capillorū Veneris ℥. iiij. vini albi ℥. j. misce, & fiat potus.
catio.
- Lans po-** Hoc potu multi ex suppressione vrinæ morti propinqui sunt ad
tus. pristinā sanitatē restituti. Vinum alkekengi valenter, & certif-
Historia simè vrinam prouocat. Vide historiam ab Arnaldo de Villanoua
exinria. traditā, qua demonstrat Cardinalem quendam affectum: sup-
pressionem

pressionem urinae quatuor diebus hoc vino fuisse curatum à medico quodam indocto, & nullius ferè nominis, qui ex paupere diues factus est hac sola curatione. Fiat vinum alkekengi hoc modo, accipe poma rubra (quæ ab antiquis dicuntur solanum rubeum) quo tempore vinum fit, quum hæc poma rubescunt, vt cerasa, & sunt plena granis paruis similibus granis ficuum, habentque tum saporem bonum cum amaritudine quadam, conseruanturque per annum filo appensa, & vbi hoc caremus vino, accipe quinque, vel septem poma in puluerem reducta, & vino albo parum decoquantur, quod percolatum bibat æger. Urinam quoque prouocat calamus gallinae oleo tinctus, si meatui penis imponatur, vel candela cerea, vel algalia argentea à viro experto (quam catheterem appellant. Græci) vt si à vesica ad penis extremitatem sit aliquid impediens exitum urinae facilius in vesicam redeat, sed hoc non est faciendum nisi à viro docto, & in hoc multum exercitato, ne viæ urinariae exulcerentur, vt sæpè fit.

Admonitio.

Scholium.

Suppressionem urinae.] Vesica pars est instrumentaria, quæ urinam seruat, quoad molestiam sentiat ab eius multitudine, aut acrimonia, tunc enim eam excernit. Urina excretio propria actio est vesica, in qua tria symptomata solent accidere, cum non fit actio, cum malè fit, & cum deprauatè. Quando non fit actio, dicitur à Græcis hoc symptoma ischuria, à Latinis verò urina suppressio, de qua disputat auctor presenti capite. Ischuria sumitur improprie, aut proprie. Improprie pro urina retentione in qualibet parte sit affectus: hac ratione, obstructio in renibus à lapide arenulis, pure, aut humore crasso facta, urina transitum impediens, ischuria dicitur. Eam cognosces ex eo, quod in regione pubis nullus in vesica apparet tumor, quia vacua est: tum quia nullum est irritamentum ad urinam excernendam. De hac ischuria non agimus modò, sed de illa, qua proprie sumitur, in qua urina in vesica contenta non potest excerni. Causa illius ischuria ex Gal. lib. 3. de caus. symp. c. 2. dua sunt, imbecillitas vesica ab intemperie potissimum frigida ortu habet. Angustia meatus duæ sūt cause, præclusio, & obstructio. Præclusio etiã duas habet causas. Prima est tumor præter naturam, qui in cervice vesica ortus, ipsam cogit cõcidere. Secunda est siccitas. Obstructionis quinque sunt causa. Prima est grumus sanguinis. Secunda pus. Tertia lapis, à quâ renouari possunt arenula, & crassa excrementa, quæ communem habent materiam.

Ischuria duobus modis sumitur.

Ischuria propria causa.

DE CVRAND. MORB.

*materialiam: Quarta corpulentum tuberculum cernicis vesica, aut
meatus urinarij, ex ulcere non rectè curato ortum: quod nostris tē-
poribus ex morbo gallico, frequenter ac idere videmus. Quinta,
callus in eisdem partibus. Qua ratione hac distinguantur, & cu-
rentur, & quod præter dictas ischuria causa, soleant esse alia dua,
nempe sensus exiguus vesica, & immodica quantitas urina in præ-
seni capite habes ab auctore rectè tradita. Dysuria, id est, urina
difficultas ab eisdem causis fit, à quibus ischuria, sed remissioribus.*

*Sanguis- Secundo, auertentibus.] In sanguinis missione, qua in
nis mis- renibus inflammatis exercetur, hac ratione distinguens, habebis
sio in re- cōciliatos Galeni locos. Si inflammatio hoc est tumor præter natu-
ribus in- ram) sit recens, cum in parte paucus sanguis sit collectus, & mul-
flamma- tus fluat, sanguinem mitte ex basilica, maiorem enim ex ea facies
tis, reuulsionem. Si verò sit inflammatio inueterata, cum in parte
multus sit iam coaceruatus humor, & paucus fluat: tunc ex pede
sanguis missus iuuabit, multo humore ex parte affecta euacuato.*

*Curatio ischuria ab humore crasso facta. Quod quamuis ita sit, Galenus tamen in methodo semper, ex pede
secat venam.*

*Tertio, vacuantibus bilem.] Consuevit auctor semper in qua-
libet inflammatione purgare bilem: nescio certè qua ratione ductus.*

*Si fiat à pituita crassa.]. Si ischuria ab humore crasso originem
ducat: primò sanguinem mittes propter venarum affectum, hac e-
nim ratione minuemus humorem obstruentem, ne fluat ad renes.*

*An sit purgan- Deinde si occasio locum det preparabimus humorem, cum oximelle
dum hel- rhodomelle, & aliis. Postea eum purgabimus cum pilulis paratis ex
leboro. 3. benedicta cum aqua fœniculi. Dices, nonne purgabis helleboro
ea ratione, qua docet Galenus lib. 6. epyd. par. 1. sent. 6. Respon-
deo, non licet, quia ex eodem Galeno in hellebori assumptione debet*

*Balnea. fieri magna corporis preparatio, qualis non poterit exerceri in is-
Medica- churia ob urgentiam symptomatis: bene tamen in eo, quem dolo-
mentum rem grauem in renibus per multos dies perdurantem, pati vide-
cantha- mus. Post purgationem balnea, in sequenti capite descripta, utilia
ridibus erunt. Qua si non prosint, in balneo medicamentum ex cantharidi-
paratū. bus constitutum exhibebis. ℞. cantharidum preparatum ḡ. viij.
(quantitatem pro virtutis robore, aut imbecillitate augens, aut mi-
nuens) cum aqua pastinaca fiat potio.*

*Quarto, prouocantibus urinam.] Optima aliqua medicamen-
ta hoc in loco proponuntur, solum aduertere, nullum ex his impo-
nendum umbilico, sed pubi, aut perineo. Medicamentum etiam ex
alliorum capitibus, tanquam ingratum omittatur, sicut illud, quod
ex corticibus ouorum, tanquam inutile.*

De renum calculo, & vesicæ.

CAPVT XLVII.

Renum & vesicæ calculi duplex est causa, altera, vt matē *Causa:*
 ria: altera vt efficiens: Materia, est humor visciens, & pitui-
 tosus in ventriculo ob assiduas cruditates genitus. Efficiens tū *Materia*
 renū, tum vesicæ calor materiam adassans, & in lapidem in- *Efficiens*
 durans: Differunt inuicem hi lapides: nam renū minores sunt *Discri-*
 friabiliiores, asperiores, & rubri: vesicæ contra: & quantū ad co- *men.*
 lorem attinet, albi sunt, aut paulum ad cineris colorē declinant.
 Præterea illis prouectæ ætatis homines sæpius quàm pueri, quā *Puerorū*
 ætate prouecti frequentius corripuntur. Voraces enim sunt *natura*
 pueri, cibisque largius vtuntur, nulla temporis, ordinis & nulla
 sumendi habita ratione: quiescere à cibo ingesto non possunt,
 pepercūque mouentur: vnde crudum alimentum per venas &
 vniuersum corpus distribuitur. Mollia verò cū sint illorum
 corpuscula, & facile eedētia obturari renes non patiuntur. Cras-
 sissimæ igitur vrinæ in vesicæ amplitudinem nullo impediēte
 recipiuntur, ibique velut in vino fæx, & in aqua limus, crassum
 illarum sedimentum subsistit, & à caliditate, quæ multa, in pueris *Nota:*
 est, cogitur deficcatum, & lapidescit: quo fit, vt frequentius in *Sabulū.*
 vesicæ lapidem pueri incidant, quem cū patiuntur, vrinas ha- *Scalptio.*
 bent aquæ similes, in quibus subsident sabulosa quædam: ipsi in- *Suppres-*
 super assidue pudendum scalpunt, idque vel axum, vel intētum *sio:*
 præter rationem, vrina repente aut in totum supprimitur, aut *Procidē-*
 non nisi guttatim redditur. Sæpè etiam comitatur ani prociden- *tia ani.*
 tia: certius tamen nullum signum est, quàm digitus immissus *Nota*
 in rectum intestinum: sic enim tum lapis vesicam infestet, & *calculos-*
 quantus ille sit, detegitur. Renū calculis sic deprehenditur: re- *rum rea-*
 nē grauis dolor, & infixi aculei instar, nullo foris tumore appa- *num.*
 rente infestat. Spina ægrè inflecti potest, crus stupet: quod ē di-
 recto laboranti reni respondet. Vomitus præterea, & cibi fa-
 stidium adest. Vrina inchoante obturatione pauca, & aquosa
 mingitur, post in totum supprimitur. Aluus cum iam nihil ex-
 cernat, ad egerendum subinde mouetur. Calculo ē renibus
 emoto vrina subidentiam arenosam habet, & sanguis plerū-
 que excernitur, ob violentiam videlicet asperioris calculi ex-
 cussi. Porro cū dolores coli sæpè cum nephritide confundā-
 tur, non ab re fuerit signa quibus inuicem distinguantur, pro-
 ponere: sunt autem, quæ sequuntur. Renū dolor, breue oc-
 cupans spatium, vno loco innititur immobilis, aut saltē per vic-
 teres decliuis ad vesicā protenditur: colicus verò magna appre-
 hendit

Distin-
ctio dolo-
ris, colici
ex renū.
Differē-
locos.

DE CVRAND. MORB.

hendit sedem, hac illac reuoluitur, & ab vno latere incipiens in alterum fertur, dolore interim ventriculo per transitum infestato. Præterea colicus affectus à cibo intenditur, nephritis remittitur. Denique in cholico dolore vehementior est, ac magis frequēs & vomitus, & nausea: per vomitū verò excreta tū biliosa, tū pituitosa sunt, quibus assūpti cibi aliquid admixtū videtur. Sunt & alia signa, sed breuitati studentibus hæc sufficiant.

*Curatio
Vicius.*

*Qua no-
ceant.*

Lapis in renibus, & vesica gigni prohibetur. Primò fuga eorum, quæ augment pituitam in corpore, calculi scilicet materiam: qualia sunt, alimenta frigida, crassa, lenta, & difficilia concoctu, vt caseus, præsertim antiquus, salsus, panis azimus, animalium partes pingues, & nervosæ: vt sunt intestina, ventriculus, cor, & similes partes, aues aquaticæ, sus, bos, lepus, hircus, pisces, præsertim grandiores, legumina demptis ciceribus: herbarum frigida, cruda, & cibus largior, & à cibo somnus, Venus, labor, & balneum, & animi perturbationes, vt ira, tristitia, timor, & similes, quæ omni tempore nocent: sumendi ergo sunt cibi parcius, quam pro appetentia, bonique sint succi, & faciles concoctu, quales sunt pullus gallinaceus, gallina, motacilla, quæ dicitur à quibusdam cauda tremula, coturnix, perdix, hœdus, carnes arietinæ, præsertim in Hispania, & similes. Potus sit vinum album, aqua liquiritiæ bene dilutum, vel aqua cinnamomi, vel aqua sola optimi fluuij, aut fontis, vel pluuiialis percolata lapide Balearico, vel saltem sine arenosa, & terrestri residentia.

Reuulsio

*Clyster
leniens.*

Cassia.

*Catholi-
con.*

*Terebin-
thina.*

Pilule.

*Diureti-
ca, pitui-
tosam
materiā
expellen-
tia.*

Secundò, pituitam genitam nobis praua victus ratione vten- tibus (ne ad renes ruat) retrahentibus, & auertentibus, vt iniecto bis in hebdomada clystere hoc leniente, vel simili. ℞. decocti maluarum, radicis althææ, seminis lini, & fœnugræci ℥b. j. butyri recentis, & benedictæ an. ʒ. j. olei sesamini, & camomillæ an. ʒ. ij. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster, vel ʒ. j. medullæ cassiæ fistularis sumpta in hebdomada, vel ʒ. j. diacatholicon, semel in hebdomada sumpta, vel terebinthina bene lota aqua capilli veneris, vel maluæ & postea cum saccharo mixta, hæc enim ventriculum, intestina, renes, & vesicam purgat sine alicuius partis detrimento. Vel pilula vna elephangina, aut ex hiera simp. singulis diebus, vel alternis sumpta.

Tertiò, pituitosam materiam, si viis vrinariis hæsit, ne in renibus, aut vesica lapidescat, expellemus vreticis vt ʒ. vj. decocti maluæ syluestris cum ʒ. j. sacchari candi, vel ʒ. v. decocti cicerum & liquiritiæ, aut ʒ. vij. feri caprini, decoctionis liquiritiæ cum ʒ. j. β. sacchari candi, vel ʒ. viij. iuris galli gallinacei decrepiti decoctionis liquiritiæ, maluarum & capilli veneris, seminis lini, & fœnugræci.

Quar

Quartò, temperamus calorem harum partium, calculi causam effectricem emulsione quatuor seminum frigidorum maiorum, syrupis violato. nenupharino summo mane sumptis, oleo violato repido renibus, & vesicæ sæpè admoto, lacte caprino, vnguento santalato, & similibus: vitamus tamen astringentia, ne materia calculi retineatur, sæpè, præsertim æstate lumbos aëri aperimus pelles, plumas, cæteraque calorifica contingere lumbos prohibemus.

Alteratio.

Expēde.

Calculus concretus in renibus, si dolorem efficiat vbicunque fuerit, sed potissimum in vreteribus expellentibus curatur, frangentibus scilicet lapidem lubricantibus, aperientibus, dilatantibus, & urinam prouocantibus: prius tamen obseruare oportet necessariam esse corporis euacuationem ante vretica, & lapidem frangentia medicamenta, siue per sanguinis missionem si dolor fuerit magnus, æger carnosus, ne partes dolentes inflammentur, siue per vomitum si ventriculus abundauerit cruditatibus, siue per clysteres, si intestina, & meatus propinqui, siue per alia medicamenta purgantia, si fuerit his opus, ne trahantur excrementa à ventriculo, vel aliis partibus ad vias urinarias, & ibi augeatur dolor, vel vrina omninò supprimatur.

De curatione calculi.

renum

Sanguinis missio.

Vomitum Clyster.

Secundò, considerandum satis est tutiorem esse purgationem, quæ fit per clysterem lenientem, & parum acrem, ea quæ fit per potionem purgantem, seu pilulas, præsertim si sit paucus clyster, ne suo pondere extendens comprimat vias urinarias, doloremque in ipsis augeat: quia medicamentis purgantibus, præsertim valentibus moti humores per corpus à partibus dolentibus attraherentur. Nonnulli hanc euacuationem per suppositoria, seu glandes faciendam esse tutius censent, quos ego non omni ex parte laudo.

Clyster porioni anteponendus.

Cur portio non probeur.

Opinio non nullorum.

Dolor in primis sedandus.

Potus.

Tertiò, sciendum est, necessariam esse ante lapidis fractionem doloris curationem omni auxiliorum genere, potionibus videlicet, clysteribus exiguae quantitatis, fotibus, vnguentis, cataplasmatibus, & balneis, vt hoc, aut simili potu. ℞. decocti radicis althææ, foliorum maluæ, & seminis lini ʒ. j. sacchari ʒ. j. misce, & fiat potus: vel ℞. olei amygdalarum dulcium recentis ʒ. iiij. sacchari ʒ. j. misce: vel ℞. decocti camomillæ, & radicis althææ ʒ. vj. sacchari ʒ. ij. misce, & fiat potus. Hic vel similis clyster dolorem harum partium curat, intestina purgat, ac vtramque viam lenit: ℞. parietariæ, foliorum maluarum, bisinaluæ ana. manip. j. seminis lini, fœnugræci, & camomillæ ana. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ʒ. vj. olei sesamini, & de semine lini

Clyster

an.

DE CVRAND. MORB.

an. ʒ. ij. benedictæ, & butyri recentis an. ʒ. j. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster. Dolor quoque curatur hoc, aut simili fotu ex decocto, seminis lini, fœnugræci, camomillæ, meliloti, radicis althææ, maluæ, parietariæ & similium. Inde facit hoc, aut simile vnguentum sæpè renibus & vesicæ, & viis vrinariis admotum: ℞. olei scorpionum sesamini, & camomillæ an. ʒ. j. axungie cuniculi ʒ. ij. mucilaginis seminis lini, & fœnugræci: & pulueris croci an. ʒ. j. ceræ quod sat est, misce, & fiat vnguentum. Vel admoueatur hoc, aut simile cataplasma bis in die renibus, & vesicæ: ℞. foliorum parietariæ, senationum apij, & herbæ medicæ, hoc est alfalfa an. m. j. decoquantur omnia, deinde cum oleis scorpionum, de semine lini sufficientibus fiat cataplasma, addendo farinæ camomillæ, fœnugræci, & de semine lini, an. ʒ. ʒ. axungie cuniculi, vituli, & gallinæ an. ʒ. iij. croci puluerizati ʒ. ij. Optimum quoque est in hoc genere remediorum sæpè admouere renibus, aut vesicæ parietariam, vel herbam medicam diuisam in partes paruas, & parum cum vino albo decoctam, vel rorem marinum cum cineribus calidis, & paucò vino, quod à nostris fœminis dicitur Tabalet. Tortella ex ouis v. aut vj. cum aqua nasæ benè permixtis, & postea frixa cum cepæ albo diuiso in partes minimas, & cum pinguedine porci, & oleo scorpionum iuuat multum. Inseffus vsque ad vmbilicum in balneo per semihoram ex decocto radicis althææ, seminis lini, fœnugræci, parietariæ, camomillæ, ficuum v. radicum diureticarum, foliorum alliorum & caparum, capilli veneris, liquiritiæ, & similium. Et dum æger sedet in balneo, bibat potum aliquem lapidem frangentem, de quo postea dicemus: his peraetis si dolor augeatur, aut si vehemens, nec spem vllam frangendi lapidem det sine periculo vitæ, tunc narcotica sunt necessaria mixta medicamentis externis, vel clysteribus, vel potionibus, semper attentè considerando, quæ diximus in vfu narcoticorum capitibus superioribus, præsertim capite. 40. de curatione colici doloris: in hoc tamen dolore ʒ. j. theriacæ magnæ femè recentis sex vel octo mensium est tutior aliis narcoticis, quia simul sensum morbi eripit, vrinam prouocat, & lapidem frangit, vt ℞. theriacæ magnæ sex vel octo mensium vsque ad annum ʒ. j. aquæ capilli veneris ʒ. ij. syrupi de duabus radicibus ʒ. j. misce, & fiat potus. His sic adnotatis accedamus ad medicamenta, quæ lapidem frangunt, & vrinam prouocant, quorum quædam à qualitate manifesta id faciunt, alia tantum à substantia, seu proprietate, alia sunt, quæ à proprietate, & qualitate simul

manifesta. Quæ à manifesta qualitate agunt, amara, nonve- *Frangē-*
 hementis caloris. quia vehemens caliditas exiccando, & re- *tia lapi-*
 soluendo lapidem duriores faceret: incisio enim in his maior *dem a*
 solet esse caliditate: quæ tamen lapidem renum frangunt *qualita-*
 (præter pauca) possunt vesicæ lapidem frangere, quamuis ma- *te mani-*
 iori vi egeat lapis vesicæ ob magnitudinem, duritiem, & di- *gesta.*
 stantiam maiorem. Medicamenta, quæ rectè lapidem renum, *Discri-*
 aut vesicæ frangunt, multis facultatibus, ac naturis egent, quæ *men re-*
 rarò vel nunquam in simplicibus reperiuntur. Primò, urinam *num &*
 prouocant, ac humores secum ad vias urinarias trahunt. Se- *vesica.*
 cundò in renibus, aut vesica ipsa, vel facultates earum tem-
 pore debito detinentur, ut possint lapidem frangere. Tertiò,
 renes, & vesica ab ipsis corroborantur, ut postea lapidem fra-
 ctum expellere possint: hoc Galenus docet 10. de compositio-
 ne medicamentorum secundum locos. Simplicia quæ lapidem
 renum, & vesicæ frangunt, grauissimis & antiquis medicis, *Simpli-*
 & à me sæpè experta hæc sunt, vinum scilicet, præsertim *cia lapi-*
 album, radix graminis, semen maluæ sylvestris, ceterac, ca- *des frā-*
 pillus veneris, pentaphyllon, radices cannarum, blitis, *gentia.*
 crocus, cinnamomum, polium maius, cicera nigra, radices
 v. diuretici, asparagi scilicet, petroselini, fœniculi, brusci, &
 apij, raphanus, bdellium, cortex ciperi Ægyptij, cortex radicis
 capparis, armoniacum, ameos, saxifragia, vrtica, chamæpi-
 tys, millium solis, amygdalæ amaræ, nuclei cerasorum, gra-
 na hederæ, nuclei persicorum, siliqua fabarum, eryngium,
 cuius vim in hoc morbo vide apud Ætium. Aqua seu decoctum
 ex his, & similibus quantitate ℥. iiij. vsque ad ℥. vj. cum mel- *Lenitio*
 le in hyeme, & saccharo in æstate ventriculo vacuo est exhi- *præcedat*
 bendum: semper tamen præcedat lenitio, & mollificatio via-
 rum urinæ per oleum sesaminum recens, vel amygdalarum dul-
 cium cum saccharo cando, vel per decoctum maluæ sylue-
 stris cum butyro, & melle, vel per terebinthinam benè lo-
 tam.

Sunt etiam & multa alia valentiora medicamenta lapi- *Valen-*
 dem frangentia, ut lapis Iudaicus (de quo Dioscorides libr. 5. *tiora.*
 capite. 93.) quantitate ciceris, præparatus in lapide marmoreo, *Lapis Iu-*
 ad modum sieph, lapidem vesicæ frangit cum ℥. iiij. semis *daicus.*
 decocti diuretici, ut capilli veneris: aliqui tamen, ut Galenus
 nono, de facultatibus simplicium medicamentorum lapi-
 dem solum renum frangere existimant. Quidam huius lapi-
 dis præparati drachmam semis præbent cum paucò vino *Ci &*
 albo. *sec apio-*

Cinis scorpionum assatorum validè, & violenter calcu- *n. um.*
 lum

DE CVRAND. MORB.

lum vesicæ frangit pondere granorum quatuor hordei cum vino maluatico. Ego non auderem eo uti : oleum tamen scorpionum pectini admotum sæpè confert , & eius iniectio per penem.

*Lapis
Spongia.*

Lapis spongiæ renum tantùm calculos frangit, vt quibusdam medicis grauissimis placet. Dioscorides tamen scribit frangere etiam vesicæ lapidem. Cuius dosis est è drachma β . ad drachmam vnā cum pauco vino, vel decocto aliquo vretico.

*Lapis
lyncis.*

Lapis lyncis calculos renum , & vesicæ frangit. Dos is est drachma vna cum pauco vino albo , aut liquore aliquo vretico.

*Cinis le-
poris
combu-
sti.*

Cinis leporis combusti valenter frangit lapides renum & vesicæ. Dos is cochlearium vnum, vel drachma vna vsque ad drachmam vnā semis. Forma comburendi leporem tradita est à multis, & à Matthæo de Gradi capit. de lapide renum, & vesicæ, & ab omnibus fermè pharmacopolis cognita est: Plinius tamen lib. 28. scribit renes leporis exsiccatos lapides renum & vesicæ frangere.

*Cinis
corticū
ouorum
gallina-
ceorum.*

Cinis corticum ouorum adustorum , à quibus pulli sunt egressi, valenter frangit lapides renum, & vesicæ, à me sæpè est expertum hoc medicamentum. Dos is à drachma semis , vsque ad drachmam vnā cum vino albo, vel aliquo alio liquore vretico.

*Sanguis
hirci.*

Sanguis hirci præparatus valenter frangit lapidem renum & vesicæ, est expertus à multis, & à me facileque obtinet principatum in curando hoc morbo. Eius dos is est à \mathfrak{z} . β . vsque ad \mathfrak{z} . j.

*Cinis
motacil-
la.*

Cinis motacillæ, quam caudatremulam vocant, valenter frangit lapides renum , & vesicæ , & caro huius auiculæ tam elixā, quàm tosta habet eandem facultatem.

*Lapis ho-
minis,
vel por-
ci.*

Lapis hominis, vel porci lapides renum frangit , autore Galeno, sed aliorum sententia renalis lapis frangit renum lapides, & vesicæ calculus comminuit vesicæ calculum. A me non est expertum medicamentum, neque à meis præceptoribus.

*Puluis
cimicis.*

Puluis cimicis lapides quoque frangit. Dos is \mathfrak{z} . β . cum vino albo, vel aliquo alio liquore vretico. Non sum expertus : viuæ tamen per penem immissæ vrinam prouocant, quemadmodum pediculi.

*Ossa me-
spilorum.*

Puluis ossium mespilorum lapillos renum, & vesicæ frangit. Dos is à \mathfrak{z} . β . vsque ad \mathfrak{z} . j. Est à multis, & à me hic puluis sæpè expertus.

*Puluis
corticū
auella-
narum.*

Puluis corticum auellanarum frangit lapidem: Dos is \mathfrak{z} . j. decoctum etiam earum eadem vi pollet. Est expertum medica-
mentum.

Puluis

Puluis anseris combustus cum paucis vino albo frangit lapidem, ut aliquibus autoribus placet. *Puluis anseris.*

Puluis pullorum hirundinum combustorum frangit lapidem. Dosis drachma una. Carnes eadem facultate præditæ sunt. *Pullorum hirundinum.*

Lapides inuenti in capitibus gallorum, & columborum veterum frangunt lapidem cum paucis vino albo: Dosis à drachma semis usque ad drachmam unam autore Plinio libro 30. *Puluis lapidis gallorum gallinaceorum.*

Puluis vesicæ mustellæ frangit lapidem. Dosis drachmæ duæ. *Vesica mustellæ.*

Puluis vesicæ apri cum vrina exiccata (Plinio autore lib. 15.) frangit lapidem. Multi alij volunt solam vrinam apri hac eadem vi præditam esse. *Puluis vesicæ apri.*

Puluis cornu cerui assati frangit lapidem. Dosis 3. j. *Cornu cerui.*

Puluis foliorum mori valenter frangit lapidem. Dosis drachma una. *Folia mori.*

Pellicula interior ventriculorum pullorum gallinaceorum frangit lapidem, ut docet Plin. lib. 30. *Pellicula interior.*

Lapides inuenti in vesica fellis bouis frangunt lapidem. *Vesica fellis bouis.*

Puluis renum asinorum frangit lapidem, ut scribit Plinius lib. 18. *Renes asinorum.*

Cinis glandium frangit quoque lapidem, ut docet Plinius lib. 24. *Cinis glandium.*

Lumbrici terrestres frangunt lapidem, autore Plinio, lib. 30. *Lumbrici terrestres.*

Lapides reperti in hepate apri lapidem quoque frangunt, ut vult Plin. lib. 28. *Lapides hepatis apri.*

Cinis Erinacei combustus rumpit lapidem, præsertim si repariatur iuxta rubum, quia rubi fructus habet hanc vim, ut ego sum expertus. Dosis à drachma semis usque ad drachmam unam. *Cinis Erinacei.*

Stercus columbinum mistum cinnamomo, & theriacæ magnæ frangit lapidem: ut ʒ. pulueris stercoreis columbini, cinnamomi, & theriacæ magnæ. an. 3. β. aquæ capilli veneris ʒ. ij. syrupi de duabus radicibus ʒ. j. misce, & fiat potus. *Stercus columbinum.*

Puluis scarabei combusti, & apis fortiter comminuit calculum. Dosis ab ʒ. β. usque ad 3. semis. *Puluis scarabei.*

Cinis leporis, & præsertim capitis valenter frangit lapidem, & carnes eiusdem habent eandem vim, si comedantur. *Cinis leporis.*

Puluis cantharidum præparatarum, cicadarum, & noctilucarum valentissimè frangit lapides, & eo non est utendum, nisi cum columbinum. *Puluis cantharidum, cicadarum, & noctilucarum.*

DE CVRAND. MORB.

Forma cū alia non suffecerint. Præparandi forma scripta est capite
prapara- 44. de curatione hydropis : quam etiam hic decreui indicare.
ndi can- Accipe duas , aut tres cantharides demptis capitibus , & pedi-
tharides. bus tantum, vt Hippocrates, & Dioscorides docent, & non alis,
 vt Arabes volunt, benè pistas: quibus adde dragaganti, & gūmi
 Arabici in aqua maluarum dissoluti. an. ʒ. iij. postea in vmbra
 exiccentur, & eodem modo bis, vel ter infundantur omnia in
 decoctum maluarum, & tandem fiant trochisci. Quorum dosis
 est ab scrupulo vno cum paucō oleo sesamino, vel amygdala-
 rum dulcium, vel decocto maluarum.

Compo- Composita medicamenta, quæ lapides renū & vesicæ fran-
sita lapi gunt, parari possunt omnia necessaria, & vtilia huic morbo me-
desfran- liūs quā simplicia, vt superiūs diximus. Et quamuis sint mul-
gentia. ta à doctoribus tradita, in præsentia nobiliora, & magis exper-
Confe- ta trademus: vt ℥. cineris vitri, cineris scorpionum, cineris
Etio salu- cauli nabati, cineris leporis, spongiæ, sanguinis hirci præparati,
berrima. cineris corticum ouorum, à quibus pulli egressi sunt, lapidis Iu-
 daici, gummi, nucis, macis, acori. an. partes æquales, seminis pe-
 troselinæ, dauci, pulegij, gummi Arabici, seminis althææ, & pipe-
 ris. an. partem vnā, & semis, mellis. q. s. misce, & fiat con-
 fectio. Dosis, drachmæ tres cū aqua, vel aliquo decocto vretico,
 est medicamentum expertū, & saluberrimum. Hoc quoque me-
 dicamentum est optimum, & ab eruditissimis medicis probatū.

℥. lapidis Iudaici, gummi cerasi, lapidis spongiæ, corticis me-
 lonis, liquiritiæ, an. ʒ. iij. seminis dauci, vitri combusti, abro-
 tani. an. ʒ. medullæ granorum pini, & amygdalarum dulcium:
 an. ʒ. iij. mellis, q. s. misce, & fiat confectio. Dosis drachmæ tres.

Alterā *cōfectio.* Hoc etiam medicamentum est vtilissimum, & valenter frangit
 lapides renū, & vesicæ: ℥. sanguinis hirci præparati, lapidis

Tertiā. Iudaici, lapidis inuenti in vesica fellis vaccæ aut tauri: anisi
 asari, amygdalarum amararum, seminis cucumeris, bdellij, co-

Quartiā. sti. an. æquales partes, mellis quod sufficit, misce, & fiat con-
 fectio. Dosis drachmæ duæ cum decocto rubæ, vel asari,
 vel camomillæ. Hoc medicamentum Gal. 10. de compositio-
 ne medicamentorum secundū locos valenter frangit lapi-

Medici des & purgat renes, & vesicam, & dolores curat. ℥. cassiæ
cuiusdā lignæ ʒ. ij. seminis apij. ʒ. iij. myrrhæ ʒ. x. piperis ʒ. ij. oli-
cibus, bani ʒ. iij. lapidis de syria masculi, vel fœminæ ʒ. j. seminis
aut bo- pastinacæ, anisi an. ʒ. ij. spicæ nardi ʒ. ij. amygdalarum amara-
lus. rum, asari. an. ʒ. iij. storacis, ireos. an. ʒ. iij. seminis papaue-
 ris albi ʒ. ij. seminis cyperi. ʒ. ij. mellis quod sufficit, misce,
 & fiat confectio. Quidam medicus eruditus laudat non pa-
 rum ad lapides frangendos cibum, qui fit ex hepate, pulmone,

reni

renibus & testiculis cum priapo hirci, cum croco, cinnamomo, & melle, & postea imple intestina hirci hac mixtura. Dosis sunt duæ, aut tres bucellæ. Habet tantam vim hoc medicamentum ad lapides expellendos, ut non solum à renibus, & vesica, sed ab annulo comedentis fracti omnes excutiantur. Res est monstruosa, si vera est. Præter supradicta quatuor medicamenta composita, sunt multa alia à doctoribus laudata, & probata, inter quæ litrontipon à 3. j. usque ad 3. ij. theriaca magna, & mithrydatum, electuarium ducis, dialacca, & diacurcuma sunt magis in usu, & magis experta: quamuis multa alia scripta sint, & etiam componi possint ex simplicibus superius dictis, & similibus: semper tamen, ut superius admonuimus, præcedant hæc vretica, & quæ lapidem frangunt mollientia, & anodina externa, & interna: de quibus iam satis diximus. Sed præter illa utilis erit hic, aut similiter clyster semel, ut minimum in die, ℥. florum camomillæ, p. iij. meliloti, fœnugræci, seminis lini. an. p. ii. β. seminis fœniculi 3. β. olei libr. vj. vini libr. j. decoquantur omnia ad vini consumptionem, postea conferuetur oleum percolatum. Dosis cuiuslibet clysteris vnciæ sex. Sæpè in die, vel saltem ter vngatur pecten, femur, & tota regio vesicæ, & renes, si opus fuerit, hoc vnguento: ℥. axungia cap. 3. j. axungia anatis, gallinæ, & cuniculi an. 3. β. axungia ursi, medullæ crurum ursi, vel vituli, & theriacæ magnæ. an. 3. iij. emplastri filij Zachariæ 3. vi. olei scorpionum, lumbricorum, camomillæ, & anethi, an. 3. β. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum. Sæpè quoque admo-ueatur parti dolenti vesica porci, vel hirci, plena sequenti oleo. ℥. olei lb. j. florum camomillæ. p. j. β. vini optimi lb. β. decoquantur omnia donec vinum consumatur, cui percolato adde olei lumbricorum, de lilio, & sesamini. an. 3. iij. olei scorpionum 3. ij. misce, his impletur prima vesica. Ad implendas alias vesicas: ℥. florum camomillæ, meliloti, vtriusque stichados, suæ arteticæ an. p. j. foliorum vrticæ. m. ij. parietariæ m. iij. radicum althææ 3. ij. maluarum. m. ij. β. seminis lini, fœnugræci, & milij solis an. 3. j. seminis fœniculi, & carui. an. 3. iij. liquiritiæ 3. j. fiat decoctum in libris duodecim aquæ donec tertia pars consumatur. Inter ea, quæ maximè utilia, & necessaria sunt ante usum, & in usu vreticorum, sunt balnea usque ad umbilicum ex decocto rerum dictarum superius, quæ vias urinarias aperiunt, molliunt, & dolores sedant: hæc tamen temperatè, & non in frequentissimo usu conferunt, ne pars dolens, & ægra fiat nimis apta ad recipienda excrementa totius corporis, & humores, & iterum generentur lapides:

Observatio.

Vnguentum.

Vesica admo- uenda.

Balneo- rum v- sis mo- deratus.

lapides:

DE CVRAND. MORB.

lapides : semper tamen ventriculo , & intestinis vacuis oportet ingredi balneum. Præter hæc balnea, quæ fiunt ex rebus vreticis, & lenientibus , sunt alia multa naturalia balnea calida, sulphurea, vel salsa, quæ habent vim manifestam, & occultam provocandi urinam, & lapidem frangendi: quæ quotidie experimur apud Italos, Gallos, Hispanos, & præcipuè inter Vasconiam & montes Perinæos sunt optima balnea dicta de Cauteres. De his

Proble. ult. 24. Philosophus 24. particula problem. ultimo.

part. In exhibendis vreticis medicamentis debet esse prudens medicus & non audax : sed semper, si fieri potest, ab iis absteineat, præsertim valentibus , nisi urgente dolore , & præsentē calculo , & necessitate ; quia sæpè ex usu eorum immodico fiunt ulcera , vel ardor urinæ , profluuium, & tandem alij morbi perniciosi.

Cucurbitula. Cucurbitula renibus admota movet lapidem, & postea admota per vretes versus vesicam ducit ipsum ad eam.

Si urina supprimatur. Aliquando lapis inter vesicam, & penem infixus urinam supprimit, & instrumento argenteo dicto cathetere, seu algalia impellenda est ad vesicam, vel scapo petroselini, vel calamo gallinæ, vel candela cerea. Si verò appareat, ferreo instrumento extrahatur.

Incisio, & eius curatio. Aliquando necessaria est incisio in pene. Si fuerit prædurus, & magnus lapis in vesica , sola incisione extrahi potest: hæc tamen facienda est à viro perito, & docto: incisio verò pro magnitudine lapidis erit facienda , quæ cognoscentur immisso digito per anum : & postea curetur vlcus per consolidantia , & glutinosa, & per cibi, & potus abstinentiam. Si sanguis in vesicam descenderit, ibique coalescat, antequàm putrescat, theriaca magna , vel coagulo hœdi cum decocto liquiritiæ euacuabitur per urinam.

Scholium.

REnum & vesicæ calculi.] *Vrina frequenter supprimitur à renum calculo, aut vesica. Proinde breuiter, qua ratione huic malo occurrendum sit, explicabo. Prius autem scias velim me consultò omittere multa, quæ in calculi disputatione proponuntur (ea enim habeo diffusè scripta, in lib. de simpl. med. fac. quem imprimendum statim, domi seruo) solùmque supponere, materiam, causam efficientem, & generationem calculi, ut inde colligamus essentialiam medicamentorum, quæ ipsum comminere nata sunt. Calculi materia est humor crassus, siue sit pituita, aut melancholia. 3. de alim. fac. cap. 6. siue purulenta substantia epy. 6 par. 1. comment. 15.*

Causa

Causa, qua calculus efficit, est calor immodicus quantitate aut tempore, non autem frigiditas, ut male voluit Vallesius, lib. 6. epy. non considerans ex Galeno, ac proinde ex veritate, viuentis animalis non posse, tantam frigiditatem intendi, ut ex ea aliquid concrescat in duritiem. Generatur calculus, calore euaporante humidam partem crassi humoris, & reliquam concrecente, ita ut si ille concretus humor in renibus moram faciat ab altero augeatur, quoad lapidis magnitudinem ex arenula acquirat. Lapis in renibus generatus & detentus, dolorem grauem efficit 6. epy. par. 1. sent. 6. quia renes non sentiunt nisi per membranam. Vallesius eodem loco existimat, magnum lapidem, quando exciditur ex carne renis, acutum dolorem inducere. Id colligit ex eo, quod hunc dolorem, difficile distinguere possumus, à colico dolore. Quæ sententia facile refutabitur, ab eo qui considerat, carnem renis esse insensilem, ac proinde neque à magno lapide posse acutè dolere, quod exemplo inflammationis docet Galen. 6. aphor. com. 5. Adde in carne renis, non posse generari lapidem, quia deficit locus, nempe cavitās: & ita Gal. 6. epy. agens de lapidis generatione, semper eius meminit. Accidit quod si in carne renis lapis generaretur, non posset ad vreterem permeare. Probatio etiam infirma est, quia cum principium vreteris, sit iuxta colon, dolor à lapide in eo contento excitatus, bene poterit à nobis colicus iudicari, præcipuè acutissimus cum sit, vreteres enim multum sensiles ex natura sunt. Hunc renum dolorem nephritim appellamus. Quem vomitus primò pituita, & deinde bilis aruginosa comitatur. Ratio hæc est. Hic dolor ad se attrahit sanguinem, & spiritum magis, quibus destitutus ventriculus debilitatur, & cum sit pituita naturalis officina eam euomit: in venis autem quæ sunt iuxta renem, à caliditate bilis adurit & fit aruginosa quæ ad ventriculum languidum expulsa vomitu euacuatur. Franciscus Vallesius 7. epy. com. 59. dubitat, qua ratione lapide existente in vno rene, aquosa fiat urina, aut supprimatur: si verum est ex Galeni sententia, partes geminas affectas esse, ut una lasa, altera ageret. Respondet venas emulgentes, simul oriri ex vna causa, ac proinde, posita raro unum renem, lapidem congerere, quin alter, à crassis succis & arenis obstruatur: & idèò urinam supprimi, aut colatam per ambos eiusdem renes puriorem excerni. Hoc autem intelligendum est in affectibus dolorem generantibus, quia in indolentibus benè potest esse affectio in vno rene, altero non cessante ab actione. Quod confirmat in homine, quem totum renem corruptum habuisse, & per urinam excretum, se vidisse testatur, qui urinam altero rene solo reddebat. Quid si in vretere prodiit lapis, & supprimatur urina? id inquit fieri, quia ob dolorem perit nixus musculorum abdominis, qui ad reddeendam urinam necessarius maxime est. Hæc Vallesius. Quæ omnia falsa sunt, imprimis

Causa efficiens.

Vallesius errat.

Modus generationis

calculi.

Dolor grauis.

Vallesius errat.

Nephritis.

Vomitus in nephriti-

de.

Dubitatio à l'al-

lesio pro

Solutio

primis

DE CVRAND. MORB.

Refuta- primis cum responderet, emulgentes venas à caua oriri, ac proinde
tur Val- affecto uno rene, alterum affici, rem falsam supponit: nempe simul
lesius. debere affici duos renes, hoc enim est contra experientiam, quia in
 dies experimur lapidem in uno rene existente, alterum renem re-
 ctè operari, ea ratione qua abiectò uno oculo sapè, alter alius ser-
 uatur. Neque distinguit rectè, quia siue sit affectus dolorificus, siue
 indolens, affecta una parte, reliqua optimè aget. Praterè si duo
 sunt renes, & duo ureteres, quis sibi poterit persuadere, lapidem
 unum ureterem obstruentem suppressere urinam? Ratio ex nixu
 musculorum desumpta nil persuadet, quia muscoli abdominis non
 habent vesicam subiectam, qua intra ossa pubis latitat, & sic potest
 comprimi solum, quando repleta est, à musculis rectis, ea parte qua
 ossibus pubis adherent. Adde, urinam excerni à facultate natura-
 li, qua expultrix dicitur. Tum si propter dolorem cessat musculorū
 nixus: debuit etiam in colico dolore cessare, & eadem ratione u-
 rinam suppressere. Experimentum etiam illud quod adducit, cor-
 rupti renis & per urinam excreti tanquam impossibile omittendū
 est: si enim ureteres tensi seruantur à renibus, non corruptus per
 quam partem ingredi poterit ureterem laxatum? tum si ren corru-
 ptus urinam non attrahebat, qua ratione renis frustula deducebā-
 tur ad vesicam? omissio ergo hac in parte Vallesio, qui controuer-
 siam ponit ubi non est: dico naturam duos fabricasse renes, ut im-
 peditam unius actionem, alter suppleret (non ut voluit Vallesius, ne
 facile obstruerentur) & u. de sequi esse impossibile (rectè se habente
 collo vesica) à lapide in uno rene contento, posse urinam suppressi.
 Quod si urina suppressio contingat, necessariò in duobus renibus erit
 obstructio; aut si in uno tantum rene sit lapis (quod ex dolore colli-
 ges) excrementa crassa in vesicam delapsa obstruerēt eius collū, &
 impedirēt, urina transitum. Qua ratione distinguatur dolor ne-
 phriticus, à colico capite de dolore colico explicatum habes.

Medica- Calculus concretus in renibus.] Quando aliquis solitus est la-
menta pidem in renibus generare, eo tempore quo arcenulas emittit, neque
renes dolore cruciatur, potest habere usitata aliqua medicamenta renes
expur- expurgantia: qualia sunt mel cum vino albo, mel cum pulvere os-
gantia. sium messalorum, decoctum pastinacæ cum melle, aqua distillati-
 tia florum fabarum cum melle, & similia. Si lapis existat in ure-
 tere acutum excitans dolorem, dilatantibus viam indigemus, simul
 etiam possumus frangentia lapidē assumere. In dolore hoc nephri-
 tico auctor sanguinem mittit, si ager sit carnosus: quasi solum
 oporteat secare venam in plethoricis affectibus. Secabimus ergo ve-
 nam in magno dolore, non propter dolorem, quia hic cum deiciat
 vires, potius eam impedit: neque propter morbum, quia lapis sui
 ablationem indicat, qua sanguinis missione, excerni non potest,
 sed

sed propter morbum magnum, qui futurus timetur, nempe inflammationem.

Secundò considerandum.] Non rectè hoc in loco rem explicat Taxatur auctor, quia si multus humor continetur in venis, potius medicamentum auctor. to purgati per os assumpto euacuabitur, quàm clysteribus lenibus.

Tertiò sciendum est.] Dolor nephriticus aut urget, aut non. Curatio si urget, cum deiciat vires, ad se trahit curationem, & ideo sedandus doloris est. Quod còmodè prestabit hoc unguentum, exterius positum in ilibus urgentis supra locum dolentem. ℞. olei scorpionum, & camomilla an. ʒ. ij. unguenti aragon, & axungia gallina an. ʒ. Philonij maioris. ʒ. ij. cera parum, fiat unguentum. Hoc dilatat partem emollientibus, & stupescit narcotico medicamento. Possumus etiam uti aliquo ex dictis oleis, cum ʒ. ij. opij permixto. Per os assumere potest ager iheriacam magnam, quando fermentationem patitur, quo tempore stuporem inducet, quia opium adhuc seruat vim: aut ʒ. j. Philonij maioris (quod post duos annos totius est) cum aqua pastinaca, aut fœniculum, ut permeet. Quod si neque remediis dictis sedatur dolor, in balneo (quod statim describetur) bibat medicamentum narcoticum: si hoc non possit, assumat, quæ vim habent calculum còminuendi, oleum amygdalarum dulcium, cum melle, aut saccharo candi appellato, quod etiam habet lubricandi vim: pulvis etiam ossium mespiliorum, vulgò azeroles utilis est, sicut & hac potio. ℞. litontripon ʒ. j. ss. pul. elec. dæcis. ʒ. ss. cum ʒ. iiij. aqua pastinaca, fiat potus. Si dolor non urget, curatio à cause ablatione inchoabitur propellentes lapidem à renibus ad vesicam, medicamentis, quæ calore & humiditate laxando, ureteres dilatabunt. His exterius applicatis, & clysteribus prestabis, exterius multis poteris uti unguentis, illud, quod paulo supra descripsimus, ab eò auferentes Philonium, ac commodatum est. Sicut & hoc alterum. ℞. unguenti aggrippæ. ʒ. j. olei scorpionum. ʒ. ij. olei rutacei. ss. cera parum, fiat unguentum, cui adde axungia cuniculi. ʒ. ij. His inungatur ilij regio, & superponantur herba medica folia, à caliditate moderate madida, vulgò alfafa absister. Clysteres parare poteris ex ruta, anetho, fœniculo, malui, surfure, semine lini, & fœnugraci: decoctioni addens, benedicta confectioem cassiam, saccharum rubrum, oleum rutaceum, aut butyrum. Quod si his remediis dolor non remittitur, ad balneum uniuersale deueniendum erit, paratum ex aqua in qua lauer seu sion vulgò crexena, parietaria, althæa, malua, & semen lini bullierint: ita ut ex eisdem herbis meatus urinary fricentur, ut dilatentur. Quod si eger noluerit ingredi balneum, prædictas partes eadē aqua fovebit, spongia vel lana. Si his omnibus peractis lapis sæpe resistat, neque excernatur, in id suppr. sionem urina efficiat, paucos ab ea liberari vid. bis. Quod si descendat ad vesicam lapis, & ibi

Curatio
nephriti-
dis, cum
non ur-
get dolor
Exterius
applicā-
da.

Clysteres

Balneum.

Si lapis
in vesica
urinam
suppri-
mat.

DE CVRAND. MORB.

Si sit urina meatu. **ur**inam supprimat (quod ex pubis tumore intelliges) veteres solebant anea fistula, lapidem à meatu amouere. Sed quoniam nimium est dolorificum instrumentum hoc, præstabit id cerea candela, olco amygdalarum dulcium, (ob dolorem) inuncta efficere. Si verò per urina meatum excernatur lapis, eisdem medicamentis utere. Quæ si non prosint, & lapis in medio via quiescat, extrahendus erit sectione per meaturum facta, cauendo semper, ne fistulosa vulnerentur corpora, quia non poterit vlcus ad cicatricem venire.

Non datur medicamentum totum rota subfrangens lapide. **Medica-** His sic adnotatis accedamus ad medicamenta.] Nullum datur medicamentum à toto substantia lapidem frangens: quia lapis non est morbus tota substantia nobis contrarius, ac proinde pel-
lucum totum rota subfrangens lapide. lis leporis cremata, lepus decollatus, aut viuus in fictili vase crematus: leporis renes cremati, cinis ungula equi, pluma palumborum, testa eochlearum, stercus murium, cinis cancrorum, vermium terrestrium, & passeruli: calculus, quem quis prius reiecerit lorium capra montana, cicada arida, hepar asini, & similia à præsticis descripta somnia sunt. Erunt ergo solum ea medicamenta lapidem frangentia, quæ calida modicè sunt, & tenuium partium; hac enim penetrando per lapidis substantiam, eam diuidere possunt. Calculi vesicae difficulter aut nulla ratione possunt frangi, propter loci distantiam, ob quam in transitu exoluitur medicamentorum vis: ac proinde ad chirurgiam veniendum erit, aperientes vesica collum, & calculum extrahentes. Quam sectionem multi non possunt tempore, felici successu exercent.

De Ardore urinae. CAP. XLVIII.

Descriptio. **A**rdor urinae, quem medici & stranguriam, & stillicidium urinae nominant, tum fit cum ægri assidue ad meiendum irritantur, urinaque paulatim, & guttatim reditur. Prouenit propter urinae acrimoniam, quam ipsa acquisiuit vel ob caliditatem hepatis, aut rerum acrium usum, maiori tamen ex parte ob bilem commixtam, quam natura sæpè per eam partem expellit: à quacunque tamen causa proueniat, ea qualitate prædita est urina ut & ad meiendum continuo stimulet, & renes sæpè, atque vesicam exulceret. Nonnunquam etiam accidit hæc passio ex ulceratione vesicae, aut ex abcessu rupto, vel in renibus, vel in vesica. Puris enim acrimonia idem, quod de urina dictum est, præstare potest. Cæterum si ex acri urinae qualitate hoc contingat, urinae sunt biliosissimæ, & vniuersus corporis habitus, & reliquæ etiam notæ bilem testantur. Si vel ex vlcere, aut abcessu, ex propriis tum vlcere, tum abcessu notis hoc ipsum dignoscitur. Mouendi in hoc morbo tyrones

Causa.

Nota.

Vitanda esse medicamentis lapide.

in me

in medica arte sunt, ne conuiuentibus, quod aiunt oculis, causas huius mali inspiciant: decipiuntur enim passim credentes ex vesicæ calculo oriri, vnde medicinas comminuendis calculis accommodatas miseris ægrotantibus ministrant, quod in eorum perniciem vertitur: augetur enim per ea medicamenta, quæ calidâ facultate sunt prædita, vrinæ acrimonia: vnde vlcus aut in renibus, aut in vesica generari necessum est, ideoque iugi cruciatu torqueri, qui in tam impias carnificum manus inciderunt, quemadmodum cuidam meo tempore contigit, qui initio remedia necessaria fugiens, post empiricorum omnia remedia amplectens in vrinæ multitudinem lapsus est, & eos morbos, à quibus deinde periti medici leuare minimè potuerunt.

*Historia
obser-
uanda.*

Stranguria, si à calculo fiat, curatur iis, quæ diximus superiori capite. Si ab vlcere, abstergentibus, mundificantibus, & incarnantibus (vt ita dicam) vlcus: de quibus cap. 28. de curatione sputi sanguinei diximus: quanquam hîc miscenda sunt, quæ clemèter ad vias vrinarias alia medicamèta deferant. Si ab acrimonia, auferentibus causam. Primò, si bilis est vrinæ mixta, victu frigido, & humido, vt vsu lactucæ, portulacæ, cichoreæ, vtriusque maluæ, cremoris hordei, & similibus: quatuor tamen semina frigida maiora sola nocent prouocando vrinam. Prodest fugere acria, salsa, acetum, coitum, labores animi, & corporis. Secundò, sanguinis missione per sectionem venæ hepaticæ dextræ, euacuando sanguinem plenitudini & robori respondentem. Hæc refrigerat hepâr, bilem vacuat, & à viis vrinariis auertit.

Curatio.

*Si ab a-
crimo-
nia cu-
ratio.*

*Qua fu-
gienda.
Sectio*

Tertiò, purgantibus bilem prius sumpto syrupo rosarum ex infusione siccarum cū aqua portulacæ per tres, aut quatuor dies ad tollendam bilis acrimoniam, & caliditatem, medicamentis clementibus, vt cassia fistulari, manna, tamarindis, myrobalanis citrinis, & rhabarbaro, vt hoc aut simili potu ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ʒ. j. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuivæ ʒ. iiij. syrupi violarum ʒ. j. aquæ horraginis. q. s. misce, & fiat potus. Et quia morbus est diuturnus, hac confectio fiat vacuatio frequens. ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ʒ. j. medullæ tamarindorum, & diaprunis solutiuæ, & conferuæ rosarum recentis, an. ʒ. ss. mucilaginis seminis psyllij in aqua maluarum extractæ ʒ. iiij. pulueris diarhodon. Abbatis ʒ. ij. sacchari dissoluti in aqua rosarum ʒ. iiij. misce, & fiat confectio. Dosis qualibet hebdomada cochlearia duo. Hoc etiam, vel simili clystere purgatio frequens est utilis. ℞. foliorum maluarum, lactucæ, violarū, & portulacæ an. m. j. hordei excor-

*vena.
Præpa-
ratio.
Purga-
tio.
Potio.*

*Confe-
ctio ad
usum.*

*Dosis.
Clyster.*

ticati.

DE CVRAND. MORB.

ficati. p. j. seminis psyllij, & cydoniorum, an. 3. ij. fiat decoctū; de quo percolato accipe vncias decem, cui adde olei violarum vncias tres, cassiæ fistularis præparatæ 3. j. vitellos ouorū numero duos, misce, & fiat clyster. Ex solo lacte ouino, vel caprino clyster est optimus, & eius frequēs vsus vtilissimus huic morbo.

Alteratio.

Balnea.

Electua-

ria.

Cōserua

Aqua.

Vnguentū

Vsus vi-

tellorum

ouorum

lauda-

tur.

Puluis.

Syrupus

eximius.

Quartò, refrigerantibus hepar, renes, & totum corpus internis & acrimoniam vrinæ tollentibus, & externis auxiliis, vt balneo folius aquæ tepidæ, electuario diatrium santalorum, diarrhodonis Abbatis, cōseruis violarum, rosarum, nenupharis, & acetosæ: aquis, vel decocto portulacæ, endiuix, cichoræ, acetosæ, & similibus. Vnguento santalato hepatis, & renibus bis in die admoto, vel hoc, & simili vnguento. ℞. oleorum rosarum, nenupharis, & violarum aqua rosata lotorum an. 3. j. mucilaginis seminis psyllij, & cydoniorum aqua rosata extractæ an. 3. ij. santalorum omnium, & trochiscorum de cāphora an. 3. j. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum. Vsus longus vitellorum ouorum recentium cum syrupo violato tollit vrinæ acrimoniam, & stranguriam. Puluis hic curat quoque eam. ℞. seminis papaueris 3. j. seminis lactucæ, & portulacæ parum tostæ an. 3. ij. pulueris liquiritiæ, quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum an. 3. j. sacchari candi violati 3. iiij. misce, & fiat puluis, qui cum ouo recenti summo manè, vel cum iure ante cibum quantitate vnus cochlearij sumatur. Syrupus de mucilaginibus ex Matthæo de Gradi, curat hanc vrinæ acrimoniam, & prohibet vlcus fieri in viis vrinariis: estque medicamentum singulare, optimum, & expertum, cuius est hæc descriptio. ℞. seminis althææ, maluarum, cydoniorum. an. 3. j. dragaganti. 3. iiij. infundantur in aqua tepida decoctis maluarum, seminis papaueris albi, & granorum alkekengi an. quantum sufficit: postea fiant expressiones dictorum seminum, & dragaganti, de quorum mucilaginibus fiat syrupus, vt ℞. prædictorum mucilaginum 3. j. β. decoctum prædictæ 3. iiij. sacchari optimi 3. ij. misce ad vnā dosim, quæ per sex, vel octo dies exhibenda est: & si fuerit vehemens caliditas, adde parum mucilaginis seminis psyllij. Aliquando in maxima acrimonia, & caliditate vrinæ oportet syringe argenteo per penem lac ouinum sæpè iniicere, vel aquam plantaginis vel hordei decoctum cum mucilagine seminis psyllij, vel cydoniorum vel collyrio albo Rhasæ sine opio, & in maximo dolore cum opio.

Scholium.

Ardor urinae quem medici.] Stranguria, à Latinis *urinae* stillicidium dicitur, in quo *urina* parum, & frequenter reddimus, l. b. 5. aph. com. 53. Quod symptoma proprium est vesicae depravatae expellentis *urinam*. Neque enim loquimur de stranguria critica. Cuius meminit Hipp. epy. part. 1. sent. 41. in qua humores Causa acres per renes ex toto corpore expurgantur. Causa symptomatice stranguria, ex Galeni sent. lib. 3. de caus. symp. c. 2. duae sunt, *ria* duae. imbecillitas facultatis retentricis vesicae, & *urinae* acrimonia. Imbecillitas vesicae fit ab octo intemperiebus, quatuor nudis ex lib. 3. itatis v. aph. com. 16 & potissimum à frigida 7. aph. com. 48. aut à quacumque fluxione humoris 3. aphor. com. 16. Acrimonia *urinae* sa- varias habet causas. Prima est abcessus ruptus in renibus, aut aliis Variis partibus, & per *urinam* expurgatus. Ad hanc causam reducenda causa est bilis acris, qua permixta cum *urina* stranguriā efficere solet: de acrimonia intelligendus est Gal. 3. aph. com. supradicto, cū scribit intemperie primò calidā, secundo calidā & siccam, tertio humidam acrem reddere *urinā*. Quo loco, ubi Gal. habet humidā, lege siccam, quia Prima. humida intemperies impedit humoris acris generationem, quam ipsam generare possit. Secunda causa est pituitosum simulque salsum Secunda excrementum. Hoc autem salsum redditum est, non à putredine, sed ex permixtione salsa serosa humiditatis, hoc est *urina*, qua salsa est: pituita enim crassa & glutinosa cū sit, habensque permixtam salsam serosam substantiam detineatur in vesica, magis irritat, quàm faciat *urina* sola. Tertiam causam stranguria addit Gal. 6. de loc. aff. c. 4. ulcus in vesica, aut meatu pudendi. Vbi per meatum pudendi intellige vesicae principium, quod cervicem vesicae appellant. Potest tamen aliquis hoc in loco Gal. tanquam diminutum accusare, quia omittit lapidē, & arenulas, à quibus stranguria excitari solet. Cui satisfacimus ea ad acrimoniam reuocantes, quia reuera arenula, & lapis caliditatem, & ardorem habent, aut ad ulcus, quia haec in transitu per corpora sentientia (saltem lapis) sua asperitate molestiam inducunt. Quod si lapis in cervice vesicae contineatur, stranguria etiam causa est, quia obstruens, & si non omnino liberum *urinae* transitum impedit. Si acrimonia *urinae* Curatio qua stranguriā facit, à pure abcessus rupti ortum habeat, absterge- gemus ulcus renis, mulsa permixta cum decocto pastinacae, & maria ab aluarū: pastinacae, ut sit vehiculum, maluarū verò propter acrimoniam. crimo- Mundato ulcere (quod ex paucis pure, minori faetore *urinae* & paucis ni- sanguine excreto colliges) cicatricem inducemus cum decocto capivi ne facta glandium, aut malicorij, addito paucis melle, aut saccharo cando

Tertia

Excusa-
tur Ga-
lenus.

DE CVRAND. MORB.

ut penetret. Exteriùs ad conglutinandum illines, unguento comi-
tiffa cum pauco aceto, ut penetrare possit. Alia etiam unguenta ex
oleis myrtillorum, rosarum, & cydoniorum cum pulueribus myrtil-
lorum, corticis maligranati, & similium, qua adstringere nata sunt
construere poteris cum pauca ceras. In acrimonia vrina à pituita
salsa, aut bile, sanguinem mittes propter venarū affectū, tum etiā,
quia sanguinis missio, ex accidenti refrigerabit euacuato humore ca-
lido. Secundo preparabis humorem, si sit pituita, oxymelle, rhodo-
melle, & aliis cum decocto maluarum, & liquiritia propter acri-
moniam. Si sit bilis, non eget preparatione, quia tenuis est. Tertiò
purgabimus bilem, cassia simul cum electuario de succo rosarum, &
syrupo rosarum Alexand. ex 9. infusionibus: pituitam verò diaca-
tholicon, diaphanicon, & agarico cum predicto decocto. Aduerte
tamen, in ardore vrina ex pituita salsa maxima utilitatis esse, usū
therebintina abietina: si eam à ʒ. ij. usque ad ʒ. ʒ. cum syrupo
violaceo assumamus. Renes & iecur in stranguria unguento re-
frigerante illines, ceroto santalino, aut ceroto refrigerante Gal cum
pauco aceto. Hoc etiam. ℞. ceroti sandarini ʒ. ij. olei nenuphari-
ni ʒ. ij. aceti ʒ. ʒ. cera parum, fiat unguentum, Neque omittendū
erit balneum aqua tepida, quod excrementa renum refrigerat, &
dilatat vias, ut ipsa euacuari possint. Syrupus de mucilaginibus à
Matthæo de Gradi, compositus maximè ardorem extinguit: si ta-
men non sint in renibus crassa excrementa: Tunc enim permiscebi-
mus cum eo oximel, aut paucum oximel scillitici. Syrupus hoc mo-
do parari poterit: ℞. seminis althææ maluarum, & cydoniorum an.
ʒ. j. dragaganti ʒ. ij. infundantur in aqua decoctionis malua-
rum, seminis papaueris, & granorum Alkekengi, an. q. s. deinde
fient expressiones dictorum seminum, & dragaganti: de quorum
mucilaginibus, & decocto predicto q. s. cum saccharo albissimo con-
ficiat ut syrupus benè coctus. Huius assumet manè ʒ. ij. cum hoc
decocto: ℞. decoctionis maluarum, liquiritia, seminis papaueris &
granorum. Alkekengi ℞. j. Si stranguria à lapide aut arenulis
oriatur, curabitur ea ratione qua diximus c. superiori.

Cate-
ther con-
struendus

Aliquando in maxima acrimonia.] Si instrumento argenteo ab
auctore posito, liquorem immittas, non perueniet ad vesicam, sed
poteris construere catheter, quod habeat longitudinem quindecim
digitorum, ita ut in parte superiori sit latius.

De mictu sanguinis. CAP. XLIX,

Causa
Externa

Sanguinis mictus sæpè à causis exterioribus fit, nonnun-
quam etiam ab interioribus. Exteriores sunt casus, & ictus
maximè cum partibus, quæ iuxta vrinæ instrumenta sunt,
inferun

inferuntur: rumpitur enim ex hac occasione vena aliqua in illis locis vnde sanguinis mixtio contingit. Præterea rerum calidarum vsus, & immoderata corporis agitatio, & ea omnia, quæ sanguinem attenuare, & ad renes, & vesicam propellere possunt, hoc malum pariunt. Internæ sunt corporis plenitudo, hepatis imbecillitas, renum in attrahendo valida facultas, eorūdem, atque vesicæ exulceratio. Calculus porrò in renibus, aut abscessus aliquis, & naturæ indicium, quam Crisim appellant, causæ sũnt. Si à causis externis proueniat hoc malum, ægrotum, quod milles dictum est, interrogabimus. Si ab internis, in causarum cognitionem sic deueniemus: si corporis plenitudo causa fuerit per methodos superius traditas, maxime cap. de cephalalgia, signa patebunt. Si hepatis imbecillitas, vrina emittitur cruenta, carniū recens cæsarum lotioni non absimilis. Si renū in attrahendo robur, vrina pari ratione cruenta, sed aliquando albidior. Si exulceratio renum aut vesicæ, sanguinis puri commixtus, & modicus excernitur: ad hæc dolor sentitur circa locū, cui vlcus inest. Si calculus renum aut abscessus, signa ex propriis capitibus mutuari oportet. Si naturæ indicium, iuuari ab ea re laborantem cernimus.

Mictus sanguinis, qui à redundantia fit, vel criticus, nisi vires deiciat, non est suppressendus. Si fiat ab vlcere corrodeute, curetur prius vlcus: si ab immodico coitu, instauratione & glutinatione succurrendum est. Si à recenti solutione, victu frigido astringente, sanguinis missione, & astringentibus medicamentis externis, & internis curabitur: de quibus dictum est de sanguinis profluvio è naribus, & hinc quoque de iis agemus. Si ab imbecillitate retentrice facultatis renum, curabitur prius, victu frigido astringente, de quo capitibus de curatione profluvij sanguinis è naribus, & de curatione sputi sanguinei. Secundò, sanguinis missione, à quacunque fiat causa, dempto coitu, per sectionem venæ iecotariæ.

Terriò, concoquentibus bilem, vel pituitam, vel atram bilem, si alius humor fuerit sanguini mixtus, quem cognosces colore, & multis aliis argumentis.

Quartò, vacuantibus per medicamenta dicta cap. 1. & 21. de profluvio sanguinis è naribus.

Quintò, astringentibus, & glutinantibus internis, & externis, ut syrupo rosarum ex infusione siccarum, myrillorum, cydoniorum cum aqua, vel decocto plantaginis, portulacæ, & similibus, lacte ouino calybeato cum pauculo bolo armeno, confectura rosarum antiqua vel hac mixtura: ℞. melleæ, confervæ rosarum antiquæ, ana. ʒ. j. pulveris coralli rubri præparati,

DE CVRAND. MORB.

*Confe-
ctio.*

Karabæ, lapidis hæmaritis præparati, spodij, dragaganti, corti-
cum glandium, boli Armenici, quatuor seminum frigidorum
maiorum mundatorum an. 3. j. syrupi rosarum quod sufficit,
misce, & fiat confectio. Dosis cochlearium vnum cum aqua
portulacæ, vel plantaginis summo manè, & omni hora, præser-
tim vacuo ventriculo. Renibus & vesicæ admoueaturnguen-

*Unguen-
tum.*

tum santalatum, vel cerotum santalatum, & panni linei perfusi
hoc, vel simili liquore: ℞. succi plantaginis & portulacæ, an.
3. iiij. aceti rosati 3. j. misce. Aliquando necessaria sunt nar-
cotica simul & astringentia, vt sunt trochisci de spodio, de
terra sigillata, & de Karabe, quorum dosis est à 3. ss. vsque ad

Potus.

3. j. Et in maximo sanguinis mictû sequens potus est necessa-
rius: ℞. philonij Romani ʒ. ij. syrupi papaueris 3. j. ss. aquæ
portulacæ 3. j. misce, & fiat potus. Si sanguis in vesica coales-
cat, curatur per medicamenta dicta c. 28. de sputo sanguinis, qua-
lia sunt theriaca magna, coagulum hœdi, & similia.

Scholium.

Sanguinis mictus.] *Omnes causa mictus sanguinis reducendæ
sunt ad tres illas, quas capite de sanguinis è naribus proflunio
ex Galeni sententia proposuimus.*

De Diabete.

C A P. L.

*Descri-
ptio.*

Diabetes à quibusdam fluor vrinæ dicitur, ab aliis hydrops
matulæ, & diaplacon à nonnullis nominatur: differt non
parum ab vrinæ multitudine, nam in syncera diabete potus non
mutatur, vt in lyenteria cibus, expellitur. In non vera, quanti-
uis aliquando vrina potum superet, mutatur tamen, & non sunt

*Historia
inaudi-
ta.*

omnia signa veræ diabetis. Puella olim Mediolanensis per se-
xaginta dies singulos sexdecim matulas vrinæ mictu impleuit,
cùm biberet circiter tres ampullas, corpus tamen per sanata
puellæ parum conciderat, magno exempli miraculo medici il-
lius temporis credebant aërem in vrinam conuerti. Hæc igitur
spuria diabetes si non curatur, in synceram transit, quæ à Ga-
leno tantum bis visa est, & à me quater, ab Ægyptiis tamen sæpè,
siue propter cælum, siue propter aquam Nili. Est autore Gal. 6.
de locis affect. cap. 3. affectus renum proprius, in quo tantus
inest vrinæ fluor, vt totum corpus exhauriatur, quo quicquid bi-
bitur, quale sumptum est, tale per vrinam redditur, qua parte si-
milis est hæc affectio ventriculi, intestinorumque laxitati, il-
li proportionem respondens.

Prouc

Provenit ex imbecillitate retentricis facultatis renum, attra- *Causa*
 cticis verò magno robore: attrahunt enim ad se renes vehemen-
 ter aquosum id excrementum, quod in sanguinem est,
 quod cum retinere ipsi præ imbecillitate non possint, ad vesi-
 cam demittunt, quæ res cum continuo fiat, continuus quoque
 adest urinæ fluor, adeò ut poculenta omnia nulla sui qualitate
 mutata per urinam continuo excernantur. Comitatur sic affe- *Signa.*
 ctos sitis vehemens, & quæ satiari alicuius liquoris haustu non
 possit, unde etiam assidue bibere cupiunt, aut bibunt, nec ab-
 re: cum id quod fuerit iniectum continuo ad renes, & vesicam
 delabatur. Viscera præ nimia caliditate exuri videntur: tumor
 autem magnus lumbos, testes, ac coxas infestat. Quod si am-
 pliùs viscerum calor increuerit, superior venter corrugatur, &
 venæ, quæ in ipso sunt, attolluntur. Vniuersus habitus corporis
 gracilescit, & tabe quadam generali afficitur.

Multitudo urinæ, quæ propriè non est diabetes, si à potu lar- *Curatio*
 giori fiat, curatur abstinentia potus. Si à qualitate falsa, &
 acri, cibi & potus ut largo esu alliorum, cæparum, & porro-
 rum abstineat ab iis. Si à frigore externo, calidis internis, &
 externis, de quibus dictum est cap. 31. de imbecillitate, ut af-
 cites curabitur. Si à paralyti, per ea quæ diximus cap. 13. Si à
 musculo rupto, vel dilacerato, curatio est difficilis, & fermè im-
 possibilis, ut in quibusdam à partu laborioso vidimus. Si autem
 inuitis urina excidat, ut pueris, & aliis quâdoque dormientibus
 causæ auferentur per euacuationem, si sit humor calidus medi-
 camentis cholagogis, de quibus cap. 1. & aliis multis locis di-
 ctum est: deinde per refrigerantia dicta superiori cap. & in hoc
 in curanda diabete. Si sit humor frigidus pituitosus post illius
 concoctionem, & vacuationem per ea, quæ dicta sunt c. 1. & c. *Ex pi-*
 tiam c. 13. de paralyti, curabitur his pilulis. ℞, castorei, myr- *tuitoso*
 rhæ, mastichis, thuris, pyrethri, copularum, glandium, an. par- *humore*
 tes æquales, cum syrupo myrtillorum, fiant pilulæ septem pro *curatio.*
 drachma. Dosis drachma vna. Hi trochisci, autore Arnaldo de *Pilula.*
 Villanova, sūt optimi in hoc affectu, quibus curatus fuit iuue-
 nis affectus diabete, & urinæ profluuium in lecto: ℞. rosarum, spo- *Trochis-*
 dijana. 3. v. seminis portulacæ, liquiritiæ, boli armenici, sumac *ci meie-*
 an. 3. j. seminis lactucæ, coriandri, santalorum, beiberis an. 3. *tibus in*
 ss. dragaganti, gummi Arabici, balaustiarum an. 3. j. cum succo ma- *lecto.*
 lorum granatorum acidorum fiant trochisci. Dosis 3. j. in die
 cum syrupo rosarum, & aqua calyceata.

Diabetes, seu transitus urinæ non mutata curatur sex reme- *Curati*
 diorum generibus: Primò, victu refrigerante, & astringente, de- *vena*
 ptis cydoneis, quæ vretica sunt, & ex eorū esu serenissimus, *diabet*

DE CVRAND. MORB.

Victus. Rex Neapolitanus Alfonsus incidit in diabctem : vehementer enim nocent huic morbo calida vretica, & etiam animi, & corporis labores, & coitus. Potus sit aqua calybeata non frequens, neque magnus, quamuis caliditas immodica ipsum semper appetat, & eo egeat, quare si potus multæ frigidaæ aquæ euomatur, est utilis: refrigerat enim, humectat ventriculum, iecur, & renes, à quorū immodico calore attrahitur potus non mutatus.

Reuul-
sio & re
frigera-
tio. Secundò, auertentibus, & refrigerantibus simul, vt sanguinis missione per sectionem basilicæ in initio cū vires adsunt, & frequenti vsu clysteris huius, vel similis: ℞. foliorum lactucæ, violarum, maluarum, & portulacæ an. m. j. hordei præparati p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ℥b. j. cui adde olei rosarum, & papaueris an. ℥. ij. cassiæ fistularis præparatæ, & diacatholiconis ana. ℥. j. sacchari rubri ℥. j. s. misce, & fiat clyster.

Conco-
ctio. Tertiò, concoquentibus bilem, vt syrupo rosarum, violarum, myrtillorum, & papaueris, & aquis vel decocto portulacæ, lactucæ, bursæ pastoris, & similitum.

Purga-
tio. Quartò, vacuantibus bilem, vt cassia fistulari, tamarindis, manna, rhabarbaro, myrobalanis citrinis, & aliis, si opus fuerit, valentioribus: vt ℞. medullæ cassiæ fistularis, & tamarindorum an. ℥. s. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia ℥. j. diaprunis solutiui ℥. iiij. syrupi rosarum ℥. j. aquæ buglossæ, q. s. misce, & fiat potus.

Alter-
tio. Quintò, refrigerantibus hepar, renes & totum corpus internis, & externis, vt electuario diatrion santalorum, diarthodonis Abbatis, diamargaritonis frigidi, conscruis rosarum, violarum nenupharis, & acetosæ, & trochiscis de camphora, & aliis multis, vt hac mixtura: ℞. mucilaginis, seminis psyllij, aquæ rosarum extractæ ℥. j. conscrui rosarum ℥. ij. conscrui acetosæ, violarum, & nenupharis an. ℥. s. trochiscorum de camphora, pulueris diatrion santalorum, & diamargaritonis frigidi, an. ℥. ij. syrupi myrtillorum, quod satis est, misce, & fiat confectio.

Confe-
ctio. Dosis duo cochlearia quolibet die summo manè cum aqua, aut decocto refrigerante. Balneum aquæ tepidæ est in hoc genere optimum auxilium bis in hebdomada ventriculo vacuo. Multi etiam viri prudentes balneum aquæ actu frigidaæ ab vmbilico ad partes infernas laudant: ego tamen nisi in iuvene, & assuetu, & æstate non auderem eo vti. Hepati, & renibus admoucantur epithemata, & vnguenta refrigerantia: vt ℞. aquarum endiuia rosarum, & portulacæ an. ℥. iiij. aceti rosati ℥. j. sandalorum omnium, & trochiscorum de camphora an. ℥. j. misce, & fiat epithema ad hepar, & renes, quod post hoc, aut simile vnguentum

guentum sæpè admoueaturn æstate frigidum actu: ℥.olei rosa-
rum,& myrrillorum ana. 3. j. ℥. vnguenti populeonis 3. ℥. pul-
ueris mastichis, thuris, sanguinis draconis an. 3. j. ceræ, quòd
sufficit, misce, & fiat vnguentum.

Sextò, corroboratibus renes, vt lacte ouino, vel caprino epo-
to, & per clysteres sæpè iniecto cū succo renū arietis, & lamina
plumbi tenuissima, & perforata supra renes, & lumbos posita
curat, non solùm hoc vrinæ profluuiū, sed etiam gonorrhæam.

Corrobo-
rantia.
Vis la-
mina
plum-
bea.

Scholium.

Diabetes à quibusdam.] Diabetes variè nominatur, Diabetes
à celeri vrina transitu: hydrops ad matulam, cū vrina quan-
titatem. Sicut enim in hydrope naturalis cavitas aqua impletur,
ita in hoc affectu matula: unde malè Vallesius existimat hydro-
pem ad matulam dici ob sitim, cū propter hanc dyspnoeam appel-
letur. Diabetes est velox exitus per urinam eius, quod potatum
est, eodem à sua qualitate non mutato. Vbi per qualitatem, spe-
ciem intellige: quia aqua epota suam seruans integram naturam
excernitur, nec tantillum in colore, odore, aut consistentia mutata.
Diabetes est symptoma in actione renum laesa: deprauatè enim at-
trahunt, si immodicum eorum motum consideremus. Inde sequitur
imbecilla retentio & alteratio, tantam enim vrina quantitatem
non possunt continere renes, & ideò nec alterare, quia res, qua al-
teratur, quieta sit oportet. Morbus, ad quem sequitur hoc sympto-
ma, est intemperies calida renum, quæ vim habet attrahendi. Mo-
dus generationis is est. Renes multum appetentes, ex venis tra-
hunt secum, hæc ex iecore, hoc ex intestinis & ventriculo. Orificium
autem ventriculi inanitum, & suctionis sensum sentiens, sic im-
mouet, hoc est appetitum potus: quo assumpto, statim à venis, iecore &
& renibus rapitur, suæque mole irritat renum expultricem. Hic
affectus rarò contingit, ita vt bis tantum eum viderit Gal. & ferè
lethalis est, quia cū cognoscitur, iam agri in magnam imbecilli-
tatem deueniunt: quia in principio agrè cognoscitur, cū sensim
fiat, in augmento, quando iam cognoscitur, extenuatos videmus
egrotos, non enim possunt rectè nutriri, cū ob defectum vehiculi,
alimentum non rectè distribuatur.

Multitudo vrinæ.] Auctor & alij quandam diabete[m] non ve-
ram finxerunt, & quod peius est, curant multam urinam ex ali-
mentis & aliis causis generatam: quæ, cū non sequatur affectum
morbosum, non eget curatione. Neque paralysis musculi vesicae
multam efficit urinam, cū non excernatur una vice multa.

Error

practi-

corum.

Alimē-

ta in dia-

betes.

Diabetes, seu transitus vrinæ.] Alimenta non solùm frigi-

da

DE CVRAND. MORB.

da sed crassa sint ex Alexandro, ne facile urinam mutantur, aut à renum calore attrahantur. Concedantur ergo caro suilla, pedes arictini, poma, pyra, & similia.

Sanguinis mis- Secundo, avertentibus.] Sanguinem mittes, quando renum calida intemperies, ex calido humore orta erit.

si9. Quinto, refrigerantibus.] Balneum sit ex aqua, in qua malua, lactuca, oxalis, viola & alie herba frigida sint decocta. Quibus regionem renis fricabis, quam postea cerato refrigerante Gallexi inunges. Assumet ager per os ʒ. j. sacchari rosacei cum lb. j. aqua hordei.

De Lumbricis. CAP. LI.

Difference.
Rotundi.

Ab Ari-
stot. dis-
sentit
Ama-
tus Lu-
sitanus
centuria
1. cura-
tione 6.

Histo-
ria.
Ascarides.
Lati.

Causa.

Note.

Lumbricorum) ut autor est Galen. 3. aphor. comm. 26.) tres sunt differentiae, quidam enim rotundi, seu teretes sunt, alij lati, alij, quos Græci Ascarides appellant, rotundi seu teretes, in superioribus intestinis magis generantur magnitudine palmari, & aliquando maiori, & ad ventriculum ipsum nonnunquam ascendunt, ibique pessima excitant symptomata: in ipso tamen ventriculo vermes gigni non possunt, ut docent Aristoteles, & Hieronymus Gabucinus libro suo de Lumbricis: quamvis in auribus, dentibus, renibus, & matrice aliquando fiant: intestinis tamen magis, & plures generantur. Ego enim anno 1545. vidi puellam nobilem expulisse mille ferme vermes paucis diebus, & spatio quatuor horarum quadringentos, quorum aliqui etiam viui, & alij mortui, & vixit, viuitque nunc incolumis, Deo fauente. Sæpè etiam per os & nares eiciuntur. Ascarides tenues sunt lumbrici, qui in parte inferiori crassi intestini magis gignuntur, & plurimi manifestè apparent in iumentis malè cibum concoquentibus, quorum malam concoctionem foetor indicat excrementorum. Latus lumbricus rarò accidit, longissimus tamen est, & sæpè per tota extenditur intestina. Paulus verò Ægineta lib. 4. capit. 57. & Aëtius lib. 9. cap. 40. affirmant, lati lumbrici generationem per mutationem esse membranæ intrinsecus tenuia intestina ambientis in corpus quoddam viuum, quod continuos stomachi morsus infert. Generantur in humano corpore huiusmodi animalcula ex frigidis, & pituitosis humoribus putredini tamen accommodis, & vi caloris animatis, perinde ac externis cætera animalia videmus gigni, quæ non ex semine, sed ex putredine ortum habent. Signa, quibus singulas lumbricorum differentias cognoscas, ex Paulo, & Aëtio in hunc modum desumpsimus. Teretes lumbricos habentes morsu tum ventriculi, tum etiam

etiam intestīnorum corripuntur, & tussi item arida, & non magna: verū frequenter irritanti. Quidam etiam singultiunt, & dormientes tremunt, & præter rationem expergefiunt, quod nonnulli vociferantes faciunt, atque profilientes, sed rursū in soporem conuersi prosternuntur. Pulsū inordinatum habent, febrēsque citra ordinem errantes, refrigeratis extremis partibus, augentur tertia, interim quarta die, vel nocte, sine ratione accessionem habentes. Pueri verò, & grandiores natu linguam exerunt, atque oculis clausis silentium, & taciturnitatem amant, ideòque excitantibus irascuntur ob imbecillitatem vigilare nequeunt. Quibusdam, dum dormiunt linguæ accidit manducatio, & conformatio oris in modum lactentium, aut accipientium cibos: qui aliquando etiam dentibus strident, & conuiuent oculis, qui aliquando sanguine suffusi sunt, & habent faciem maximè iuxta malas rubicundam, quæ rursū mutato colore liuescit: breui verò hæc, & ex interuallis fiunt. Quibusdam in ventriculum ex intestinis ascendant nauscatum cibi, atque vellicationum causæ futuræ: vnde laborantes cibum auersantur, quòd si comedendum impuleris, nauscabundi, quod dentibus terunt, aut non deglutiunt, aut illic euomunt. Venter nonnunquam corruptos cibos excernit, & tympani modo intumescit: reliquum verò corpus tabe citra rationem consumitur, neque inedia, neque immodica vacuatione aliqua exinanitum. Multi quasi dilirantes absurda in somno loquuntur, alij decubitus huc illuc mutant, ex loco ad locum sese vicissim proiciunt. Qui ab ascaridibus infestantur, vehementem habent ani pruritus, subindeque ad egerendum irritantur, & post excretionem, vt plurimum melius habent. Quibus verò lati lumbrici fiunt, ij morsus in ventriculo vellicantes sentiunt, & ad cibos potentem, & qui corrigi non possit, appetitum habent: rapiunt enim, atque consumunt huiusmodi animalia quicquid alimenti oblatum fuerit: vnde denū cibos assumi expedit, alioqui erodentur intestina: & ideò quædam puella (vt diximus cap. 33.) ob vermem duodecim cubitorum incidit in famem caninam. Consequitur sic affectos corporis gracilitas, & imbecillitas cum tarditate: minimè verò fallax signum erit, si cum recrementis quædam cucurbitæ semini similia excernantur.

Histo-

ria.

Duplex est lumbricorum curatio, prima eorum generationem prohibet, secunda eos genitos enecat, & expellit de quorum omnium speciebus, & generationis locis multi multa scripserunt: inter quos edidit librum Hieronymus Gabucinus Fa-

Cura-

tio.

Præcau-

tio.

Vidus.

gigni

DE CVRAND. MORB.

gigni prohibent, à qua cruditatibus putrescentibus fiunt vermes. Necessaria est tunc alimentorum pituitam generantium priuatio, nocetque immodicus cibus, & deprauata victus ratio, vt si cibus crassior præcedat tenuem, si à cibo animi & corporis labores absint, vt coitus, præsertim si sit immodicus, & si manus, & pedes à cibo lauentur aqua calida. Frequens quoque vacuatio per picram simp. non solum enecat vermes, sed ipsos fieri prohibet, vacuando materiam pituitosam, & crudam.

Vacuatio.

Lumbrici iam geniti curantur primò, victu tenui calido & sicco, acri & amaro. Aliquando eorum morsus, si fame sæuiant, rebus dulcibus est placandus.

Vera curatio.

Secundò, medicamentis enecantibus à tota substantia, seu proprietate, vel à qualitate manifesta calida in tertio gradu, &

Victus.

amara, quæ sua vi natura eos enecat. Et horum quædam sunt

Enecantia vermes.

simplicia, de quibus Hieronymus Gabucinus c. 22. sui operis, & quædam composita, de quibus idem autor cap. 25. loquitur: in præsentia aliqua meliora, & probata scribam. Quæ ventri ad-

Quatuoriora.

mouentur, sunt tutiora, & infantibus, & pueris magis admo- uenda. Sed interna per os aliquando exhibentur, præsertim cum in superioribus intestinis reperiuntur: aliquando per clysteres, si locus vermium sint intestina inferiora.

Calida simplicia.

Calida medicamenta simplicia, quæ vermes enecant, sunt mentastruum fluuiale, cordumeni, semen porri, nigella, nu-

Seminis Alexandrini excellentia.

clei, & folia persicorum, cortex arboris celsi, & succus eius, radix filicis, myrrha, aqua rutæ, semen apij cum lacte aut syrupo acetoso, nasturtium, semen crucæ, semen Alexandrinum obtinet inter omnia principatum, quæ vermes enecant. Dosis eius cum aceto infusi 3. j. Absinthium vtrumque, abrotanum, allium præcipuè cum aceto, amygdalæ amaræ, amonium, aristologia, præsertim longa, calamentum, radix camaleontis, eupatorium, gith, succus lapathij, breui tempore, centaurea, costus, enula, lupini, puluis martubij statim, origani succus, polium, scabiosa valenter, semen vrticæ, hyssopus, zedoaria, granum milij indum. Succus chelidonix, raphani, succus cardamomi, puluis dictami, santonicum valenter, gentiana, semen brasicæ valenter, omnis matricaria, herba, quæ à nostris Valentinis dicitur cuquera, seu lumbrigera, quæ in littoribus inuenitur, & sub aqua maris iuxta saxa nascitur, vt in oppido de Xabea re-

Lans herba

gni Valentini, & aliis multis locis: hæc enim vermes hominis non solum interficit, sed terrestres, si imposita ipsis fuerit, vt

contra

à pharmacopola fide digno accepi, & nos sæpè experti sumus

vermes,

hoc. Dosis in infantibus est scrupulus semis vsque ad scrupu-

qua

lum vnum cum melle & aqua portulacæ, seu graminis. Errant

nostræ

nostræ fœminæ Valentinae, quæ opinantur huius herbæ vsum *moschu* vermes efficere, cum sit falsum, & rationi contrarium; vulgò *marinu*. dicitur à quibusdam corallina, & à Dioscoride lib. 4. c. 84. mari- à Dio-
pus moschus. vide quid de ea sentiat Anton. Musa lib. de exa- *scoride*
mine simplicium. *dicitur.*

Frigida medicamenta, quæ vermes interficiunt, sunt, granum *Error*
coriandri, si sæpè comedatur, sumac, acacia, hypoquistis, portu- *fœmina*
lacæ semen, & aqua, & succus, malum granatum acidum, cor- *rum.*
tex mali granati, flos, & radix ipsius, plantago minor, endiuia, *Frigida*
cichorea, lactuca, acetosa, rubus, lac asinæ, succus citrangulò- *simpli-*
rum, acerositas citri, & omnia acida, quæ pituitosam materiam *cia.*
materiam incidunt.

Composita medicamenta, quæ vermes interficiunt, multa *Compo-*
sunt, vt theriaca magna, myrridatum, syrupus de absinthio, sy- *sita.*
rupus de menta, syrupus de prasio, syrupus de calamento. Et hic
syrupus valenter ipsos enecat: ℞. succi mentastri, succi radicis
enulæ, succi absinthij, succi rutæ, ana. ℥. iiij. succi lactucæ asi-
næ, succi cichoreæ, succi graminis ana. ℥. vj. sumac, cornu cerui
vsti, seminis portulacæ, & corticis granatorum an. ℥. iiij. fiat de- *Syrupus.*
coctum ad medietatem de quo percolato, & sufficiente quanti-
tate mellis, vel sacchari in æstate, & ægro bilioso fiat syrupus,
cuius dosis ab ℥. j. vsque ad ℥. ij. Hoc medicamentum potenter *Confe-*
vermes interficit, & est vtile omnibus: ℞. theriacæ de citro ℥. j. *ctio.*
rasuræ cornu cerui adusti, seminis Alexandrini ana. ℥. ij. ꝑ. se-
minis portulacæ, corticis mali granati, ana. ℥. ij. nigellæ, myr-
rhæ, an. ℥. j. theriacæ magnæ ℥. j. ꝑ. rasuræ eboris, corticis mori-
celsi, an. ℥. iiij. syrupi de absinthio q. s. misce, & fiat confectio.
Dosis est cochlearium vnum cum aqua portulacæ, vel grami-
nis Hiera sump. à Gal. drachinis tribus vsque ad vnciam vnam *Hiera.*
vermes enecat, & expellit. Agaricus trochiscatus habet eandem *Agari-*
vim, & rhabarbarum quoque vt ego expertus sum. Et si prius *cus.*
bibat lac, vel per clysterem mittatur, citius peribunt vermes. Si *Rhabar-*
infans habuerit vermes, & noluerit bibere potum ex hiera *barum.*
simplici, vel ex aliis medicamentis vermes enecantibus, ventri *Topica.*
& vmbilico admoventur fel arietis, vel bouis, cum pauco pul-
uere aloës, lupinorum, centaureæ, coloquintidæ & similium.
Hoc cataplasma ventri sæpè admotum vermes interficit: ℞. Cata-
centaureæ vtriusque absinthij, polipodij quercini an. ℥. ij. cen- *plasma.*
tonicæ, ℥. ꝑ. decoquantur omnia cum aceto, & postea cum fel-
le arietis, vel bouis fiat cataplasma. Hoc vnguentum valenter
eos interficit: ℞. absinthij, costi, amati, calamenti, origani, pule- *Vnguen-*
gij, persicariæ, foliorum persici, an. m. j. decoquantur omnia *tum.*
in aceto, & post piansantur, & percolentur ad modum carnis
cydonio

DE CVRAND. MORB.

cydoniorum, cui adde aloës, agarici, an. vnciam vnam, coloquin-
tidæ vnciam semis, olei amygdalarum amararum, & pellis bu-
buli, quod sufficit, misce, & fiat ad formam vnguenti.

Scholium.

Lumbricorum ut autor est.] Non est quod in hoc loco immo-
remur, inquirentes, an elminthes vox significet omnes lum-
bricos: an verò duo tantum eorum genera. Neque an lumbrici in
omnibus possint generari partibus. Sufficit enim ei qui rectè cura-
re volat, scire ex Gal. lumbricorum esse tria genera. Tum lumbrici
posse generari in ventriculo, renibus, vesica, utero & aliis par-
tibus. Quod quamvis ita sit, cum in intestinis frequentissime, & in
aliis partibus raro generentur, proinde Galen. lumbricos in inte-
stinis generari in lib. de locis affectis scripsit. Practici in radice
errant. dentium, vermem generari existimant, decepti ex nervo ibi im-
plantato. Lumbricorum ex 3. aph. comm. 26. tria sunt genera: Pri-
mus continet eos lumbricos quos teretes, aut rotundos ex figura
lumbricorum nominamus: qui in tenuibus generati intestinis, aliquando ad ven-
triculum ascendunt, ubi humores agitantur varia pariunt sympto-
mata. Hos per nares & os aliquando excerni videmus, quos melius
esset infernè egredi ex 2. prog. sent. 17. quia gula non est fabricata
propter expulsionem. Secundum genus est lumbricorum elatorum. Hi
in duplici sunt differentia, quidam adeò magni sunt, ut eandem
intestinarum figuram habeant, & appellantur tenia, hoc est fascia.
Vidi ego à Ludouico Collado præceptore accersitus fasciam adeò
magnam ut ferè vlnæ longitudinem attingeret, & adeò caua, ut
totam manum includeret. Alij appellatur cucurbitini lumbrici, ob
figuram, quam habent semini cucurbitula similem. Generantur
lumbrici lati, ut practici scribunt sequuti Paulum ex interna mem-
brana intestinarum animata, & mutata in vermem. Cucurbitini
predicto verò, ex eadē membrana in latas, sed minores partes animata. Quorum
sententia falsa est, quia si interna intestinarum tunica animari de-
bet, ex putredine id fiet. Qua autem ratione poterit tam magnū vl-
cus viuente animali in intestinis excitari, & quod magis est sine fe-
bre. Hi lati lumbrici cum raro generentur, proinde Gal. 3. l. aph. com.
26. eorum non meminit. Tertij lumbrici ascarides appellantur, in inte-
stino recto generari soliti. Qui similes sunt vermibus in stercore iu-
uentorum & casco ortis, vehemetissimos inducentes pruritus. Hi om-
nes lumbrici tribus differentiis inclusi, cōueniunt in materia, & in
causa efficiente. Materiā habent pituitosum humorem putrefactū,
cuius efflatu digna quantitas (generatur enim in vetriculo) in in-
testi-

testinis coaceruari solet. *Causa efficiens calor est præter naturam* *Causa*
excitatus in pituita putrescente, ac proinde Gal. lib. 3. de loc. af- *efficiens.*
fect. com 26. à magno calore eos fieri scribit. Si dicis, non videri, *Obiectio*
ratione consonum, calorem præter naturam (cuius proprium est
omnia corrumpere) rei viuæ esse causam. Respondeo, illum
calorem respectu nostri, esse præter naturam, at respectu materia
prædictæ esse naturalem, & in ea certo modo permiscere elemen-
ta, & idcirco posse rem viuam efficere.

Secundò medicamentis enecantibus.] *Lumbricus pars est in Quo-*
corpore addita toto genere præter naturam, ac proinde auferenda. do aufe-
Auferitur à duobus generibus medicamentorum. Primum toto runtur
temperamento operatur, cum enim lumbrici animalia sint, ha- *lumbrici*
bent sua venena, corallum, cornu ceruinum, lumbricos terre-
stres & similia, solo experimento cognita. Secundum genus me-
dicamentorum, qualitate manifesta lumbricos interficit amari-
tudine videlicet, 14. method. ca. ultimo, vel quia amarum non est
esculentum, ac idcirco assumpto ex defectu nutrimenti moriuntur
vermes: vel quia amara eis infesta sunt. Aliqui ab acris etiam,
lumbricos interfici sentiunt. Quorum sententia nobis non placet: *Acria*
quia si loquantur de acris non esculentis, squamina aris, & non in-
aliis decipiuntur, cum hæc per os non assumantur: fide esculen- *terficiunt*
tis, alimenta sunt, poterunt ergo vermes nutrire. Sentio ergo acria *lumbrici-*
medicamenta non interficere lumbricos, sed mediis ipsis expelli, *cos.*
cum acria irritent. Lumbrici teretes & lati medicamentis per os
assumptis oppugnantur, at Ascarides per clysterem infusis, de-
cocto hordei cum lupinis, & aliis amaris (dummodò non adstrin-
gant) addita hiera picra.

De hæmorrhoidibus. CAP. LII.

HÆmorrhoides, vt ex Ætio lib. 14. cap. 5. aliisque gra- *Descri-*
 uissimis autoribus colligere possumus, venarum in sede *ptio.*
 sunt explicationes, dilationesque à crebro sanguinis defluxu
 sic appellatae, qui nos à multis mortis lethibus liberat, autore
 Hippocrate libr. 6. Aphor. quamuis Gal. lib. 6. de symptomata-
 rum causis, capit. 2. velit omnem sanguinis fluxum præter na-
 turam toto genere esse, excepto eo, qui mulieribus ab utero
 defluit: hæmorrhoidum tamen fluxus, si ordinem seruet, & non
 sit immodicus, melancholicum morbum, affectionesque renū-
 curat, & ipsæ longo tempore suppressæ hydropem, tabem fa-
 ciant, autore Hippocrate aph. 12. lib. 6. Quare idem pater, &
 magister noster Hippocrates lib. 4. Aphor. 26. sanguine supra
 emissum, malum esse, & infra bonum vult: & Galienus comment.

confir

DE CVRAND. MORB.

confirmans sententiam, dicit: si ab hæmorrhoidibus, & mensibus fluat. Quidam putant aliquos ex genere Hebræorum hoc sanguinis fluore esse singulis mensibus affectos diuina ultione, alij credunt ob perpetuum timorem ipsos sanguine atro abundare, & ideo hoc sanguinis defluxu indigere. Harum quædam sunt cæcæ, quædam apertæ: cæcæ à Græcis condylomata dicuntur. Manardus tamen lib. 7. epist. dicit, condylomata esse tubercula in ambitu matricis sanguinem fundentia à similitudine extremorum in pugno clauso in quatuor digitis nodorum. Nihil ex his sanguinis euacuatur, aut parum: perpetuò tamē intumescunt, & illarum variæ sunt differentię & species, si Arabibus barbaris, & experientiæ credimus, verrucalles videlicet, vneæ, morales, & vesicales propter variam earum figuram, & naturam sanguinis. Apertæ verò sunt, à quibus certis temporibus defluit sanguis, aliquando seruat, ut diximus, ordine sæpè non seruat, nec debita quantitate. Et omnes, præsertim cæcæ, reperiuntur cum dolore, & aliquando sine ipso. Proueniunt utraque ex copia, & malitia sanguinis melancholici, cuius causæ externæ, & internæ solēt esse variæ, ut ex c. 9. huius libri cognoscere possumus. Signa quibus hoc malū deprehenditur, sūt satis nota: cæcus tamē sæpè comitatur dolor ani, cū stercus excernitur.

Curatio Hic fluxus immodicus curatur quatuor auxiliorum generibus. Primò, victu frigido astringente, & incrassante sanguinē, sensim tamen, & cautè: nam si fuerit antiquus, non omninò est astringendus, cum ex doctrina Hippocratis Aph. 12. lib. 6. si una earum non fuerit relicta, periculum est, ne fiat hydrops, vel tabes: neque enim Aëtius 14. sermone, c. 5. est audiendus, qui contra Hippocratē, rationē, & experientiam docet omnes has venas esse claudendas, post antiquum sanguinis profluiū, si ægri vtantur debita victus ratione. Sit ergo victus similis victui illi, qui præscribitur in profluuio sanguinis è naribus, & ipso sanguinis, de quo c. 21. & 28. dictum est: quamuis hîc sit alius lenienda vis passis sine granis, prunis damascenis, iure mercurialis, & blitis, ne stercus sua duritie noceat.

Reuulsio Secundò, auertentibus, ut sceta vena iecoria dextra vacatione larga, & quæ respondeat plenitudini, & naturæ ægri, & cucurbitulis hepatis, & partibus superioribus affixis: & vinculis, & frictionibus earundem & foribus, post sanguinis tamen missionem, vel sine ipsa, si ob virium defectum vena rumpenda non sit.

Obturbatio. Tertio, contrahentibus, & glutinantibus ora illarum venarum, & refrigerantibus, & incrassantibus sanguinem sumptis, Sumenda & admotis, ut syrupo rosarum, malorum granatorum, myrtillorum

tillorum. cydoniorum aquis, vel decocto portulacæ, plantagi-
nis, acetosæ, solani, & similium. Conserua rosarum antiqua, *Confectio*
conserua cydoneorum, bolo Armeno, terra sigillata. Karabe,
hæmatite lapide, sanguine draconis, spodio, & similibus. Hæc
mixtura est utilis, & necessaria huic profluvio. ℥. micletæ,
conseruæ rosarum antiquæ an. ʒ. j. β. corallij rubri præparati,
lapidis hæmatitis, Karabæ, gummi tragaganti an. ʒ. ij. sangui-
nis draconis, thuris, mastichis an. ʒ. j. syrupi cydoniorum q. s.
misce, & fiat confectio. Dosis cochlearium vnum summo ma-
nè, & omni hora cum aqua sanguinariæ, vel portulacæ, vel
plantaginis. Aliquando necessaria sunt narcotica, si fuerit im-

*Narco-
tica.*

modicus fluxus hic. Si supradictis, & similibus non curatur,
inter quæ trochisci de Karabe, vel spodio, vel de terra sigillata
à drachma semis vsque ad drachmam vnam sunt optimi, &
athanasia, & requies magna ab scrupulo vno vsque ad drach-
mam vnam cum aqua, aut syrupo astringente aliquando serua-
tis legibus, & ordine capite 36. descripto de curatione scilicet
diarrhææ est necessarium philonium maius, vel Persicum, vel

*Admo-
uentia.*

Romanum ab scrupulo vno vsque ad drachmam vnam. Sistit
hoc profluvium albumen oui mixtum aqua rosata, & puluere
mastichis, sanguinis draconis, thuris & aliorum medicamen-
torum astringentium ipsis venis actu frigidum admotum, de
his tamen abundè diximus capite 21. de curatione profluvij

sanguinis è naribus. Aliquando in hoc sanguinis profluvio,
quemadmodum in aliis, sunt necessaria cauteria, vel medica-

*Caute-
ria.*

menta narcotica, vt suppositorium ex rebus astringentibus, cū
paucis opio, seruata tamen vna si antiquus fuerit fluxus, vt di-
ximus cum Hippocrate. Si verò summa esset imbecillitas vi-
rium, totus est sistendus fluxus hic, & postea facultate per
alimenta optima corroborata iterum posset scindi aliqua vena
ex iis, ne hydrops, vel tabes, vel mania fieri possint.

*Si flu-
xus sit
cum im-
becillita-
te con-
iunctus.*

Quartò, emendantibus sanguinem victu, & aliis: nam si
sanguis largior sit in corpore, victu tenui curatur, & sanguinis
missione. Si biliosus, victu frigido, & purgatione per myro-
balanos citrinos, rhabarbarum, tamarindos, & cassiam fistula-
rem. Si pituitosus, victu sicco cū temperata caliditate, & astri-
ctione, & purgatione per myrobalanos Kebulos, agaricum,
& alia medicamenta phlegmagoga, dummodò ipsis miscean-
tur astringentia. Emendant sanguinem, postea electuarium
diatrion tantalorum, diarhodonis Abbatis, conserua buglos-
sæ, rosarum, & cydoniorum. Squamma ferri debite præpa-
rata, sæpè videlicet in aceto infusa, & decocta, & exsiccata
prodest. Eius drachma vna, vel duæ bis in hebdomada sūptæ

*Emenda-
tio san-
guinis
copiosi.
Biliosi.
Pituitosi.
Emen-
dantia
sangui-
nem post
evacu-
tionem*

ventricu

DE CVRAND. MORB.

ventriculum & hepar roborant, & humorum malignitatem leniunt, & castigant.

*Curatio
doloris.*

Dolor hæmorrhoidum curatur per causæ abscissionem, quādo non est vehemens, nec facilitatem nimis resoluit: nam si

*Doloris
ab in-
flamma-
tione*

vehemens dolor est, amouendus etiam erit per narcotica, ut sæpe dictum est, non habita ratione causæ. Dolor, si ab inflā-
matione fiat, primò curatur, victu tenui, & refrigerante. Se-
cundò, anertentibus, ut sanguinis missione per sectionem basi-
licæ, & vinculis, frictionibus, & fotibus partium superiorum.

curatio.

*Reuellē-
tia.*

Tertiò, repellentibus, ut aquā rosarum, portulacæ, plantaginis, & candido oui cum oleo rosato, mucilagine seminis psyllij,

*Repellē-
tia.*

& cydoniorum. Quartò, in augmento, & vigore, repellentibus, & resoluentibus, ut oleo camomillæ, & rosarum misto, vel

*Repellē-
tia &
resolue-
tia.*

hoc vnguento. ℞. olei rosarum, & camomillæ, an. 3. j. mucilagine seminis psyllij, & fœnugræci, & seminis althææ an. 3. ij. ceræ, q. s. misce; & fiat vnguentum. In declinatione resolu-

*Suppu-
rationis
curatio.*

uentibus tantum curatur. Si inflammatio in suppurationem transeat ab arte est natura corroboranda, & iuuanda: quæ ta-

*Suppu-
rationis
curatio.*

men post primam dictam tutior est duabus aliis, nempe quæ in lapidificationem, vel corruptionem finiantur: pessimi enim

*Suppu-
rationis
curatio.*

sunt hi duo vltimi modi omnium tumorum præter naturam, præsertim huius partis, cuius affectus, autore Gal 9. de com-

*Suppu-
rationis
curatio.*

positione medicamentorum secundum locos, difficulter curā-

*Suppu-
rationis
curatio.*

tur quatuor de causis. Prima, ob eius sensum. Secunda, pro-

*Suppu-
rationis
curatio.*

pter vsum partis, excrementa enim sua vi acri mouent faculta-

*Suppu-
rationis
curatio.*

rem expultricem. Tertia, in medicamenta vtilia non detinentur

*Suppu-
rationis
curatio.*

tempore necessario in ea parte. Quarta, ob caliditatē, & humi-

*Suppu-
rationis
curatio.*

ditatem partis huius, ideoque amat hic locus siccantia, & re-

*Suppu-
rationis
curatio.*

frigerantia medicamenta, ut sunt metalla, præsertim tuthiam.

*Suppu-
rationis
curatio.*

Suppurata ergo inflammata parte à natura & ab arte per medi-

*Suppu-
rationis
curatio.*

camenta suppurantia, de quibus fermè omnibus Iacobus Hol-

*Suppu-
rationis
curatio.*

lerius lib. 1. c. 5. de materia chirurgica abundè scripsit: mix-

*Suppu-
rationis
curatio.*

tura tamen ex farina tritici sine furfure, aqua decoctionis ma-

*Suppu-
rationis
curatio.*

luarum, & oleo satis suppurationem efficit, est triapharmacū Galeni, & si addas parum croci. & vitellos ouorum, erit effica-

*Suppu-
rationis
curatio.*

cior: deprehendes pus genitum esse per febris, & doloris re-

*Suppu-
rationis
curatio.*

missionē. Post, necessaria est puris extractio apperto suppura-

*Suppu-
rationis
curatio.*

to loco ferro, aut igne. Tandem curatur abstergentibus & vlti-

*Suppu-
rationis
curatio.*

mò consolidantibus: sed in hoc consule doctū chirurgū, & se-

*Suppu-
rationis
curatio.*

quere Iacobi Hollerij librū secundum de materia chirurgica.

*Suppu-
rationis
curatio.*

Quando dolor hic à sanguine implente has venas absque in-

*Suppu-
rationis
curatio.*

flammatione, & fluxu fit, quod per tumorem, & colorem de-

*Suppu-
rationis
curatio.*

prehendes, sanguis ab illis est mittendus, præcipuè si ægroti

*Suppu-
rationis
curatio.*

soliti

soliti sint habere hunc fluxum, quod fiet. Primò magnis frictionibus partium infernarum, pudendorum. Secundò, cucurbitulis admotis partibus internis coxarum, & parti, quæ est inter anum, & testes. Tertiò, secta vena saphena, vel poplitis. Quartò, apertione harum venarum lanceola, vel ferro tenuissimo. Et si ipsæ non appareant exterius, magna compressione versus inferiora, & magna cucurbitula fient manifestæ. Ex ipsis una, vel plures rumpantur, & secundum tumorem unius, vel plurium extrahatur sanguinis copia respondens plenitudini, id fieri potest per hirudines. Quintò, acubus argenteis, vel aureis, præsertim si fuerit sanguis tenuis, vel foeminarum. Sextò, frictionibus per medicamenta acria, qualia sunt calamentum, origanum, cycaminus, piper, nitrum, & fel, quod est aliis potentius. Septimò, per medicamenta excoriantia, qualia sunt folia ficus, scylla, & alia lacticinia, & pulvis cantharidum, qui est aliis valentior in hoc morbo. Octaua, per ignem, seu cauterium actuale: hæc tamen apertio non fit, nisi cum est initium corruptionis, & gangrenæ. Turius ab eis mittitur sanguis quarto & quinto auxiliis sanguinem mittentibus. Emisso sanguine sufficienti, locus affectus curandus est mundificantibus, & abstergentibus, clementibus, & consolidantibus hoc, aut simili vnguento: ℞. vnguenti basiliconis ℥.ij. olei de chrysomellis, terebinthinæ abietis, benè lotæ. an. ℥.j. camphoræ & ruthiæ præparatæ an. ℥.j. ceræ albæ ℥. iij. misce, & fiat vnguentum. Quando dolor est ob earum magnitudinem, & fluxum immodicum, & antiquum, curantur exsiccantibus, & resolventibus post debitas vacuationes, & auersiones. Ligatura earum in radice filo tenui serico sensim arctius astringendo, donec in totum abscindantur, est probata, & satis tuta apertio earum secundum longitudinem per cauteria parua admouendo porci pinguedinem non salitam, donec eschara, seu crusta decidat: & postea secundo, & tertiò, & quartò eisdem paruis cauteriis eodem modo apponendo pinguedinem, donec crusta, & tota substantia earum putrida consumatur. Aliqui in hoc morbo laudant medicamenta corrodentia, sed ego non laueo ea, neque ignem actualem. Hæc sunt experta & tutiora Quorum ad hæmorrhoidas has exsiccandas, & ad curanda earum, & antidam osti- vlcera, & incisuras, drachmæ scilicet dimidium pulueris radicis, vel floris lilij cum paucis diebus sum- probatur. Eandem vim dimidium drachmæ unius pulueris radicis pentaphilonis cum paucis aqua frigida in æstate, & calida in hyeme sæpè manè sumptum. Idem fit squinantij puluere. Vsu no- Drachmæ duæ galbani ter sumptæ cum aqua frigida potenter stro pro- exsiccant bant.

*Aperien-
tia orifi-
cia vena-
rum*

*Vnguen-
tum de-
tergens
& conso-
lidans.
Doloris
à fluxu
immodi-
co & an-
tiquo cu-
ratio.*

*Quorum
antidam
ostium
probatur*

- exiccant has hæmorrhoidas. Ego hoc sum expertus. Pulvis capitis piscis saliti, & casei antiqui æquis ponderibus: idem facit electuarium de scoria ferri, & pilulæ de bdellio valenter exiccant has hæmorrhoidas, si inrerius sumantur. Multa quoque sunt, quæ adnota ano valenter exiccant, & sanant has hæmorrhoidas, quorum aliqua meliora, & experta in præsentia adducam: ut ℞. mellis ℥. j. β. aceti ℥. j. vitreoli viridis, floris æris, tuthiæ præparatæ, lithargirij, plumbi vsti, an. ℥. ij. mel, & acetum prius feruefiant, deinde extra ignem misce pulveres, & fiat vnguentum: vel ℞. radicis hyari sine cortice. ℥. ij. radicis liliorum alborum ℥. j. β. pulveris panis porcini, & pulveris panis furfuracei an. ℥. j. β. pulveris nucum cupressi ℥. j. granorū myrti, seminis plantaginis, thuris, sandaracæ Arabum an. ℥. β. farinæ fabarum ℥. ij. olei laurini, & de chrysomellis an. ℥. ij. misce, & fiat ad modum cataplasmatidis, addendo parum decocti radicum præcedentium. antequàm admoueatur ano, fiat lotus cum vino rubro, exiccat, & resoluit has hæmorrhoidas, & repellit humores fluentes ad eas. Balnea naturalia, quæ habent vim desiccandi sunt optima in hoc, vt sulphurea, salsa, aluminosa. Balneum, vel lotus ex decocto cannarum, filipendulæ, granorum myrti, radicum hyari, & similium valenter exsiccat. Suppositoria, seu glandes ex radice peucedani, vel gentianæ, vel hyari, vel ircos valde has hæmorrhoidas exiccant. Suffitus etiam stercoris vaccæ, vel spoliij serpentis est in hoc optimus, & suffitus huius pulveris. ℞. anacardi ℥. ij. galbani ℥. j. stercoris columbini, & stercoris vaccini, an ℥. j. β. misce & fiat pulvis. Hoc vnguentum hæmorrhoidas has curat exiccando, resoluendo, & aliquando aperiendo. ℞. melongenarum in partes parvas diuisarum ℥. iiij. radicum iridis in partes parvas diuisarum ℥. ij. olei lib. j. fiat decoctum ad vini consumptionem, cui percolato adde axungia anatis, & gallinæ an. ℥. j. olei scorpionum ℥. j. β. ceræ q. s. misce & fiat vnguentum. Ego expertus sum quendam nobilem affectum his antiquis hæmorrhoidibus cum dolore vehementi & rhagadibus, seu scissuris post multas vacuationes, & auersiones incidisse ex crassa natura, & constitutione corporis in satis macram: curatum tamen fuisse lotu frequenti ex decocto rubi, & additione post lotum pulveris eiusdem rubi, & vnguenti pompholygos. Sed quia dolor in hoc morbo est grauissimum symptoma, & ad se omnem curationem trahit, nulla habita ratione causæ eius, omni studio oportet ipsum curare. Quare considera benè, quæ Iacobus Hollerius scripsit c. 5. tertij libri: in præsentia tamen aliqua probata adducemus. Primò, curatur dolor hic & quicunq;

quicunque alius fotu, & lotionē frequenti ex decocto croci. Secundo, ex fotu, & vnctione sæpè. Tertiò, ℥. pulueris camomillæ ℥. ij. pulueris anethi ℥. ij. croci puluerizati ℥. j. vitellos ouorum numero ij. sæpè q. s. misce, & fiat cataplasma: quod valentiùs dolorem curat duobus prioribus auxiliis. Quarto, ℥. olei rosati ℥. iiij. vitellos ouorum numero iiij. croci puluerizati ℥. j. misce, & fiat ad modum vnguenti, quod est præstantissimum remediũ. Quintò, ℥. olei nenupharis, & camomillæ an. ℥. j. succi lactucæ ℥. ij. farinæ hordei ℥. j. simul parum ferueant, & in fine adde croci puluerizati ℥. j. vitellos ouorum numero iiij. misce, & fiat ad modum cataplasmati. Si dolor fuerit maximus, adde iusquiamini, vel mandragoræ, vel opij ℥. j. Maximum hunc dolorem curabit etiam suppositoriũ ex solo philonio. Hoc vnguentum est in hoc symptomate optimũ: ℥. olei de nenuphare, & olei de papauere an. ℥. j. olei mandragoræ ℥. j. β. croci puluerizati ℥. j. ruthiæ, cerusæ lithargirij an. ℥. j. amydi, terræ sigillatæ an. ℥. ij. opij. ℥. j. vitellos ouorum numero iiij. misce, & fiat ad modum vnguenti in instrumento plumbeo. Hoc cataplasma est valentissimum in dolore curando: ℥. radicũ althææ ℥. j. β. radicum liliorũ ℥. ij. foliorũ maluarũ, & iusquiami an. m. j. camomillæ ℥. j. meliloti, seminis anethi an. ℥. j. β. farinæ fœnugræci, seminis lini, & hordei an. ℥. j. β. olei sesamini ℥. iiij. opij. ℥. j. misce, & fiat cataplasma cum decocto herbarum & radicum præcedentium.

Vnguentum.

Cataplasma.

Scholium.

HÆmorrhoides vt ex Aëtio.] *Hæmorrhoids nil aliud significat, quã sanguinis euacuationem: ac proinde, per quãlibet explicatã partẽ contingat sanguinis euacuationes, si vim nominis consideraremus, hæmorrhoides dici poterunt. Consueuerunt tamen veteres medici, fluores sanguinis per venas ani tantum hæmorrhoides appellare, quia per has venas solet frequenter sanguis præter naturam excerni: & idẽ existimo Gal. lib. 6. epyd. par. 5. comm. 25. hæmorrhoides appellare sanguifluas venas. Et quamuis hæmorrhoides quadam sint caca, & quadam reclusa, cum frequentius soleant esse reclusa, proinde huic effectui, nomen impositum est euacuationẽ significans: sunt enim hæmorrhoides euacuationes per venas ani. Inde videbis malè aliquos, hæmorrhoides appellare distentiones venarũ ani. Hæmorrhoides reclusa symptoma sunt, in iis quæ excernũtur toto genere præter naturã. Morbus est instrumentarius, in via, aut canitate. Hæmorrhoides caca dolorẽ inferunt: qui reclusa*

Nomen

tur.

Hæmor-

rhoides

Symptō

DE CVRAND. MORB.

ptoma Symptoma est, orium, ex inflammatione illarum venarum, &
sunt. continentium partium, ut ex nimia earum mole colligimus. Cau-
Morbus sa supradicti morbi in via humor est, varius tamen, & vario mo-
caeca. do ad eam perveniens partem. Quia aliquando melancholia, aut
Causa sanguis abundans, à natura expulsa per dictas venas euacuatur:
morbi si aliquando verò ex Galeno 6. epyd. par. 5. com. 25. siue natura
pra dicti prouidentia, aut conatu, sanguis dilatans impetu orificium ve-
 na excernitur. Hinc varias intelligimus Hippocratis sententias.
 Quarum una est 33. lib. 6. Epyd. par. 3. altera verò 11. libri
 6. aphorismorum: si enim per ani venas sanguis fluens, optimus
 sit, & solum quantitate peccans, liberabitur ager à pleuritide
 & peripneumonia. Si sit cacochimia melancholica, aut sanguis
 melancholicus, non patietur phagedenica ulcera, id est, corrodentia,
 neque furunculos, neque exanthemata in cruribus oriri solita:
 quae similia sunt cum tercbinti fructu. neque melancholiā, nec ne-
 phritim à lapide (cuius melancholicus humor est materia) oriā. So-
Contro- let quarè à medicis exortus venarum ani, quas haemorrhoides ap-
uersia pellare solent. Rondoletius, Altomarius & alij existimant, per par-
de venis tem exteriorē intestini recti, disseminari exiguas venas à caua or-
hemor- tas: at per internam partem venas maiores, ex vena porta proce-
rhoidi- dentes. Vnde colligunt haemorrhoides venas, esse ramos vena caua,
bus. & vena porta: & ita euacuatione humoris in toto corpore iecore,
Senten- & renibus contenti, per venas exteriores intestini, qui à caua pro-
tia Ron- cedunt, excerni: at euacuationem melancholia ex liene per venas
doletij internas. Curtius in haemorrhoidibus, per utrasque venas sangui-
& alio- nē excerni persuadet, rarò tamen per ramos vena porta, quia hi
rum non propter expulsionem, sed propter attractionem fabricati sunt
Sentētia à natura. Certè si exactè rem cōsideramus, videbimus omnes hos
Curtij. errare: quia vena sanguiflua se aperit in cauitatem intestini,
Omnes aliter non possent sanguinem profundere. Et ideò solum vena à
supradi- porta enata, haemorrhoides dicuntur, quia habent ora in cauitatē
si errāt intestini patentia. Adde per haemorrhoides venas copiosum ex-
 cerni sanguinem aliquando, quem per propagines vena caua per
 musculū disseminatas, & intestini partē exteriorē euacuari nō pos-
 se ostēdit earū paruitas. Id quod Altomarius scribit de euacuatio-
 ne totius corporis per haemorrhoidas, fieri scilicet per venas à caua
 ortas, falsum est. Nam praterquàm quòd per illas non potest fie-
 ri (ut diximus) copiosa euacuatio, nil impedit, quominus per alias
 fiat habentes cum vena porta communicationem, ob quā frequē-
 ter natura solet totū expurgare corpus. Neque Curtij ratio con-
 cludit, si aduertas Gal. in lib. de natu. fac. ex professo proba-
 bare, per easdem venas, per quas distribuitur alimētum per corpus
 fieri etiam humoris, aut excrementorum euacuationem.

Altoma-
rij la-
psus.

Curtij
ratio
nulla.

Hic

Hic fluxus immodicus curatur.] Si in hemorrhoidibus euacuetur plethora, aut peccans humor, cum liberentur homines à supradictis malis, nihil efficiendum erit, quia euacuatio cum comodo animalis exercetur. Si sit excedens, solet cachexiam, & hydropem. Que se efficit, & frigerato iccore. Si sit deficiens, & diminuta euacuatio, si quatur, supprimatur humor melancholicus: fit melancholia, & iecoris resuppressionis refrigeratio: si vero sanguis, hydrops, & cachexia suffocato calore sit haec contingunt: sicut pleuritis, peripneumonia, aut in alia parte hemorrhoidum inflammatio sanguine ad pleuram, pulmonem, aut aliquam aliam dibus partem decumbente. Cum ergo immoderata hemorrhoidum euacuatione, aut suppressione, tot eueniant mala, oportebit diligenter occurrere. Si immodica euacuatio sit, simul & recens, tota suppressio. Cura-
men la erit. Dubium autem est de inueterata. Hippocrates 6. aphorismo. 12. in antiquis hemorrhoidibus, venam apertam re-
linquit: at Aëtius purgato corpore omnes claudit. Verior tamen est de inueterata Hippocrates, quia in antiquis hemorrhoidibus natura per anum terata consuevit sarcinam deponere: quam consuetudinem si repente mutemus, supradicta mala excitabimus. Quod exemplo confirmauit 4. epy. sentent. 132. ubi Alippum (qui hemorrhoidibus affectus erat) curatum, insanum redditum scribit. Dices, nonne si una una aperta relinquitur, totum corpus refrigerabitur? Respondeo, maius malum, & citiorem mortem sequi, si eam statim supprimamus. Si hemorrhoides non fluant, aut nunquam fluxerunt, aut aliquando fluxerunt. Si nunquam fluxerunt, aperienda à nobis sunt videntes hominem lienosum, aut melancholicum. Si fluxerunt aliquando, multò melius eas mouebimus, potissimum si videamus ex earum suppressione aliqua mala iam sequi. In fluxu immodico hemorrhoidum, victum frigidum & adstringentem imperat auctor, & alij cum ipso. Male tamen, quia ea quae frigida sunt, & adstringentia, stercus indurant: quod magno egens conatu, & forti expressione ad hoc ut expellatur, sanguinum fluxus augetur. Sint ergo alimenta temperata, aut lenientia alium propter dictam causam.

Iacotius reprehenditur.

Secundò auertentibus.] Distinctione opus erit, si noluerimus errare cum auctore. In immodica euacuatione humoris melancholici ex liene, basilicam sinistram sica, quae vasorum & naturae nis misce habet reftitudinem: in ea verò quae ex toto corpore, aut iccore fit, sio exerbasilicam dextram. Idem seruandum est in cucurbitularum applicatione.

Tertiò, contrahentibus.] Omnia medicamenta, quae ab auctore hoc in loco per os assumenda describuntur, omittite: quia sua adstrictione stercus indurant. Adde ab his non posse obstrui venam reclusam, quae in ano posita multum distat ab ore: uti tamen poterit

Unde Lapsus auctoris.

DE CVRAND. MORB.

illis medicamentis, quæ ab auctore ano applicantur.

Medica- Quartò, emendantibus.] Medicamento ex squamma ferri pra-
mentum parato, non est quod utaris per os: bene exterius applicando sequi-
ex squa- tus Galenum lib. 5. metho. c. 10. qui eo exsiccat ulcera auris & ani-
ma fer- Septimò per medicamenta excoriantia.] Fel taurinum con-
ri, ubi uenientissimum anostomicum est.

utile. Ligatura earum in radicem.] Si tenues sunt, ligatura utilis est:
Ligatu- secus si crassa.

ra quæ- Aliqui in hoc morbo laudant.] Abstinentium à corrodentibus
do pro- medicamentis, quia fluxionem mouent: Et ab igne actuali propter
dest. vicinas partes.

Vt ℥. mellis ʒ. j. & c.] Omittatur hoc medicamentum, quia vi-
triolum, & flos aris caustica sunt.

Error Vel ℥. radice hiari.] Si radix hiari, & liliorum, & puluis pa-
auctoris. nis porcini aperienti habent vim, cur ea miscet auctor in hac com-
positione, in qua ulcera ani exsiccare instituitur? Suppositoria de-
me ab his acia.

Hoc vnguentum est in hoc symptomate optimum.] Optimum
est, sed nonne breuius oleo rosaceo, oui luteo, & opio id prestabis?

De procidentia ani. CAP. LIII.

Descri- Cum anus aut propter musculorum obliquorum sedem sur-
ptio. sum reuellentium imbecillitatem, & resolutionem, aut
propter ingentem in egerendo conatum procidit, aliquando ab
inflammatione, vel alio tumore præter naturam, cuius curatio
necessariò præcedere debet, reductionem intestini, malum sit
nulli non notissimum, quam procidentiam ani nominamus,
barbari exitum ani, aut langaonis dicunt.

Curatio. Si ani procidentia sit à sola intemperie, contrariis curatur se-
di admotis in forma vnguenti, vel cataplasmati, vel fots: in
omni tamen quiescat altis clunibus, & iunctis præcipuè ano
reducto in suum locum. Si sit ob imbecillitatem, vel resolutio-
nem, seu paralysem muscorum, curabitur. Primò victu exiccan-
te, & calfaciente, de quo c. 13. Secundò, pituitam apparantibus.
Tertiò vacuantibus medicamentis conuenientibus, de quibus
eodem 13. capite egimus. Quartò & vltimò, dissipantibus, & re-

Vnguen- soluentibus, ut hoc, vel simili vnguento: ℥. olei costini, & ca-
tum. storei. an. ʒ. j. olei rutæ. ʒ. j. β. pulueris castorei, & anthos. an. ʒ. j.
pulueris mastichis ʒ. β. ceræ q. s. misce, & fiat vnguentum. Ante
cuius appositionem pars affecta foru huius decoctionis præ-
paretur: ℥. camomillæ, anthos, saluæ, balaustiarum, foliorum
lauri an. p. j. nucum cupressi, & gallarum an. paria. vj. fiat deco-
ctura

Etum in libris sex aquæ, donec tertia pars consumatur.

Si infans, aut puer laboret ani procidentia, humidis, & frigidis corporibus humoribus purgatis per hieram simp. vel agaricum trochiscatum, infideat decocto saluæ, absinthij, stæchados, abrotani, rutæ, origani, roris marini, facto ex vino calybeato, & aqua aluminosa, vel sulphurea, & vngatur anus vnguento superiori, vel simili, & quiescat multis diebus clunibus elatis, & clausis. Pix comesta curat ani procidentiam, & eius suffitus par-
 ti affectæ immissus. Folia porri, vel thasi barbari decocta cum vino, & ano admota valenter curant ani procidentiam. Suffitus ex corio anguillæ salito est optimus in hac ani procidentia curanda. Idem fit suffitu plumbi vsti. Cuius cancri fluuiatilis admotus ano curat eius procidentiam, & scissuras Pilulæ de bdellio sumptæ idem faciunt.

Scholium.

Cum anus aut propter.] Anus extremitas est intestini recti, Anus ubi tres muscoli reperiuntur. Vnus transuersus, ipsi ano circumuolutus, dictus sphynxter ab actione: quia constringendo anum in voluntarium fluxum excrementorum impedit. Duo alij sunt obliqui, non magni, sed membranosi, & lati: utraque ani parte supra prædictum rotundum musculum siti. Horum usus est in magnis contentionibus, euersam sedem sursum retrahere. Est etiam in ano membrana, qua alligatur ossi sacro, & lumbis. Ex his facile est intelligere, quæ hoc capite à doctoribus proponuntur. Procidentia ani tunc dicitur, cum extremitas intestini recti, foras delabatur: ita ut non lateat visum. Morbus est in situ vitiat. Causa eius erunt omnia, qua laxare possunt musculos, & ligamentum ani, qualia sunt humida: & qua paralysim in musculis inducere possunt, ut frigida: & tertio magnus ad egerendum conatus, qualis tenesmum comitari solet. Practici aliam addunt causam, nempe inflammationem: decipiuntur tamen, quia inflammatio non laxat, sed musculos tendit. Quod si in procidentia ani, intestinum inflammatur: non poterit reponi, quin prius inflammatio sedata sit.

Si ani procidentia sit à sola intemperie.] Procidentia ani neque à calida, neque à sicca intemperie sit, quod debuit auctor distinguere.

Si infans aut puer.] Cum anus sit pars affecta, ei applicanda sunt medicamenta. Unde ea, quæ ab auctore per os exhibentur, cum eorum vis non perueniat ad anum, omittantur.

De procidentia vteri. CAP. LIV.

*Descri-
ptio.**Causa.**Laborio-
sus par-
tus,
Labor
corporis
& ani-
mi.**Note.**Curatio
Dissipa-
tia fla-
tum. Su-
fus re-
rū gra-
ue olen-
tium.**Vterus
maximè
amat re-
dolentia**Qua v-
terum
ad suū
locum**trahunt,
Medica-
mentum*

QVando vterus ita euertitur, vt exteriùs emineat, autore Ætio libr. 16. capit. 78. malum fit, quod ipse procidentiam vteri nominat. Arabes autem præcipationem matricis & exitum appellant. Cuius causæ quamplurimæ sunt, nonnunquam enim accidit ob casum ab alto decidente, scilicet muliere in coxarum vertebra: rumpuntur enim tunc membranæ quædam, quibus vulua propinquis partibus annectitur vnde procidere ipsam necesse est, sæpè ob ingentem conatum, quo premitur mulier, in laborioso & difficili partu, maximè verò in abortu, vt secundam expellat. Aliquando propter inconsideratam partus extractionem, aut nimiam spiritus detentionem, aut immensi ponderis elevationem, aut percussione vteri, aut animi vehementes affectiones hoc ipsum accidit: & ob humoris plurimi, ac tenacis defluxum, partumque frequentiam: laxantur siquidem atque soluuntur appendices profundo vtero superiùs inhaerentes. Iam & sine vlla causa istarum hic morbus contingere solet, cum debilitato corpore membranæ, musculique vuluam sustinentes exoluuntur, quod ingrauescente ætate fieri consuevit. Morbus satis per se patet, cum vterus ipse procidens oculis cerni possit. Procidit autem secundum os eius, & quod pendet struthio camelii ouum similitudine refert, maioris tantum, & minoris ratione differens, Causarum porro notæ tum ex ægrotantis sermonibus, tum ex corporis constitutione notatæ intelligentur.

Similis est hæc curatio præcedenti, causa enim in illa & in hac est auferenda, si possit, & vterus loco nativo est restituendus, nisi impediat tumor vteri magnus, quem dissipabis fotu, & lotionem ex decocto cymini, anisi, baccarum lauri, camomillæ, & similium facto vino rubro. Post insperges pulueribus stipticis, ne recidat, de quibus superiori capite dictum est. Suffus rerum graue olentium, vt pennarum perdicis, assæ foetidæ, castorei, solæ combustæ, capillorum, sulphuris, & similia exceptus per vuluam infundibulo, vel cathedra perforata est necessarius. Ouum sub gallina factum, agitatum, lanis inuolutum, & vuluæ admotum, vterum reducit ad proprium locum: quia vterus maximè abhorret foetida, & ab iis fugit. Amat non parum redolentia, quare naribus admouenda sunt, vt moschus, ambra, vel alia minoris pretij, vt galia, & flores citranguli, rosæ, violæ, & similia. Cucurbitula magna fixa vmbilico vterum ad proprium locum trahit, & conseruat. Reducto vtero ad proprium locum cubet clunibus sublatis in sublime aliquot

aliquot diebus, & umbilico imponatur hæc mixtura: conser-
uat enim uterum in propria sede, confert etiam suffocationi, *uās ute-*
& omni inordinato motui: ℞. alitæ muscatæ, galitæ musca-
ritæ, an. ʒ. iij. ambritæ, musci, an. g. v. utriusque itoracis an. ʒ. *suo loco.*
ij. β. iethiæ electæ, ʒ. ij. omnia cum oleo ex itorace, miscean-
tur, & extendantur super pannum coccineum forma rotunda
ad prælidium umbilici.

Scholium.

Quando uterus.] Uterus situs est inter intestinum rectum & Vteri si-
vesicam loti j qui locus maximè accommodatus est ad reci-
piendum semen, ad fœtum usque ad iustam magnitudinem seruā-
dam, & cum usus postulat, excernendum. Habet uterus varia
ligamenta. Recto intestino, & vesica fibrosis quibusdam & tenui-
bus ansulis alligatur, sacro ossi (ut multi sentiunt) quibusdam ner-
uosis, & musculosis vinculis lumborum etiam vertebri ex Galeno
quod medio peritoneo intelligendum est. Prædictis ligamentis suo
loco seruatur uterus, quæ si laxentur, mutabit situm ad vnum, aut
alterum latus declinans, aut prominens exterius, nunquam ta-
men, uteri prolapsus contingit eius fundo per os egrediente, ut
multis placuit: hoc enim ab oris uteri angustia impeditur. Si ob-
iicis fœtum maiorem per hanc egredi partem. Respondeo non esse
parem rationem, quia fœtus ponderosus est, & à natura expelli-
tur. Curationem pete ab autore, solum adde, modum, quo uterus
debet restitutus seruari, ne procidat. Seruabitur ergo uterus re-
positus armilla, aut circulo ex are facto, in vuluam immisso, ita
ut cerea candela per ipsum circumuoluatur, ne, a carnem cōtin-
gat. Aduerte etiam auctorem, non rectè animi vehementes affe-
ctiones & imbecillitatem corporis prolapsus uteri causas statuere,
quia ab his non possunt uteri vincula laxari.

Anne-
xusQuomo-
do fiatuteri pro-
cidenciaObiectio
soluitur.Quomo-
do uterus
restitu-
tus ser-
uetur.

De immodicis mensibus. CAP. LV.

Immodicè fluere menses in fœminis tunc dicimus, autore *Quid*
Aëtio, quando conferta sanguinis menstrui copia pluribus *mensii.*
diebus effluxerit, quod multis de causis accidit. Prima: quia iu-
sto tenuior redditus sit sanguis, quæ res ab externis ut plurimū cum pro-
causis euenire solet, tamethi ab internis etiam contingat. Et *fluuium*
enim & legimus ipsi & vidimus aliquando in muliere, quæ se *Causa.*
pius æquo exercuisset, huiusmodi mensiū defluxū contigisse,
qui multis medicorū præsidij sisti non potuit & in mulieribus
tempe

DE CVRAND. MORB.

temperamento bilioso hoc ipsum accidere quotidie experimur. Porro quæ sint causæ tum externæ, tum internæ, quæ sanguinem possint attenuare, superfluum esset recensere, cum sæpius dictæ sint, & per se lector facile inuenire possit. Accidit præterea symptoma propter vasa aliqua aut aperta, aut fracta, aut etiam erosa, siue magna ea sint, siue parua. Nonnunquam etiam ob partus grandiores, & post abortus, quos ut plurimum mensium immoderatæ purgationes solent consequi. Cæterum si à sanguinis tenuitate oriatur hæc affectio, considerare oportet antea vitam, & eas omnes causas tam exteriores, quam interiores, quæ sanguinem tenuiorem solent reddere. Si verò vasorum accidat vitio, vel quia fracta, aut erosa sunt, erumpentis sanguinis multitudinem (ut inquit Aëtius) conuenit considerare: cuius verba hæc sunt. Amplioribus vasis fractis, aut apertis, magna & conferta sanguinis copia defluit: ab angustioribus verò oppositum accidit, sicut ab erosione paulatim, & cum maximo dolore delabitur. Ab aliis causis si accidat, facile ex ægroti sermonibus deprehendetur. Consequitur sic affectos cutis decoloratio, appetitus imbecillitas, concoctionis difficultas, nonnunquam pedum, & totius corporis tumores quidam laxi, & generatim ea omnia, quæ excedentem hæmorrhoidum defluxum consequuntur.

Nota.

Curatio Si immodicus fluor mensium est à sanguinis copia, curatur
quando victu tenui, & astringente, ut cydoniis, pyris, agresta acetosa,
est à san- amygd, & oriza cum lacte amygdalarum, vel caprarum caly-
guinis beato, fuga carniū, ouorum, & sanguinem augentium. Sece-
copia. tur vena interna dextra, extrahaturque sanguis respondens ple-
Victus. nitudini, & viribus ægri. Si ob bilem mixtam sanguini, præce-

• **Sectio** denti victu frigido, & astringente, de quo capitibus vigesimo
vena. primo, & vigesimo octauo, de sanguinis profluvio ē naribus, &
Si à bile de sputo. Vacuetur bilis cholagogis, ut myrobalanis citrinis,
victus. rhabarbaro, tamarindis, cassia fistulari, & similibus: ut ℞. medul-
Purga- læ tamarindorum, & medullæ cassiæ fistularis recens extractæ
tio. an. ʒ. ʒ. pulueris corticum myrobalanorum citrinorum, & rha-
barbari electi infusi per noctem in aqua endiuia, an. ʒ. j. syrupi
rosarum ʒ. j. aquæ portulacæ quod satis est, misce, & fiat potus.

Quæ si- Deinde sanguis refrigeretur, & sistatur syrupo rosarum, gra-
sūt san- natorum, myrtillorum, cydoniorum, de agresta, & de ribes, &
guinem. aquis portulacæ, plantaginis, sanguinariæ, & similium. Dosis
Purgan- quolibet die summo mane syruporum vnciæ duæ, & aquarum
tia pi- vnciæ quatuor. Si ob mixtam pituitam (quod color sanguinis al-
tuitam. bus ostendit, quemadmodum flauus bilem) phlegmagogis va-
cuetur, ut myrobalanis chebulis, agarico, & aliis: ut ℞. diacatho-
liconis

liconis ꝑ. ꝑ. corticum myrobalanorum chebulorum, & agarici
 trochiscati an. ꝑ. j. diaphæniconis. ꝑ. ij. rhodomellis ꝑ. j. aquæ
 fœniculi q. s. misce, & fiat potus: præcedenti tamē pituræ aquo-
 sæ concoctione per syropos de absinthio, & rhodomel cum
 aqua fœniculi, & absinthij. Si ob atram bilēm mistam, quod ni- *Atram*
 ger color indicat, vacuetur epyrhimo, myrobalanis indis, sero, & *bilem.*
 aliis: vt Ꝓ. confectionis diasenæ ꝑ. iiij. pulueris epithymi, & *purgan-*
 corticum myrobalanorum indorum an. ꝑ. j. syrapi buglossæ ꝑ. j. *tia.*
 aquæ borraginis q. s. misce, & fiat potus, prius tamen appa- *Auer-*
 retur bene atra bilis per medicamenta dicta cap. i. & cap. 9. de *tentia.*
 curatione melancholiæ. Facta iam corporis euacuatione, &
 factis etiam auersionibus omnibus, tum per sanguinis missio-
 nem, tum per purgationes, per frictiones partium superiorum,
 & ligaturas dolorificas, & forum earundem; & per frequentes
 cucurbitulas scapulis, & potius mammis affixas. Sanguis om- *Refrige-*
 ni studio refrigerandus, & incrassandus est, vt quiete animi, *ratio, &*
 & corporis. Scimus enim Vicecomitem ipsam Castri boni *quies.*
 perisse menstruorum immodico fluore, cuius causa fuit ma- *Historia.*
 gnus motus: confecit enim pedibus iter trium leucarum, vt *Stiptica*
 vocant, ad visendam imaginem virginis Mariæ de Sarrança. *sanguini-*
 Et aliis etiam omnibus internis, & externis stipticis, & re- *nem in-*
 frigerantibus est incrassandus, vt drachma vna pulueris ka- *crassan-*
 rabæ, & corallij rubri multis diebus sumpta cum paucis syru- *tia.*
 po, vel aqua frigida, & astringente, vel iure arietis, vel pedum *Mixtu-*
 suis, vel vituli, vel amydo prædictio iure decocto, vel lacte ca- *ra ma-*
 lybeato. Dimidium vnciæ conseruæ rosarum vetustæ cum *ximè a-*
 syrupo, vel aqua astringente per aliquot dies sumptum sistit *stringēs.*
 hunc fluxum sanguinis. Idem fit drachmis tribus micletæ:
 vel Ꝓ. micletæ, conseruæ rosarum antiquæ, ana. ꝑ. j. ꝑ. pulue-
 ris spodij, sanguinis draconis, Karabæ, lapidis hæmatitæ præ-
 parati, balaustiarum, rosarum, corallij rubri præparati, mastichis,
 cornu cerui vsti, thuris, acaciæ, gummi dragaganti, & gummi
 Arabici ana. drachmas duas syrapi myrtillorum, quantum
 iussit, misce, & fiat confectio. Dosis est cochlearium vnum
 cum aqua plantaginis, portulacæ, vel sanguinaræ. Vteri loco *Vtero ad*
 anteriori, vt & posteriori medicamenta adstringentia, & fri- *mouen-*
 gida actu potentia admota sistunt hunc sanguinis fluorem: *da.*
 vt sunt succi, vel aquæ plantaginis, portulacæ, solani, & si-
 nilium cum aceto, & bolo armeno, & aliis pulueribus a-
 stringentibus. Stercus asininum non solum interiùs sumptum
 cum syrupo aliquo, & aqua astringente: sed exteriùs admotum *Asini*
 cum aqua calybeata, & paucis aceto sistit hunc sanguinis, *stercus.*
 & quemcunque alium fluorem, vt ego expertus sum. Hoc
 vnguen

DE CVRAND. MORB.

Vnguentum. vnguentum est in hoc genere probatum: ℞. olei myrtillorū, cydoniorum, & mastichis an. ʒ. j. pulueris boli Armeni præparati sanguinis draconis, & trochiscorum de Karabe an. ʒ. j. aceti cochlearium vnum, ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum. In vteri cavitatem necessariæ, & vtilissimæ sunt iniectiones medicamentorum astringentiū, glutinantū, & ora venarum ruptarum consolidantium, quales sunt aquæ, vel succi portulacæ, plantaginis, solani, sanguinariæ, & similium. Galenus enim diebus quatuor solo succo plantaginis infuso per metrenchitas curavi antiquū mensiū fluore, qui nullo alio auxilio curari potuit. Si his liquoribus addas pulveres astringentes, erit auxiliū efficacius. *Pessalus.* Pessalus, seu pessarium longū ex supradictis succis, & pulueribus astringentibus cum terebinthina, vel pice & lana pudendo mulieris affixus valenter sistit hunc fluorem. *Suffitus.* Suffitus stercoris ouini, vel asinini per vuluā susceptus inhibet hoc sanguinis profluium. Suffitus ranarū combustarū egregiè retinet hunc defluxū sanguinis, vt ego expertus sum in excellentissima domina mea duce Cardonæ & Sugurbi anno 1544. hoc fluore affecta septem fermè mensibus, quæ diuino fauore ad pristinā restituta est valetudinē. *Vngula mula.* Suffitum vngulæ mulæ sistere mirificè hunc sanguinem expertus sum: quamuis ab eo fiat per mensem sterilis fœmina, vt quibusdam placet: Hoc medicamentum multas nobiles Cottalanas laborantes hoc affectu satis antiquo curauit: ℞. corticum duorum ouorum recētium adulatorū, thuris, mastichis, an. ʒ. ʒ. margaritarū electarum, corallij rubri præparati, Karabæ, ana. ʒ. ij. lapidis hæmatitæ, & sinaragdi præparati an. ʒ. ʒ. farinæ hordei sine furfure. p. ij. albumina quatuor ouorū, & si opus fuerit adde parū aquæ calybeatæ, & fiant duo panes, seu placentæ, & coquantur in furno, vt possint in puluerē redigi: dosis huius pulueris est à drachma semis vsque ad drachmā vnā cum iure pedum arietinorum sūmo mane. *Narcotica vltima auxilia & externa minùs periculosa.* Vltimò curatur hic fluor, vt cæteri narcoticis seruatis omnibus, quæ sæpè diximus præcipuè cap. 40. de curatione colici doloris: quia periculosiora sunt narcotica interiùs sumpta iis quæ inniiciuntur, vel admouentur parti inferiori, & omnibus minùs periculosa sunt exteriùs admota, inter ea quæ sumuntur, requies magna vt clementiùs narcoticum, deinde athanasia, postea trochisci de Karabe, de spodio, & de terra sigillata, postea Philonium maius, vel Romanum, vel Persicum, vel Tharsense: hæc tamen nullo modo sunt admouenda, neque exhibenda, quando facultas est imbecilla, ne paucus natiuus calor extinguatur à medicamentis tam frigidis, sed potiùs facultas est roboranda succo carnium

carnium & iure optimò cum succis cydoniorum, acetosæ, & agrestæ. Sed quia hoc sanguinis fluore, & aliis omnibus ventri- *Ventri-*
culus imbecillior redditur, prudenter alimentis frigidis est nu- *culi cor-*
triendus æger, ne magis debilitetur, & externis dictis cap. 31. *robora-*
est corroborandus, & nullo modo internis, ne sanguis calefa- *tio.*
ctus aptior sit motui.

Scholium.

IMmodicè fluere menses.] In ea sanguinis euacuatione, quam *Conside-*
singulis mensibus utiliter in mulieribus experimur, hac omnia *râda in*
considerare opus est. Primò substantiam, qua euacuatur. Secundo *mensiū*
locum, per quem euacuatur. Tertiò tempus, in quo incipit & desinit *fluxu.*
euacuatio. Quarto quantitatem sanguinis euacuati. Vltimò an possint *Quis sã-*
concipere mulieres illa, in quibus non fluunt menses. Quam sit sub- *guis pro-*
stantia, qua in menstrua purgatione excernitur, ex Galeno facile *fluat.*
colligimus: fœmina enim ex lib. 14 de usu pari. cap. 6. ratione sexus
mare est frigidior, eò usque, ut alimentum, quod conficit, totum di-
scutere non possit: domi etiam agit, neque vehementibus motibus
exercetur, aut sub claro sole viuit, lib. de vena sec. aduer. Eras. c. 7.
ac proinde in venis copiosum sanguinem coaceruat: qui, tẽpore quo
non concipit, à natura (multitudine eius grauata, per uterum (qui
pars languida est, salubriter expellitur, at tempore, quo utero ge-
stat, idonea est ipsi fœtui materia. Vnde colliges duo. Primum san-
guinem menstruum optimum esse, & ex quatuor humoribus consti-
tutum: quem natura consultò per uterum expellit, quia est alterum
principium nostræ generationis, & alimentũ seminis & fœtus. Se-
cundum, ridicula esse, qua Plinius lib. 7. nat. hist. cap. 15. de san- *Plinij la-*
guine menstruo scribit, cum nititur probare, nil mulierum profluvio *psus.*
magis monstrificum esse: locus per quem sanguis mēstruus excerni-
tur, uterus est: ad ipsum enim perueniunt vena magna, & arteria
ex vasis, quæ sunt iuxta os sacrum. Ex quibus quedam inseruntur *Venarũ*
in uterum, per quarũ orificia in eius cavitatẽ patentia (cotylidonas *uteriva-*
Græci, & Latini acetabula appellant, quibus vena & arteria um- *rius lo-*
bilicales dictæ adhærescunt) sanguis excerni solet in virginibus & *cus.*
mulieribus quæ non conceperunt. Quadam verò in collum uteri, & *In gra-*
pudendum disseminantur, per quas tempore conceptus, solet fieri in *uidis per*
aliquibus gravidis menstrua euacuatio. Non ab interioribus, quæ *quas ve-*
sunt in cavitatẽ uteri, quia ab his secũde pendent, & ideo nil pos- *nas fit*
sunt in uteri sinum immittere, ut auctor ex Gal. lib. 5. aph. com. 60. hac eua- *cuatio.*
Ex his intelligemus, an, qua Iacotius in suo scholia scribit vera sint: *Sentiẽtia*
duo enim persuadere coratur. Primum est, in gravidis fluere ali- *Iacotij.*
quando sanguinem menstruum non per collũ uteri, sed per eius ca- *uitatem:*

DE CVRAND. MORB.

uitatem: in primo tamē mense, in quo os uteri multum non est con-
strictū, ut ostendit superfœtatio, qua eo tempore fieri solet. Secundum
est euacuationem sanguinis factam per venas, quæ sunt in collo u-
teri, nō esse menstruam, sed hamorrhoidalem, quia sanguis ille cras-
sus est, & venæ sunt iuxta anum, & habent orificia in cavitatem
patentia. Ex curatione hoc ipsum probat, quia si hæc euacuatio per
uteri collum facta supprimatur, curatur sanguine misso nō ex pede,
ut in suppressis mensibus: sed ex brachio, ea ratione, qua in hamor-

Iacotius rheidibus suppressis facere solemus. Hæc Iacotius, qui maxime &
reprchē- crasse decipitur. Primò, quia si orificia venarum in cavitatē uteri
ditur. patentia, tempore conceptus, adherent orificiis vasorum, quæ per cho-
rion disseminantur, non poterit, ut recte docuit Galenus, sanguis per
illas in cavitatem uteri excerni. Neque id recte ex superfœtatione
probat, quia hæc nō solum in primo mēse, sed & in quarto, & quinto
contingit: ut enim multa taceam exempla, uxor cuiusdam doctoris,

Historia. qui hic Valētia regia cancellaria præsidebat Gallari appellati, post
quatuor menses ab obitu viri filiū peperit, & deinde nono mēse al-
terū. Neque enim causa superfœtationis consistit, in eo quod orifi-
cium uteri sit apertū aliquantulū, ut simul etiam voluit Vallesius

Causa lib. 5. epy. comm. 11.) quæ semper euenit orificio ita clauso, ut ne spe-
superfœ- cilli cuspidē admittat: sed in uteri attractione, quæ tunc contingit,
tationis. quia dilatatur in coitu à fricatione, & calore orificiū uteri, & ita
Secundò semen attractū potest uteri cavitatem subire. Altera Iacotij senten-
reprchē- tia manifestā habet redargutionem, quia si sanguis per collū uteri
ditur Ia- euacuatur, semper ex vena caua fluit, & euacuatur nō per venas in
cotius. eam cavitatē patētes, quomodo erit hamorrhoidalis. Præsertim cum
non sit sanguis crassus (ut ipse sentit, sed optimus venarum quantitate
grauans. Ratio ex curatione desūpta nil cōcludit, quia si supprima-
tur illa euacuatio, quæ in gravidis per collū uteri cōtingit, si ledit,

Non om- non mouemus eam, secantes venam pedis, ne multo sanguine eua-
nibus in- cuato, qui infernè habet impetum, fœtus moriatur, sed ex brachio, ut
cipit eo- euacuemus redundantiam. De tempore quo incipit, & desinit hæc
dē tem- euacuatio, nil certi diffinire possumus, quia pro quantitate sangui-
pore hæc nis, & eius consistentia maxime euacuat. In quibus enim mulieri-
euacua- bus, multus est sanguis, aut tenuis, citius incipit, & tardius desinit
tio. menstrua euacuatio: contrā verò in quibus crassus est aut paucus.

Quod quāuis ita fit, maiori tamen ex parte incipiunt mens. 5 & 3.
Quanti- aut 14. anno, eo quod tunc iam non absunt fœmina tantū sangui-
tas san- nem in corporis augmentū: desinunt autem 45, aut 50. quo tēpore
guinis iam sanguis ea copia non generatur, qua possit abundare singulis
euacua- mēsibus. Quantitas sanguinis, qui solet euacuari singulis mēsibus,
di incer- non est certo diffinieda: quia pro natura & victus ratione mutatur.

ta. Ad ultimum (quod in hac disputatione inquirendū diximus) re-

spondet

spondet Aristoteles, bene posse concipere mulieres, antequam menses fluant. Aliqui experientiam ad id confirmandū addunt. Caterum Gal. A. Galenum habet contrarium Aristoteles, qui libro de uteri dis. capi-
 te 10. ante mensium eruptionem non posse fieri conceptū scribit, quia contra-
 semen caret vero alimēto, sanguine videlicet. Tum quia levis uterus
 est, ob vasorum occlusionem, & sic decidit semen: aptius enim est ad
 concretionem asperū quā leue: quod in lignis & lapidibus videre
 est, quæ si volumus vnire, prius (ut rectè dixit Diocles) scalpello e-
 xasperamus. Neque experientia potest dicere contrarium, quia in
 foeminis, quæ sine precedentibus mensibus conceperunt, tēpore coitus
 motum habuerunt. Prædicta ergo euacuatio menstrua si tempestiue
 fiat utilis est: si verò immodica (quam ex noxa colliges) mala, ut
 docuit Hippocrates 5. aphorismorū sent. 57. mensstruis enim largius
 fluentibus morbi fiunt, refrigeratio totius corporis habitus, fœdus
 color, tumor pedum, omnium virium imbecillitas, animi etiam deli-
 quium, & conuulsio libro quinto aphorismorū, sentent. 56. Quod si Immodi-
 immoderatus hic fluor in grauidis contingat, fœtus afficitur iuxta cus flu-
 Hippocratem, eodem libro sent. 60. Hæc immoderata sanguinis per xus sym-
 uterum euacuatio, symptoma est in his, quæ excernuntur, quātitate ptem.
 peccantia. Eius causa ex libro quinto aphorismorum, commenta. 53. est.
 tres sunt. Apertio orificiorum eorum vasorum, quæ in uteri cavitatē Causæ
 desinunt, sanguis calidus, & tenuis, & totum corpus (propter malū immodi-
 habitum, hoc est, imbecillitatem à sanguine etiam moderato aggra- ci fluxus
 uatum) expellens ad venas uteri. Prima causa est morbus instru- tres.
 mentarius in via. Secunda intemperies calida iecoris, multam bilē Prima
 generans. Tertia intemperies est totius habitus corporis, valida ta- causa.
 men, aliter ipsius vires nō deieccrit. Præter hos morbos, nullus alius Secūda.
 prædictum efficit symptoma, & ideo auctor, Rondoletius, Altoma- Tertia.
 rius, & alij Aëtium sequuti decipiuntur, existimantes erosionem, & Error
 venarum rupturam menses immodicos efficere: quia immodica mē- multo-
 sium eruptio, consueto natura tempore fit, ea verò quæ ex erosione, rum.
 aut ruptura procedit, quolibet tempore contingere potest. Vnde hæc
 sanguinis euacuatio per uterum nominabitur, non mensium im-
 modica euacuatio. Ea autem sanguinis præter modum euacuatio,
 quæ post partum aut abortum, aliquando euenit, ut ex Galeno li-
 bro tertio epyd. parte 3. comment. 35. colligimus, menstrua euacua-
 tio appellatur, quia quod expellitur est sanguis mensstruus propter
 factum in uterum immeritum: quamuis ille sanguis distinguatur
 ab eo qui singulis mensibus euacuatur, ut libro de atra bile cap. 8.
 docet Galenus: ille enim qui post partum expurgatur, portio est de-
 terrima: (nam optimum sanguinem factus attraxit, non solum pec-
 cans quantitate, sed & qualitate, & ita in epydemiis supradictō
 loco, hunc sanguinem melancholicum esse scribit.

DE CVRAND. MORB.

Si immodicus fluoꝝ mensium] Si ex imbecillo corporis habitu partes grauiata expellant ad uterum sanguinem, & hac ratione fiat Vena se- immodicus mensium fluxus, secabimus vnam basilicam dextri, aut Etio qua sinistra brachij, nihil enim refert. Cucurbitulam etiam magnam sub do est e- mammis infigemus, iuxta Hipp. 5. apho. sent. suar enim communes xercen- utero & mammis vna: hac enim ratione reuellemus sanguinem à da. parte affecta. Alimenti quantitatem minuemus, & corporis habitum roborabimus.

Si ob bilem mixtam sanguini.] Bilis sanguini mixta ipsum tenuem reddet, & fluxioni aptum. Sanguinem ergo mutemus & utemur cucurbitulis, ut reuellamus. Alimenta frigida sint, aut temperata, frigidis tamen aliterata.

Melan- Si ob mixtam pituitam] Si melancholia & pituita sanguinem cholia crassum reddunt, quomodo immodicos menses efficiunt.

& pitui- Facta iam corporis euacuatione] Tota ratio curandi hoc sym- ta non ptoma hac ratione procedat. Symptoma hoc aut urget, aut non urget. sunt cau Si urget, ei prospiciendum est alimentis & medicamentis incrassanti- sa. bus sanguinem, auxiliis etiam repulsiuis. Si vero non urget, causa Ratio to remedia applicabimus, habitum corporis roborantes, sanguinem te- ta curan nuem incrassantes, & intemperiem, à qua procedit, corrigentes. Vlti- di hoc mò etiam meatuum laxitatem constringentes.

Sympto- ma.

De suppressis mensibus. C. A. P. LVI.

Descri- ptio.

Quibus faeminis menses non fluunt.

Quemadmodum menstruæ purgationes cum modum exce- dunt multarum ægritudinum causæ, ita quoque cum in totum supprimuntur, multos pariunt morbos, ut ex aphorif. 57. sectionis quintæ colligitur: de suppressis igitur mensibus pauca dicamus. Suppressos autem menses tunc dicimus esse, quoties cum secundum naturam fluere deberent, non fluunt: debent autem secundum naturam fluere in iis, quæ neque gra- uidæ sunt, neque infra decimum quartum annum, aut supra quinquagesimum constituuntur & præter has etiam illæ, quæ aut cantatrices sunt, aut saltatrices, aut immodicè se exercent, menstruis purgationibus naturaliter carent. Atque ut summa- tim dicam iuxta sententiam Aëtij, mulieres calidioris tempera- turæ, validisque exercitationibus addictæ, & agrestes parum admodum purgantur. Præter his quæcunque suppressos ha- bent menses ægrotare necesse est: supprimuntur autem men- ses, vel quia summa adest sanguinis plenitudo venas replentis, atque obturantis, vel quia sanguis sit crassus, viscidus, ac len- tus, à quo etiam venas obstrui necesse est. Non purgantur *Cause.* etiam mulieres, quæ longa aliqua ægritudine, aut acuta la- borant,

borant, vt phtisi, quartana, hectica febrî, ardenti, atque aliis id genus. Præterea quæ insigni aliqua vacuatione sunt exinanitæ, vt sanguinis missione, vomitu, sudore, sanguinis è naribus profluvio, alui fluore. Ad hæc & quibus puris copia alicunde emanat, & pustulæ in cute effloruerunt. Ob peculiare vteri vitium menses quoque interdum retinentur, verbi gratia ob pinguedinis copiam, aut carnis excrescentiam, aut callum; aut cicatricem ex ulcere, quod in vtero antecessit. Hæc enim vasorum vteri ora obstruere possunt. Causæ facile *Nota.* patere possunt: generaliter verò quibus menses præter naturam retinentur, dolores circa lumbos, femora, collum, sciniput, & oculorum radices accidere solent. Corporis præterea gravitatem, quæ sic laborant, patiuntur, nauseant cibum, avertunturque, fastidiunt, & horridos quosdam per vniuersum corpus discursus habent, quales iis, quæ conceperunt, accidere solent: vrina interdum in nonnullis difficulter redditur, interdum planè suppressitur. Cæterum mensium suppressio si à pituita copiosa, & venarum ora obstruente contingat, videre est laborantem somnolentam ad omnem motum segnem, colore candidam: plumbi quoque interdum colori similem pituitam assidue excreantem, & aliquando euomentem. Vrina quoque aquosa esse solet.

Menses si ob sanguinis inopiam ex inedia, aut victu parco, *Curatio* aut longo morbo, aut alia vacuatione per se constiterint, proprie non sunt suppressi, cieri possunt antequam mulier redierit *quando* ad propriam naturam. Si verò alia de causa suppressi sint, per *ex san-* abscissionem causæ euocantur, vt si à siccitate fiat, rebus humi- *guinis* dis curatur, non calidis, & exiccantibus, ne augeatur morbus. Si *defectu* ab obstructione, à qua ferè semper fit, curatur primò victu *fit.* tenui attenuante, & aperiente, de quo capitibus 42. & 45. de ob- *A siccitate.* structione hepatis, & lienis. *Ab ob-*

Secundò abigentibus causam suppressionis, & obstructio- *structio-* nis, quæ si sanguis fuerit per sectionem saphenæ, aut vena- *ne vi-* rum pedum abigetur: quamvis Matthæo de Gradi videatur *aus.* primam sanguinis missionem esse faciendam ex basilica, *Sanguis* quando corpus est multo sanguine plenum, ne attracto san- *nis mis-* guine multo ad infernas partes augeatur obstructio. Deinde *sio.* euocandi sunt menses frictionibus, ligaturis & cucurbitu- *Matth.* lis partium internarum, & coxarum, lotionibus, & fotibus ea- *de Grad.* rundem. Vltimò, per medicamenta aperientia, & diureti- *Euacua-* ca, de quibus statim dicemus: clementiora tamen in hac con- *tio men-* ueniunt, quàm in facta ab humoribus pituitosis, & crassis, *sium.* quæ primò curatur victu tenuante, & aperiente, vt diximus.

DE CVRAND. MORB.

A pituita. Secundo apparantibus pituitam rhodomelle, oxymelle simp. syrupo de duabus radicibus, & aliis dictis 1. cap. cum decocto, vel aquis eodem cap. dictis ad concoquendam pituitam.

Victus cōcoctio. Tertiò vacuantibus phlegmagogis eodem 1. cap. dictis, vt agarico, turbit, diaphanicone, electuario, indo maiori, & aliis similibus: vt ℞. pilularum de agarico, & cochiarum an. 3. ℞. cum aqua fœniculi fiant pilulæ septem.

Purgatio. Quartò menses omni arte sunt euocandi, cucurbitulis videlicet coxis affixis, frictionibus, ligaturis, & fotibus partium infernarum, vt syrupo capilli Veneris, de artemisia, de duabus, & de quinque radicibus quantitate duarum vnciarum quolibet mane sumpto per multos dies cum aquis duplis, vel decocto radicum diureticarum, croci, cinnamomi, calamenti, artemisiæ, sauinæ, & similium.

Fotus, & infessus. Fotus, & infessus ex decocto medicamentorum supradictorum aperientium in tempore consuetæ purgationis valenter ciēt menses, præcipuè, si sumatur tunc potus, hic aut huic similis: ℞. hæmagogi 3. j. aquæ capilli veneris, & sauinæ, ana. 3. ij. syrupi de artemisia vnciam vnā, misce.

Potus valenter educens. Et si menses inceperint, sanguinis missio ex poplite, vel Suffitus. pede valenter euocat menses. Suffitu per vuluam excepto rerum aperientium, & redolentium cum Hippocrate quinto aphorismorum 28. aphorismo menses euocantur. A fotu, & infessu, vngatur locus anterior, & posterior vteri hoc vnguento: ℞. olei de lilio, sesamini, & scorpionum, an. 3. j. axungię cuniculi, & gallinæ an. 3. ij. pulueris croci, spicæ, & sauinæ, an. 3. j. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum. Hoc

Vnguentum. medicamentum valenter menses euocat: ℞. diacurcumæ, & dialacæ, an. 3. j. trochischorum de myrrha, de capparibus an. 3. iij. pulueris spicæ, croci & cinnamoni an. 3. j. 3. ℞. syrupi de artemisia quod sufficit, misce, & fiat confectio. Dosis cochlearium vnum quolibet die mane cum vnciis tribus decocti, vel aquæ capilli veneris, vel artemisiæ, vel sauinæ, drachma vna, vel duæ theriacæ diateffaron cum decocto: vel aqua prædictarum rerum menses prouocat, valentiùs tamen theriaca magna, & mithridatus id efficiunt cum electuario hæmagogo.

Alia mixtura in hoc potentissima. Hoc medicamentum optimè menses excitat etiam suppressos septem annis: ℞. myrrhæ, calamenti montani, ana. 3. iij. medullæ passularum 3. ij. rutæ recentis 3. iij. sauinæ 3. vj. Ex omnibus contusis bene, & sufficienti quantitate mellis fiat confectio. Dosis drachmæ duæ cum decocto rubear tinctorum. Pessi longi ex superiori confectioe, & felle tauri cum lana in vuluam & vterum affixi aperiendo venarum

ora menses prouocant. Pessus ex radice rubeæ tinctorum *Pess.* cum felle tauri, vel alicuius animalis rapacis clementer menses euocat. Idem facit hic. ℞. pulueris castorei ʒ. j. β. musci grana iij. olei sambucini, & terebinthinæ, an. quod sufficit, misce, & cum lana fiat pessus longus: vel ℞. medullæ caricarum ʒ. β. succi mercurialis ʒ. j. pulueris radice gentianæ & pulegij an. ʒ. ij. pulueris nigellæ ʒ. j. cum pauca terebinthina, & lana vel gossypio fiant pessi, seu pessarij duo, vel tres longi. Pessi facti ex armoniaco, opopanace, galbano, sagapeno, & euphorbio sunt valentiores ad menses euocandos *Radix* aliis dictis superius, præcipuè si addas cyclaminum, cuius ra- *cyclami-* dix valentissimè menses ciet, & vt quibusdam videtur, si su- *ni.* per eam femina transeat, etiam menses euocat. Si vulua, & uterus ab his, & similibus pessis, & aliis medicamentis calidis aperientibus afficiantur calida intemperie, initio vlce- *Calidi-* rum nesciatum erit consilium docti chirurgi. Interim fo- *tatem* tus & lotio ex decocto plantaginis, & maluarum iuuat mul- *ulcus cu-* tum hoc affectu vexatos, & vnguentum album camphora- *rancia.* tum. Pilulæ hæ valenter menses ouocant: ℞. musci, myrrhæ *Pilula.* an. ʒ. ij. stachados, rubeæ tinctorum, pulegij, corticum citri, piperis longi, corticis cassiæ lignæ, granorum pæoniæ, calami aromatici an. ʒ. iij. spicæ nardi ʒ. j. cum aqua artemisiæ fiant pilulæ septem pro drachma: dosis drachma vna: syru- *Syrus.* pus hic egregiè menstrua mouet ℞. rubeæ tinctorum, arthemisiæ, sauinæ ana. man. β. mentæ, absinthij, radicem fœniculi, radicem acori squinantij, anisi, origani, nepitæ, matris syluæ ana. ʒ. β. gariophyllorum, melissæ, linguæ bouis an. ʒ. iij. cyperij, galangæ, calami aromatici, fœniculi, ameos, cymini rustici an. ʒ. ij. cinnamomi, medullæ passularum an. ʒ. v. fiat decoctum secundum artem, cum quo percolato, & melle sufficienti fiat syrupus. Dosis vnciæ tres.

Scholium.

Quemadmodum menstruæ.] Ex Hippocr. lib. 5. aphor. sent. 57. Si menstrua non sunt, ex utero morbi cōtingunt, quia ex sanguine detento processu temporis uterus patitur affectionē similem aut inflammationi, aut erysipelati, aut schiros aut cancro, ex quibus lege consortij afficitur totum corpus. Et quamuis mensuum suppressio noxia sit, magis tamen noxia est ea, quæ à partu contingit, eò quòd hac non solam abundantiam, sed insignē etiā humorum prauitatem 3. epy. part. 3. comm. 73. quia post partū, ut auctor est Galenus lib. de atra bile, euacuatur portio san-

guinis

DE CVRAND. MORB.

Sanguinis deterrima. Solet menstrua euacuatio, in quibus coassueta erat
 nis men- cessare, ob defectum materia, nempe sanguinis: in his quæ morbo
 strui sup aliquo laborant mulieribus, quæ multum se exercuerunt, & in
 pressio. quibus copiosa sanguinis euacuatio precessit. De hac mensium sup-
 Causa. pressione non loquimur modo, quia suppressionem menstruam illam
 De qua appellamus, in qua sanguine in venis non deficiente, eius per ute-
 suppress- rum fluor, ab aliqua affectione impeditur. Affectio hæc aut est in
 sione hic utero, aut in sanguinem in utero varia esse solet: Prima est, angu-
 sit ser- stia venarum uteri, à prima conformatione contracta: quam affe-
 cti- cti- tionem morbosam non licet appellare, cum à natura indita sit, &
 mo. Prima morbus innatus non detur: crit autem morbus simpliciter, qui est
 causara- intra limites sanitatis. Secunda est uteri densitas, quæ à frigiditate
 zione v- contrahente corpus uteri, & vase in eo contenta ortum habet, &
 zeri. ideo non fluit sanguis, vel si fluit, tenuis & aquosus. Quod conside-
 Secunda rans Hippocrat. lib. 5. aphor. sent. 62. mulieres uteros densos habentes,
 causa. tes, non concipere scripsit. Tertia est cōpressio vasorum uteri. Quæ sit
 Tertia aut à tumore præter naturam circumiacentium partium, aut ab
 causa. omenti multa pinguedine, ut in obesis mulieribus in quibus descē-
 Quarta dit omentum usque ad os uteri: non curantes hæc in parte Vesaliū,
 causa. qui omentum non posse usque ad os uteri descendere sentit. Quarta
 Quinta est obstructio. quæ sit à crasso, glutinoso, aut multo humore. Quinta
 causa. intemperies uteri frigida densans uterum: aut sicca eum indurās.
 Sexta Sexta affectio suppressens menses, traditur à Galeno lib. 5. apho.
 causa. comm. 57. est autem robur vasorum uteri, adeo ut quod influit, non
 Quid per admittat. Quod certè difficile mihi videtur, consideranti uterum à
 robur v- natura esse fabricatum languidum, ut sarcinā per ipsum depone-
 zeri in- ret: ac proinde per robur non nativum, sed factum à medicamentis
 telligat adstringentibus intelligo. Alia causa quæ sunt callus, oris uteri di-
 Gal. storsio, aut inflammatio, carnis excrescentia, & pellicula supra os
 Aliacau uteri generata in his, quas vulgò closes appellamus, à practicis ad-
 sa à pra- ducta nobis non placet, quia non possunt impedire mensium euacua-
 cticis tra tionem, quæ etsi per os uteri non fiat, potest tamen fieri per venas ad
 dita nul- eius collū peruenientes. Tum quia non possum mihi persuadere, tam
 ba. magnum collum in utero posse generari, ut omnium venarum orifi-
 cia occludat. Affectus sanguinis est, cum est crassus aut glutinosus.
 Quæ causa non est distincta ab obstructione, quia si nullum sit in
 venis impedimētum, sanguis etsi crassus & glutinosus, fluet, & ex-
 cernetur. Dices, Cur ergo Gal. obstructionem causam distinctam, à
 sanguine crasso & glutinoso statuit? Respondeo, quia aliquando est
 obstructio, sine tali sanguine. Quamvis varia sine istius suppressio-
 nis sanguinis causa, ut in plurimum tamen sit ab obstructione à
 sanguine crasso orta: ac proinde lib. 5. aphor. comm. 36. ad excitandū
 menstruas suppressiones, duos scopos describit Galenus, aperi-
 orificio

orificiorum vasorum ad uterum peruenientium, & sanguinis extenuationem. De hac ergo suppressione est praesens caput.

Secundò, abigentibus causam.] Ut sanguinem menstruum re-
tentum moueas, non euacues ex brachio, quia cum reuelles, & con-
trarium motum ab eo, quem molitur natura, induces: sed ex pede,
cùm sanguis per uterum faciat impetum. Vnde malè multi ex me-
dicis sequuti Aëtium, prius secant venam brachij, ut euacuent ve-
nas, & deinde pedis, ut moucant menses. Quasi euacuatio ex pede, vli ex-
plenitudinem ex vena caua non euacuet? Vbi nomine pedis intelli- cenda
ge totum illud, quod est ab articulatione coxae usque ad digitos. Sanguis
Euacuatio ergo (quam, ut moueamus menses, exercemus) potest fieri nis mis-
scarificatione, aut sanguinis missione. Scarificatione fiet, quando mu- sio.
lier candida est, aut simul candida & obesa. Ratio hac est: Mulier In mu-
candida habet tenuem, & aquosum sanguinem (& ideo Hippocrat. liere cā-
6. epyd. part. 1. sent. 6. has mulieres appellat aqua laborantes) & dida sca-
ita poterit per locum sacrificatum rectè egredi. Dices, nōne melius rificatio-
egredietur secta vena? Respondio verum esse, sed ex ea sequi aliud ne mo-
malum, quod est multos spiritus euacuari: at scarificantes prater- uēdi mē-
quàm quod commodè fluit sanguis, exigua spirituum fit iactura. ses.
In muliere obesa, cùm habeat exiguas venas in cruribus, etiam si
eas probè inscindamus, non poterit sanguis nec mediocriter fluere: ac
proinde eam scarificare oportet. Sanguinis missione euacuabimus ex
pede, si mulier sit nigra, & magis, si magnas habuerit venas. Nigra Nigra
enim mulieres, sanguinem habent crassum, qui per scarificatum lo- cur non
cum, commodè non euacuabitur. Hæc Gal. in lib. de curat. per san- scarifi-
guinis missionem cap. 11. videant ergo qui in hoc affectu semper ve- centur.
nam secant, & nunquam ex poplite euacuant, an secundum artis
præcepta operentur. Euacuatio autem sanguinis missione siue scari-
ficatione ex pede facta, non debet exerceri: quando iam fluunt mē-
ses, sed duobus aut tribus diebus antea, quo tempore futura expe-
ctatur euacuatio, ut libro de curat. ra. per san. miss. c. 17. docet Ga-
lenus, & hoc fecisse medicos Roma medentes in libro de vena sec.
aduersus Erasistratos c. 7. scribit. Rationem huius rei hanc esse
existimo, Cùm in missione sanguinis solcat sequi animi deliquium
(in quo sanguis recurrit ad cor) si quo tempore fluunt iam menses,
ex missione sanguinis, animū linqueret mulier, euacuatio supprime-
retur: quod cùm non timeamus antequàm fluant, idè tunc eua-
cuare oportet. Hoc verum est cùm deficientem euacuationem cura-
mus. Ratio victus sit extenuans.

Victus

Deinde euocandi sunt menses frictionibus.] Amara calida ratio.
cùm sint, & tenuium partium, menses mouens, quamuis etiam ha- Quæuo-
beant partes adstringentes (ut in absinthio videre est) quia hæc cēt men-
adstrictio poros internos, qui magni sunt, nō occludet. Omnia etiam ses.

DE CVRAND. MORB.

Spersa puluere nepita, aut pulegij. Possumus manè hac uti potione: ℞. mithridati 3. j. Syrupi capillorum veneris 3. j. misce cum aqua cap. veneris, & fiat potio. Hac confectio accommodatissima est: ℞. diacurcume 3. ij. trochiscorum de absinthio, de rhabarbaro, & de myrrha, aut de capparibus an. 3. j. s. quatuor sem. frig. an. 3. j. pulueris diarhodon. Abbatis 3. iij. pulvis foliorum sabina s. ij. cum syrupo capillorum veneris, fiat confectio. Cuius singulo manè assumet ager cochlearium unum, cum aqua sabina & borraginis, & deinde se exercebit quoad incipiat sudor, aut difficilis respiratio.

*Medica- Solemus in hac Valentina ciuitate, in hoc affectu exhibere medi-
mentum camentum ex scobe ferri paratum, cum foelicissimo successu. De-
Valenti- bet autem hac ratione parari. ℞. trochiscorum de absinthio, & de
nis vfi- rhabarbaro an. 3. j. antidoti hamagogi 3. j. s. artemisia, cinnamo-
tatum. mi, an. 3. j. limatura ferri preparati 3. j. cum syrupo capillorum
veneris fiat confectio. In hac compositione, quamuis limatura ferri
videatur basis, ei tamen non debetur medicamento totius actio, sed
aliis, qua propter hanc limaturam melius agunt, cum enim sit cras-
sarum partium, in causa est, ut immorentur, & ita tota compositio,
propter limaturam redditur anostomoticum medicamentum. Ad-
uerte ultimò ex Gal. 4. method. cap. 7. opportunum tempus exhi-
bendi medicamenta menses mouentia esse, statim post balneum ad-
huc linteo inuolutis.*

De vteri suffocatione. CAP. LVII.

*Varia
nomina.*

VTeri suffocationem, alij strangulatum vteri, alij hysteri-
cam suffocationem, alij spirationis ob vterum ablatio-
nem, alij vterinam apnæam vocant (quam animi defectio præ-
cedit, ut docet Gal. 1. de arte curatiua ad Glauconem) quamuis
Stephanus Atheniensis discrimen esse inter apnæam, & vteri-
nam strangulationem velit, sit enim ipso dicente, apnæa ex su-
perfluitate se minis putrescentis, prauasque quasdam exhalatio-
nes, ac præsertim frigidas ad cor mittentis ipsum, atque ita spi-
rationem intercipientis. Contingit verò quandoque melancho-
licas exhalationes, quæ ex ipso semine feruntur sursum ad ce-
rebrum recurrere, symptomâque melancholica facere. Stran-
gulatione apud eum fit ex spasmo matricis sursum tractæ, & per
continuitatem intestina, ventriculum, septum transversum, ac
respiratoria alia membra comprimendis. Sed quia frequenter
ab vteri strangulatione fit morbus comitialis, & syncope per
consensum, propria, & vera huius affectus definitio erit hæc:
malum tunc accidens, cum vterus vaporis copia ita intendi-
tur, ut modò sursum modò in latus retrahi videatur. Eius dua-

Apnæa.

*Defini-
tio.*

Causa.

in vniuersum causæ sunt, retentum scilicet semen genitale, & *A semi-*
 mentruæ purgationes cessantes. Et licet nunquam hæc affe- *ne sape*
 ctio accadat, quin alterutri horum accepta referenda sit, fre- *cius sym-*
 quentiùs tamen euenire solet seminis detenti causa, & quæ ob *ptoma-*
 hanc causam fiunt vteri suffocationes, vehementiùs solent af- *ta.*
 fligere, & symptomata multò læuiora inducere, vt copiosè Gal.
 disp. 6. de locis affectis cap. 5. Quem locum si quis optimè con-
 sulat, multa quæ ad hanc affectionem pertinere videntur, & de
 speculatione digna sunt, dilucidè à Galeno tractata comperies:
 eos igitur ad eum librum remittimus, quicunque diligentes na-
 turæ inquisitores magna interdum admiratione tenentur, quæ-
 rentes quid fiat, vt cum in hac affectione intercepta nonnun-
 quam respiratio in totum sit, & arteriarum pulsatio intermissa:
 ægrotans tamen viuat, & paulò post ad solitas operationes, per-
 inde ac si tale quippiam non esset passa, reuertatur. Cur præte-
 rea tanta varietas accadat symptomatum pro intentionis remis-
 sionisque modo differentium, & quomodo detentum semen,
 cum mole quam minimum sit, tam grauium symptomatum sit
 causa. Quorum omnium quæstionum causas ibi leges: non
 enim breuitati studentes maluimus his omnibus prætermis-
 sis ad signorum enarrationem conuerti, quàm in iis, quæ ad artis
 opera non sunt necessaria, diutiùs immorari. Ex signis igitur *Nota*
 alia sunt, quæ ipsam accessionem solent præire, alia quæ comi-
 tari. Præire solent, & maximè cum accessio proxima est, men-
 tis torpor, pigritia, crurum imbecillitas, faciei pallor, aspectus
 mœstus. Comitantur hæc, quæ sequuntur laborantes. Interdum
 iacent sine sensu immobiles cum obscuro paruoque pulsu,
 vel omnino sine vlllo. Interdum sentiunt quidem, & mouentur,
 integræque sunt ratione: cæterùm animi defectione & diffi-
 cili spiratione laborant. Interdum verò, & crura, & brachia
 contrahuntur. Adest præterea inclinatio ad somnum, desipien-
 tia, detentio instrumentorum sensus, vox obmutescit, & con-
 uelluntur nonnunquam. Cum iam inclinat accessio, rubore
 suffundi malæ incipiunt, & oculi attolli, atque aperiri. Hu-
 miditas præterea quædam perceptibilis è mulieribus locel-
 lis excurrit: Intestina immurmurant, atque vterus ipse paula-
 tim laxatur, mente, scilicet, sensu, ac motu iam redeuntibus.
 Per circuitus malum hoc solet corripere infirmas, præcipuè
 eas, quæ viduæ sunt, aut alias viri concubitu sunt vix, & cum
 omni tempore poscit, maximè inuadit hyeme, & autumnò.
 Reliqua ex Gal. Paulo & Ætio sunt petenda. In accessione *Curatio*
 oportet vniuersum corpus perfricare, & extremas præcipuè in acces-
 partes infernas ligare, ægrotantque collocare, ceruico, & sca- *sione.*
 pulis

DE CVRAND. MORB.

pulis accliuioribus, & femoribus, & inguinibus decliuioribus. Naribus eius sunt admouenda foetida, vt funiculus lucernæ nuper extinctus, plumæ maximè perdicum, lancæ soleæ combuitæ, capilli, cornu capræ vstum, pix eliquata super carbones, galbanum, castoreum, assa foetida, vrina multorum dierum, & sulphur, quòd valentissimè excitat ad accessiõnem in qua rarõ sione est faciendã est vacuatio, nisi timeatur suffocatio & mors repentina: nam ad prohibendam eam necessaria esset sanguinis missio ex saphena, vel vena pedis, præsertim si ex suppressis mensibus sit morbus. Quæ etiam lternutamentum faciunt, naribus sunt admouenda, & vacuatio per acres clysteres non est negligenda, de quibus c. 12. de curat. apoplexiæ. Si à detento semine sit, curabit maritus, vel si non habet, nec possit, obstetrix suis digitis, & rebus aromaticis ad inferiora euocet vterum, & per vuluam frictionibus purget semen, si citra peccatum fieri possit hoc. Hæc mixtura est optima huic rei: ℞. olei de lilio, nardici, & cheyrini, an. ʒ. j. galix muscatæ, & alix muscatæ an. ʒ. j. musci, & ambræ an. ḡ. viij. zibeti ʒ. ʒ. miscẽ. In omni tamen causa in ipsa accessiõne pili pectinis radicatus, & vi magna sunt auellendi ad excitandum. Idem præstant cucurbitulæ coxis & tibiis affixæ, quæ si magna fuerit vmbilico affixa, vterum reducit ad propriam sedem, vaporesque à capite, & partibus superioribus auertit, trahitque ad inferiora: sed reducto vtero ad suum locum ad illius conseruationem debetam vmbilico sunt admouenda, quæ diximus cap. 54. de curatione procidentix vteri. Vel hoc: ℞. emplastri stomatocis quod s. galbani ʒ. ij. galix muscatæ ʒ. j. musci & ambræ an. ḡ. viij. misceantur omnia cum oleo sambucino, & extendantur super pannum coccineum ad formam rotundam pro vmbilico. Morbus comitialis, & syncope, si cum hac vteri suffocatione coniungantur, vt sæpe fit, curantur eo modo, quem diximus cap. 8. & 30. semper tamen habenda est prima curandi ratio partis eius, quæ prius affecta est, post aliarum quæ per consensum laborant.

Extra Extra accessiõnem ipsam curatur per causæ abscissionem, vt **accessio-** si ex suppressis mensibus nascatur, adhibeantur, quæ diximus **nem cu-** capite superiori. Si verò ex semine detento & corrupto, vocetur **ratio.** maritus. Si non possit viro vti, præcibus, & ieiunio curabitur. Nutriatur ergo pane, & aqua: menta tamen & ruta, & agnus castus semen minuunt. Ad purgationem vteri iniectus hic liquor ad modum clysteris instrumento argenteo est efficax remedium: ℞. aquæ naphæ, seu florum aranciorum, ℥. j. aquæ oxymi ʒ. iiij. galix muscatæ ʒ. ij. galbani ʒ. iij. musci, & ambræ an. ḡ. v. syru

v. syrupi de artemisia ʒ. iiii. croci puluerizati, cinnamomi & gariophyllorum an. ʒ. ʒ. misce.

Scholium.

Vteri suffocationem.] Per uterū singulis mensibus excerni Vteri re-
solet sanguis, ut superius docuimus: solet etiam, & ex testibus tractio
foemina semen in eius cavitate immitti, & ex his duobus principiis quomodo
(qua vicē habent causa efficiētis & materia) generatio omnis fieret. fiat.
Inde in corpore solent consortij lege ex utero tanquā ex radice va-
rij morbi prodire, cum aliqua ex diētis substantiis in utero abundat.
Si substantia qua abundat, sit sanguis menstruus ob aliquē affectū
retentus cū uteri venis, quae multae sunt, & magna repleantur, ute-
ri sequetur retractio, recta, si ex aquo vena sanguine abundet, si ve-
rō non ex aquo, sed solūm unius partis vena, versus illam partem
uterus retrahetur, ita ut semper uterus sursum aliquantulū recur-
rat. Addo aliquantulum, quia eiuꝝ ligamenta nō patiuntur ipsum
multum eleuari. Hic sanguis detentus, si putrescat, febrem synochū Sanguis
accendit, quae ex hac sola parte accidit, ob venas quae multae & mēstruus
magna sunt, ut docet Gal. lib. 6. epid. part. 1. com. 2. Si sine putre- putrefa-
dine corrumpatur sanguis, si sit biliosus & acris, solet ad princi- ctus &
piūm nervorum mittere vapores, & eo nomine motus convulsuos detentus
efficere: aut ad cerebrum eos mittens, convulsionem uniuersalem, feb. syno-
qua dicitur epilepsia. Quod si aliquando vera eueniat convulsio, id chū pa-
proueniet, quia in corpore disposito, agitatione humor motus & rit.
fluens replebit nervosa corpora. Si sanguis sit melancholicus, ex va- Sympto-
poribus eius cerebrum petentibus melancholica deliria excitantur, mala
sicut ex pituitoso sanguine sopores. Quod si multi vapores septum qua se-
comprimant, efficiunt (sicut in gravidis, & his qui ob alimenti copiā quantur
distentum habent ventriculum) difficilem respirationem, non autē ex isto
suffocationem, quam à vaporibus gutturis musculos replentibus, sanguine
fieri existimo. Quod colligo, quia quae hanc affectionem patiuntur bilioso.
mulieres eas partes habent eleuatas, & manus ipsis adhibent, indi- Quomo-
cantes molestiam & suffocationem. Refrigerationem tetius corporis, do suffo-
quam comitatur respirationis (quoad sensum) priuatio, sanguis de- catio v-
tentus nunquā efficiet, neque Galenus lib. 6. affectionum loc. vbi ex teri con-
professo de hac materia disputat, id significauit, nisi dixerimus san- tingat.
guinē aliquando venenatam induere naturā, & eius vapores cor-
dis caliditatem celeriter extinguere. Nā si alter sanguis mēstruus
detentus refrigerare posset cor, cum frequēter supprimatur, frequē-
ter etiam cor refrigeraret. At rarissimē, aut nunquam cōtingit uni
medico etiam multis annis excrecenti medicinā eam videre, & tunc
in vidua, aut virgine. Si substantia, quae in utero abundat, semē sit,
tunc nō contingit retractio, quia vasculum spermaticorū sola disten-

DE CVRAND. MORB.

tio id non poterit prastare, ut ex affec. 6. colliges, quod non rectè cõ-
 sideravit Rondoletius, Neque retrahetur uterus (ut sentit Valle-
 zij error. sius) eo quod ob appetitum veneris extendatur, sicut pene in viris:
 Vallesius quia ob talem appetitum non retrahitur, inò descendit versus col-
 reprehẽ- lum uteri, ut cum virili mēbro iungatur. Quod similitudine osten-
 ditur. dit Galenus libro 1. de semine c. 5. ex v. t. r. iculo de sumptis: hic enim
 Semen quando appetit cum fundo suo ad stomachum recurrit. Si ergo se-
 putrefa- men retentum putrefiat venenata putredine, vapores ex eo ascen-
 dũ qua dentes cum toto temperamento contrarij sint, & corruptrices, cali-
 sequan- dum innatum cordis extinguentes, totum corpus refrigerant, ita ut
 tur. sequatur respirationis (quoad sensum) abolitio, qua omnino viuẽte
 animali non potest cessare, Quod si semen non ita prave corrumpa-
 tur, prout fuerint vapores ex eo ascendentes, aut acres, aut aliã ha-
 bentes qualitatem, sequetur animi deliquium & alia symptomata
 peiora, quàm sint illa, qua ex sanguine retento afficiunt: quia cor-
 ruptio seminis peior est sanguinis corruptione, ut experientia docet
 in symptomatis, qua viduis cucnire solent. Ex his, qua diximus, in-
 telliges, quàm malè Altomarius, Rondoletius, & alij sequuti Paulũ
 Error suffocationem uteri appellant uteri retractionem: cum neque ex re-
 Pauli & tractione suffocatio sequatur, neque in ea suffocatione, qua ex semi-
 aliorum tractione suffocatio sequatur, neque in ea suffocatione, qua ex semi-
 de uteri ne retento sit, retractio contingat. Nec minys errant existimantes
 suffoca- symptomata in suffocatione uteri euenientia fieri, ex eo quod semẽ
 zione. aut sanguis menstruus ex retẽtione, & mora refrigerantur, refrige-
 rẽntque uterum, & simul alteratione, aut vapore medio cor, & ce-
 rebrũ. Non enim est necesse, ut semen, aut sanguis refrigeretur, quia
 hac ratione semper in suffocatione uteri sequeretur corporis refrige-
 ratio, quod falsum esse supra vidisti. Adde ex prædictarum substã-
 tiarum frigiditate, non posse sequi tãtam corporis refrigerationem,
 qua ad pituitam vitream, quam frigidiorẽ esse certum est, nun-
 quam sequitur. Et ita tam magna in corpore frigiditas maiorem
 causam arguit. Posset quis per contrarium dicere, semen uteri suf-
 focationem efficit, ubi immoratur. Respondet Rondoletius, non reti-
 neri semen in vasis spermaticis, quia ibi conservatur, aut in eorum
 alimentum absimitur: sed in cavitate uteri, ubi quando grauat
 Rõdole- quantitate sua, inter somniandũ expellitur. Hac sententia mihi vi-
 zij sen- detur falsa, quia in viris ex retento semine in vasis spermaticis, vi-
 tentia. demus sequi capitis gravitatem, corporis pigritiam, inappetentiam,
 & alia symptomata. Secundo, si semen in cavitate uteri cõtinetur,
 ergo per eius os effluet, neque enim retinebitur ab utero, cum solũ
 non possit conceptum efficere, sine maris semine. Tertio etiam si non
 Rõdole- somniet mulier, si semen peccat quantitate poterit expelli. Dicen-
 tij sen- dum ergo erit semen retineri in vasis spermaticis & glandulis illis,
 falsa. quarum meminit Fallopius, qua ad seruandum semen videntur
 facta.

facta. Symptomata varia, qua in uteri suffocatione apparent, quem morbum uteri sequuntur. Altomarius uteri suffocationē dicit esse morbum in situ. Qui maximè decipitur, quia ea uteri retractio non Altom-
ladi actionem, neque ex ea symptomata prædicta lege consortij se-
ri error
quuntur. Alij eam, intemperiem frigidam esse fatentur. Qui etiam Alij ta-
errant, quia ut iam probauimus, uterus non refrigeratur in uteri xantur.
suffocatione. Obiicies, nonne in suffocatione uteri eleuantur flatus,
qui à diminuto calore ortum habent. Respondeo, uteri calorem,
comparatum ad multam substantiam ibi detentam, dici langui-
dum, non quòd talis sit in sua essentia. Ego in uteri suffocatione, in Auctori
utero non unum morbum, sed multos esse existimo. Si uteri suffo- sentēias
catio, à sanguine retento eueniat, varios poterit habere morbos, quos de uteri
capite de menstrua retentione uidebis. Si à semine oriatur, distin- suffoca-
guere oportet. Non enim semen retentum & corruptum (etsi ex eo tione.
sequantur aliqua accidentia) semper est morbus, sicut neque cibus
corruptus in ventre, etsi ex eo vertigo, dolor capitis, & alia sequan-
tur. Quia quando accidentia sunt exigua, videntur esse intra limi-
tes sanitatis: & tunc semen, & cibus afficiunt nos ea ratione, qua
causa externa. Quomodo uero symptomata magna sunt, molestēque
afficiunt, sequuntur tunc morbum in numero addito, semen enim
est pars addita præter naturam ea ratione, qua cibus corruptus in
ventre, & humor in atheromate, steatheomate, & meliceride.

In accessione oportet vniuersum corpus perfricare.] Ante
accessionem proposuit auctor aliqua signa ex Aëtio desumpta: qua
non sunt inseparabilia, nam aliquando ridentibus, & ludenti-
bus feminis, repente præhendit accessio. In accessione si sit corporis fri-
giditas, non licet sanguinem mittere, quia illa non est sine animi
deliquio. Ea non existente ex pede sanguinem educes.

Si à detento semine sit.] Si suffocatio proueniat à detento se- In suffo-
mine, non mittes sanguinem, quia sanguinis missio non euacuat se- catione à
men. An uero liceat fricatione facta in pudendo, irritare naturam, semine
ad expellendum semen, Theologis discutiendum relinquo. Solum sanguis
illis aduertendum propono ut meliùs iudicare possint) semen quod non mit-
eo tempore irritatione excernitur, foeminis inuitis, aut saltem non tendus.
consentientibus excerni.

Et secundò illud semen, iam non esse prolificum, imò uenerum,
& corporis excrementum inutile, & multorum malorum, imò sa-
pe certe mortis occasionem.

De Mola in utero. CAP. LVIII.

MOla, Authore Galeno. infernis quædam caro est, aut si Descri-
mauis cum Aëtio, & Paulo, affectus quidam uteri ad prie-
scyrthi

Cause. scyrthi naturam tendens nunc in yteri ostiolo, nunc in toto ipso ad tactum lapidosus apparens, à motus autem difficultate, & grauitate molæ nomen assumpsit. Fit hoc mali genus interdum post inflammationem præcedentem eueniens, interdum post locale vlcus, cui raro supercreuerit. Nas citur etiam à semine muliebri, & sanguine menstruo ad vterum utroque fluente, atque retento ibique caloris immodici vi tum coacto, tum in carnis formam transmutato. Signa ab Ætio sic ponuntur. Affectū tumor immitis consequitur cum hypochondriorum retractione, gracilitate, decoloratione, appetendique deiectione, ac primo conceptionis opinio suboritur: nam & menses supprimuntur, mammae intumescunt, stomachus euertitur, lumbi grauantur, venter attollitur: temporis verò progressu discernitur: molam enim dolor punctiōis sensum inferens, subsequitur, nec in ea motus vllus, sicut in vero conceptu percipitur, post toto corpore diminuto, & ventre ampliato certa hydropis imago deprehenditur, à qua tamen distinguitur: neque enim hic ut in hydrope magnus impulsu tumor recedit, aut excauatur, aut tympani sonum reddit, neque eiusdem manus concursu vlla fluctuatio percipitur: interdum tamen tempore præcedente iecur refrigeratur, & hydrops superuenit: animaduertere tamen oportet, hæc omnia signa, ne cum sene 135. annos nato Auenzoar, & doctissimo Matthæo de Gradi, decipiamur: ille uxorem vterum gerentem purgavit sexto mense: hic verò vxoris partum ad decimum tertium mensem expectauit: quæ post mola laborare inuenta, optimè ab eodem curata fuit.

Nota.

Curatio. Curator vteri mola victu earum, quæ mensibus detentis laborant, de quibus cap. 56. diximus, post remediis euocantibus menses, de quibus eodem cap. Si ob flatum fiat mola (ut

Historia contingit cuidam fœminæ Iudææ Olysiponensi, quæ arbitratæ se fœtum in vtero habere, ventum tantum peperit) curatur primo frequenti vacuatione per elephataginas pilulas,

Pilula elephatagina. quæ in hac & omni fœme causa obtinet principatum. Euacuato corpore flatus dissipandus est diacymino, diagalanga,

Clyster flatum potenter dissipās. dianthos cum decocto camomillæ, seminis fœniculi, capilli veneris, & artemisiæ. Clyster hic valenter dissipat flatum. ℞. camomillæ p. j. baccarum lauri, anethi, cymini, seminis fœniculi, & anisi an. ʒ. j. anthos, stichados calendulæ an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ʒ. x. cui adde diamusci dulcis, & diagalangæ an. ʒ. ʒ. misce, & fiat clyster. Si in vterum iniiciatur aliquid prædictæ mixturæ purgabit flatum vteri. Pessi ex rebus dictis cap. 56. sunt optimi huic quoque morbo: ut ℞. pulu. seminis melanthij cardamomi ana.

Pessi.

3. j. pulueris euphorbij, & castorei an. 3. ss. succi mercurialis, & terebinthinæ, an. quod sufficit, misce, & fiant cum lana, vel gossypio duo pessi longi.

Scholium.

Mola auctore Gal.] Nomine mola non intelligimus cū Pau- Quid
lo tumore vteri, sed cū Gal. 14. de usu. par. cap. 7. carnem nomine
inutilem, atque informem. Qua inutilis dicitur, quia nec est pars mola in
corporis, nec ex ea animal fit: informis verò, quia nec alicuius ani- telligen-
malis figurā seruat. Hac mola ex Syluij sententia (in lib. de hem. na- dum.
tura, in Scholio illius sententia, qua sic habet. Primum igitur necesse
est, &c.) Fit à sola foemina, sine masculi semine, ea ratione, qua oua
hyphenemia, hoc est subuentanea appellata, ex gallina sine galli coi-
tu. Errat tamen Syluius ut ex prædicto Galeni loco intelliges, in eo
enim probat bene posse in volucribus animalibus, solam foeminam
formam artificiosam induere, ob eorum caliditatem & siccitatem:
non autem in gressilibus, in quibus, ob humiditatem foemina corpus
omniò est imbecillum. Mola morbus est in numero, est enim pars Mola
addita in corpore toto genere præter naturam ex 14. method. cap. quis
13. Quod videtur falsum, quia si mola est caro, erit ergo pars ad- morbus.
dita toto genere secundum naturam ea ratione qua sextus digitus.
Respondeo, molam non esse veram carnem, aut si concedamus esse
carnem, Galenum eam appellare toto genere præter naturam, quia
non habet formationem, quam sextum digitum habere videmus.
Mola non fit sine coitu, ita tamen, ut viri semen sit modicum, &
morbosum, quod incipiat motum conceptui tribuere, & non perfi-
ciat. Ab hoc semine fit membrana chorion, qua multis vasis adha-
ret utero, quibus mola viuens attrahit sanguinem, quo nutritur,
& augetur, ita ut vteri conceptus spem non adimat: proinde non re-
ctè Vega existimat, molam augeri non nutritione, sed appositione, &
agglutinatione. Solet tamen mola, ex venis multum attrahere (po- mola ma-
tissimū in principio) & hac ratione iecore refrigerato sicut in copiosa gna at-
euacuatione) hydrops sequi. Ex hac etiam valida mola attractione tractid.
fit, ut in principio sua generationis in mammis non coaccruetur lac,
quamuis deinceps copiosū generetur. Ex his colliges difficile esse co-
gnoscere, an mulier conceperit necne: videmus enim in mola genera-
tione, & suppressione menstruorum, s. qui generationē lactis. augmē-
tum māmillarum, tumorem in ventre, & flatum in eo motum. Ac
proinde non est mirum, si libro 4. epyd. uxor Antigenis ignoraret, an
pregnans esset: & similiter Himene soror, qua ex suppressis mēsis
intenta habebat hypocondria. Altomarius & alij mola causam
materialem, semen & sanguinem efficientem modicum ca-
lorem

Mola non à calore fit, ut vult Alzomarius, sed à temperamento seminis. *lore statuunt. Errant tamen, quia calor est instrumentum mola, qua à temperamento seminis, & sanguinis ea ratione, qua verus conceptus generatur, aliter non viueret, quia qua à calore crescunt, non viuunt. Curabitur mola, si auferatur, cum sit res inutilis addita. Auferetur verò medicamentis, eisdem, quibus secundas retentas expellimus.*

De partu laborioso, & secundis detentis.

C A P. LIX.

Causas & notas pete à Rhodione. *Curatio Ante partum Viſtus.* *Balneũ.* *Fotus.* *Qua facile partum faciunt.* *Impediẽtia partum.* *Iuxta partum viſtus.* *Vnguentum.* *Lapis aquila.* *Causa laborioſi partus.* **H**VIUS rei copioſam, & neceſſariam doctrinam ſcriptam reliquit Eucharis Rhodio ſuo lib. de hominis partu, in quo cuiuſlibet partus naturalis, & non naturalis formas depinxit, nos tamen omiſſis cauſis, & ſignis breuitati ſtudentes, & ſuo ordine curationem tantum indicabimus. Quando tempus pariendi accedit, vterum gerens vtatur exercitatione moderata, nutriaturque alimentis facilibus concoctu, & mollientibus, quales ſunt vux paſſæ ſine granis, caricæ, pruna, vux, butyrum, malua, ius pingue. Balneum quoque ex decocto rerum mollientium eſt optimum, & neceſſarium, & fotus partis inferioris vtero proxima, cuiuſmodi ſunt malua, biſmalua, ſemen lini, fœnugræcum, vux paſſæ ſine granis, caricæ, melilotum, & ſimilia. Amet ea quæ partum facile faciunt, cuiuſmodi ſunt lapis ſmaragdus, iaſpis, corallus, ſtorax, radix cyclamini, & radix artemiſiæ ſiniſtræ coxæ alligata. Abſtineat ab iis, quæ partum impediunt, vt eſt aër frigidus comprimendo, & intenſe calidus vires matris, & fœtus diſſoluendo. Pyra à toto ſubſtantia impediunt partum, etiam ſi non comedantur. Cùm tempus pariendi appropinquat prægnans ambulet pedetentium per loca decliua, & initio partus bibat ius pinguis gallinæ cum facultate ſeminis lini, vel fœnugræci, addendo parum croci, vel cinnamomi, & parum vini albi generoſi, vel rubri mediocriſ ſubſtantia. Partes etiam ventris inferioris, pudenda hoc vnguento bene calido vngantur ℥. olei ſiſamini, amygdalarum dulcium, & de ſemine lini an. ʒ. j. vtriuſque dialthææ, hyſſopi humidæ an. ʒ. ſſ. mucilaginis fœnugræci, & ſeminis lini an. ʒ. ij. axungia gallinæ, & anatis an. ʒ. j. ſſ. croci puluerizati ʒ. ſſ. ceræ. q. ſ. miſce, & fiat vnguentum. Comprimere anhelitum verſus inferiora facilem partum reddit. Lapis aquilæ ſuſpenſus de coxa parturientis valenter trahit fœtum non ſolum viuum, ſed mortuum, & ſecundas ipſas: oportet tamen poſt partum ſtatim lapidem amouere à coxa, ne attrahat ad ſe vterum. Difficilis partus fit vel ob defectum

Etum matris, vel vitium foetus, vel secundarum. Si vitio parientis, quia nimis crassa sit, vel animo pusillo, aut in experta dolo-rem, aut suapte natura imbecilla, aut habeat vterum exiguum ob ætatem, aut propter errorem in compositione, aut quia laborat vteri inflammatione, vel aliarum partium vtero proximarum. Si ob primam causam, ante partum est emacianda ciborum paucitate, & multo labore, multis vigiliis, & curis. Si sit timida, animus addendus est. Si doloribus non assuefacta, validissime spiritum comprimat, & locus vteri superiori vnguento, vel huic simili benè vngatur. Si imbecilla sit, optimo iure caponum, vel gallinarum, & aqua carniū, vino bono, & odoribus nutriatur. Si ob paruitatem vteri, superiori vnguento, vel oleo communi, vel iure pingui, & similibus mollientibus partes pudendæ vngantur sæpè, benè humectatæ, & *Curatio* mollitæ extendantur satis, & aperiantur in partu. Si ab inflam- *per cau-* matione, vel alio vteri morbo propriam pete curationem. Si *sarum* vitio foetus difficilis reddatur partus, quia magnus sit vterus, & *abscissio-* pudendum foru, balneo, vnguento vterum mollientium egent, *nem.* ut diximus, in exiguo vtero. Si ob figuram naturæ aduersam, *Figura* educatur ad naturalem figuram: est enim naturalis figura par- *natura-* tus, quando caput foetus à principio, deinde reliqua membra *lis par-* manibus super fœmoribus porrectis, & capite in neutram par- *tus.* tem declinante egrediuntur. Proxima huic figura est, quando pedes ambo priores apparent, & manus non suprà fœmora, sed in sublimine erectæ fuerint. Aliæ omnes figuræ præter has duas à natura abhorrent, quas omnes Eucharius Rhodio exactissime suo libro demonstravit. Quando igitur est figura naturæ contraria, à docta obstetrice habente manus, & digitos longos, & graciles, vel à pastore prudenti, & sene reducatur in primam figuram naturalem & omnium optimam, vel in secundam ei proximam, si figura non naturalis sit ei propinquior. Deinde *Admo-* expectabis partum naturalem, & verbis blandis bonam spem *nitio,* fœlicis partus, & masculi, quo omnes ferè mulieres gaudent, dabis: & si opus fuerit, vterum & vias omni arte aperies, partumque facilem reddes. Inter alia tamen excitanda est sternutatio parienti. Multa sunt præterea, quæ partum facilem reddunt præter superius dicta, quorum aliqua à multis experta, & laudata in præsentia adducam. Si ob foetus imbecillitatem fiat difficilis partus, corroborandus est per restaurationem matris, de qua superius dictum est, & præter illa pariens hoc pulvere cum optimo iure corroboranda est. *Pulvis.* ℞. cinnamomi electi, cassiæ lignæ, croci an. ʒ. j. ossium de corde cerui, & spicæ an. ʒ. ʒ. ambre & musci an. ʒ. x. sacchari *Fœtus* optimi

DE CVRAND. MORB.

*mortui
signa.
Expellē-
tia mor-
tuum
fœtum,*

*Lac hu-
manum,
Dicta-
mus.
Euphor-
bium.
Suffitus.*

*Vngula,
& ster-
cus asi-
ni, spo-
lium ser-
pentis.
Pessi.*

*Succus.
callitrici*

*Obste-
rix.*

*Ad se-
cundinā*

optimi ad pondus omnium, misce, & fiat pulvis. Dosis scrupu-
lus vnus. Si fœtus fuerit mortuus, quod cognosces frigidita-
te ventris inferioris, motu rei grauis ad motum matris, & fœ-
tore narium, & oris matris, hoc potu expelletur. ℞. pulueris
assæ fœtidæ, & castorei an. ʒ. j. aquæ sauinæ. ʒ. ij. syrupi ca-
pilli veneris ʒ. j. ʒ. misce, & fiat potus. Hoc quoque medica-
mentum valenter educit fœtum viuum, & mortuum: in viuo
tamen educendo mitiora sunt necessaria. ℞. myrrhæ, castorci
storacis an. ʒ. j. ʒ. cinnamomi, seminis, vel foliorum sauinæ
an. ʒ. j. mellis q. s. misce, & fiat confectio. Dosis ʒ. ij. cum
vino albo, vel aqua quinque radicum diureticarum, vel alia
simili. Hoc medicamentum fœtum expellit clementius tamen
quàm duo superiora. ℞. assæ fœtidæ ʒ. ʒ. rutæ sicca ʒ. ij.
myrrhæ ʒ. ij. misce. Dosis ʒ. j. ʒ. cum generoso vino. Lac hu-
manum, si bibatur, expellit fœtum autore Arnaldo de Villano-
ua: est enim tutissimum auxilium, & clementissimum. Drach-
mæ duæ succi dictami, vel pulueris eius cum vino vel aqua ca-
lida expellit fœtum sine violentia. Drachma vna euphorbij a-
bortum inducit, & fœtum violenter extrahit. Suffitus huius me-
dicamenti frequens, & instrumento conueniente immissus e-
ducit fœtum viuum, & mortuum. ℞. timiamat, ameos, opopa-
naxis, galbani, sulphuris viui an. ʒ. ij. cum felle vaccæ fiant for-
mulæ cicerales, vel ad formam lupinorum. Suffitus vngulæ a-
sini, vel stercoreis eiusdem fœtum educit. Suffitus spolijs serpen-
tis similiter fœtum educit. Hi pessi molam vteri dissipant, &
expellunt valenter, & fœtum quoque. ℞. armoniaci, opopana-
cis, hellebori nigri, saxifragiæ, aristolochiæ longæ, & rotundæ,
pulpæ coloquintidæ an. ʒ. j. succi rutæ, cucumeris syluestris, &
fellis vaccini an. partes æquales, terebinthinæ parum misce, &
cum lana, vel gossypio fiant pessi longi. Pessus ex succo rutæ
& scammonio educit fœtum, sed minùs valenter quàm superio-
res. Succus gallitrici iniectus in vterum sanguinis profluuium
illius prohibet, quod partum laboriosum præcipuè post acria
medicamenta, sequi sæpè solet. Si ob secundarum crassitiem
partus sit difficilis, quia non auclluntur, neque abrumpuntur,
obstetrix prudens digitis propriis, vel forcipibus eas scindat,
vt fœtus egredi possit. Si verò ob earum tenuitatem ante de-
bitum tempus rumpantur, & humor collectus in vtero fluat,
& tandem vulua, & viæ sicciore factæ partum difficilem effi-
ciant, oportebit pudendum, & partes iuxta vterum vnguen-
tis, fotibus, incessibus, & balneis iam dictis humectare, & vias
aperire.

Si à partu in vtero secundina detenta sit, summo studio
educenda

educenda est, non tamen subito & violenter, vt multi imperiti faciunt: enixa enim fatigata labore partus benignè tractanda est, ne simul anima, & secundina educantur, vel prius anima agatur, multis enim diebus viuunt enixæ non expulsis secundis, quas potest natura sensim, & multò tempore expellere. Quiescat ergo enixa, & mente confirmetur, & statim à partu *Oleum* bibat libram feminis olei communis, cum drachma vna croci puluerizati, post, vomitu, tussi, sternutatione, & anhelitus compressione excitetur expultrix facultas ad expellendam secundinam. Si tamen his non educatur, enixa nutriatur iure optimo *Vomitus, tussis, sternutatio, anhelitus, dictio.* caponum, vel gallinarum, aqua carnis, ouis recentibus, vino optimo, & aubus montanis. Vteri locus infessibus, vnctionibus, & fetibus rerum mollientium est parandus, vt dictum est *Infessus.* superius in partu difficili. Post quæ foetus mortuum expellunt, conferunt, qualia sunt superius dicta, & præter illa, infessus ex decocto foliorum, & granorum, aliorum foliorum vñem (est herba similis vermiculari sapore salso, ex qua fit sal) camomillæ, & foliorum ebuli educit secundinam. *Pessus, Vnguentum.* Pessus, & vnguentum ex leporis coagulo, & croco pudendo admotum secundinam educit. Suffitus spoliij serpentis, idem præstat, & cataplasma ex eodem spolio serpentis cum ruta, artemisia, & absinthio *Spolium serpentis.* coxæ admotum, & vuluæ secundinam educit. Suffitus vngulæ asinæ, & capræ, stercoris bubulli, columbini, seminis porri, alij corticis, minoris pini, hellebori, aristolochiæ longæ, nigellæ, & *Suffitus, Infessus.* similium educit valenter secundinam. Infessus, vel suffitus, seu euaporatio ex decocto rutæ, prassij, abrotani cum oleo de lilio *Infessus, Suffitus.* extrahit secundinam. Pessus, & clysteres ex allio: aspalto, assa fœtida, balsamo, stercore accipitris, galbano, gentiana, serapino, *Pessus, Clyster.* scammonio, vite alba ireos, & succo dictami: omnibus simul vel aliquo ex his secundinam educunt. Vnciæ duæ succi ex aliquo horum medicamentorum valenter educunt secundinam dictam scilicet, artemisiæ, politrichi, petroselini, prassij, mercurialis, verbenæ, porri, rutæ, pulegij, hypericonis, & similium. *Pulvis potentissimus.* Drachma vna pulueris huius cum vino optimo, vel aqua diu-dauci, dictami, seminis porri, pulueris lumbricorum terrestrium *Balsamum.* an. 3. ij. misce, & fiat pulvis, qui obtinet principatum in hoc morbo. Balsamum sumptum secundinam expellit, & efficit foetum minam sterilem, vt quorundam fert opinio.

Scholium.

HVius rei copiosam.] Ex Gal. 3. de nat. fac. cap. nouem mensibus plerisque mulieribus perficitur in utero foetus. Vbi nomine perfectionis foetus, non generationem, sed eius augmentum intelligit, quod est finis retentionis uteri. Foetus absolutus, cum iam per os nutriri possit 15. de usurp. c. 7. moleque sua molestus sit utero, manibus & pedibus motu membranam primò internam (qua ei contigua est) rumpit, & deinde alias: quo tempore postulante usu, os uteri dilatatur, à vinculisque absolutus, foras procedit suo pòdere, & nixu, expulsus etiam ab utero, & matre adiuuante contrahendo musculos abdominis. Vnde ad optimũ & facilem partũ hac omnia concurrant opus est. Primò orificium uteri expeditũ. Secundò motus foetus, quo rumpat mēbranas: figura eius accommodata, ita ut prius caput, & deinde totũ corpus, manibus ad latera adherentibus egrediatur, aut prius pedes, manibus sursum eleuatis: numerus etiã foetus si unus egrediatur: & ultimò magnitudo mediocris, ut possit per os uteri egredi. Tertiò necessum est ut membrana foetum obuoluentes, nec sint nimis dura, nec molles. Quarto uteri robur. Vltimò robur matris ad tolerandos dolores, & comprimendum abdominis musculos. Hinc partus difficilis varias causas colliges. Prima in uteri ore consistit, quando angustum est, distortum, tumore affectum, aut aliquã contraxit duritiem. Secũda, in foetus praua figura, qualis est omnis alia à supradictis: in amisso, aut languido eius motu, cum mortuus est aut imbecillus: in magnitudine modũ excedente: & in numero cum multi foetus in utero continentur: viuit enim adhuc hoc anno qua est 1579. mulier Salustra nomine, obesa, & statura humilis, qua nouem uno partu enixa est quod nonnullis semel, sed bis ei euenisse certissimè scio. Tertia causa est, membranarum durities, qua difficulter rumpuntur, aut mollities ob quam eis ante tempus ruptis egressaque urina tempore partus via non lubrica, simulque deficit utero humor ipsum ad expulsionem etiam irritans. Quarta imbecillitas expultricis uteri, qua ab intemperie oriri solet. Vltima verò causa in foemina pariente consistit, cum languida est, aut malè tolerat labores.

Quomo- do fiat partus. Si à partu in utero secundina detenta sit.] Tribus membranarum tenuibus obuoluitur foetus, dum est in utero.

Partus facilis causa. Prima qua eius adharet cuti Annion appellatur, à molliie. Hac veluti sudorẽ foetus excipit, in quo veluti innatans vehitur, ita ut minùs grauis utero sit. Altera subsequitur tenuissima, quã allãtoidem nuncupant, à similitudine farciminis quod allas dicitur. Hac ad vesicam est peruia, & ideo facta ut urinã pueri coaceruet. Tertia & externa tenuis, sed foris reliquas duas & fortum ambit.

Difficilis partus varia causa. Hanc

Hanc Græci chorion (quod est radicatio) appellāt, quia in ipsā innumera vena radican- tur: Latini secundā, aut secundas quia videntur esse secundū domicilium fœtus ab utero. Hac falcrum est venarum & arteriarum, quæ tandem in venam umbilici degenerant, & respondent venis, & arteriis uteri, ita ut ora oris adhæreant, quibus fœtus utero alligatur. In huius membrana historia, Vesalius duplici nomine reprehendit Gal. Primò quòd putarit Galenus hanc membranam ex semine fieri, cum fiat potius ex sanguine, & eius substantia non sit membrano- sa, sed carnosā, carni lienis simillima. Secundo, quòd dixerit hanc membranam totum fœtum obuoluerē, cum tantum à mucronata cartilagine, usque ad os pubis fœtus obducatur. Male tamen reprehenditur Galenus à Vesalio, quia Vesalius chorion membrana ex semine ortum habet, & totum obuoluit fœtū. reprehēdit Gal. Deceptus autem fuit Vesalius, existimans membranam hanc non esse rem distinctam à substantia carnosā ei adharente, quam distinctam esse ex primo de semine, & 4. de usu pa. colliges. Defen- ditur brana quæ fœtum uterum iam egresso, aliquando interiùs remanet. Gal. quam oportet extrahere ea ratione, quæ docet autor.

De ramice, seu hernia

CAP. LX.

Descri-
ptio.

QUum peritonæum (quam Arabes membranam sifach nominant) qua parte vasis seminariis peruium est, aut laxatur, aut etiam rumpitur, ita ut aliquid vel in inguinā, vel in scrotum descendat, ægritudo fit, quæ Græcis cele, Latinis tum ramex, tum hernia dicitur, barbaris ruptura. Porro cum variè hæc affectio contingat: plures enim eius numerantur differentiæ pro corporum, & substantiarum ad scrotum, aut ad inguina deuolutarum natura, iis omnibus nomina imponuntur: nam si intestinum descendit, enterocèle, hoc est intestini ramex: si omentum, epiplocele. i. omenti ramex: si aqua, hydrocele, hoc est aquosus ramex: si melancholicus sanguis in vasorū anfractibus colligitur, circocele, id est, varicosus ramex: si spiritus, pneumatocèle, hoc est flatusosus ramex, denique si caro dura intra testium tunicas increfcit, sarcocèle, hoc est, ramex carnosus dicitur.

Differen-
tiæ va-
ria.

Causa.

Fit hoc morbi genus multis de causis: nam quod in inguinā, aut in scrotum, tum intestina, tum etiam omentum descendant, perinde ac in enterocèle, & bubonocèle contingit, occasionem præbere solēt multa: cuiusmodi sūt ictus, saltus, clamor, immēsa alicuius molis sublatio, & quicquid huiusmodi corpori, aut extrinsecus, aut intrinsecus potest accidere: ab his enim causis facile peritonæum aut extēditur, aut laceratur. Cōmunes autem notæ v- triq; intestinorū inquā, & inguinis ramici hæc sūt. Tumor in in- guine, vel scroto cōspicius ceratur, & in exercitationibus, itine-

Nota.

DE CVRAND. MORB.

re spiritus retentione , & aliis occasionibus maior quàm ante apparens, qui sic comprimatur , tardè quidem recurrit , celeriter autem rursus deuoluitur. Cæterùm quò diiudices, num propter peritonæi extensionem ramex sit factus , an propter eiusdem ruptionem , animaduertere oportebit, quoties ob extensionem peritonæi ramex obortus sit , intestinum non vniuersim , sed particulatim temporis spatio , & ob causas quilibet deuolui , tumoremque æquabilem , ac profundum apparere intestino , quod deuolutum est , peritonæo costricto: secus sit , quum vniuersim deuoluitur , idque ob causas violentas duntaxat. Tumor præterea immensæ magnitudinis, inæqualisque in cute protinus eminet, quod scilicet intestina extra peritonæum elabuntur. Aquosi ramicis causæ simul ac notæ, & differentiæ apud Aëtium libr. 14. & 22. hunc in modum leguntur. Hernia aquosa quandoque ex occulta, quandoque ex manifesta causa contingit, ex occulta quidem quum aquosus humor circa partes corpusculorum , quæ scrotum contexunt , ac implicant sanguini admixtus collectus fuerit. Ex manifesta verò , quum ex plaga collisis, aut fractis vasis sanguis affluens ad aquosam substantiam transmutatur. Vbi igitur sponte constiterit aquosus humor collectus , subflauus , aut sup pallidus is inuenitur. Vbi verò ex plaga, cruentam , ac faeculentam materiam reperiēs. Humor autem vel intra rubicundam testiculi pelliculam consistit , vel extra ipsam inter eam & pelliculas adiacentes , vel in propria pellicula velut vesica quædam continetur , atque hoc genus herniam in tunica superagnatam vocamus. Aliquando verò duplex hernia oboritur , cum collectio & in rubicunda tunica , & in superagnata consistit: siquidem igitur in pellicula rubicunda humor collectus fuerit, tumor vnus coloris apparet sine dolore, in principio dum adhuc parua est collectio ad contactum cedens: postea verò aucta collectione testiculus humore vndique circumdatus occultatur: at tumor in ambitu extensus ac renitens ad tactum herniæ carnosæ suspicionem imperitis exhibet, possunt tamen tactu discerni: nam hernia carnosæ omninò renititur, sed aquosa digitis cedit. Si verò in superagnata tunica humor colligatur, tumor ipse siue magnus, siue paruus fuerit omnino circumscribetur: at si simul quoque in rubicunda tunica collectus fuerit, duo tumoresprehenduntur, alter in superagnata, alter in rubicunda pellicula.

Quòd si extra rubicundam pelliculam collectio fiat, testiculus tactui occurrit. Cæterùm ab hernia aquosa differt
her

hernia intestinorum, quoniam in aquosa tumor eiusdem peritus magnitudinis semper, & quolibet corporis situ persistit: neque enim humores velut intestina transferuntur. Inguen prætereà in hernia aquosa secundum naturam se habet, qua nota vel maximè aquosa ab omenti hernia distinguitur: nam in hernia omenti semper in scroto omentum persistit: neque unquam transfertur, id quod etiam in aquosa contingit. Verùm in omenti hernia inguen rarefactum deprehenditur. Atque hæc de ramice sunt satis: nam quæ de aliis speciebus dici poterant, cum vel ex iis, quæ supradicta sunt patere possint, superuacaneum esset hîc scribere: qui plenioram tamen disputationem desiderant, adeant Aëtij librum 14. & Galeni medendi methodum.

Flutuosa hernia curatur primò, victu calfaciente ægri, & *Curatio* nutritis si fuerit infans: secundò dissipantibus flatum internis, *flatuosa* & externis, qualia sunt rosata nouella, armoniacum, rosarum, diacyminum, diagalanga, dianthos, electuarium de baccis lauri. Infans qui non potest omnia medicamenta necessaria sumere, cum lacte sumat semen fœniculi, vel anisum māsū, vel parum aquæ nasæ, & parti affectæ admoueatut carica assata cum puluere cymini, vel carui, vel arancium assarum cum eodem puluere, vel mel parum decoctum cum stercore bubulo. Si æger fuerit puer, iuuenis, vel senex valentioribus eget, de quibus capite 31. de curatione imbecillitatis ventriculi.

Aquosa hernia curatur, primò victu calido & exiccante, de *Aquosa.* quo diximus cap. 44. de curatione hydropis.

Secundò, apparantibus humorem aquosum, vt rhodomelle, oxymelle simp. syrupo de duabus radicibus, & aliis dictis cap. 1. & multis aliis locis.

Tertiò, phlegmagogis: vt agarico puluere hieræ simp. turbit, diaphænicon, & aliis, de quibus eodem 1. capit. sed frequenter oportet purgare pilulis elephanginis. & de hiera simp. & agarico trochiscato: quia euacuant sine molestia.

Quartò, dissipantibus flatum medicamentis internis & externis dictis capit. 44. de curatione ascitæ. Vltimò verò omnis aqua euacuanda est filo transfixo in scroto, qua emissæ vlcera exiccantibus, & glutinantibus sunt curanda, adhibendo tamen medicamenta partibus primò affectis, vt hepati, lieni, & aliis.

Carnosa hernia, si antiqua non fuerit & minùs dura, curatur rebus emollientibus, & dissipantibus carnem, vt hoc præcedenti tamen debita victus ratione & corporis purga-

DE CVRAND. MORB.

tione: ℥. igitur oleorum camomillæ, anethi, sesamini, & amygdalarum dulcium, an. ʒ. j. mucilaginis seminis lini, & fœnugræci, an. ʒ. ʒ. pulueris rosatæ nouellæ, camomillæ, & croci an. ʒ. j. ʒ. emplastri de meliloto, quod sufficit misce, & fiat vnguentum. Vtrumque diachylon cum armoniaco hanc herniam longo tamen tempore dissoluit.

Varicosa

Varicosa hernia non sine magna difficultate curatur. Primò, victu dicto cap. 9. de melancholia. Secundò, apparantibus atrū humorem conuenientibus medicamentis, de quibus eodem c. 9. Tertiò, vacuantibus, vt confectione diasenæ, confectione medicaminis hamec, sero caprino, epithymo, pilulis de fumo terræ, Indis, & de lapide lazuli. Quartò, mollificantibus, & dissipantibus, vt medicamentis dictis superius in curatione carnosæ herniæ.

*Aliarū
specierū
curatio
difficilis.*

Vltimò verò varices eximantur more cancerorum ferro candenti, quamuis hoc opus non ab omnibus ferri possit. Alij omnes modi, & differentiæ earum, quæ ex laxato dydimio, aut rupto peritonæo, siue omentum decidat, siue intestinum in Infantibus, & pueris, sunt faciliores curatu, præsertim si recentes fuerint: antiquæ enim sine opere manuum non possunt curari.

*Intestini-
nalis.*

Hernia, quæ curatur primò victu adstringente, & glutinoso, de quo cap. 28. de curatione sputi sanguinis, & somno, & quiete, fugaque cibi flatuosi, vehementis, saltus, & clamoris. Postea si intestinum fuerit extra peritonæum ægro resupinato, sublati cruribus sensim reducatur intestinum ad locum proprium, nisi stercus, vel flatus hoc impediat, quo tempore flatus est dissipandus iam dictis, & stercus mollius factum fortibus, vnguentis, suppositoriis, & balneis ex butyro, mucilagine fœnugræci, seminis lini oleo sisamino, & amygdalarum dulcium est euacuandum: intestino tamen in scrotum lapso, vel extra peritonæum iniectio clysteris est suspecta, & maximè timenda: quum multi nostris temporibus sine voce subito perierint, excepto clystere post motum intestinum à proprio loco, ad quem reduci non potest plenum postea substantia clysteris.

*Clyster
periculo-
sus habē-
ribus in-
testinum
extra.*

Intestino ad locum suum reducto à chirurgo docto, & prudenti, conserua ipsum idoneis instrumentis, & ligaturis. Scissuram quoque astringe, id tamen fiet à viris in hoc in lapidibus à vesica extrahendis exercitatis, & probatis. Et incisioni impone medicamenta glutinantia, & constringentia, vt emplastrum contra rupturam in omni regione satis cognitum, & ab omnibus pharmacopolis confectum. Hoc quoque est

est optimum: ℞. picis naualis. ʒ. j. lithargyrij, ceræ albæ, & ci- *Empla-*
 trina: colophonix, armoniaci, galbani an. ʒ. v. ʒ. visci quær- *stru op-*
 cini, thuris, myrræ, gypsi an. ʒ. ij. & ʒ. iij. boli armenici, nucis *timum.*
 cupressi an. ʒ. j. & ʒ. iij, aloës caballini, consolidæ maioris, &
 minoris, mastichis an. ʒ. v. ʒ. aristologiæ longæ, & rotundæ
 an. ʒ. j. & ʒ. ij. & ʒ. ij. gallarum ʒ. ij. & ʒ. ij. terebinthinæ lo-
 tæ forti aceto ʒ. ij. & ʒ. iij. acaciæ, sanguinis draconis, mu-
 miæ an. ʒ. ʒ. his omnibus puluerizatis accipe ilia pellis arie-
 tinæ sine pilis diuisa in partes paruas, decoquantur in aqua
 donec liquefiant: quibus adde glutinis ligni fabrorum & scri-
 ptorum, & piscium ana. ʒ. j. His omnibus liquefactis adde pul-
 ueres, & fac secundum artem emplastrum in magdalconi-
 bus, cuius quantitas, quæ satis sit, extensa super alutam ad
 magnitudinem rupturæ semper ei adhæreat. Lactens quoque *Infans*
 his externis facillimè curabitur, præsertim si nutrix debita *facilli-*
 ratione victus vtatur. Puer vel iuuenis præter iam dicta si per *mè cura-*
 xx. dies, vel xxx. resupinus quiescat, & quolibet die manè *tur.*
 accipiat ʒ. j. pulueris consolidæ maioris, vel minoris cum iu- *Cōsolida*
 re pedum arietis, vel alio liquore astringente, vel paucō vino *utraque.*
 rubro astringente, vt est Saguntinum, mihi crede, curabitur *Dacty-*
 hernia, maximè si non fuerit antiqua. Eandem habet vim pul- *lus pal-*
 uis seminis, vel dactylorum palmæ syluestris, si multis diebus, *ma syl-*
 & in eodem pondere sumatur. Dimidia drachma pulueris radi- *uestris.*
 cis. Valerianæ cum paucō vino rubro decem, vel quindecim *Valeria-*
 diebus sumpta curat herniam, vt fide doctissimorum virorum *na.*
 habeo compertum. Vnciæ duæ succi scabiosæ sumptæ manè
 quolibet die curant herniam. Hoc medicamentum paucis die- *Succus*
 bus curat herniam: ℞. mastichis, olibani, colophonix, boli ar- *scabiosa*
 menici, sanguinis draconis an. ʒ. j. pilorum leporis incisorum *medica-*
 in partes minimas ʒ. iij. mellis, & farinæ orobiam. q. s. misce, *mentum*
 & fiat mixtura. Dosis ʒ. iij. vel iij. Puluis radiceis pentaphyllonis *probatū.*
 curat herniam. Guido de Cauliaco doctissimus medicus & chi- *Radix*
 rurgus aliorum, & sua ipsius experientia curauit herniam scru- *penta-*
 pulo vno limaturæ chalybis sumpto singulis diebus manè per *phyllo-*
 30. dies, cum paucō vino rubro, & aqua decoctionis hepati- *nis.*
 cæ, dummodò per aliquot dies ante & ponè emplastrum ex *Chalybs*
 magnete, & apostolicone, & contra rupturam parti affectæ ad- *Empla-*
 hærens portet, permutatione eius facta tertio quoque die. Hoc *strum*
 emplastrum est optimum, quamuis sit paucorum simplicium, *bonum*
 quod per mensem curauit herniam: ℞. aloës, thuris, mastichis, *paucorū*
 dragaganti, gummi Arabici, sanguinis draconis, boli armenici, *simpli-*
 mum an. partes æquales cum albuminibus ouorum, fiat em- *cium.*
 plastrum.

DE CVRAND. MORB.

**Opus per instru-
menta.** Quando supradictis auxiliis hernia non curatur, oportet ad opus chirurgicum aggredi. Aliqui partem, per quam descendit intestinum, contrahunt ferro candentis alij caustica potentia ad-
mouent ab aliis acy perforatur, & meatus astringitur, ne inte-
stinum vel omentum descendat. Sed quia admodum difficile est laxationem, vel peritonei incisionem antiquam curare sine testis extractione, ab erudito, & in hoc exercitato diu viro te-
stis, vel testes cum dyndimo abscindantur, & extrahantur, cu-
ius modum & formam Paulus libro 6. cap. 62. & Albubunatis scripserunt.

Scholium.

**Varia
hernia-
rum spe-
cies con-
numerā-
tur.**

**Entero-
cele ab
ileo solo
fit.**

QUum peritonæum.] Ramicis differentia quadam à loco, & quadam à materia tumorem efficiente desumuntur. A loco cũ humor est in inguine, qui dicitur bubunocèle, aut scrotio, & appella-
tur ocheocèle. A materia, si sit aqua, dicitur hydrocèle. Qui sua
tentione carnosam herniam representat, quod ex testis pellucidita-
te (qua in aquosa apparet) in loco obscuro accensa circa candela di-
stingues. Si sit flatus, appellatur pneumatocèle, in quo ramice et si
testis lumine appposito sit perlucidus, est tamen testis leuior, quàm
in supradicto. Si sit caro, sarcocèle nominatur, qui tumor est du-
rus, & longus formam habens testiculi, & qui longo tempore sen-
sim increuit. Fit à carne duriori, in aliqua scroti parte nata, aut
ut voluit Gal. ab scirrho, per scirrhum non eum, qui ab humore,
sed carnem duram intelligens. Si sit varix, cirsocele nominatur,
qui ramex à tumore venarum nutrientium testiculum fit. Quem
cognoscimus ex inaequalitate, quã tactu sentiunt in multis exiguis
extuberantiis apparentibus. Si intestinum enterocèle dicitur. Vbi
per intestinum non intelligimus rectum, quod cum relaxatur, in a-
num delābitur, neque colon, quia hoc tenibus adheret, neque ieiunū
aut duodenum, quia hac sublimiora sunt, sed ileon, ut rectè do-
cuit Paulus. Hic ramex cognoscetur ex tumore molli repente nato,
augetur clamore, & multo cibo, & in eo tactu sæpè deprehendun-
tur indurata excrementa. Si tandem ramex fiat ab omento tanquã
ex materia, appellatur epiplocele. Quem cognosces ex tumore par-
uo eodem modo semper apparente tactuque molliusculam senties
substantiam. Hunc ramicem non admittit Vallesius 2. epy. sec. 1.
comm. 19. deceptus à Vessallio, qui omentum usque ad pubem non
posse descendere scribit. Iacotius duas hernias, quæ vera non sunt,
sed apparentes tantum describit. Quarum una est, cum trāslatus est
testis ad inguen: Altera cũ ex vehementi imaginatione in libidino-
sis colligitur semen inter tunicas testiculi. Difficile tamen videtur,
imò

modò est impossibile, testem posse in regione inguinis sibi cauitatem parare: sicut & alterum quod de semine scribit, cum nulla pateat semini via, per quam intra membranas possit colligi. In ramice intestinali, & omentali, morbus est in situ. In aliis morbus est intemperies cum affluxu humoris, hoc est tumor præter naturam. Reliqua ex auctore pete.

De Arthritide. CAP. LXL.

Arthritis tunc fit, cum in vniuersum omnes corporis articuli propter alienum à natura humorem confluentem dolor occupat. Latini hunc morbum articulare appellat, Barbari arthreticam passionem: verum animaduertere oportet arthritidem, podagram, & ischiadem affectiones esse genere easdem loco tantum differre, cum alioqui vna sit communis omnium origo: est enim arthritis, cum in omnibus articulis dolor insidet, podagra cum in pedibus tantum, quemadmodum chiragra cum manus obsederit dolor. Ischias autem cum eam iuncturam, quam Græci ischiam, Latini coxam nominant. Quare non ab re fuerit, nobis præsertim, qui breuitati studemus, harum omnium affectionum curationem hoc cap. comprehendere: tametsi de arthritide caput tantum inscribatur. Fit autem arthritis multis de causis, quarum quædam interne sunt, quædam externæ. Externæ sunt casus, percussio, corporis immodica exercitatio, vt lucta, cursus, aliæque id genus, præsertim si statim à cibo fiant, articulorum præterea luxationes, & quicquid extra incidens articulos ita potest debilitare, vt ad recipiendos deriuatos aliunde humores idonei sint: inter quæ veneris immoderatus vsus, & solitæ exercitationis intermissio numerantur. Mœrores præterea, cura & vigiliæ, cæteræque animi perturbationes ex eorum genere sunt, quæ arthritidem, podagram, & cæteras articulares affectiones possunt efficere, non modò quod corpus imbecillius reddant, sed quòd noxios quoque humores procreent. Inter alia quoque, quæ maximè hanc affectionem inducunt, sunt assiduæ cruditates, crapulæ, & eorum alimentorum vsus, quæ & difficilia coctu sunt, & pituitosos insuper humores generant. docet hoc Galen. com. 28. lib. 6. aphor. dicens, ætate quidem Hippo. pauci podagra laborant propter vitæ moderantiam, nostris verò temporibus vsque adeò auctis eduliis, vt nihil addi posse videatur, infinita est podagrarum copia, cum nonnulli sint, qui non exercentur, & cruditatibus atque ebrietate obruuntur, & ante cibum assumptum bi-

Descriptio.

Species.

Causa.

Quare tempore Hippocratis pauci laborabant arthritide.

bunt

DE CVRAND. MORB.

bunt vina generosa, ac venere vtuntur immoderata : nonnulli verò etsi non in his omnibus, in aliquibus saltem eorum, quæ dicta sunt, delinquant, sed cum peccatum fuerit magnum, sæpius in vno eorum, quæ diximus deliquisse satis erit. Ob hanc igitur causam etiam eunuchi podagra corripiuntur, quamuis non vtantur venere, talis enim est eorum desidia, insatiabilitas ebrietásque, vt etiam sine venereorum vsu podagra possint corripí. Confirmans hanc sententiam Gal. comm. 30. eiusdem libri, eunuchos, inquit, itaque videmus quosdam podagra laborantes, pueros verò non vidimus : quia illis Venus non nocet, nec vitæ immoderantia in cibis ob caloris copiam : sed ego vidi, quod Hippoc. & Galen. non viderunt, nobilem videlicet puerum septem, aut octo annos natum Vallesium laborantem non tantum podagra, sed arthritide vere & autumno, cui non fuit hæreditarius morbus articularis, & satis ille biliosus erat. Vsus etiam vreticorum præsertim à cibo multo, difficili concoctu hanc generat affectionem. Comperit quoque est vini meracioris præsertim vetusti, assiduum usum huius affectionis causam quam maximam esse : ac proinde medicorum omnium decreto huic malo obnoxius vini vsus, quamprimum interdictur. Sed neque silendum erit, quòd sæpè à parentibus hoc vitium in posteròs dimanarit, vnde hæreditarij morbi esse consueverunt arthritidis, & podagra, quod nec diffitetur Galen. 6. apho. comm. iam dicto 28. multos dicens laborare podagra, quòd auos & patres podagricos habuerint. Porro internæ causæ sunt humorum multitudo, aliquando sanguineorum, biliosorum nonnunquam, atque melancholicorum : frequentius tamen crudorum, atque pituitosorum : quia articulorum cavitates replentes tumores & dolores, quales in inflammationibus reperiuntur, excitant : quam rem plurimum iuuat tum articulorum ad recipiendum propter imbecillitatem aptitudo, tum cæterorum membrorum ad expellendum fortitudo, quò fit, vt qui in vniuersum causas colligere vellet, in tria genera partiretur, humorum, inquam, copiam, articulorum imbecillitatem, & cæterorum membrorum robur : hoc tamè admonere vellem priusquam ad signorum enarrationem, & curationem deueniatur, Bilis vis. frigidos, crassos, & pituitosos humores ad ipsos articulos facile deferri non posse, & neruorum compactæ substantiæ insinuari, ni ab aliquo humore, cuiusmodi est bilis, deducantur. cuius beneficio fit, vt tametsi crassi consistentia sint, angustissimos tamen meatus permeent, tenuissimo scilicet humore

viam

viam aperiēte. Vnde veræ curandi methodi præceptum est medicamentis, quæ ad hos humores vacuandos propinantur, aliquid misceri debere, quod bilem educat. Signis, quibus morbus cognoscitur, non est opus, cum vel dolor ipse articulis innotens morbi speciem statim exprimat. Causæ verò, humores scilicet abundantes, quicunque sint, siue biliosi, sanguinei, melancholici, aut pituitosi: nam procatacticæ causæ ex ægrotantis sermonibus sunt petendæ, & per traditas superiùs methodos, maxime cap. de cephalalgia dignoscenrur. Cum Paulo verò *Ægine-
ta* neta hunc in modum inuestigabis, habet autem verba eius hic *Paulus
Ægine-
ta* subscribere. Variæ itaque sunt affectionis huius, ceu dictum est causæ: humorum tamen negotium facientium differentia hæud difficulter locis quibus impacti sunt perspicuæ redduntur, tum coloribus, tum cæteris accidentibus prodita. Biliosus namque fluxus colore sublurido, & rufo deprehenditur. Idem caloris insuper sensum ingerit, cruciatumque acerbiorē efficit, & protinus ad supremam cutem circa amplum tumorem erumpit, calidarum rerum impositu magis exacerbatur, quemadmodum è diuerso dolorificis placatur: quod quidem cæteris ferè omnibus magna ex parte, peculiariter verò aliis biliosis euenit. Febris item sæpenuerò in accessionum summis vigoribus accedit, valdeque sitibundi redduntur. Consimili modo, & in melancholicis attrioris coloris corpus deprehendas, sicut in pituitosis album, & aquosum corpus cernitur, vnde minus cruciatur, & seriùs tument particulæ: perinde atque si sanguineus humor in corpore abundat, cruentum colorem membra præferunt. Sed ad exactiorem iudicationem iuuabit te superior victus ratio, &c.

Dolor iuncturarum à causâ calidâ cum humore curatur sex re- *Curatio
calida.* mediorum generibus. Primò, victu tenui, & refrigerante, & calidorum abstinentia, præsertim vini & veneris: hæc enim in causa etiam frigida nocent.

Secundò, phlebotomia partis appositæ: vt in arthritide dextræ manus, venam cubiti sinistri secamus, & in podagra dextri pedis venam cubiti dextri incidimus: quamuis aliqui cum Galeno venam poplitis dextri secandam esse volunt. In dolore tamen iuncturæ dextræ coxæ (à Græcis dicitur ischias) vena poplitis dextri est secanda, vt Galen. ostendit in libello de curandi ratione per sanguinis missionem, & in plerisque aliis locis. Multi initio, & corpore pleno existente venam cubiti eiusdem partis secant, quod Galenus visus est docere 10. de compositione medicamentorum secundo loco.

Tertiò

DE CVRAND. MORB.

*Quando
vacuan-
dus est
humor
absque
concoctio-
ne in hoc
symp-
tome.*

Tertiò, remittentibus sanguinis feruorem frigidis, & astringentibus, vt syrupis rosarum, granatorum, myrtillorum, cydoniorum cum dupla aqua portulacæ, plantaginis, acetosæ, & solatri per tres, aut quatuor dies: in dolore tamen magno absque syrupis, & concoctione euacuanda est bilis: quamuis non sit turgida propriè: nam quemadmodum in vehementissimo dolore narcotica sunt necessaria, quæ dolorem non auferendo causam curant, ita coactè vacuandus est humor dolorem pariens vehementem sine concoctione, quia maius est auxilium nocumento.

*Anody-
na.*

Quartò vacuantibus bilem, vt pilulis hermodactylorum minorum à drachma vna ad scrupulos quatuor, vel drachmis quatuor electuarij de succo rosarum, aut diaprunis solutiu.

*Admo-
nitio.*

Quintò, anodynis, à quibus incipiendum aliquando est & repellentibus, vt cassia fistulari dissoluta in oleo rosato, farina hordei, mucilagine psyllij, vel cydoniorum extracta aqua rosarum, & paucò aceto ad penetrandum magis, vel succo, aut aqua solani, plantaginis, vel portulacæ. Prodest quoque panis medulla, lacte macerata, & parum cocta addendo vitellos duos onorum, & oleum rosatum, cum quo vermes terreni sint cocti, frigidum applicetur. Hæc omnia dum calefcunt, sunt mutanda, & sæpè. Si dolor est intolerabilis, prædictis addes opij drachmam vnā, croci ad penetrationem parum. Hoc cataplasma est optimum in doloribus iuncturarum intolerabilibus à causa calida: ℞. farinæ hordei sine fure, & medullæ panis. an. p. ij. foliorum iusquiami, maluarum, & violarum an. m. j. florum camomillæ & corticis papaueris albi. an. p. j. Ex his decoctis fiat cataplasma addendo oleorum lumbricorum, & papaueris an. ʒ. j. opij, & croci an. ʒ. ʒ.

*Cata-
plasma
ad ma-
gnū
dolorem.
Dissipa-
tia deco-
rum.*

*Vnguen-
tum.*

Sextò, dissipantibus id, quod fluxum est, & vt oleo camomillæ, de lilio, anethi, decocto camomillæ, radicis althææ, fœnugræci, & meliloti, vino austero factò, vel aqua marina, stercore vaccino, vel hoc, aut simili vnguento. ℞. olei camomillæ ʒ. ij. olei de lilio & de semine lini an. ʒ. j. mucilaginis fœnugræci, & seminis althææ an. ʒ. ij. pul. rosatæ nouellæ, & stercoreis bubuli an. ʒ. j. ʒ. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum. Arthritis à causa frigida pituitosa curatur, primò victu parum calido cum astrictione, quare vinum in ea nocet, quia crudos humores ad iuncturas trahit, in quibus, vt & in nervis facilè in acetum conuertitur. Bibat ergo laborans ex hoc dolore aquam cinnamomi, vel decoctum seminis fœniculi,

*Frigida.
Vinum.*

vel

vel anisi. Quòd si vinum valenter appetat, sit rubrum, & astringens, vt Saguntinum, & aqua multa dilutum.

Secundo, apparantibus pituitam vt rhodomelle cum aquis, aut decocto fœniculi, melissæ, & similium, dummodò valentia diuretica non sumantur, præcipuè ante purgationem, quia humores ad iuncturas ducerentur, & ideo calculo renum, aut vesicæ affecti ex vsu longo diureticorum in arthritidem incidunt.

Tertiò, vacuantibus pituitam à iuncturis, vt drachma vna pilularum hermodactylorum maiorum ad scrupulos quatuor, vel drachmis quinque diacarthami ad drachmas sex. In hac causa, quia est diurnus dolor, bis, vel ter in mense fiat vacuatio per has pilulas. ℞. pilularum arthetricarum maiorum, & agarici trochiscati an. ʒ. j. turbit electi ʒ. ij. diagridij optimi ʒ. j. cum aqua vux arthetricæ, fiant pilulæ triginta. Pro dosi tres. Vel si non potest transglutire pilulas, hæc mixtura fiet. ℞. diacatholiconis ʒ. j. ʒ. diacarthami ʒ. j. agarici trochiscati, & turbit electi an. ʒ. ij. conseruæ buglossæ ʒ. iij. pulueris rosatæ nouellæ ʒ. j. ʒ. rhodomellis q. s. misce, & fiat confectio. Dosis, cochlearium vnum qualibet hebdomada. In hac, & omni materia arthritidis utilis, & necessaria est vacuatio in vere per sanguinis missionem & per medicamenta purgantia, etiamsi non actu dolore afficiantur, vt docet Hippocrates aphoris. quadragesimoseptimo lib. 6. & Galenus in comment.

Quartò, dolorem sedantibus statim principio adhibendis, vt oleo camomillæ, oleo lumbricorum, de therebinthina, de semine lini, de lilio, de vulpe, & similibus. Cataplasma ex farina camomillæ, meliloti, fœnugræco, semine lini, & puluere stercoris vaccini cum oleis supradietis valdè sedat dolorem. Cataplasma ex mucilagine seminis fœnugræci extracta cum aceto, & aqua cum melle est probatum, & efficax auxilium, si per tres dies hæreat loco dolenti.

Quintò, dissipantibus, corroborantibus, & resoluentibus moderate, ne tenui dissoluto crassum duritiem lapideam suscipiat. Hæc omnia quoque dolorem mitigant, qualia sunt dicta in quarto genere auxiliorum, & hoc vnguentum. ℞. oleorum camomillæ, vulpini, & de lilio an. ʒ. j. vnguenti Aragon, & marciaton ap. ʒ. ʒ. mucilaginis seminis fœnugræci, & seminis ligni, an. ʒ. iij. pulueris mastichis, & rosarum an. ʒ. ʒ. ceræ q. s. misce, & fiat vnguentum. Præstantissimum quoque est partes dolentes ab hac frigida materia oblinire sæpè adipe anseris pinguis exenterati & farti lumbricis terrestribus. fœnugræco,

Admonitio.

Frequens Purgatio. Pilule.

Admonitio in præseruatione.

Quæ huc tollunt dolorem.

Dissipatio.

Præstantissimū auxilium.

DE CVRAND. MORB.

*Terebin-
thina
laus.*

*Lignum
guaiac-
cum.*

*Ischias
valen-
tioribus
curator.*

Vrtica.

*Cata-
plasma.*

*Cucu-
mer syl-
uestris.*

*Aliud
valen-
tius.*

*Cantha-
rides.*

*Mel
anacar-
donum.*

*Exper-
tum &
potens
auxi-
lium.*

græco, croco, terebinthina, confuti & tosti. Secundus adeps, qui defluit in vas aceto albo plenum est melior fons, & balneum ex decocto camomillæ, meliloti, fœnugræci, vix arthetice, roris marini seminis lini cum aqua salsa, vel à qua chalybs, aut ferrum candens extinguitur, est efficax remedium. Longus vsus pilularum terebinthinæ abietis decies lotæ cum aqua vix arthetice curat hanc arthritidem antiquam, si curabilis est, quia soluere nodosam nescit medicina prodagram. Dosis tertio quoque die tres magnitudine ciceris. Potus aquæ ligni guaiaci per tringinta, vel quadraginta dies euacuato corpore solet curare hanc antiquam arthritidem: muta tamen eius facultatem secundum variam naturam ægri & morbi. Dolor iuncturæ coxæ, quæ à Græcis dicitur ischias, & à barbaris sciatia, valentioribus indiget remediis propter huius iuncturæ magnitudinem, qualia sunt pyrethrum, costum, nasturtium, sinapis, nitrum, stercus bubulum, ciconiæ, & leporis. Cataplasma ex his omnibus, vel aliquibus cum oleo scorpionum, vulpino, & foliis lauri, rutæ, cyclamini, & squillæ est optimum, vel vnguentum. Cataplasma ex pice, sulphure admotum huic magnæ iuncturæ antiquam ischiadem curat. Aliquando sunt necessaria maxime attrahentia, & quæ vesicas afficiunt & adurunt, vt est cataplasma ex foliis vrticæ bis in die loco dolenti admotum, post lauerur locus decocto saluiæ: & roris marini cum aqua salsa.

Cataplasma ex ruta viridi, & scordeon cum pinguedine porci & aceto valet multum sua facultate in hoc morbo. Maioris vis est cataplasma ex radice cucumeris syluestris cum pinguedine suilla, vel ex alio. Hoc etiam est optimum & experitum. ℞. absinthij, radicis ebuli, furfuris ana. p. j. stercoris columbini ℥. j. & β. salis communis ℥. j. omnia in aceto decoquantur, & fiat cataplasma, vel fiat ex sinapi, & ficis. Omnium quæ diximus est potentissimum cataplasma ex cantharidibus & fermento, & staphisagria factum, à quo fiant vesicæ, quæ apertæ per dies aliquot conseruentur foliis brassicæ, vel fermento, & pinguedine porci. Cataplasma ex melle anacardonum est valens causticum in hoc probatum à quodam doctissimo medico, fit hoc modo. Anacardi pisti infundantur in aceto per septem dies, postea sensim, & igne paucò decoquantur, donec terra pars consumatur. Post caloris absentiam, quod supernatat, collige, quia illud est mel anacardonum antiquorum.

Sapientissimus quidam medicus multos suo tempore laborantes coxendico dolore curauit, & vnum affectum eo per annos decem & octo caustico facto ex capitulo vix calcis, & alum

aluminis, cuius crusta butyro, vel axungia porci non salita est, est amouenda: deinde locus apertus à docto chirurgo est conseruandus falsa carne, vel ligno busti per sex menses, vt possit materia per vlcus euacuari.

Aliqui medici satis eruditi igne actu aperiunt locum supra *Ignis.* iuncturam, primò, & secundò supra coxam, & tertio sub genu: semper tamen particularia auxilia sequantur vacuationes totius corporis: quamuis tutius esset, si sex digitos infra iun- *Admo-* cturam dolentem aperiretur locus igne, & apertus per aliquot *nitio.* menses conseruaretur. Sed si de his auxiliis omnibus pyroticis perfectam, & integram, doctrinam accipere cupis, lege caput quintum libri tertij Iacobi Hollerij de materia chirur- *Holle-* gica. *rius.*

Scholium.

A Rthritis tunc fit.] Vt quæ in hoc scholio dicenda sunt, re- *Quid* cte intelligantur, supponere oportet. Primò articulum esse articu- *articu-* naturalem ossium compositionem, ad motum voluntarium factam. *lus.* Secundò, in articulis cum caput vnius ossis, ingrediatur cauitatem alterius, maximam esse in hac re varietatem, quia aliquando caput ossis magnum est, & cauitas profunda vt in coxa articulatione videmus: aliquando verò caput in superficiariam cauitatem recipitur, vt in articulationibus digitorum. Tertio, ex articulis, aliquos habere multas partes suprapositas, vt est supradictus coxa articulus, qui habet musculos tibia, fæmoris, membranam carnosam, cutem, nervos, & tendones, aliquos nudos esse, quales sunt illi, qui in manibus & pedibus sunt. His suppo- *Quid* sitis ad arthritim descendamus, quæ nomen assumpsit à symptoma- *arthri-* te, & loco affecto. Est enim dolor articularum, non quilibet, sed fa- *tis.* ctus à fluxione humoris. Cum diximus arthritim esse articularum dolorem, intelligimus aut omnium, aut multorum. Quare si in vno articulo est dolor, etsi à fluxione humoris fiat, non arthritim, sed articuli dolorem appellamus: nisi in manu, pede, & ischio, vbi dolor hic, proprio nomine dicitur chiragra, podagra & ischias. Arthritis est symptoma sensus tactus, actio scilicet eius deprauata. Morbus ad quem sequitur, est tumor præter naturam articularum, distendens partes in eis contentas. Aduerte tamen hunc tumorem factum à fluxione humoris, esse distinctum à veris tumoribus: non enim tumor continetur in poris partium similium (nam sequeretur ad arthritim conuulsio nervo aut tendone distentio) sed in cauitate articuli, aut iuxta articulum, à quo supra posita corpora,

DE CVRAND. MORB.

qua vim habent sentiendi, distenduntur, & ita dolent. Unde morbus hic erit referendus ad tumorem præter naturam, ut ex 6. aph. comment. 49. colliges. Hic autem tumor fit à duabus causis. Prima est imbecillitas articuli, quam etsi à natura habeat, imbecillior. tamen se ipso reddi potest, aut in prima conformatione, cum à semine languido formatur: & ideo aliquando anthritis videtur morbus hereditarius: aut secundo, extra uterum, cum intemperiem aliquam contraxit. Secunda causa est fluxio humoris ad articulos. Fluxio duas habet causas. Vna est plethora, siue sit ad vires, siue ad Iacotius vasa: altera est cacochima: ab his enim solet natura aggravari, & irritari. Neque Iacotius rectè sentit, cum scribit, arthrim fieri sensim in articulo congesto humore ob malam partis nutritionem: hac enim non erit anthritis, cum neque à sanguine, neque ab alio humore naturali fiat. Humor enim, qui sensim coaccruatur, sensim etiam mutat naturam, ut in atheromate & meliceride videmus. Neque in morbo galli fit anthritis ex congestione sine tumore, ut voluit Rondoletius. Quia si humor in articulo inclusus non facit tumorem, neque distensionem efficiet, ac proinde non erit anthritis, in qua ob distensionem excitatur dolor in articulo. Dices, in anthritide cuius partis distentio excitat dolorem? Rondoleticus respondet, ligamentum esse duplex, vnum quod ab esse ortam habet, & hoc non sentire, alterum à periostio, & hoc sensum habere, & ideo huius ligamenti distentionem in anthritide doloris esse causam. Decipitur tamen, quia ligamentum ex periostio ortum in nulla corporis parte reperitur. Verum quidem est, aliquando tendonem vicem habere ligamenti, ut in lato tendone in genu apparet.

Qua Dicendum ergo est supra articulos transire nervos & tendones pars do- musculorum, qui dolent à tumore distenti, ut constat ex 6. aphor. leat in com. 49. hæ enim partes acutè sentiunt, nervus, quia defert vim arthri- sentiendi, tendo verò, quia fit ex febris nervorum. Humorem facien- tide. tem arthritim ex multis cognosces, ex natura agri, ex colore arti- A me- culi, doloris sensu, iuvantibus & nocentibus. Anthritis à melanchor- lancho- lia raro fit, & ideo non describimus eius notas, ut plurimum ta- lia raro men fit à pituita, quia articuli pituitoso sanguine nutriuntur, qua fit ar- etsi non fluat, & dolorem non efficiat. sua frigiditate sensum aufe- thritis. rens articulitamen mixtam cum sanguine aut bile fluere ad arti- culos experimur, frigiditatēque eius retusa tensione dolorem efficere. Quibus Cognoscemus arthritidem ortum habere ex pituita ex natura pi- signis tuitosa, colore articuli albicante, dolore obtuso & persenerante, & arthriti- quod ledatur à frigidis, & quod talem habuerit victus rationem dis cau- qua multam pituitam generavit, & ultimò quia singulis diebus se cogno- habet accessionem. Cognoscemus arthritim fieri ex sanguine, ex na- scantur. tura agri, si sanguinea sit, ex rubore articuli simul cum gravi do- lore,

lore, addo simul, quia signum ex rubore articuli in principio arthritidis non habet magnam vim: ex ante acta vita si multum sanguinem generauit. Si arthritidis fiat ex bile, cognoscetur ex natura agri biliosa, ex colore articuli ad flauum tendente, ex dolore acuto rei pungenti simili precessit ratio victus bilem generans, & exacerbationes doloris fiunt de tertio in tertium. Arthritidis quo plures afficiet articulos, aut maiores, maiorem arguet causam, quod pauciores, minor. m.

Dolor iuncturarum à causa calida.] Etiam si à bilioso humore oriatur arthritidis, non tamen solus est, sed permixtus cum pituita, & ideo vide, ne nimius sis in frigidis alimentis.

Secundò, phlebotomia.] In dolore arthritico semper secanda est vena, idque non semel, nec bis solum, sed aliquando ter, quater, & decies, & amplius, si opus fuerit, inspecto virium robore, quod non sentit: & fluxione, quæ est affectus postulans euacuationem omnium humorum, quoniam hi fluunt ad locum tumore affectum, ac proinde mittere uellendi sunt. Ex loco autem affecto collige utendi modum in sanguinis missione. Si enim omnes articuli afficiantur, secabis basilicam dextram, aut sinistram. Si articuli dextri brachij affecti sint, ex sinistro euacuabis, & contrà. Si sit podagra dextri pedis, secas locum venam brachij dextri, aut pedis sinistri, quia hæ partes, eandem habent vasorum rectitudinem cum loco affecto. Si dolor sit in coxendice, distinguendum est: nam in principio, quia scopus reuulsione magis urget, ex brachio eodem secabimus venam, aut ex altero crure, potissimum in mulieribus, in quibus suppressi sunt menses: tunc enim reuellemus, & euacuabimus ex parte, magis tamen reuellemus. Quod si in principio, ex eodem pede venam secare ausi fuerimus, magis attrahemus humorem (deorsum impetum habentem) ad partem affectam. Facta reuulsione quando iam humor ex parte euacuandus est, quod indicat affectus factus, tum ex eodem pede secanda est vena.

Tertiò, remittentibus sanguinis feruorem.] Non est quod his frigidis & adstringentibus utaris, quia hæc neque fluxionem sistunt, & causam arthritidis augebunt, quoniam plures humores crudos generabunt, qui semper solent esse arthritidis causa.

Quartò, euacuantibus bilem.] Non est euacuanda sola bilis, sed opus est permiscere Agaricum, aut diaphaniconem ob pituitam.

Quintò, anodynus.] Dolor aliquando urget, quando scilicet deiecit vires, aut auget affectum, & tunc trahit ad se curationem 12. method. c. 1. Quod si aliquando Gal. dicit symptoma indicare curationem, cum affectui officit, per affectum tunc non morbum, sed sanitatem intelligit, quæ continetur etiam in genere affectus, ut patet ex Galeno. vide diff. morb. Si ergo in arthritide ex dolore sequatur

In arthritide
semper
fluxione
omnium
humoris
affectum
mitten-
re uellendi
modum
Locus
affectus
Sanguis
Sanguis
nis mit-
tendi de-
monstrat.

Victus
qualis.

Purgan-
tia.

Quando
anody-
nis uten-
dum.

tur

DE CVRAND. MORB.

sur noxa in viribus, cum sedabimus anodynis medicamentis, quæ nec multum calida sunt, quoniam hac reddunt humorem coctum difficilem. Vteris ergo cataplasmate ex lacte cum croco & pane constructo, aut ex fursure & sapa addito rosaceo, aut oleo de lateribus aut alio tenuium partium: quod viam sternat anodina facultati.

Narco-
ticis non
utendū.

Quod si vehementissimus sit dolor, solent medici ad philonium persicum, & alia narcotica, quæ anodina improprie dicuntur, descendere. Existimo autem ego melius esse abstinere ab his, quia si ingentissimus est dolor, signum est fieri à sanguine bilioso, is autem, cum tenuis sit, citò feretur ad cutem, tendones & nervos sine tensione relinquens. At opium, & alia narcotica bilem impengendo, & impediendo eius motum ad externa longiorem dolorem efficiunt, etsi ad tempus ipsum sedent.

Arthritis à causa frigida.] Et si pituita sit arthritidis causa, semper tamen cum ea permixta est aliqua portio humoris biliosi, ut supra docuimus. Hoc loco autor exhibet alimenta aliquantum adstringentia, alij non solum alimenta adstringentia prescribunt, sed cum medicamentis attenuantibus adstringentia miscent, ne attenuantia humorem ducant ad locum affectum, qui videntur ignorare occasionem exhibendi attenuantia: nam non est utendum eis, nisi sedata fluxione.

Purgans
medica-
mentum.


Tertiò, euacuantibus pituitam.] Cum medicamentis pituitam purgantibus misce quæ euacuent bilem hoc modo. ℞. Syrupi rosarum Alexandrinarum ex nouem infusionibus ℥. iiij. Electuarij de succo rosarum, & diaphæniconis an. ℥. ij. cum decocto communi, fiat potio. Possumus purgare pilulis de fumo terre, aggregatiuis, & arthriticis: neque in hoc affectu sufficit semel purgare, & sic per interualla possumus purgare pilulis, aut confectiōe aliqua, aut sumentes ℥. ss. terebintina prout purgaucrit aucta aut diminuta quantitate.

Curatio

Quintò, dissipantibus.] Cum arthritis ad tumorem præter naturam referatur, eadem ratione curabitur, qua tumor in principio dis, quæ utentes repellentibus medicamentis, quod potissimum præstabimus in arthritide à bilioso humore facta perfundentes articulum aqua morum frigida 5. aphorism. sen. 2 5. ubi Gal. in commentario duplici nomine præter ne aquam dolorem sedare scribit. Primò, quia doloris causam renaturã. mouet repellendo. Secundo, quia sua frigiditate sensum torpidum In ischia efficit, quod idem scribit Galenus decimo de comp. secundum locos. de cur Neque existimes in arthritide semper repellendum esse, quia si dolor sit in ischiade, non licet repellentibus uti, quia cum hic articulum re- lus tegatur à multis musculis repellentium medicamentorum vis pellenti- ad articulum non perueniet, & augebimus affectum, quia ex venis bus. per partes suprapositas disseminatis repellamus humorem ad articulum.

culum. Neque utendum est repellentibus in arthritide critica, quia in criti-
in febris melius est humorem ad articulum fluere, quàm ad partem ea ar-
principem. Neque repellendum est cum ex parte principe sit fluxio, thricide,
nisi fiat ad partem, qua habeat insignem usum qualis est oculis. & in ea
nunc enim repellentibus utemur: quod non faciemus, si fluat humor in qua
ad articulos, quia magnum incommodum est ferri humores ad par- pars
tem principem. At si ex venis ad articulos fluat humor, facta reuul- princeps
sione repellentibus utemur, nullum enim sequetur incommodum, humoris
imò humor ad venas repulsus concoquetur. Hoc loco Galenus sibi trans-
videtur contrarius, quia ut diximus ex 10. de comp. secundum lo- mittit
cos, & 5. aph. in arthritide repellere licet: at libro secundo de homi- repellat.
nis natura commentario 11. in fine contrarium videtur sentire. Iam
(inquit) non raro cum in morbo articulari & podagra artus humo-
res peterent, & illinc repulsi in principem aliquam partem irua-
sissent, morte conspeximus hominem affectum esse, unamque restare
spem salutis si ad artus retrahere eos valeamus: Hac Galenus. Vbi Galenus
videtur sentire ex articulis non esse repellendos humores. Respon- ab intu-
deo repellere & corroborare esse res distinctas: corroboramus enim ria vin-
in sanitate, robur addentes parti, ne recipiat: repellimus vero in dicatur:
morbis humorem fluentem ad partem, & eum, qui iam fluxit. Iam
nobis non licet articulos roborare, ne recipiant quoniam sunt partes
languide, ad quas melius est humorem fluere, quàm ad aliquam,
qua necessaria est: possumus tamen repellere ex articulis facta prius
reuulsione, eo modo quò supra diximus, quod idem in cute etiam
efficimus. Ex his facile liberatur Galenus à contradictione,
quia in libro de hominis natura de repulsione, qua
medicamentis roborantibus articulos
fit, loquitur:

FINIS PRIMI LIBRI



PETRI PAVLI,
PERE DÆ
SETABENSIS,
IN

LIB. II. MICH. IOANN. PASCHALII,
de curatione Febrium,

SCHOLIA.

*De febre sanguinea, seu continenti, quam synochum
cum putredine appellant.*

CAPVT. I.

Defini-
tio.



Diuisio.

YNŌCHOS Græcis, continens Latinis est febris, in qua vna accessio ab initio ad finem perpetuò manens in multos dies porrigitur. Hæc duplex est, altera sine putredine, quæ similis est diarræ, de qua in præsentī non agimus, cū raro medicus ad curandas diarias vocetur: quomodo autem solus sanguis non putris febrim efficere possit, quando calidus, & humidus existens putredini magis expositus videtur, non est hoc loco & tempore explicandum. Altera est synochus cum putredine, de qua nunc agimus, cuius tres sūnt differentiæ. Nam quædam à principio ad finem æquali magnitudine perdurant, has Græci omotonas vocant, in eodem vigore permanentes: alia enim tria tempora occulta sunt: quædam verò semper augentur, eas Græci acmastras, id est, incrementum suscipientes, aut inualescentes nominant, principium, vigor, & declinatio in his occulta sunt, quemadmodum in vltimis tria tempora priora. Alæ paulatim diminuantur, & decrescunt, paracmastras, hoc est.

est decrefcentes appellant: de his fufius Galen. 9. method. & lib. 2. de differentiis februm, cap. 2. lib. 2. de crifibus cap. 7. agit. Quare fallitur Auicenna, credens Galenum negaffe dari febreſ ſanguineam putridam. Fit ſynochus ex putredine ciborum multorum, & ſanguineorum, multa exercitatione, præſertim à cibo & vere, & iuvene carnoſo: otium immodicum augeſ ſanguinem, & humores omnes, à quibus in vaſis maximis potiſſimum (quæ circa alas & inguina exiſtunt) putreſcentibus ſynochus hæc fieri ſolet, præcipuè ſi obſtructiones adſint, quas Venus gignit à cibo, & ebrietas. Signa huius febris ponuntur à Galeno 9. methodi, quæ multa ſunt, rubor ſcilicet faciei magnus, & totius corporis ſomnus immodicus, calor magnus, qui acrior eſt eo, qui ſequitur ſynochum ſine putredine, minùs tamen mordax, quàm in ardenti. Pulſus iis maximus, vehemens, celer, creber, & inæqualis tamen, ſi cum aliis febribus putridis comparetur, vrina rubra & craſſa.

Error

Auicenna.

Cauſa.

Nota.

Curatur hæc ſex remediorum generibus. Primò, victu frigido, & humido, (minùs tamen humido, quàm bilioſæ febres) & tenui, vt ſucco malorum granatorum, cremore hordei, lacte amygdalarum dulcium, cichorea, lactuca cocta, ſi ventriculus eſt imbecillus, vel cruda, cum aceto & ſaccharo, ſi eſt validus, carne cydoniorum ſaccharo condita, radice bugloſſæ ſaccharo condita, pyris, & malis cotoneis aſſatis, pane loto. Si facultas ſit imbecilla, vel poſt ſanguinis miſſionem, & alias vacuationes, nutriatur iure, & carne pulli gallinacei refrigeratis, agreſta, acetofa, hordeo decorticato, ſemper tamen conſideranda eſt natura ægri, ætas, regio, conſuetudo, & anni tempus in quantitate, qualitate, numero cibi ſumendi, vt Hippocrates docet 17. aphoriſmo primi libri. Potus ſit aqua hordei, & in declinatione vinum album bene dilutum, præſertim ſi ventriculus fuerit imbecillus.

Cura-

tio.

Victus.

Secundò, ſecta baſilica dextra, & miſſo ſanguine uſque ad animi deliquium, ſi vires adſint: ego ſemper noſtris temporibus extraho ſanguinem non ſemel, ſed bis aut ter, & quandoque quater vno, vel duobus diebus: numerus tamen dierum non eſt ſemper inſpiciendus. In hac tamen febre à principio oportet mittere ſanguinem, ita tamen vt respondeat plenitudini, & robori virium. Ante tamen ſanguinis miſſionem ſi non times ſubitam ſuffocationem, & ſemel in ipſo quoque febris die hoc aut ſimili clyſtere alius lenienda eſt, & inteſtina purganda: ℞. foliorum maluarum violarum, & mercurialis an. m. j. farfuris, & hordei ſine cortice an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ℥. j. & 3. iij. cui adde caſſiæ fiſtulæ præparatæ, & diacatholiconis an. 3. ij. miſce, & fiat clyſter.

Sectio.

vena.

Obſ. r.

ratio.

Clyſter.

DE CVRAND. MORD.

*Potus
aqua
frigida.*

*Impe-
dientia
potum
aqua
frigida.
Aduer-
se.*

*Conco-
ctio.*

*Purga-
tio.*

*Prescri-
ptio di-
niti ac-
commo-
data.*

Pilula.

Vsus pi-

lularum

damna-

tur in

morbis

biliosis.

Boli lau-

dantur.

Qua no-

ceant.

Dictum

Torna-

mira.

Tertiò, potu magno aquæ frigidæ, qui Galeno autore 9. method. post sanguinis missionem in hac febre maximum est præsidium, nisi quæ illum impedian, æger habeat, vt sunt tumor; partis principis obstructio, magna inflammatio, vel imbecillitas alicuius visceris, defectus caloris innati, & natura contraria potui aquæ frigidæ: solet enim potus multus aquæ frigidæ hanc febrem præsertim non putrem, & putrem quoque post sanguinis missionem, & humoris biliosi concoctionem curare sudore, vel ventris profluuiio, vel aliquando febrem hanc & ardentem in pituitosam mutare: quo autem modo id fiat, non est præsentis instituti, nec sanguis, nec bilis possunt in pituitam verti, cum coctum non possit fieri crudum.

Quartò, concoquentibus, refrigerantibus, & bilis, quæ fit ex sanguine tenuiori, acrimoniam remittentibus, vt syrupus granatorum, acetosæ S. violarum, rosarum, & endiuia: S. & comp. & similia cum aquis, vel decocto duplo endiuia, cichoreæ, acetosæ, scariolæ, & similia sumptis per duos vel tres dies.

Quintò, vacuantibus bilem, vt cassia fistulari, tamarindis, rhabbaro, myrobalanis citrinis, manna, diaprunis solut. & electuario de succo rosarum, vt ℞. medullæ cassis fistulæ recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ℥. ss. infusionis rhabbaro in aqua endiuia per noctem factæ ʒ. j. squinanti ḡ. iij. diaprunis solut. ʒ. iij. syrupi violarum ʒ. j. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus: vel si est diues, ℞. mannæ electæ ʒ. j. ss. rhabbari electi infusi per noctem in aqua endiuia, deinde ciecta substantia ʒ. iij. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus. Si tamen abhorret liquida medicamenta purgantia: ℞. pilularum de rhabbaro ʒ. j. cum aqua cichoreæ, fiant pilulæ septem, & aurentur. Sed ego in hac, & in aliis biliosis, non laudo pilulas: quia præterquam quòd omne medicamentum purgans (autore Galeno comm. 24. primi aphoris.) per se calfacit vehementer, forma pilularum magis calfacies propter siccitatem coniunctam, quæ simul cum caliditate non potest minui, quemadmodum in mixta cum syrupo, & decocto, & cassia, & tamarindis in potibus fieri solet. Quare post potionem magis laudo bolos, seu bucellas: vt ℞. rhabbari electi puluerizati, & pauca aqua endiuia madefacti ʒ. vj. sacchari, q. s. misce, & fiant boli quinque vel septem: & ideo in his & biliosis febribus medicamenta purgantia valenter, & insalubria etiam castigata nocent, vt est scammonium, colocynthis, helleborus, & similia: solebat dicere eruditissimus Tornamira, medicos eis in his febribus videntes non esse curatores, sed interfectores

Sextò.

Sextò, refrigerantibus, & corroborantibus cor, iecur, & totum Altera-
 corpus internis & externis, vt electuario diatrium santalorum, *rio* &
 diarhodonis Abbatis, diamargaritonis frigidi conferua rosarum, corrobo-
 conferua violarum: vel hoc electuario: ℞. pulueris diatrium *ratio.*
 santalorum 3. ij. pulueris diamargaritonis frigidi 3. j. confer- *Sumen-*
 uæ acetosæ 3. iij. sacchari dissoluti in aqua rosarum q. s. mis- *dum ele-*
 ce, & fiat electuarium in tabellis pondere 3. ij. Dosis quoli- *ctuarium*
 bet mane 3. iij. cum 3. iij. aquæ cichoreæ, vel acetosæ, vel *cū aquis.*
 endiuix, vel decocti hordei sine cortice, vel cum vino albo *Admo-*
 bene aqua diluto, cordi sæpe, admoueaturs hoc epithema tepi- *uenda*
 dum, vel actu frigidum in æstate, & ægro iuuenē. ℞. aquæ ro- *cordi.*
 sarum 3. iij. aquæ acetosæ, & huglossæ an. 3. iij. aquæ melif-
 sæ 3. ij. pulueris diamargaritonis frigidi, & trochiscorum de
 camphora an. 3. j. misce, & fiat epithema cordi admouendum *Epithe-*
 omni tempore ante & post vacuationes, quia cor non potest *ma.*
 obstructione affici. Hoc vnguentum bis admoueaturs cordi, *Vnguen-*
 quod in omnibus febribus biliosis, & pestilentibus est opti- *tum bi-*
 mum, eoque Carpetani medici vtuntur, & est Gainerij. ℞. olei *liosus.* &
 nenupharis 3. iij. pulueris nenupharis 3. ij. santalorum rubro- *pestilen-*
 rum, seminis acetosæ, coralli rubri præparati an. 3. j. marga- *ribus fe-*
 ritarum electarum, ossis ex corde cerui an. 3. ss. camphoræ *bribus.*
 ʒ. iij. misce, & fiat vnguentum. Hepati bis in die ventriculo
 vacuo admoueaturs vnguentum santalatum, vel cerotum santa-
 latum & hoc epithema tepidum. ℞. aquæ endiuix, & cicho-
 reæ, an. 3. iij. aquæ rosarum, & absinthij, an. 3. ij. santalorum ru-
 brorum 3. ij. spodij 3. j. aceti rosati cochlearium vnum, misce, & *Hepati*
 fiat epithema. Balneum aquæ tepidæ in hoc genere auxiliorum *epithe-*
 est optimum huic, & aliis febribus, præsertim hecticæ, vt dice- *ma.*
 mus capite octauo huius libri. Totum enim corpus refrigerat, *Balneū.*
 & reliquias materiæ resoluit.

Scholium.

SYNOCHOS Græcis, continens Latinis.] Febris est intemperies *Quid*
 calida, in toto corpore, aut saltem pluribus, aut precipuis par- *febris.*
 tibus existens, & actionem ladens. In hac definitione, in-
 temperies est genus, quo communicat febris cum aliis intempe-
 riebus. Reliqua, quæ in definitione continentur, differentia sunt.
 Cùm dicimus hanc intemperiem esse calidam, separamus eam ab
 aliis tribus intemperiebus frigida, sicca & humida, cùm eam
 collocamus in toto corpore, separamus febrem ab intemperie calida
 unius partis. Vltimò definitionis membro, febris distinguitur

ab aliis intemperiebus, quae includuntur intra limites sanitatis: Singula partes istius definitionis breuiter explicanda veniunt. In primis febris est intemperies calida, ut Gal. lib. de causis morborum & 6. aphor. com. 16. & aliis locis docet. Qua in re videtur An febris sit intemperies sicca. contrarius sibi, & Hippocrati. Sibi contrarius est, quia 2. acutorum com. 24. calorem febrilem siccum, & 1. aphor. com. 16. febrem passionem calidam siccam nominat, Vnde febris non in solo calore, sed simul cum siccitate consistet. Hippocrati contrariatur, quia hic supradicto aphorismo victum humidum febricitantibus consulit sentiens febrem esse affectum siccum. Respondco febrem solum esse positam in calore prater naturam, neque coniunctam habere siccitatem. Quod ultimum confirmat Vallesius, quia si aliquis utatur victu humido, ita ut factus sit humidior quam pro natura, & febricitet, tunc febris sine siccitate erit. Non tamen est, quod his & similibus utamur argumentis, cum facillimum habeamus, & quod multum urget. Argumentum huiusmodi est, si febris essentia in siccitate etiam est posita, ergo omnis febris coniunctum habebit marasum, s. d. hoc est falsum, ergo & primum. Maior nota est, quia marasmus nihil aliud est, quam intemperies sicca morbosa totius. Assumptionem falsam esse, experientia docet. Ad argumenta facile erit satisfacere. Ad Gal. qui febrem appellat passionem siccam, & calorem siccum. Respondco, in febre semper esse siccitatem, quia Vallesius ta- immoderata caliditas ex accidenti consumendo humidum eam sibi xatur. adsciscit, hac tamen non est morbosa, sicut neque ea quae est in homi- Cur ne bilioso. Quid ad Hippocratem? Vallesius sentit Hippocratem in Hip. fe- febribus victum humidum imperare, precautionis gratia: Quod no- bricitan- tis non placet, quia in febribus solent phrenitis, lethargus, & alia tibus im symptomata frequenter euenire, quae à nobis non prauidentur, quia perat vi- non contingunt necessariò: cur ergo marasum, qui rarissimè in fe- Etum hu- bribus euenit, praecauet Hippocrates? Dicendum ergo est Hippocr. midum. victum humidum imperare febricitantibus, propter calorem, quia Febris humiditas eum obtundit, sicut siccitas acuit. Secundò febrem dici- in toto mus esse in toto corpore, quia quum intemperies calida sit in corde corpore. quod fons est caloris, & à quo calidum parium fouetur, non est Calor mirum, si affecto principio omnes partes afficiantur. Hoc autem in febrilis telligendum est, si nihil impediat, quod propter typhiriam & epia- morbo- lam dicimus. Hoc considerans Gal. 6. epid. part. 1. com. 29. in febribus. bus calorem in toto corpore, aut saltem praecipuis, aut pluribus partibus collocat. Ultima definitionis pars calorem febrilem morbosum Quae actiones & prater naturam esse demonstrat. Huius enim caloris proprium ladatur est omnia corrumpere, & naturalium actionum ordinem perturbare. in febribus. Vbi per actiones naturales, eas quae secundum naturam fiunt, intelligimus, quae animales & naturales comprehendunt, ita tamen, ut in febribus

febris actiones naturales potissimum laedantur, & inter eas illa, Obie-
qua concoctrix appellatur. Dices, nonne in febribus saltem diariis, etio.
imaginatio, ratio, & memoria saepe illaesa seruantur? Respondeo sem- Differē-
per laedi, quia non ita recte, neque tanto tempore exercentur actiones tia fe-
prædicta, ac in sanitate. Neque hoc mirandum est, quia in febribus brium.
instrumentum commune laesum est, nempe calidum innatum. Tum Essentia
etiam, quia febris morbus est omnium partium les fe-

Illis positis, differentia febrium tradenda sunt: quarum quedam brium
sunt essentiales, quadam accidentales. Essentiales illæ sunt, quæ ex differen-
essentia febris (qui calor est) desumuntur. Quæ tres sunt: Prima de- tia res.
sumitur ex qualitate caloris: Secunda ex motu: Tertia ex eius sub- Prima.
iecto. Ex qualitate caloris, febres appellantur magna, aut parua: si Secunda.
proprie loquentes intensa, & remissa. De his loquitur Hipp. 6. epyd. Tertia.
sent. 29. cum scribit febres quasdam esse statim ardentes, & quas- Ex qua-
dam debiles. Ex motu pendent illæ febres, quas Hipp. eodem loco pri- litate
mo mites, deinde incrementales, & alias è conuerso statuit. Ex mate- caleris
ria diuiditur febris, in diariam, putridam, & hecticam. Diaria di- differen-
citur illa, in qua calor factus est in spiritibus. Putrida, in qua in tia ex
humoribus, ita ut ex eorum putredine ortus sit. Hæctica verò in motu.
qua in partibus solidis (hoc est, quæ consistentiam habent) calor fa- Differ.
ctus est, at in humoribus & spiritibus in fieri. Differentia febrium ex ma-
ex qualitate & motu caloris desumpta à materia pendent, quia teria.
calor in materia sicca intensus apparet, at in humida remissus: in Diaria.
materia tenui celeriter mouetur, in crassa tardè. Et ideo has omit- Putri-
timus differentias, & eas, quæ ex materia sumuntur, appellamus es- da.
sentiales, quia variam postulant curationem, & cum finis sit ratio Hæctice.
formalis artis, variant finem istius partis curatiua in medicina, qui Omnes
est curare morbos. Differentia febrium, quæ accidentales appellari febrium
solent, sumuntur ex accidenti proximo, aut remoto. Ex accidenti differen-
proximo, cum ex colore febrem diuidimus, quia talis in cute efflo- tia reuo-
rescit color, qualis est humor, qui redundat. Hac ratione Hippoc. su- catur ad
prædicto loco. 6. epyd. febris prærubra, præpallida, & liuida memi- differ. ex
nit, ubi in rubris & pallidis utimur dictione præ, quia illi colores, mater:
nisi sint valde intensi, non sunt mali, contra quam accidat in liuido cur dif-
colore, qui malus semper est, nisi non sit valde intensus. Ex acci- fer. ex
denti remotè varia etiam febrium differentia sumi solent. Quæ mat. di-
sunt, febris longa, & breuis, nocturna, & diurna: continua, & in- cuntur
termittens & alia similes. Ex his omnibus febrium differentiis, eas essentia-
qua ex accidenti ortum habent, omittimus, item etiam quæ ex mo- les.
tu, & qualitate caloris desumuntur, solæque disputare institui- Differ.
mus de his differentiis febris, quæ à materia pendent, de putridis, acciden-
scilicet & hecticæ propriis capitibus, præsentem autem loco de diaria, tales
de qua autor non disputauit, agere non instituiimus. Diffc-

DE CVRAND. MORB.

20. *Febris diaria aut est exquisita, aut non exquisita. Febris diaria
 21. exquisita illa est, qua ex calefactis spiritibus ortum habens, per spa-
 22. tium unius diei (hoc est viginti quatuor horarum) perdurat, sine or-
 23. tum habeat à causa externa affectum in corpore relincente, sine
 24. non relincente affectum. Quod dico propter Menam & alios, qui
 25. eam febrem diariam, qua ex causa externa, affectum aliquem in
 26. corpore relincente ortum habet, diariam minùs exactam appel-
 27. lant. Non exquisitè diaria est illa, qua ex vaporibus ab humoribus
 28. calidis elevatis fit. Qua media est inter diariam, & putridam: com-
 29. municat enim cum diaria, quia non fit ex putredine humorum,
 30. neque ex caliditate facta in partibus solidis: cum putrida verò com-
 31. municat, quia ex calefactis humoribus ortum habet. Ex his diariis,
 32. quadam appellantur Synochi non putres, in quibus feruet sanguis
 33. in vasis ab ira exercitatione, aut alia causa, à cuius vaporibus cor
 34. calefit. De his febribus agit Galenus nono method. capite 1. & 2.
 35. Alia sunt diaria orta ex levi obstructione cutis in his hominibus,
 36. in quibus acres sunt humores 9. method. capite 4. In eis enim ca-
 37. lidi vapores elevati cor calefaciunt, & inde fit febris diaria. Ha-
 38. febres faciliè mutantur in putridas, aucta obstructione, nisi precau-
 39. tione utamur, sanguinis missione revellentes humores. Solent medi-
 40. ci hoc in loco querere. An detur febris diaria ex putredine spiritus.
 41. Hac controuersia ex hac altera pendet: An possint spiritus putrescere
 42. Vallesius constanter affirmat spiritus posse putrescere. Quod probat
 43. primò auctoritate Aristotelis 4. lib. meteo. cap. 1. ubi scribit om-
 44. ne spiritus putrescere prater ignem. At spiritus non est ignis, ergo putrescet.
 45. Secundò, aër potest putrescere, ergo & spiritus. Antecedens expe-
 46. rientia docet, in pestilenti constitutione. Consequentiam probat ex
 47. Galeno, qui in libro, An sang. in art. contineatur, spiritum esse aëre
 48. crassiorem scribit, ac proinde oculis videri. Quòd autem crassior sit
 49. ostendit quia fit concoctione ex ipso aëre, at coctio incrassat. Ego ta-
 50. men constantissimè assero, spiritum non posse putrescere. Quod con-
 51. firmo ex natura rei, quia ad putredinem obstructio requiritur,
 52. quam nunquam faciet spiritus, tenuissimus cum sit, & faciliè diffle-
 53. tur. Quod considerans Gal. 1. de diff. feb. cap. 7. febrem diariam
 54. exemplo lapidum, & aliorum, qua alterari possunt, & non putre-
 55. fieri, demonstravit. Præterea ad putredinem requiritur quies, quam
 56. spiritus non habet. Adde materiam putredinis esse humiditatem
 57. excrementitiam, qua in spiritibus non reperitur, cum ad igneam ac-
 58. cedant naturam. Rationes Vallesij nil concludunt. Prima enim
 59. ostendit, ipsum non rectè aduertisse ea, qua docet Arist. 4. meteo. c. 1.
 60. Eo enim in loco non sentit omnia alia corpora ab igne putrescere:
 61. non ignorat Arist. ferrum, lapidem, elementum terreum, quod sum-
 62. mè siccum est, non putrescere, sicut nec alia similia corpora, qua mul-
 63. tum*

Solutio
 prima
 rationis
 Vallesij

rum sicca sunt. Non ergo erit hac bona consequentia, ex Aristotele omnia putrefieri possunt prater ignem, ergo spiritus putrescent. Ad Aristotelem ex serie contextus respondendum est, in eo enim cap. 1. agit de generatione, quam dicit fieri à calido & frigido, quia calidum frigido temperatum (quod est calidum innatum) generationem efficit, permiscendo humidum cum sicco. Et ita igneum elementum est agens, quod permiscet: at alia elementa sunt materia ignis, quia cum miscentur, ab eo patiuntur: & ideo possunt putrefieri, cum ignis victus non potest gubernare mixtionem: cum autem vincit, non fit putredo: unde ignis non potest putrefieri, quia est agens, bene alia, qua sunt materia ipsius. Videat ergo Vallesius, quàm longè à mente Aristotelis proponat propositionem, qua simpliciter prolata falsa est, nisi contextus antecedentia, & consequentia aduertamus. Ad secundam rationem respondeo, negando consequentiam. In cuius confirmatione duo affirmat Vallesius. Primum est, ex Galeno spiritum esse crassiorem aëre. Secundum, spiritum videri. Quæ duo falsa sunt. Primum, quia spiritus est crassior, non aëre, ut vult Vallesius, sed æthere (ut eo loco ait Galenus) hoc est secunda aëre purissimo, ex quo fit nam ex tenuissima aëris parte, & vaporis rationis. Spiritus sanguinis etiam tenui parte, spiritus generationem obtinet in corde, concoctione: quæ, etiamsi incrasset, non proinde dicendum est spiritum esse crassiorem aëre, sed tenuissima aëris parte, ex qua generatur. Unde hac consequentia non valet, aër putrefit, ergo & spiritus. Quia aër quietus potest esse in uno loco, habetque continuitatem, & humiditatem, & sic potest putrefieri: quæ omnia deficiunt spiritui, ut diximus. Secundum, quod Vallesius scribit, nempe ex Galeno spiritum videri, quod & omnes affirmare non video: ostendit ipsos per transcennum legisse illum libellum, cui titulus est. An sanguis in arteriis contineatur, in quo Galenus contra Erasistratum disputans probat, spiritum solum, non contineri in arteriis hac prima ratione. Si spiritus solus in arteriis contineretur, videremus eum exire, ergo solus non continetur. Propositionem confirmamus, quia si videremus eum exire, id colligeremus ex coincidentia arteriarum. Quod similitudine possumus ostendere in vire, in cuius compressione solemus dicere, nos videre aërem ex eo egredi. Respondebant sectatores Erasistrati Galeno, non est necessarium nos videre exire spiritum ex arteriis quia tenuis, & levis est spiritus, & sic facile expirat. Contra hos disputat, ea ratione, quæ diximus ex compressione desumpta. Videant ergo, qui spiritum videri ex Galeno affirmant, quantum à veritate abhorrent: aliud enim est dicere videri spiritum, & aliud videre spiritum exire, hoc enim ultimum signo prædicto possumus intelligere. Iam si tam acutè vident, ut eis non lateat spiritus,

spiritus, dicant mihi eius colorem, aut ipsum ostendant mihi, hoc enim sensu, non ratione debet probari.

Febrem diariam aliqui in varias differentias diuidunt, pro varietate spirituum, qui aut sunt vitales, aut animales. Non considerantes spiritum vitalem solum in corde calidum efficere diariam.

**Difference-
diaria-
rum.** *Dicendum ergo est, febrem diariam unicam esse, neque posse in varias differentias pariri, cum spiritus vitalis unicus tantum sit: ac cum pro causarum varietate, curatio diaria varietur, differentia diaria ex causis variis desumenda erunt. Diaria semper fit à causis*

externis, in quibus opus est considerare, an sint presentes, an non, tum an febrem efficiant, affectum aliquem in corpore generando,

**Causa
presen-
tes indi-
cant.** *vel sine affectu. Si causa presentes sunt curationem indicant, non autem si sunt absentes. Si causa affectum aliquem efficiunt, ut frigus, & balneum aluminosum densitatem cutis, ablatiis causis non ad febrem, sed ad curationem affectus veniendum erit. Si vero*

nullus sit affectus, diariam curabimus, ut manifestum est in illa qua fit ex ira, & exercitatione. Et ita cum Galen. 8. method. in fine, diariam conuenire cum hectica scribit, intelligit de diaria, cuius causa nullum affectum in corpore generauit, hac enim curatur alteratione, sicut & hectica.

**Signa
commu-
nia dia-
riarum.** *Signa febrium diariarum quedam sunt communia, quedam vero propria. Communia omnibus diariis conueniunt, quae traduntur à Galeno primo de differ. febr. cap. 8. Propria signa sunt illa, quae causas particulares febrium diariarum ostionem, refrigerationem,*

**Signa
propria.** *cruditatem, iram, tristitiam, bubonem, vini potum, & alias similes demonstrant: de quibus agit Galen. 1. de arte curat. ad Glauconem, & 2. Criseon cap. ultimo. Ex quibus locis hac omnia pete, neque enim animus est transcribendi ea, quae rectè à Galeno sunt explicata, ut multi facere solent, eo solum nomine, ut chartas impleant, & aucti voluminis auctores videantur.*

**Metho-
dus ad
curan-
das fe-
bres pu-
tres.** *De febribus putridis iam cum auctore agendum est, sed antequàm particularem earum curationem aggrediamur, aequum erit breuiter methodum generalem proponere, qua id prestare possimus. Primò ergo aduertendum est, in omnibus febribus putridis, hos septem affectus reperiri. Primus est febris, 2. putredo, 3. prohibita transpiratio, 4. obstructio, 5. humoris multitudo, 6. humoris crassities, 7. humoris glutinositas. Vnde febris varias habet causas antecedentes, quarum quedam solum sunt causa, ut putredo, & fluxio humoris multi, crassi, aut glutinosi. Prohibita transpiratio est symptoma, & causa putredinis. Obstructio est morbus, & causa putredinis. Haec febrium causa aliquando omnes sunt presentes, aliquando non omnes. Praesentes sunt omnes, cum febris est in principio, tunc enim est fluxio humoris, obstructio,*

prohibita transpiratio & putredo. Non autem sunt omnes causa praesentes, cum febris est in aliis temporibus: nam in augmento febrium tam deficit fluxio, sicut in statu fluxio & obstructio non sunt, in de-
 ctinatione verò sela est putredo (sicut in statu) sed iam euacuatur. Secundo aduertendum est, omnes fibres putres conuocare in putredine, differre autem pro varia putredinis differentia ex loco, seu foco putredinis desumpta. Putredo enim vel est in toto corpore, aut maxi-
 mis vasis, ut in febre syncho, vel est in una tantum parte. Rursus haec putredo, quae in una consistit parte, vel est cum phlegmone, vel ci-
 tra phlegmonem: si est sine phlegmone, pars illa, quae obstructionem ha-
 bet in qua putrescit humor, dicitur focus putredinis. Si humor pu-
 tret in toto corpore, febris ex eo orta caret accessionibus. Si verò in
 una tantum parte putreat, particulares circuitus efficit: simulque fe-
 brem continuam, aut intermittentem: continuam, si humor putrefa-
 ctus in foco, ob eius multitudinem, aut facultatis expultricis imbe-
 cillitatem, intra vasa continetur: intermittentem verò si propter cau-
 sas contrarias, per habitum corporis expellatur. Haec omnia conside-
 ramus, propter curationem, quia cum in syncho non sint circuitus,
 hora consueta cibabimus aegrotum, non sic in aliis febribus, quae cir-
 cuitum habent in quibus in hora accessionis abstinendum est ab ali-
 mento, nisi urgeat aliqua occasio: ut si vires concidant, qua ratione S.
 metho. biliosi aliquando in hora accessionis cibantur. Tum in syn-
 cho, & continuis, dummodò adsint vires, quocumque tempore licet
 sanguinem mittere, at in intermittentibus solum in hora intermissio-
 nis. His positis metho. lo rationali ex indicationibus desumpta, febrem
 putrem hac ratione curabis. Febris putris est morbus fiens, hoc est,
 qui habet causam ipsam fouentem. Habet ergo aliquid factum, & Metho-
 aliquid quod fit. Id quod factum est, debet curari, quia est morbus: id
 quod fit, debet prohiberi, ne fiat, quod praestabimus auferentes cau-
 sam, quae est putredo. Haec etiam habet quid factum, quod curationem
 etiam postulat, & quid fiens, quod prohibebitur auferentes prohibi-
 tam transpirationem, quae est eius causa. Prohibita transpiratio non
 habet quod factum, & quid fiens, ut male voluit Altemarius, quia
 haec factum essentiam habet in fieri & perpetuo ab alio dependentem.
 Debet ergo auferri quod praestabimus, prospicientes obstructioni, quae
 est eius causa continens. Obstructio etiam habet aliquid factum, in-
 dicans curationem: & aliquid quod fit praeuisione egens, quam pra-
 estabimus, auferentes eius causam, quae est fluxio humoris multae, crassi,
 aut glutinosi. Unde in hac resolutione principium à febre sumimus,
 & tandem ad fluxionem gradatim descendimus, ita ut id quod in
 resolutione ultimum est, sit primum in curatione: quia affectus non
 potest tolli manente causa, unde ortus est. His si addamus indica-
 tiones, quae à viribus, & natura sumuntur, integrari habebimus
 methodum.

Differē-
 tia pu-
 tredinis
 conside-
 randa in
 curatio-
 ne.

Metho-
 dus cu-
 randi fe-
 bres pu-
 tres.

DE CVRAND. MORB.

methodum. Indicationem à natura tunc addemus, cum in quotidiana rationem habuerimus ventriculi, in tertiana iecoris, in quartana verò lienis. Aduertendum praterea est, nos in hoc libro non agemus de re de febribus, quæ inflammationes sequuntur, quoriam hæ sunt symptomata, & curata inflammatione cessent: sed de aliis febribus putridis, quæ citra inflammationem fiunt, & in quibus septem illos affectus consideramus. Quid autem unusquisque ex illis indicet, propriis capitibus explicabimus incipientes à syncho.

Nomina Febres quotidiana, tertiana, & quartana dicuntur, non quia hæ febrium beant accessionem, singulis diebus, tertio, aut quarto euenientem, quia putrida- hac ratione duplex tertiana diceretur quotidiana: sed quia talium, de fiunt humore, quotidiana, quia fit à pituita, tertiana à bile, quarta- syncho. na ab humore melancholico. Ex his manifestè patebit, febrem syncho- Duplex chon (hoc est continentem) appellari eam quæ ex sanguine ortum habet: quæ caret circuitibus, & una continua clauditur accessione, chus. quia non habet unum certum locum affectum, sed multos. Hæc duplex Syncho plex est non putris, & putris. Synchum non putrem ex vaporibus ex sanguinis calefactis generari, & ad diariam referri supra, cum de guine diariis erat sermo, explicauimus. De qua in præsentia non disputari pro. mus, sed de altera syncho putri, quæ habet ortum ex putredine subat ex corum, vel sanguinis (quod idem est) in omnibus vasis, vel maximis, eius cau- & calidis, qualia sunt illa, quæ inter alas, & inguina clauduntur: sa pri- ibi enim caudices vena, & arteria existere anatomes docet. Hanc mō. autem putredinem in omnibus vasis, aut magnis inclusam solus sanguis (hoc est massa sanguinaria) efficere potest. Quia eius putredinis causa est plenitudo (ut ex 9. metho. cap. 5. & prima historia cap. 4. colligimus) non ea quæ est ad vires, sed ad vasa. Vtraque autem à solo sanguine fit, nullus enim humor solus tantum augeri potest, ut venas distendat, quod in morbo regio experieris, & aliis similibus affectibus.

Obiectio. Dices, nonne dantur plethora biliosa, melancholica, atque etiam pituitosa, quam nos plethoram secundum quid appellamus?

Solutio. Poterit ergo ex hac fieri etiam synchos. Respondeo concedendo consequentiam, cum enim in hac plethora humor non sit separatus à sanguine, si in eo breue habuerit augmentum, poterit facere synchon: sin verò magnum, cum iam tunc sanguis sit multum pituitosus, melancholicus, aut biliosus, neque poterit facere plethoram ad vasa, & febris quæ sequetur habebit circuitus illius humoris aucti. Quod synchos febris fiat ex solo sanguine per præpollentiam dicto, (quia sanguis humor quartus solus nunquam extat) præter rationem dictam, aliis etiam conformabimus, ita ut hæc sit secunda ratio, desumpta ex

Secunda ratio. 9. method. cap. 3. ubi scribit Gal. febrem synchon fieri, cum humor aqualiter, & citè, in omnibus vasis, aut magnis putrescit. Vbi illa duo verba aqualiter, & citè consideranda sunt: aqualiter enim in omnibus

omnibus vasis solus sanguis, qui in eis potest redundare, putrefieri poterit, sicut & citò, cum non diffletur, quia est calidus, & sic facile in-
temperiem calidam concipiet, & humidus : & ideò multi calidi &
humidi vapores ab eo eleuati neque rectè gubernati citò putredinis
erunt auctores: sicut & ipsemet sanguinis citò etiam facile putredi-
nem concipiet. Tertia ratio ex eodem loco Galeni, synochos febris ne- Tertia
que in frigida aetate, ut senectute, neque in frigido corporis tempera- ratio.
mento, quale est hominis melancholici & pituitosi, quia melancholia,
& pituita citò non possunt putrefieri, neque in hominibus gracilibus,
hoc est biliosis, quia multum diffillantur, fieri potest. Ergo fiet in solis
sanguineis. Quarta ratio ex eodem capite Galeni, synochos carnosos Quarta
& multo sanguine affluentes afficit, ergo solùm fiet ex sanguine. ratio.
Quinta in synochos Quinta
est maximus ex eodem loco Galeni, ergo ex solo ratio.
sanguine, fiet, quia homines sanguinei & carnosissimi, cum habeant maxi-
mum pulsum, & sic nature usque ad magnum tantum possunt
peruenire. Sexta ex curatione colligit institutum, quia solùm in sy- Sexta
nochis mittimus sanguinem usque ad animi deliquium, ut inferius ratio.
vi lebinus, propter Septima
qua à solo sanguine fit. Septima ex 9. ratio.
method. cap. 5. de Septima
apertè id monstrat, eo enim in loco Gal. ratio.
plenitudinem ad Septima
synochon non ratio.
scribit, quia ea nec ob-
struit venarum ora, nec et prohibet Septima
congestionem, nec tunicas ratio.
earum distendit, nec ruborem, nec tumorem inuehit. Iam à contrario
sola illa causa, illa causa faciet synochon, qua distendit venas, ita ut
in eis tumorem efficiat, qui est signum non plenitudinis, sed magna
plenitudinis, qua ruborem inducit in cute. Certissimum ergo erit ho-
mini vel mediocris iudicij, hac omnia à solo sanguine summè aucto-
feri, & ita hunc solùm synochon generare posse. Ex his colliges ma-
lè Altomarium à bile, pituita & melancholia syncera synochon etiam Altoma-
fieri scripsisse. Probat autem etiam à bile fieri his rationibus. Prima rij sen-
desumitur ex Gal. lib. 2. diff. febrium c. 7. ubi continuam ex bile fe- tentia.
brem diuidit in synochon, & continuam. Secunda etiam vim habet Prima
ex lib. 2. Criseon cap. 6. ubi Gal. postquam synochon febrem conti- ratio Al-
nuam esse, & acutam scripsit, consequenter de ipsa loquens hac ad- tomarij
dit, sufficit enim genus agnoscere, quod biliosa sit, atque deirens, hac probans ratio.
Gal. si synochos est biliosa, ergo bilis synochon efficiet. Tertia ratio synochon Tertia
Hippocr. 4. de ratione victus sic habet. Cum vena totius corporis fieri ex ratio.
exiccata, attraxerint acres, ac biliosas humiditates ex carnibus, fe- ratio.
biles ardentes sunt. Iam si hoc ita est, si bilis à venis omnibus attra- Secunda
hatur, ex carnesis partibus faciet synochon. Quarta ratio, si syno- Tertia
chos febris fit ex sanguine putrescente, ergo & ex bile, consequentiam ratio.
probat, quia sanguis cum admodum putrescit, eius tenuior portio in Quarta
bilem mutatur. ratio.

Quod ex pituita etiam generare possit, probat ex lib. 4. acutorum,

DE CVRAND. MORB.

genera- ubi Hippocrates fatetur, pituitam salsam à totius corporis venis at-
 re syno- tractam, aliud causa genus efficere: ergo cum hac pituita erit putre-
 chon. facta in omnibus venis, vena habebit accessionem, & sic erit syno-
 chos. Hæc Altomarius. Cuius rationes soluenda sunt, cum iam paulò
 supra probauimus solum sanguinem ex quatuor humoribus constitu-
 tum, synochon generare posse. Prima ratio desumpta ex Galeni loco
 Solutio non rectè considerato: ibi enim hoc est 2. de disse. feb. totum quæ ex
 prima flaua bile fiunt additum est, & superfluum imò repugnans Galeni
 rationis. doctrina, ut disputationis series persuadet. Postquam enim Gal. egit
 Alto- de intermittentibus febribus, illo cap. 7. incipit agere de continuis, eas
 marij. diuidens hoc modo, Continua febres, aut sunt continentes, aut nomen
 generis seruantes, continua dicuntur. Rursus continentes, tres habent
 Solutio differentias, sicut & continua, quæ eo loco enumerantur. Et ita ex,
 secunda plicatio huius loci, ostendet etiam locum, qui habetur 2. criseon, ex
 rationis. quo secunda ratio habet vim, corruptum esse: ibi enim totum illud,
 quod biliosa fit, delendum est, ut ex contextu colligo. In eo enim inci-
 piens agere Galenus de continentibus febribus, eas ait esse continuas,
 & ardentes. nullam faciens mentionem, quod sint biliosa, ac proinde
 cum concludit, sic legendum est, Sufficit enim genus agnoscere,
 quod continua sit, & aduens. Tertia ratio ridiculam habet conse-
 Solutio quentiam. In primis cum Hippo. dicit venas exiccatas attrahere bi-
 xertia lem ex carnibus, intelligendum est, venas eo modo affectas attrahere
 rationis. ex carnibus ichores sanguinis. Non tamen intelligendum est, hos sem-
 per ubi attrahuntur, facere febrem: hoc enim falsum est, sed tantum,
 quando in aliqua vena à crasso humore obstructio incepta est, tunc
 enim ichores ibi detenti augment obstructionem, & sic fit putredo tan-
 ta, quæ potest generare febrem. Secundo, etsi vena attrahant bilem ex
 carnibus, & hac perficiendo obstructionem febrem generet, habebit
 circuitus tertianos. Tum bilis flaua non potest obstruere, quomodo
 ergo efficiet synochon? Quarta facillimum erit satisfacere, si enim
 Quarta sanguis iam habet tenuem portionem in bilem mutatam, febrem
 rationis efficiet habentem tertianos circuitus, & tunc Galenus eam ap-
 solutio. pellat febrem biliosam, nos autem non loquimur, nisi de san-
 guine non mutato adhuc in bilem, aut melancholiam, & putre-
 facto, hic enim est, qui facit synochon. Vltima ratio quæ probat pi-
 tia syno- tuitam salsam generare synochon duo habet absurda, quæ sunt, pi-
 cha fe- tuitam salsam posse in toto corpore putrere, & secundo posse fa-
 bris tres cere vnã accessionem. De differentiis synocha febris disputemus,
 sunt. quæ tres sunt. Prima appellatur à Græcis acmaistica, à La-
 Prima. tinis augefcens: quia à principio sue generationis semper ha-
 Secunda bet accessionem incrementem: causa huius rei est, quia in ea plus pu-
 differen trescit sanguinis, quàm dissipetur de putrefacto. Secunda dicitur à
 tia. Græcis omozonos, cuius accessio semper eundẽ seruat tenorem: hoc est,

qua

qua neque diminuitur, saltem sensibiliter: quod provenit ex eo quod tantum dissipatur humoris putrefacti, quantum de nouo putrescit. Tertia differentia synochos, à Græcis paracmastica, à Latinis de-
 crescens dicitur, in qua accessio semper decrescit, quia plus dissipatur ex putrefacto sanguine, quam putrescat de nouo. Dices si una-
 quaque synochos unam habet accessionem, ergo habebit etiam unum-
 tempus solum. Respondent omnes medici, verum esse synochon so-
 lum habere unum tempus morbi sensibile, & tria insensibilia. Quia quantum crrent, hac ratione probamus. Sanguinis missio non
 est exercenda in statu, aut morbi declinatione; sed si synocha febres
 habent unum tantum tempus, tunc in eis sanguinem mittimus in
 statu, & declinatione: Ergo hæc febres non habent unum tantum tem-
 pus, sed multa. Maiorem probamus, quia tempore status non est flu-
 xio humoris, & est coctio perfecta. At in declinatione, cum humor
 peccans iam à natura euacuetur, non est quod eius motum pertur-
 bemus sanguinis missione. Assumptio nota est, quia in omotono (si
 tantum habet statum) cum sanguinem mittimus in statu exercemus
 euacuationem sicut in paracmastica in declinatione. Ego autem (una
 cum Ludonico Collado præceptore doctissimo) sentio, has tres synocha
 febris differentias, habere quatuor tempora uniuersalia sensibilia.
 Cognoscuntur autem ex cruditate & coctione: principium enim est
 quando est signum cruditatis in calore, pulsu, & vrina. Augmen-
 tum, quando incipit coctio. Status, quando perfecta est, declinatio ve-
 rò cum febris iam mutescit. Dices, si hoc ita est, qua ratione unam
 appellamus augetcentem, aliam in eodem statu permanentem, & aliã
 decrescientem? Respondeo, quia hæc est propria constitutio huius febris,
 ut in declinante erit manifestum, in hac enim in principio humor
 multus facit obstructionem, ita tamen fluit ad eam ut minus fluat
 quam dissipetur, hoc tamen, non tollit febrem esse in principio, idem
 dicendum in aliis temporibus. Quod autem hoc sit verum, colliges ex
 9. method. cap. 4. in secunda historia serui cuiusdam, qui synochon
 putrem patiebatur. Quem Gal. post secundam noctem vidit putres-
 centium humorum præsentem notas, unde queso Gal. desumit no-
 tas humorum putrescentium, nisi, ut iam diximus, ex calore, pulsu, &
 vrinis? Tum nonne quando humor putrescit, est cruditas? Adde in
 eadem historia inferius hæc scribere Galenum, itaque ad portionem
 minuētis se febris, vrinæ quoque concoctio præcesserat, eratque
 haud obscurum septimo finiendam. Sensim ergo procedebat con-
 coctio, in hac synocha post cruditatem, & id.ò, quando in synochis san-
 guinem mittimus, in principio sensibili id præstamus.

Tertia
differentia.Obiectio.
Solutio
medico-
rum.Refuta-
tio solu-
tionis.Propria
solutio
& vera.

Obiectio.

Solutio.

Sectio
vena.

Secundò secta basilica dextra.] Synochos febris non potest curari,
 nisi prius causa eam generantes auferantur, quæ sunt putre. o, prohi-
 bita transpiratio, obstructio, & multitudo humoris. Ex his causis cum

fit prima multitudo, ab hac incipienda est curatio. Hac indicat sui ablationem, qua fit per contrarium nempe euacuationem lib. 2. aph. sent. 22. Cum autem euacuatio possit fieri inedia, balneo, frictione, exercitatione, purgatione & sanguinis missione, de remedio euacuante in hoc effectu, hoc modo deliberabis. Plethora in syncho est magnus affectus: postulat ergo magnū remedium, qualia sunt inedia exercitatio, balneum, frictio, & similia, qua idco omittuntur. Remanent ergo duo remedia magna, purgatio, & sanguinis missio. Purgatio caret occasione, quia non est affectus eum indicans, remanet ergo sola sanguinis missio, qua cito, & multum omnes humores potest ex toto corpore

Sanguis euacuare. Hec autē exercetur à Galeno aliquando, usque ad animi
nis mis. deliquium 9. meth. 4. sic & 6. epy. par. 1. com. 29. & aliis locis delibe-
sio usque rans de ipsa ex affectu postulante talem euacuationem & prae sen-
ad ani- tia virtutis. Affectus postulans est maxima plenitudo, qua maximam
mi deli- postulat euacuationem. Vires autem summae sunt: quia homo est car-
quium. nosus, & iuuenis, & idco habet maximum pulsum: inde colliges, in his
 febribus synochis (cum ratione maioris & minoris differant) non esse
In bilio- necessario mittendum sanguinem, usque ad animi deliquium, sed ani-
sis febr- mi deliquium esse terminū illius euacuationis, ita ut in summa pleni-
bus pro- tudine, non liceat ulterius euacuare, nisi voluerimus egrum interfice-
bat Val- re. Vnde videat Vallesius, qua ratione possit constare sua sententia,
lesius qua lib. 7. controuersiarum nititur probare, in febribus biliosis conti-
sanguis nuis, etiam sanguinem mittendum esse, usque ad animi deliquiū. Pri-
nem esse ma ratio, Gal. 2. aphor. com. 29. in ardentissimis febribus sanguinem
mitten- mittit usque ad animi deliquiū: sed febris tertiana cōtinua est febris
dum us- ardentissima, ergo in ea licebit talē euacuationem exercere. Secunda
que ad Gal. sanguinem mittit in hac febre, ut refrigeret, ergo & id licebit in
animi tertiana continua, in qua intensior est caliditas, quā in syncho. Ter-
deli- tia ratio, in synochis Gal. copiose euacuat, ne humor propter feruorem
quium. in partem principē feratur: sed in tertiana continua magis feruet ca-
Prima lor quā in syncho, ergo licebit in ea propter eandem causam eua-
ratio. cuare copiose, hoc est usque ad animi deliquium. Et cum possit aliquis
Secunda ei obicere, in tertiana cōtinua deficere virium robur. Respondet se lo-
ratio. qui non de ea tertiana, qua exquisita est, sed de notha, in qua vires
Tertia possunt constare. Certē ego multum miror virum doctissimū nunquam
ratio. aduertisse, has rationes nil concludere, neque ex quo affectu deliberare-
Contra mus in syncho, de sanguinis missione. Nos enim ut Gal. & rei natura
Vallesiū. docent, in ea usque ad animi deliquiū euacuamus, indicatione sum-
Secunda pta ex causa obstructionis, qua plethora est, rō ergo mittimus sangui-
& tertia nē, ut refrigeremus, ut secunda ratio docet. Quod si ex tali euacuatio-
rationes ne sequatur corporis refrigeratio, & inde delectatio, id ex accidenti.
solum- prouenit, non quod nos id instituamus efficere. Neque etiam sangui-
tur. nem mittimus, ne sanguis decumbat ad partem principem, ut ter-
 tia

tia ratio docet, verum est, ex hac sanguinis missione id aliquando prohiberi. Prima ratio nil concludit, quia et si Gal. scribat lib. 2. aph. in ardentissimis febribus, sanguinem esse mittendum usque ad animi deliquium. Quid intelligat per febres ardentissimas ipsemet explicat lib. 6. epy. & lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 11. & 9. methodi: in quibus locis agit de hac copiosa euacuatione, & solum meminit ardentissimarum, quae ex sanguine sunt, & quamvis id non scripsisset, nos ex natura rei debemus id colligere. Si enim hac tam copiosa & summa euacuatio, postulat magnam plethoram & summum virium robur, quae desiderantur in tertiana qualibet, quomodo licebit in ea summe euacuare? Quod si in tertiana notha sunt vires, ut vult Vallesius, non tamen summa, sed tales, quae poterunt ferre euacuationem, propter reuulsionem factam.

Tertio, potu magno.] Post sufficientem sanguinis missionem, quam cognosces ex coctione, quae in urina apparere incipit, cum iam curata sit causa obstructionis ad hanc veniendum est. Curabitur obstructio suo contrario, quod est aperiens. Hoc varium est, decoctum capillorum veneris, cithorea, aut alterius similis cum oxymelle. Eligenda enim sunt aperiencia minus calida, quia quae calidiora sunt, augendo calorem humorum putrium, augebunt & putredinem. Aduerte tamen aperiencia medicamenta obstructionem curare, sanguinem fluxilem efficiendo, & motum ei tribuendo. Iam obstructione curata, ut possit putredo per conuenientes regiones expelli, utiliter exhibetur aqua frigida potus. Qui refrigerans partes ab intemperie calida languidas, eis robur addit, temperiem generando: haec autem roborata, putredinem expellere solent, per sudorem, urinam, vomitum aut deiectionem: aut simul multis ex his euacuationibus. Quod si aeger iuuenis fuerit, & carnosus, astate media, natatio in aqua frigida commoda erit, quae corrigendo partium intemperiem, sudorem mouebit. Neque frigiditas densando poros cutis eam prohibebit, quia potius ab ea, ad mediocritatem reducentur, nimis dilatati à calore febrili, & aetatis. Quod si Hippocr. lib. 3. acutorum natationem in aqua frigida vitet in agrotis, intellige cum Galen. in illis agrotis, qui virium habent imbecillitatem. Dices, cur putredinem nos non euacuamus? Respondeo ad auferendam putredinem in viventibus, nos expectare actiones facultatum naturalium, quae ratione in syncho separata parte putri à non putri, eam quae putris est, facultas expultrix euacuat, quae sollicita est de animalium salute, & proinde recte dicebat Hippocr. natura medicus, nos enim ministri tantum sumus. Iterum obijcies, diminutè tradidisti curationem, quia prohibitam transpirationem, quae etiam debet auferri, omisisti. Respondeo, consultò, id esse factum, quia, ut iam supradixi, prohibita transpiratio habet essentiam in fieri, & ideo curata obstructione cessare.

DE CVRAN. MORB.

Quartò concoquenti bilem.] Neque bilis eget preparatione, neque hic affectus pendet ex bile, cur ergo prepararet bilem, nescio.

Auctor Quintò, vacuantibus bilem. [Febris synochos, ex sanguine ortum taxatur. habet, & non ex bile, proinde non est quòd ea euacuemus. Vera est, si hac febris perseveret, sanguinis tenuiorem portionem mutari in bilem. & hanc febrem iam esse biliosam, quæ curabitur ea ratione, quæ inferius videbis.]

De febre ardente. CAP. II.

Descriptio.

Ardens febris Latinis, causos Græcis, est febris biliosa de genere continuarum: errant igitur qui cum Arabibus volunt à falsa pituita posse procreari: errant quoque qui cum iisdem ponunt discrimen inter ardentem febrem & tertianam continuam: quia neque à bile flava putrescente in venis, quæ a corde distant, fit, neque illa ab eadem bile putrescente in venis cordi propinquis tantum, sed (Galen. auctore in variis locis, præsertim comm. 69. li. 4. aphor. febris ardens eiusdem est generis cum tertiana exquisita intermittente, eò quòd ab eodem humore bilioso ambæ procreentur. Differt tamen ardens à tertiana exquisita, quòd in hac flava bilis per totum corpus fertur, in ardente autem febre ipsa

Causa.

bilis in venis vnà cum sanguine continetur. Omnia quæ bilem flavam procreant, efficere possunt febrem hanc, aër scilicet nimis calidus, alimenta acris & admodum calida, vt piper, sinapi, cæpe, allia, vinum vetus, & similia, & animi & corporis labores. Ex his enim flava bilis gignitur omni tempore, & ætate, præsertim æstate, & iuventute: à qua in venis putrescente fit ardens febris. His notis cognoscitur, lingua eorum qui hac febre laborant, arida fit, aspera & nigra ventriculi erosio, sitis intolerabilis, vigilia, capitis dolor, nonnunquam etiam delirium, mouentur ferè semper ab vna parte in aliam, vt animalia turgida & venere capta, & tumores turgidi, à quibus sæpè fit hæc febris. Quare deiectiones alui eis liquidæ, & pallidæ sunt, quamuis sæpe alius dura sit. Pulsus celerimus, vrina flava, & aliquando alba, quæ delirium futurum significat: fiunt aliquando surdi hi, & nonnunquam muti. Septem reme-

Curatio.

diorum generibus curatur. Primò victu tenui refrigerante satis & humectante, vt aëre in æstate parato, aqua rosata inspersa sæpe per totam habitationem, foliis etiam lactuæ, myrti, salicis floribus violarum, nenupharis, & rosarum, fuga anhelitus multorum, iræ, & aliorum, quæ calefaciunt. Nutriatur cremore hordei, succo

Cibus.

granatorum, lactuca, præcipuè cum aceto & saccharo, cichoria, cucurbita, lacte amygdalarum dulcium, & quatuor seminum frigidorum, cucurbita saccharo condita, radice bulgossæ saccharo condita,

condita, scapo lactucæ condito saccharo, dicitur à Valentinis gorga daniel. Si sit æger imbecillus, nutriatur iure pulli cum lactuca in eo elixa, vel hordeo sine cortice: semper tamen habenda ratio eorum, quæ diximus capite præcedenti cum Hippocrate 17 aphorismo primi, & etiam eorum, quæ 8. & 10. Aphorismo eiusdem lib. docuit Hippocrates, in quibus habetur, in vigore morborum, & iuxta vigorem non esse cibum exhibendum, neque in his, in quibus vigor est omnis morbus, ut in apoplexia, vel maxima febre. At in aliis plus cibi esse dandam in initiis, & semper *Error fac* versus vigorem minuendum, cuius contrarium consilium no- *minarū* stræ sceminae quotidie sequuntur, dant semper in morborū ini- *in victa.* tiis parum cibi, & augent ipsum continuò vsque ad vigorem, & ipsum sæpè augent, vel multum saltem præbent, quo errore non pauci ægri pereunt. Potus sit aqua hordei sine cor- *Potus.* tice solūm. In prandio & cœna, & cum julep violarum, & rosarum, & syrupo acetositaris citri quacunque alia hora.

Secundò secta basilica dextra, si fuerint signa sanguinis, *Sectiones* rubedo scilicet totius, venæ magnæ & plenæ, vrina rubra & *na.* ætas florida, & robur virium. Cum verò in hac febre non ap- *An secan* parent signa sanguinis, non est necessaria sanguinis missio: *da sit ve* sed purgatio bilis, neque in omni purrida febre est secanda *na in om.* vena, ut multi recentiores medici cum Gal. 11. meth. volunt. *ni febre* Nam non deprauato sanguine, primo vel secundo loco per- *putrida.* mixtionem vel corruptionem potius noceret, & ideo ipse Galenus libro primo de arte curatiua ad Glauconem cap. de curatione tertianæ exquisitæ, nihil de sanguine mittendo dicit: & post eodem lib. capite de tertiana notha: quòd si inquit, sanguinem mittere oporteat, neque hoc quoque omittendum, sed ab initio statim adhibita earum rerum quas scis distinctione tantum mittendum, quantum præsens exigit status: & capite de curatione quartanæ eodem libro, deinceps de quartanis dicemus, quas etiam ab initio mediocriter ac leniter tractare oportet, nullum acre medicamentum, aut euacuationem exhibentes, nisi sanguis fortè vehementer superabundans appareat, & si vena incisa is qui fluit niger videatur ac crassus, præcipuè verò in iis, qui liene laborant, huiusmodi cernitur. audaciùs mittendus est: quòd si tenuis, aut flauus extiterit, statim supprimendus: & postremo eodẽ libro cap. de curatione continuarum. Sanguinem verò, inquit, mittere oppottet, & ob morbi magnitudinem, & quibus multò plus ruboris insit, quàm naturæ conueniat, & maior quam pro consuetudine corporis tumor, & venæ eminentiores atque magis extensæ, his omnibus est auferendus, nisi vires,

DE CVRAND. MORB.

aut ætas, aut aliquid eorum, quæ supra commemorauimus, prohibuerit. Concludamus cum Gal. his in locis, sanguinem non esse mittendum in omni febre, quæ dependet ex putredine humorum. Huic libro est maxima fides adhibenda, quia scripsit in eo de febribus ex professo, & propriam disputationem de his tantum instituit, in methodo verò generalius omnia persequitur. Deinde librum hunc ad Glauconem scripsit, qui in philosophia & medicina diu multumque versatus erat.

Cur magna fides adhibenda lib. de arte curandi ad Glauconem.

Neque Galeni authoritas vndecimo methodi repugnat (ut diximus) huic nostræ, vel potius Galeni sententiæ & veritati, neque etiam commentarius 23. primi libri aphorismorum, ut aliqui recentiores medici censent, est contrarius nobis, in quo non docet Galenus omnem febrem ardentem indigere sanguinis missione usque ad animi deliquium, nam non verum id est, nisi quando sanguis peccat cum bile. Cum enim sola bilis putrescit, sanguis nullo modo mittendus est: quia eius vacuatio simul cum spiritu & nativo calore vel mortem, vel maximum periculum induceret.

Si bilis turgat.

Bilis ergo putrescens in hac febre ardenti si sit turgida absque concoctione, & sine sanguinis missione vacuanda est hac, aut simili potione: ℞. medullæ tamarindorum, & medullæ cassiæ fistularis recens extractæ. an. ʒ. ʒ. infusionis, ʒ. iij. rhabarbari in aqua endiuia per noctem factæ, diaprunis solutini ʒ. ij. ʒ. syrupi violarum ʒ. j. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus.

Potio. Potio diuiti.

Vel si est diues: ℞. mannæ electæ ʒ. j. ʒ. infusionis ʒ. ij. rhabarbari in aqua endiuia factæ, iuris pulli gallinacei, decoctionis florum cordialium, quod satis est, misce, & fiat potus. Si fuerit pauper,

Potio. pauperi. Clyster.

fiat vacuatio per priorem portionem sine rhabarbaro, die sequenti, & omnibus diebus, dempto die euacuationis per medicamentata purgantia hoc, vel simili clystere aluus lubricetur, ℞. foliorum maluarum, violarum, lactucæ, cichoreæ, & mercurialis an. m. j. furfuris, hordei sine cortice, quatuor seminum. f. m. conquassatorum an. p. ʒ. fiat decoctum, de quo percolato accipe ʒ. xv. olei violarum ʒ. iij. sacchari rubri, & cassiæ fistulæ præparatæ. an. ʒ. j. misce, & fiat clyster. Si maxima fuerit caliditas febrilis, adde tro-

Epithema cordi admo- uendum Præparatio bilis non turgentis.

chiscorum be camphora ʒ. j. mucilaginis seminis psyllij, & cydoniorum. an. ʒ. iij. olei papaueris ʒ. ij. Cordi à primo die omni hora admoueatur epithema aut simile: ℞. aquarum rosarum, & acetosæ. an. ʒ. iij. aquæ buglossæ ʒ. ij. aquæ melissæ, & aceti rosati. an. ʒ. ʒ. pulueris diamantharitonis frigidi, & trochiscorum de camphora. an. ʒ. ʒ. misce, & fiat epithema pro corde. Vnguentum cardiacum Gainerij, cuius descriptio continetur cap. præcedenti, sæpe cordi admoueatur tepidum.

Tertiò,

Tertiò, si materia biliosa non turgat, apparatus syrupo endiuix S. violarum, granatorum, endiuix compos. acetositatis citri, acetositatis limonum, nenupharis, de papauere cum duplo aquæ, vel decocti endiuix, cichoreæ, acetosæ, scariolæ, lactucæ & similia concocta hac bile.

Quartò, vacuantibus bilem, vt cassia fistularis, tamarindis, *Purgathabarbaro*, & aliis dictis primo cap. lib. 1. ex quibus simpli- *tio.* cibus & compositis variæ & multæ sunt formulæ, vt ℞. me- *Potio.* dullæ cassiæ fistulæ recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. ʒ. infusionis ʒ. j. rhabarbari electi in aqua endiuix per noctem factæ, diaprunis solutiui ʒ. iiij. ʒ. syrupi violarum ʒ. j. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus. Die sequenti aluus leniatur, & lauentur intestina clystere descripto cap. præcedenti, aut simili, vel bibat ʒ. iiij. decocti *Deco-ctū hor-dei loco clysteris.* hordei cum cortice cum vncia vna sacchari. Si omnino æger non possit bibere potum purgantem, vel eius ventriculus statim ipsum expellat, fiant boli, aut bucellæ, vt diximus capite superiori.

Quintò, refrigerantibus cor, iecur, & totum corpus in- *Alterat.* ternis & externis, vt potu aquæ frigidæ in magna quantita- *tio.* te, obseruatis omnibus, quæ diximus cap. præcedenti, tertio genere remediorum. Nam in hac febris ardenti utilior est & *Sumen-* magis necessarius, & hac mixtura: ℞. conseruæ violarum, *da.* nenupharis, acetosæ & rosarum an ʒ. j. conseruæ borragi- *Potus* nis ʒ. ʒ. pulueris diamargaritonis frigidi, & diarrhodonis *aqua frī* Abbatis an. ʒ. j. sacchari q. s. misce, & fiat conditum auro *gida his* coopertum, quo sæpe vtatur, præcipuè tempore sitis cum *utilissi-* aqua hordei: vel ℞. julep rosati, & violati. an. ʒ. iiij. syrupi *mus.* acetositatis citri ʒ. ij misce, & vtetur cum eadem, vel simili *Mixtu-* aqua tempore sitis. Summo mane per aliquot dies accipiat *ra ad bi-* drachmas quatuor electuarij diatrion santalorum, vel diar- *bendum.* rhodonis Abbatis, vel diamargaritonis frigidi, cum pauca *Electua-* aqua acetosæ, vel cichoreæ, vel hordei, vel pauco vino albo *ria, &c.* benè diluto. Syrupus ex aqua, vel succo cucurbitæ valenter extinguit sitim & calorem febrilem. Hoc electuarium cor- *Electua-* roborat, refrigerat, & est suaue gustanti: ℞. sacchari dissolu- *rium* ti in aqua rosata ʒ. iiij. fiat electuarium in tabulis ponderan- *suaue.* ribus ʒ. iiij. si adderes pulueris margaritarum electuarum, & ossis de corde cerui an. ʒ. j. esset magis cardiacum, quod omni tempore est utile. Hæc enim confectio est bona, præsertim si cor afficiatur palpitatione, vel alio affectu, animi sci- *Confec-* licet deliquio & simili: ℞. theriacæ de citro ʒ. j. conseruæ *lio car-* acetosæ, & nenupharis ana. ʒ. ʒ. confectiois de Hiacyntho *diaca.* ʒ. ij.

DE CVRAND. MORB.

*Aqua
cordi
admo-
uenda.*

*Hepati.
Obfer-
uatio.*

3.ij.pulueris diamargaritonis frigidi, & coralli rubri præparati ana. 3.j. foliorum auri numero iij. syrupi acetositatis citri, q.s. misce, & fiat confectio. Dosis omni hora cochlearium vnum cum pauca aqua acetosæ, vel buglossæ. Admoueatur sæpe in die & omni tempore cordi epithema descriptum in fine secundi generis remediorum huius capitis, in æstate actu frigidum, & in hyeme tepidum: & bis in die admoueatur vnguentum cardiacum Gainerij, de quo capite præcedenti, aut simile. Hepati quoque bis in die admoueatur cerorum santalatum, vel vnguentum tepidum, & sæpe in die hoc, aut simile epithema: ℞. aquarum endiuix cichoreæ, & schariolæ an. 3. iij. aquæ absintij 3.ij. aceti albi cochlearium vnum, pulueris santalorum omnium, & pulueris diarrhodon Abbatis an. 3. j. misce, & fiat epithema pro hepate. Hæc non sunt admouenda hepati, nisi post vacuationes. Renibus, & spinæ admouearur bis in die vnguentum, vel cerorum santalatum, quod habet vim refrigerandi.

*Corre-
ctio sym-
ptoma-
tum sic-
citatis
& ni-
groris.
Confe-
ctio.
Doloris
capitis.
Vigilia-
rum.*

Sexto corrigentibus symptomata videlicet oris, & linguæ siccitatem, & nigrorem, capitis dolorem, & vigilias immodicas. Siccitas linguæ & oris, & nigror curantur continua ablutione facta aqua rosata cum paucis aceto rosato, vino albo, bene aqua diluto, lacte amygdalarum non decocto, & sine saccharo: humectantibus quoque, ut mucagine seminis psyllij & cydoniorum aqua rosarum extracta: & hac mixtura seu loch, quæ sitim quoque extinguit, sæpe & parum ex ea transglutiendo: ℞. mucilaginis seminis psyllij, & cydoniorum an. 3. ss. sacchari candri violati puluerizati 3. j. syrupi violarum q.s. misce, & fiat concoctio. Capitis doloris curatio tradita est cap. 3. primi libri, quamuis curata febre, illius causa curetur. Symptoma hoc, dolor scilicet, aliquando trahit ad se curationem ob sui magnitudinem. Vigiliæ immodicæ curantur, ut diximus cap. quarto prioris libri, emulsione scilicet seminis papaueris, syrupo papaueris, vnguento populeonis fronti admoto, & frotu seu lotionem tibiæ ex decocto foliorum arundinis, lactucæ, salicis, myrtillorum, corticum papaueris albi, & similium: & hoc potu sumpto hora nona, vel decima post solis occasum: ℞. confectiois Alkermes 3. ss. syrupi papaueris 3. j. ss. aquæ nenupharis 3. j. misce, & fiat potus.

Scholium.

*Febris
ardens
& conditio
3. febr.*

ARdens febris. Latinis.] Febris causans, aut ardens, non est differentia febris, sed conditio. Illa enim febris dicitur ardens, quæ habet magnum ardorem, & inexhaustam sitim, 4. acut. sent. 17. & 1. epyd.

epid.com.1. Et ideò synochos, tertiana continua, tertiana intermit- Omnes
 tens, & quartana continua, ardentes sunt. Dices nōne Hippocr. 4. cōtinua
 acut. quandam causam ex pituita salsa describit? Respondeo verum ardētes.
 esse, illum tamen ad eum, qui ex bile fit reuocari: quia ex lib. de mor-
 bo & symp. omnis humor calidus biliosus est. Hoc cap. auctor de ter-
 tiana continua disputat. Qua sicut & omnes alia continua, cum sy-
 nocho conuenit in hoc, quod continua est tum in calore, putredine, &
 obstructiōe. Differt verò ab ea, quia in synocho, obstructio fit à ple-
 thora, ac tertiana continua ab humore crasso, aut glutinoso. Tum sy-
 nochos caret accessionibus, non autem continua. Febres ardentes cu-
 rantur, ex ratione, qua synochos: primò mittentes sanguinem: secundo
 auferendo obstructiōem: tertio putredinem: & quarto febrem refri-
 gerantes. Curationem tertiana continua, de qua hic agit auctor, ex
 sequenti capite (ubi agit de tertiana exquisita) etiam intelliges: quo- Curan-
 niam amba sunt eiusdem generis, fiunt enim à bile, cum hoc tamen tur ar-
 discrimine, quòd in febre ardente humor faciens febrem intra vasa dentes
 manet, at in intermittente fertur per carnes, aut habitum corporis. sicut sy-
 Solum duo hoc in loco explicare volo breuiter: Primum, An in febrili- nochos.
 bus continuis, sanguinis missio, in sola declinatione exerceri possit. Se-
 cundum, An febris lenticularis appellata, propter symptoma, postu- An in
 let particulari curationem. Vt ergo à primo exordiar, respondeo, in cōtinuis
 febribus continuis quocunque tempore accessionis, posse nos vtiliter sit mit-
 sanguinem mittere, dummodo sit in principio morbi. Id confirmo hac tendus
 ratione. De sanguinis missione deliberamus, ex affectu postulante in acces-
 euacuationem omnium humorum, & absentia impediunt. Sed in signe.
 febrium continuarum accessionibus, quocunque tempore illa duo re-
 periuntur, ergo licebit in quocunque tempore sanguinem mittere. Af-
 sumptionem probo, quia in quocunque tempore accessionis predicta,
 est fluxio humorum ad focum, & robur virium. Imò melius est
 tempore quo viget accessio, sanguinem mittere: quia tunc solent flue-
 re humores ad focum, in quo viget magis calor 1.1. method. Neque
 est per ratio in intermittētibz, quia cum in his tempore accessio-
 nis, humor à natura expulsus extra venas, si in habitu corporis,
 sanguinis missio poterit remigrare ad venas, & ita ex intermit-
 tenti fieri continua. Vnde cum in his habeamus prohibens, nūpe mo-
 rum nature contrarium, sanguinem mittētes tempore intermissio-
 nis. Dices, Galenus lib. de cur. rat. per. 1. cap. 20. scribit, in ipso An fe-
 die, in quo sanguinem mittimus, obseruandam esse inclinationem bris len-
 febris (ut sita im addit) particularium circuituum declinationem. ticularis
 Respondeo, loqui Galenum de illis febribz, in quibus sanguinis habeat
 missio in hora circuitus propriam habet indicationem. Secundum propriā
 explicemus, de febre lenticulari (quam Tauardillo castellani, & curatio-
 nos Valentini vulgò appellamus, ob maculas in cute apparentes acm.
 similes

DE CVRAND. MORB.

similes pulicum mensibus) aliqui integros libros scripserunt, & ita postulabat integrum librum hac disputatio, in quo nil aliud faciendum erat, nisi errores in illis contentos refutare. Quidam enim hanc febrem semipestilentem efficiunt, hoc est ortam ex putredine, & venenato humore: & idè esse contagiosam, & habentem periculosa accessientia. Alij hanc febrem non pestilentem, sed quæ induxit naturam pestis appellant: & quod fiat à putredine, habente pravam qualitatem. Unde omnes hi concedunt habere propriam curationem, tum propter maculas, tum quia sine alexipharmacis non cessat. Et ita quidam sanguinem mittunt ob plethoram, alij non ob virium imbecillitatem. Quidam purgant in principio, & alij non purgant. Quidam utuntur cucurbitulis, frictionibus, & sudorem mouentibus: alij bene utuntur cucurbitulis cum scarificatione, quia attrahunt ad cutem, & euacuant, non tamen sudorem mouentibus, neque urinam, quia hæc cum sint calida, augent feruorem humorum. Omnes in principio utuntur alimentis frigidis & adstringentibus, quidam ob putredinem, quidam ob venenum, & alij ob seminarium, hoc est pravam qualitatem. Multi etiam in principio utuntur alexipharmacis ex margaritis, & aliis adstringentibus constructis. Non utuntur alio mento tenui, quoniam inquirunt à prauitate humoris statim vires debilitantur. Hanc & multam aliam varietatem videbis, quæ ostendit eos ignorare morbum, & veram eius curationem. Breuiter ergo veritatem sic accipe. Hac febris continua est, quia à principio usque ad finem nunquam cessat: & putrida, ut ex calore, pulsu & urina conspiciamus. In eius principio solent apparere macule, in cute, quæ symptoma sunt in excretis. Non sunt autem exanthemata, quia non sunt tumores: unde reuocare eas poterit ad vitiliginem. Hæ macule non sunt ob feruorem, ut Vallesius & alij sentiunt, nescio enim unde in hac febre feruor contingat, potissimum cum ipsinæ ab humore crasso pendere scribant, sed sunt ab humore vi facultatis expultrici ad cutem delato, quia cum putredo sit in humore crasso, sua acrimonia irritat. Præterea hoc symptoma, cum non deiciat vires, neque augeat affectum, non trahit ad se curationem ac proinde contemnendum. Solum enim ex eo colligimus, morbum esse mali molis, hoc est qui sit ex inæquali humore, qui non ita facile coquitur. Non autem est signum putredinis venenata, quia tunc hac febris multos interficeret: & excretionem veneni in cute videremus, quod non contingit, imò nulla sunt veneni signa. Dices, non est pestilens sed semipestilens. Quid mea, dicere febrem esse semipestilentem, est somnium & res ad libitum scripta: si enim putredo, quæ facit febrem, habet venenum, nonne erit pestilens? huius febris putredinem appellat Mercado putredinem sordidam, quasi putredo sit ulcus. Neque in cute apparentes macule, significant pravam qualitatem humoris nobis

Varia
senten-
tia in
essentia.
Varia
senten-
tia incu-
ratione.

Propria
sententia.

Non est
morbus
venena-
tus.

nobis incognitam, quia hac febris sine alexipharmacis ullis cessat. Iam si lenticula sunt symptoma, quod ad se non trahit curationem, cucurbitula, sudorifica medicamenta, frictiones, & alia nonne erunt inutilia? In principio enim morbi si applicentur, aut adhibeantur augendo obstructionem putredinem etiam augebunt 8. method. Si in principio, quando appareret, his non utantur, quid proderunt? Curanda ergo erit febris hac lenticularis, sicut aliae febres continua. Primò vitum in ea insituentes habita ratione virtutis, & status morbi, absurdumque est, & prater experientiam affirmare, vires in hac febre statim in principio, à prauitate humoris debilitari, cum nos innumeros quos curauimus, decies aliquando, & plus in principio sanguinis missione euacuauerimus. Alimenta etiam adstringentia, quae exhibent, inspersa pulueribus ex margaritis & aliis lapidibus, & medicamentis adstringentibus maxime ledunt, obstructionem augendo. Iam statim in principio sanguis mittendus est, non ob plenitudinem, ut hi sentiunt, sed ut reuellamus humores fluentes ad focum. Sanguine misso, & curata fluxione, ad obstructionem veniendum est, eam aperientes attenuantibus medicamentis, constructis ex decocto borraginis, cicorei cum radicibus; capillorum veneris, cum syrupis capillorum veneris, borraginis, oximelle, & similibus. Aperta obstructione, si natura rectè euacuat, nil est efficiendum: si verò non euacuat, aut diminutiue euacuat, tunc oportet purgare. Et tandem potius aqua frigida febris curanda. Vsus Alexipharmacorum nullus est, imò hac quocunque tempore nocent, quia sunt crassa, & obstruentia, neque habent in hac fibre qualitatem contrariam. Hac ratione curamus in hac Valentina ciuitate contemnentes lenticulas, ac si non essent, cum felici successu: quia exercemus ea, quae rei natura docet, & experientia (quae in ciuitate multa est) confirmat. Neque mirandum est multos in Bethica regione mori, cum prauè curetur, imò tota medicorum curatio ex instituto videtur excogitata ad hominum perniciem. Quid de symptomatis in hac fibre apparentibus? Hac febris cum sit continua pro varia corporis dispositione, modo phrenitim, modo lethargum, modo alia symptomata inducit, quae non solum in hac, sed & in aliis continuis febribus etiam euenire solent.

De Tertiana exquisita.

CAP. III.

EXquisita Tertiana, febris intermittens est, à sola bile flaua proueniens extra venas putrefacta, quare periculo caret, ut docent Hippocrates & Galenus Aphorismo 43. libri quarti, etiam si sit acutus morbus auctore Galeno comment. 20. libr. 3. cuius contrarium tradere videtur comment. 30. libr. 5. Aphor. in initio. Duplex est Tertiana sincera, prima

Definitio
Tertiana
exquisita.

ma vnica, altera duplex: vnica verò est, cum tertio quoque die semel accessio fit. Altera duplex, scilicet ea cum bis accessio exquisitæ bilis fit, vel quolibet de solus bilis accessio appareat.

*Causa
exquisi-
ta ter-
tiana. Si-
gna ter-
tiana
exquisi-
ta.*

Externæ causæ sunt similes causis febris ardentis, quamuis minores, Galeno autore commen. 59. libr. 4. aph. Vtraque à flaua bile fit, interna est bilis flaua mota per corpus totum, & extra venas putrescens, autore Galeno eodem commentario. Hæc tertiana exquisita statim ab initio in singulis accessionibus affert rigorem vehementem pungentem, ac vulnerantem: quia mouetur acris humor per partes sentientes, & in hoc differt ab ardenti febre, in qua non accidit rigor, nisi ante crisin bonam, vel malam: bilis quoque vomitu expellitur: Est in hac tertiana sincera ordo exactus, & æqualitas pulsuum, qui in augmento accessionum ad vehementiam, ac magnitudinem, atque frequentiam excitantur. In vigore sitim inuehit magnam, post calor æqualiter per totum corpus diffunditur, & primo contractu sentitur plurimus, ac mordax, & statim à manu tangente vincitur. Et fermè semper desinit cum sudore accessio, quæ intra duodecim horas terminatur: si verò diuturnior ac longior fuerit accessio, non est exquisita tertiana. Vrina eius similis, est vrinæ eius, qui febre ardente corripitur.

Curatio.

Victus.

*Aduerte
quando
in acces-
sione ci-
bandus
sit ager.*

Curatur quatuor remediorum generibus. Primò, victu simili ardentis febris, per omnia ferè: quamuis hæc tertiana remissionibus egeat, & in ipsa accessione ager nullo modo sit nutriendus, Hippocr. autore aphor. 11. primi libri, nisi facultas esset imbecilla, aut natura ægri biliosissima parata ad hæcticam, qua in re non solum est cibus dandus in ipsa accessione, sed in eius tempore deteriori, in statu scilicet. Præter hæc ante ipsam accessionem, saltem per septem horas est nutriendus, & post ipsam: semper tamen sequi oportet, quod docet Hippocr. aphor. 17. lib. in vigore tamen accessionis ager bibat copiosè aquam frigidam hordei cum syrupo violato, vel saccharo, præsertim si bilis sit concocta: sudore enim superueniente statim finietur accessio, & etiam totus morbus. Somnus maximè nocet in principio accessionum, & in augmento minùs, & in vigore forsan nocebit, in declinatione maximè iuuat, in qua si noceat, est signum lethale, cum Galeno com. 1. lib. 2. aphor.

*Signum
lethale.*

*Præpa-
ratio,
Purga-
tio.*

Secundò, apparantibus bilem, de quibus dictum est cap. superiori tertio remediorum & 1. c. primi libri.

Tertiò, vacuantibus bilem in die post accessionem quartam, quæ solet esse status huius morbi, præsertim quando finitur in septem circuitibus, aliquando vnico, vel duobus cir-

cub

euitibus terminatur: intellige de vacuatione, quæ fit per inferiora. Nam in ipsa accessione non est facienda vacuatio ab arte, ne addamus laborem labori: per vomitum verò initio, & per sudorem in fine accessionum sæpe natura, & ars ipsam sequens solent euacuare. De medicamentis, quæ bilem purgant, simplicibus, & compositis dictum est cap. superiori quarto genere remediorum, & primo cap. 1. libr. & in multis aliis locis, præcipuè 1. 3. & 4. cap. primi libri.

Quartò, refrigerantibus, & corroborantibus cor, iecur, renes, & totum corpus, internis, & externis dictis quinto genere auxiliorum, cap. præcedenti: quamuis hîc paulò mitiora conueniant.

Aduerte.

Alteratio & corroboratio.

Scholium.

EXquisita.] *Tertiana intermittens, ex bile putrescente in loco obstructionis fit. Dico in loco obstructionis, quia bilis flaua tenuis cum sit, obstruere non potest: omnis enim obstructio ex Gal. fit à tribus causis, ab humore multo, crasso, aut lento. At bilis non potest esse multa, quia per multum Gal. 10. method. c. plethoram intelligit, quam bilis sola efficere non potest. Bilis etiam neque crassa est, neque glutinosa. Fit autem febris ex bile hac ratione, quando ab humore crasso aut lento obstructio est in aliqua vena, bilis adueniens perficit obstructionem, & cum ipsa abundet, putrescit non disflata, & hac ratione generat febrem. Est autem hac intermittens quia quando incipit putrescere bilis in foco putredinis, expellitur extra vasa per sentientia membra: ubi putrescit omnino, & facit accessionem, quæ ut plurimum sudore finitur. Dices, nonne bilis vitellina, & porracea possunt obstruere? Respondeo id concedendo, quia crassa sunt. Neque cum Gal. 1. de arte curatiua ad Glauc. scribit hanc febrem fieri ex concitata bile flaua, per concitatam bilem intelligit turgentem, sed bilem per habitum corporis motum. Signa februm putrium in genere habes lib. 1. de diff. feb. cap. 7. Signa verò Tertiana exquisita, lib. 2. cap. 3. & 1. de arte curatiua ad Glaucorem.*

Bilis flaua non obstruit.

Obiectio Solutio.

Curatur quatuor remediorum generibus.] Si vires consent usque ad statum, tenui victu utere, ut ptisana. Quod si vires languidiores fuerint, victum augentes exhibebimus galinæ pullum, aut galinam. Post concoctionem crassiori victu utemur, cerebellis suum, pedibus, carne porcelli & aliis, ut probe hominis substantia, quæ multum dissipata est, resarciatur. Tū quia hæc alimenta facile corrumpi non possunt, imò qualitatem bilis retundunt. Quod si vires sint languide, misce cum eis quæ obstructiones aperiunt, malua utitur etiam Galenus lactuca, & atriplice, quæ frigida sunt. Ovis utemur etiam

Victus.

ante coctionem decoctis cum pauco petroselino. Ex fructibus pira cocta cum pauco cinnamomo & saccharo optima sunt: pira enim refrigerant, cinnamomum adstrictionem corrigit, & saccharum aperit. Pruna etiam, & cerasa conceduntur, ex piscibus saxatiles: turdus, vilis, phichis, sparus. Vinum ante coctionem ob consuetudinem, aut ut sit aquae vehiculum concedatur, ac proinde debet esse paucum. Post coctionem liberalius dandum, quia urinam & sudorem mouet.

In ter-
tiana
Galenus
sanguini-
nem
mittit.

Secundo, apparantibus bilem.] In Tertiaria hi sunt affectus, calor, putredo, prohibita transpiratio, obstructio ab humore crasso, & fluxio humoris ad obstructionem: unde curatio debet incipere a sanguinis missione. Multi imò omnes affirmant, Galenum in libro artis curatiuae omisisse sanguinis missionem, & incepisse a refrigerantibus, propter febrem, quae magna est. Decipiuntur tamen, quia ibi etiam consulti sanguinis missionem, ut qui indicationes intelligit, videre poterit. Ibi enim postquam scripsit contrariorum contraria esse remedia, quae quod superat reprimant, quod autem deest sarciant. Flaua autem bilis humor, omnium qui in corpore sunt humorum calidissimus ac siccissimus est, itaque exinaniendus est: hac Galenus. Si bilis est exinanienda, qua alia ratione quaso, nisi in principio sanguinis missione: & post coctionem purgatione? Dices in hac febre non sunt vires. Respondeo verum esse vires deficere ad euacuandum, non autem ad reuellendum. Quod si adeò imbecilles sint, ut sanguinis missionem non ferant, multum refrigerantibus utemur. Quae acrimoniam bilis temperabunt, & sic retardabunt eius impetum. Ex Galeno enim 3. de san. tu. bilis cum impetu fluens perficere potest obstructionem, quae si sensim moueatur, eam exterget.

Obstru-
ctio cu-
ratur.
Obiectio.
Solutio.

Secundo, apparantibus bilem.] Sedata fluxione humoris biliosi ad focum putredinis, quod ex coctione incipiente deprehendes: quo tempore iam incipit augmentum. Tunc non ad preparandam bilem, ut dicit auctor, sed ad curandam obstructionem veniendum est. Quae curabitur syrupis refrigerantibus ob febrem, & aperientibus propter obstructionem, qualia sunt Syrupus endiuiae, borraginis, acetositis citri cum decocto hordei, cichorei, borraginis & endiuiae. Dices, in augmento non licet sanguinem mittere. Respondeo bene licere, quia tunc adhuc est fluxio, neque multum diuertimus naturam.

Purga-
tio.

Tertio, euacuantibus bilem.] Aperta obstructione si natura non expurgat bilem, tunc eam purgabimus extra accessionem tamen, ne impediamus naturae motum, qui ad externa fit. Considerare autem oportet motum humoris, qui si lateat, quia natura nullam tentauit euacuationem, tunc per intestina, per quae solet communiter natura euacuare bilem, purgabimus. Per deiectionem purgat Galenus absinthio, quod deiectione, & per urinas optimè euacuat, obstructiones aperit, vetriculique os roborat. Per urinas purgat decoctum apij. Per sudorem

sudorem autem balneum dulcis aqua, quod humectat corpus, & excrementa, per habitum corporis euacuat; refrigerat etiam ex accidenti, euacuatis calidis excrementis.

Quartò refrigerantibus.] Si putredine euacuata intemperies aliqua calida remaneat in iecore, corrigenda est ea ratione, quæ docet auctor in sine capitis superioris: omitte tamen descriptionem cardiacam ibi descriptam, quia continet aurum & alia inutilia.

Refrige-
ratio ie-
coris.

De Tertiana notha, seu spuria.

C A P V T IV.

Tertiana notha, seu spuria, est febris intermittens, quæ fit ex flaua bile vincente, & pituita pauciore: & hæc dicitur à barbaris maioris famæ: quia sæpius accidit: vel à bile flaua dominante, & atra bile pauciori, putridis extra venas, & per totum corpus: & hæc dicitur à barbaris minoris famæ, quia raro accidit. Externæ causæ sunt omnes, quæ bilem simul, & pituitam gignunt, vt de ipsa agamus, quæ magis accidit. Sed vincentibus causis bilem generantibus vide, quæ diximus capite 2. huius libri, & capite sequenti de quotidiana, & ex iis compara tecum causas: notæ enim mixtæ sunt, non simplices, vt in sincera, & exquisita tertiana, aut in quotidiana pura, & ideo incipit accessio cum rigore mitiori, & leuiori, quàm in exquisita tertiana: licet sit longior horror, sentiatúrque frigus actu, à frigidis enim humoribus humor syncerus, & vehemens fieri nequit. Longius etiam principium est accessionis, quemadmodum omnia tempora accessionis & etiam totius morbi: nam excedit duodecim horas, & quantum maior est accessio, tantò magis ex pituita gignitur: & quantum longior accessio, tantò totus morbus longior: aliquando enim incipit tertiana notha initio autumnii, & finitur vere: exquisita verò longissima septem circuitibus iudicatur. Sitis in hac est minor, & sudor: quamuis aliquando ægroti sudent copiosè, quòd si frigidus sudor fuerit, maximam indicabit longitudinem. In ventre apparent obstructions, aliquando in hepate, & aliquando in splene. Quòd si in membris durities aliqua fiat, hydropem indicat imminentem. Curatur sex remediorum generibus. Primò, victu refrigerante, & humectante magis, quàm calefaciente & exiccante, habita ratione multitudinis vtriusque humoris, quæ per signa cognosci potest, ideoque Galen. primo artis curatiuæ ad Glauconem optimè miscet parum piperis cum cremore hordei non nimis tenui, quia morbus hic diuturnus est, duratque multos

Descri-
ptio.

Causa.

Note.

Curatio.
Victus.

DE CVRAND. MORB.

Cibus. menses, aliquando sex; semper tamen nutriendus est æger extra ipsam accessionem vel in declinatione ipsius, nisi æger fuerit imbecillus, ut diximus capite præcedenti. Nutriatur ergo iure gallinæ teneræ, & carnibus arietinis cum hordeo excorricato, & paucis ciceribus nigris, vel radice petroselini. Nutriatur quoque carnibus ipsius gallinæ non solum elixæ, sed etiam affatæ, & pullo gallinaceo, coturnice, perdice, & hædo, & frusto aliquo cuniculi. In initio cœnæ comedat cappares sine sale, & cum saccharo, vel senationes cum melle, & aceto, vel folia raphani, & similia. In fine verò cortices citri saccharo conditos, vel nucleos pini conditos etiam saccharo, & similia.

Potus. Potus sit aqua cinnamoni, vel aqua ceterach, seu scolopendriae Græcorum, non officinarum, quia est lingua ceruina, & phillitis Dioscoridis, quæ astringit. Quod si appetentior vini sit, debet album parari, vel rubrum tenuis substantiæ. Somnus in primis tribus temporibus accessionis magis nocet, quam in exquisita tertiana. Motus & exercitatio extra ipsam accessionem moderata est utilis, & necessaria, saltem frictio totius corporis.

Horroris & frigoris ablatio. Secundò, tollentibus horrorem, & rigorem, qui sua longitudine, & vehementia solet ægrum cruciari: ut pannis lini actu calidis partibus extremis admotis, & parti ei, quæ inter testes, & anum interioret. Oleo ex camomilla, vel lilio, vel rutæ bene calido illis partibus admotis mederi possumus. Paucum vinum, si bibatur, curat hunc rigorem cum horrore: & si sit cum infusione trium radicum plantaginis erit efficacius remedium. Aliqui in hoc genere remediorum laudant tria hepata ranarum cum paucò vino. Quæ si in initiis trium accessionum sumantur, solent curare hos vehementes horrores, & rigores.

Potus vini sedat rigorem. Tertiò, secta vena cubiti dextra, si fuerint signa sanguinis (de quibus cap. 2. huius libri de febre ardenti diximus) sanguinisque copia extrahatur respondens plenitudini, naturæque ægri, inanito tamen ventriculo, & intestinis per hunc vel similem clysterem. ℞. foliorum maluarum, & folio. violarum nigrarum an. m. j. furfuris & camomillæ an. p. j. seminis carthami ʒ. iij. fiat decoctum, de quo percolato accipe ʒ. xv. in quo dissolve diacatholiconis ʒ. j. benedictæ ʒ. ʒ. olei violarum ʒ. iij. olei camomillæ ʒ. j. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster.

Preparatio humorum. Quartò, apparantibus bilem cum pituita, quamvis habitatione pituitæ quantitatis, vel qualitatis sint vel augenda, vel multis diebus sumenda calida hac, vel simili forma, ut ℞. syrupi de bizantiis, & endiviæ composita an. ʒ. iij. rhodomellis

domellis ℥.vj. misce. Item ℥. aquarum capilli veneris, cichoreæ fœniculi, & endiuæ an ℥. vj. misce, vel earundem rerum ℔. ij. Hæc sumantur per sex dies, vel si opus fuerit plures his, donec paratus sit humor: quamuis ob sui diuersitatem non vnica sed pluribus vacuationibus indigeat, semper præcedentibus concoctionibus multis.

Quintò, vacuantibus materiam mixtam ea bile vincente, & Purgapituita pauciori, vt ℥. diacatholiconis ℥. vj. diaprunis solutiui ℥. iij. diaphœnicis ℥. ij. rhodomellis ℥. j. decoctionis communis q̄s. misce, & fiat potus. Vel ℥. pilularum aggregatiuarum ℥. iij. optimi diagridij ḡ. iij. cum aqua buglossæ fiant pilulæ septem, & aurentur. Vel ℥. pilularum de rhabarbaro ℥. ij. agarici trochiscati ℥. j. optimi diagridij ḡ. iij. cum aqua borraginis fiant pilulæ septem, & aurentur. Aliqui hac notha tertiana affecti solo vomitu sunt liberati, vt vult Gal. primò de arte curatiua ad Glauconem, qui si sponte satis non excitatur, potest arte moueri, syrup. acetoso simp. cum decocto seminis raphani, & aliis similibus. Si tamen prior & vnica euacuatio non suffecerit, quemadmodum rarò in his nothis tertianis sufficit, iterum corrobore roboratis ventriculo, hepate, & corde, & refrigeratis per ea, quæ dicemus sexto sequenti genere remediorum, est humor concoquendus syrupis, & mendicamentis iam dictis genere quarto præcedenti, vel hoc, aut simili medicamento: ℥. quinque radicum diureticarum, liquiritiæ an ℥. j. capilli veneris, ceterac. cichoreæ, endiuæ, scabiosæ, absinthij, borraginis an. m. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ℔. iij. sacchari ℔. j. syrupi de bizantiis, & endiuæ compositi an ℥. iij. trochiscorum de rhabarbaro ℥. ℔. pulueris diarrhodonis Abbatis ℥. ij. pulueris, cinnamoni ℥. j. misce, & fiat syrupus non perfectè decoctus. Dosis vnciæ sex quolibet die. Et qualibet hebdomada semel, vel bis fiat vacuatio per has pilulas: ℥. pilularum de rhabarbaro, & aggregatiuarum an. ℥. j. fiant pilulæ xv. & aurentur, si non est pauper. Dosis tres. Si opus fuerit, adde cuilibet earum ḡ. j. optimi diagridij, vel si non amat pilulas, vel non potest ipsas transglutire, ℥. diacatholiconis ℥. ij. diaprunis solutiui ℥. j. diaphœniconis ℥. ℔. agarici trochiscati, & confectæ borraginis an. ℥. ij. rhomellis quod sufficit, misce, & fiat confectio. Dosis cochlearium vnum cum aqua absinthij, vel buglossæ.

Sextò, refrigerantibus iecur, & totum corpus internis, & externis, & aperientibus obstructions venarum meseraicarum, hepatis, & lienis, si fuerint quæ in hac notha tertiana sæpè reperiuntur, præsertim quando est longa: quamuis obstructio

DE CURAND. MORB.

Obstru- curanda prius sit, quam vacuanda materia, imò sine eius
ctio prius curatione nunquam curabitur febris: apparente ergo obstru-
curanda, ctione fiat fons in ipsa & toto ventre inferiori ex decocto quin-
quã va- que radicum diureticarum, camomillæ, seminis lini, fœnugræci,
cuanda absinthij, præcedenti fons hoc, vel irrigatione facta spongia bis in
materia. die vacuo ventriculo vngatur venter versus splenem hoc vngu-
 ento: ℞. olei de capparibus, & amygdalarum amararum an. ʒ. j. ʒ.
Vnguen- vtriusque dialthææ, vnguenti Aragon ana. ʒ. ʒ. armoniaci disso-
luti spleni luti in aceto ʒ. iij. ceræ q. s. misce, & fiat vnguentum: adde pulueris
ad mouē- trochiscorum de myrrha ʒ. j.
dum.

Hepati laboranti obstructione admoueatur hoc, aut simile
Hepati. vnguentum: ℞. olei amygdalarum amararum vnciam j. olei
 nardini ʒ. ʒ. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum. Et
 si opus fuerit vti non solum externis dictis, sed aliis, & internis
 ad has obstructiones necessariis, vide quæ diximus capitibus 42.
 & 45. primi libri. Curatis his obstructionibus, atque euacuata
 iam materia, refrigeratio, & corroboratio per electuarium
 diarrhodon Abbatis facto per aliquot dies erit utilis, & neces-
Refrige- saria, sumptis quolibet die drachmis quatuor cum paucis vino
ratio & albo aqua diluto. Et hepati admoueatur hoc, vel simile vn-
corroboratio. guentum, ℞. vnguenti santalati ʒ. j. ʒ. olei nardini ʒ. ʒ. pul-
 ueris diarrhodonis ʒ. j. misce. Si ventriculus laborauit aliqua
Hepati. imbecillitate, ei admoueatur hoc, aut simile vnguentum: ℞. olei
Ventri- de absinthio ʒ. j. olei laurini ʒ. ʒ. pulueris gariophyllorum, cin-
culo. namoni, & rosæ nouellæ an. ʒ. ʒ. ceræ, q. s. misce, & fiat vnguen-
 tum. Et si opus fuerit, vide alia scripta c. 31. de imbecillitate ven-
 triculi libri primi.

Scholium.

Quæ sit **T**ertiana nota.] Tertiana notha, aut spuria, potest fieri à bile vi-
tertiana tellina, qua crassa est, & hæc rarò contingit: aut à permixtione
notha. humorum crassorum cum bile. Frequenter autem solet accidere ex
 permixtione pituitæ cum bile. Ex idè symptomata habet non bilis
 sincera, sed confusa & mixta, ut rectè docet auctor.

Victus in **P**rimò, victu refrigerante.] Galenus in lib. 1. de art. cur. in mor-
morbis. bis, inquit, victus ex morbi longitudine, & virium robore, virium ro-
 bur expulso cognoscimus: Morbi verò longitudinem, & breuitatem,
 ex humoris morbum facientis natura, & aliis symptomatis. Nam si
 humor sit pituitosus, longior erit morbus, quàm si sit biliosus. Tum si
 singulis accessionibus nulla fiat vacuatio, rigor sit exiguus, accessio-
 que perduret, signum est morbum esse longum: si contra res eue-
 niat,

niat, breuiorem. Si ergo vires sunt robusta, & morbus coctus difficilis, inedia conducet. Quia hoc victu nec morbus augebitur, nec vires concident, quæ ob robur sufficient, usque ad morbi coctionem quem vincent cum non impediuntur ab alimento. Quod si vires sint languida, & morbus facilis coctionis, utendum erit victu crassiori, quia etsi alimentum humorem augeat, cum facile coquatur, à viribus robustis vincetur. Hos duos modos solum adducit Galenus, quia ex his facile est tertium inuenire victum, qui in morbo contumaci, & viribus languidis imperandus est. Hic victus tertius mediocris esse debet: nec tam tenuis, ac in virtute robusta, nec tam crassus, ut in his, qui vires habent languidas, cum morbo facili coctu coniunctas. Corroborabimus ergo vires: sed non adeo ut malum augeamus, quod contumax est. Hinc colligemus quo victu sit utendum in hac tertiana, quem ex longitudine morbi, & viribus debemus instituire. Quod difficile est, posse exacte prestare, cum sint contraria indicationes, quæ ex morbo, & virtute sumuntur. Consulentes enim uni, alteri officimus. Quantum enim inedia morbo est utilis, tantum deicit vires, quas in hoc morbo oportet seruare, cum debeant longiori tempore laborare.

Secundò, tollentibus horrorem, & rigorem.] Radicem plantaginis proprietate valere contra rigorem, & horrorem, sentiunt multi: Quod ridiculum est, magis autem quod scribit auctor, de tribus menta hepatis ranarum, quasi duo, aut quatuor non possent prodesse, si contra veram esset facultate occulta agere, ita ut ex ipsis utilitas sequeretur.

Tertiò, secta vena.] In hac febre sicut in aliis putridis, supra dicti affectus sunt considerandi. Et cum indicatio à febre non urgeat: sicut in supradicta, proinde Galenus nullam mentionem fecit refrigerantium, & humectantium, incipienda ergo erit curatio ab obstructione fiente, siue ab humore, qui eius est causa. Hunc reuellemus mittentes sanguinem (etsi non sint signa sanguinis) si tamen vires constent. Dices, hac febris non est magnus morbus, ergo non licebit in ea sanguinem mittere, cum ex morbi magnitudine, & virium robore de hoc remedio deliberemus: Respondeo, verum esse, nos non mittere sanguinem propter magnum morbum presentem, sed propter alios morbos graues imminentes.

Quartò, apparantibus bilem.] Sanguine misso diuretica medicamenta propinabimus. Non quod velimus urinam ante coctionem mouere, hoc enim non est faciendum: sed quia diuretica aperientia sunt. Et ita propter obstructiones ea propinamus, dummodo non sint multa. Et ita calida & sicca, ne febrem augeamus. Vtemur ergo syrupis his oxymelle simplici, syrupo endiuia compositio, borraginis, fumiterræ, & aliis cum aquis quinque radicū, cichorei, borraginis. Si hac non sufficiunt potissimum hyeme & aliis temporibus, in quibus humor con-

DE CVRAND. MORB.

**Apoze-
mata.** tumax est, uti poteris Apozematis: qua sunt Syrupi longi ex Syrupis,
**Absin-
thium.** aquis trochiscis & aliis compositi. Licet etiam uti Syrapo de absin-
thio, aut decocto, nō ante septimum diem. Quia ante septimum diem
cruditates multa sunt in ventriculo, qua ab absinthio impingen-
tur ex 6. de sanita. At cū post septimum diem tenui victus ra-
tione, humores sint cocti, utiliter tunc absinthio utemur, quod robo-
rat interna viscera, & deobstruit. Coctionem humoris iuuabimus
quiete, quia in hac calor non mouetur ad externa, ut in exercitio.
Fomentis etiam externis, ungentes iecur, ventriculum & lienem
Balnea. oleo de absinthio ut calefiant, & roborentur. Balnea ante coctionem
inutilia sunt, tum quia in hac febre non est necessaria corporis hu-
mectatio: tum quia augent obstructiones: tum quia humores crassi
à balneo non poterunt euacuari. Post coctionem non adeo audacter
eo utemur ac in tertiana exquisita, propter dictas causas: semel ta-
men & bis ipsum concedemus, ut melius humores coquantur. Cly-
steribus fortioribus uti oportet ex chamemelo, ruta & aliis cum
agarico, aut diaphœnicone, & hiera.
(Quintò, euacuantibus.) Rectè purgat auctor. Aduerte tamen,
quod si materia impetum fecerit ad urinae meatus, tunc utendum
esse diureticis. Vomitus utilissimus est, hic tamen non est ciendus,
nisi nausea precedat. Facilius autem est post cibum vomere, quia
permiscentur excrementa cum alimentis.

**Purga-
tio.**
**Vomi-
tus.**

De Quotidiana. C A P. V.

Diuisio. **Q**uotidiana febris duplex est, altera intermittens, quæ fit à
Causa. pituita extra venas, & per totum corpus putrida, singulis
diebus accidens: altera sine intermissione, quæ fit à pituita pu-
trida in venis. Vtriusque febris causæ sunt alimenta pituitosa, ut
Signa. pisces herbae frigidae, legumina, & otium. Quotidiana intermit-
tens haud quaquam cum rigore primo statim die inuadit, sed
temporis progressu, refrigeratio potius, quàm rigor occupat: &
quantò pituita est frigidior, tantò maior est refrigeratio. Qua-
re in ea, quæ ex acida, vel vitrea contingit pituita, erit maior,
quàm in ea, quæ ex dulci generatur. Pulsus, cū primū ac-
Pulsus. cessio fit, inordinatus est, & inæqualis, tardus, paruus, ac
debilis. Neque in augmento magnitudo, velocitas motus, &
Calor. frequentia quotidianæ accidunt: Calor illi non tam acris, ac in
tertiana, neque multum, ac crebro spirare compellit, sed anhe-
litus expirationes humidæ, fumosæ, & multum vaporosæ sunt.
Tardè ac ægrè accenditur, ac tempus longum consumit, dum
Urina. ad summum inualecendo peruenit. Non sitiunt ij, urinae al-
bæ, aquosæ, tenues, vel crassæ, aut turbulente. Nullus sudor

in primis diebus erumpit, neque exacta quies apparet donec *Spatium*
ad finem totius morbi deuentum sit. Spatium accessionum est *Febris*
decem & octo horarum, & quietis falsæ fax. Has omnes notas, *quoti-*
& plures alias scribit Galen. primo de arte curatiua ad Glauco- *diana*
nem, & secundo de differentiis febrium, & secundo de crisibus. *rarissi.*
Sed quia Hispani, & qui habitant calidas regiones rarissimè his *ma apud*
febris exquisitis laborant, his prætermis ad curationem ip- *nos.*
sam accedo.

Curatur quinque remediorum generibus. Primò, victu in- *Cura-*
cidente, & extenuante, de quo capitibus septimo, & octauo, & *tio.*
aliis locis prioris libri dictum est, dummodò non nutriatur nisi
in fine accessionis, & extra ipsam, nisi deficerent vires. Victus *Victus.*
quoque non sit tenuis propter morbi longitudinem: nutriatur *Cibus.*
ergo iure columbi cum ciceribus, & radice petroselini, vel iure
gallinæ cum eadem radice, & foliis raphani, vel perdice, vel tur-
ture & similibus cum pipere, cinnamomo, croco, & aliis aro-
matis.

Potus sit aqua cinnamomi, vel radicis petroselini. *Potus.*

Secundò, corrigentibus rigorem, vel potius frigus oleis *Frigoris*
calidis spinæ toti admotis, vt rutæ, lauri, de lilio, de castoreo, *corre-*
& extremis apponantur panni bene calidi. Drachma vna the- *ctio.*
riacæ magnæ, vel mithridati, vel rubæ trochiscatæ cum pau-
co vino, decoctionis rutæ, saluæ, & abrotani est optimum
remedium, in hoc præcipuè post 14. diem, & parum purgato
corpore.

Tertiò, concoquentibus pituitam medicamentis dictis pri- *Conco-*
mo cap. & aliis de morbis pituitosis prioris lib. per 8. vel 10. dies. *ctio.*

Quartò, vacuantibus pituitam exhibitis tempore falsæ quie- *Purga-*
tis: de quibus dictum est cap. 1. & aliis prioris libri. Aliquando *tio.*
est utilis vomitus in hac febre, præcipuè si natura indicauerit,
quem decocto seminis raphani, & anethi cum oxymelle simp.
poterimus prouocare.

Quintò, corroborantibus ventriculum, & hepar: vt electua- *Vomito-*
rio rosatæ nouellæ, aromatico rosato Gabrielis, theriaca ma- *rium.*
gna, mithridato, conserua acori, sticados. Dosis horum est 3. vna *Corrobo-*
vsque ad 3. ij. cum vnciis duabus, vel tribus aquæ vel decocti *ratio.*
sceniculi, anisi, petroselini, melissæ, & similium.

Scholium.

Quotidiana febris duplex est, 1) Quotidiana febris à pituita *Quoti-*
putrescente ortum habet. Cuius signa lege apud Galen. libro *diana.*
secundo de diff. feb. cap. 4. In hac febre (putrida cum sit) affectus:

DE CVRAND. MORB.

Signa. *superius cap. 1. explicatos, considerare oportet, ut rectè curetur. De-*
Curatio. *bemus enim incipere à causa obstructionis, qua est humoris fluxio.*
An in *An autem eam debeamus sanguinis missione auferre, nec ne, distin-*
quoti- *ctione est opus. Si enim succi crudi in hac febre abundant, multi*
diana sit *sint, & paucus sanguis cum ipsis permixtus, tunc non licet sangui-*
sanguis *nem mittere, quia non constant vires. Quod si sanguis plurimus*
mitten- *sit, & humores crudi plurimum non excedant sanguinem mitte-*
mus. *mus: quia est robur virium. Sanguine misso, cum obstructio fiat ab*
Curatio *humore crasso, & glutinoso, inscindentibus, & urinam mouentibus:*
obstru- *(qua vim habent aperiendi) utendum erit in primis diebus (ut ait*
ctionū. *Gal. arcu. ad Glauc.) aut ut vertit Leonicens, post primos dies.*
Inter- *Acachia, Mena & alij primam lectionem sequuntur: nos secundam.*
pretatio *Quamuis enim utraque lectio tolerari possit, secundam tamen ele-*
loci Ga- *gimus, quia melius est primis diebus uti inedia, sic enim coquun-*
leni. *tur humores in ventriculo contenti, & hac ratione post primos dies*
Ventri- *melius attenuabuntur. Extenuantia quibus utendum est sunt*
culi ra- *oxymel, syrupus de stechade, rhodomel melioratum cum decocto fœ-*
zio ha- *niculi cichorei & similium. Circa statum opus est ventriculi (ubi*
benda. *pituita generatur) rationem habere, ita ut in ipso rectè humores co-*
Quies. *quantur. Quietem ergo imperabimus, & exterius ungemus ven-*
Vnctio. *triculum corroborantibus, oleo irino, mastichino, de absinthio, nardi-*
no, & similibus: qua calorem ventriculi augment, & ipsum constri-
gunt: quod post coctionem faciendum est, sicut & vomitus post co-
ctionem mouendus, decoquentes semen radicula, & oxymel permis-
centes. Post humoris coctionem, eum purgabimus diaphanicone, hie-
ra & aliis. Victum ex cap. superiori institues. Aduerte tamen in
hac febre non esse multum calidis medicamentis utendum, quia ex
4. de san. tu. in his, qui cruditatibus laborant, eas ad venas dedu-
cant maiores.

De Quartana. CAP. VI.

Diffusio. **Q**uartana duplex est, quædam continua, quæ fit, ex atra bile putrescente in venis: altera intermittens, quæ fit ex atra bile extra venas, & per totum corpus putrescente. Et hæc duplex est, vna intermittens, quartana, cuius accessio accidit quarto quoque die, vel duplex, cuius duo circuitus fiunt in quinque diebus. Accessio primi respondet quarti diei accessioni, & secundi accessio quinti diei accessioni, tertius verò est dies quietis tantum. Cuius causæ sunt alimenta melancholica ut falsa omnia, carnes hircinæ, bubulæ, leporinæ, ceruinæ, cochleæ, legumina, animi & corporis labores immodici, & aliarum febrium longitudo, præcipue si fuerint sine ordine, & autumno. Hæc febris

Causa.

Nota. non

non statim, & primo die cum rigore vehementi, inuadit sed talis est, qualis iis, qui frigescent gelu vehementi, Progrediente & adauēta febre vnā cum rigore. augetur, inualeſcitque quotidie vsque ad totius morbi augmentum. Sensus rigoris non est pungentis, & stimulantis cutem, sicut in exquisita tertiana, sed inducentis algorem vehementem, & tanquam ossa frangentis. De differentia rigoris, tertianæ, & quartanæ vide Galenum 2. de differentiis febrium capit. 5. & 2. & de crisi- bus capit. 3. Et si vis scire, an frigidi humores rigorem efficere valeant, vide commentarium doctissimi Valleriolæ capit. 5. libro de symptomatum causis. Pulsus in ea sunt satis tardi, ac in principio accessionum rari, & duri, in augmento, & vigore sunt veloces, & frequentes: quamuis sic conferantur cum pulsibus febrium biliosarum, & sanguinearum, sint tardiores & rariores: in hac enim paulatim humor veluti lapis, aut testa, aut os succenditur, & semel incensus diu conseruatur. Quare longiores sunt accessiones, & morbus longissimus est, ferè semper durat vnum annum, aliquando duos, & quandoque duodecim annos scimus durauisse: atra enim bilis, vehementer resistit, & tardè mouetur: ægri cutis dura est, & densa, & tempus, in quo fit frequentius est inæquale, autumnus videlicet, vrinæ ægrotantium sunt tenues, albæ, & aquosæ.

Curatur sex remediorum generibus. Primò, victu humido, & parum calfaciente, vt iure arietis & gallinæ cum buglossa, & borragine, & aliis omnibus dictis capite nono prioris libri, dummodò æger sumat alimentum extra accessionem, nisi vires deficerent. Cauendum est, ne sint alimenta flatuosa, & melancholica, vt legumina salia, & alia similia his. Potus sit vinum rubrum mediocris substantiæ, & ætatis mediæ, dilutum aqua decoctionis radicis buglossæ. Utatur quiete corporis, & animi, & somno. Bis saltem in hebdomade venter hoc, aut simili clystere leniatur, & lubricetur: ℞. foliorum maluarum, mercurialis, borraginis & buglossæ an. m. j. epytimi ʒ. ss. furfuris p. prunorum damasce- norum paria sex, fiat decoctum, de quo percolato accipe libram vnā semis, cui adde diacatholiconis ʒ. j. confectionis medica- minis hamec, ʒ. ss. oleorum sesamini, & camomillæ, an. ʒ. ij. butyri recentis ʒ. j. misce, & fiat clyster.

*Curatio**Victus.**Qui cibi**vitandi.**Potus.**Clyster.* *Sectio**vena.*

Secundò, si omnia ferè sanguinis signa adsint secta ve- na interna cubiti, dextri, & missio sanguine, qui plenitudi- ni & viribus respondeat autore Galeno primo de arte cu- rativa ad Glauconem: quamuis in hac longissima febre sanguis parcè est mittendus. Aliqui lienis venam secant in hac

DE CVRAN. MORB.

*An se-
canda
sit vena
iecora-
ria sini-
stra.*

*Conco-
ctio sy-
rupi.*

*Aqua
vel de-
coctum.*

*Purga-
tio.*

Potio.

Pilula.

*Admo-
nitio.*

*Syrupus
prepa-
rans ma-
teriam
secundo
loco.*

hac febre. Sauanarola vir doctissimus in ipsa coniunctione secat iecorariam sinistram, & se multos laborantes quartana pristinae salutis restituisse dicit.

Tertiò, post tres menses ab initio febris concoquentibus, & apparantibus atram bilem, de quibus cap. 1. & 9. prioris libri dictum est. Sed propter tyrones: ℞. syrupi borraginis, & buglossæ, an. ʒ. vii. (syrupi de fumo terræ simp. & de epithymo. an. ʒ. iiij. syrupi de scolopendria, ʒ. iiij. misce: & ℞. aquarum buglossæ, borraginis, scolopendriæ, & capilli veneris an. vncias decem, vel decocti horum libras tres semissem.

Quartò, materia aliquo modo apparata vacuanda est hoc, vel simili medicamento: ℞. diasenæ, & medullæ cassiæ fistularis recens extractæ. an. ʒ. ʒ. pulueris epythimi, ʒ. ij. ʒ. decocti florum cordialium quod s. misce, & fiat potus, quem in secundo die quietis accipiat, si vnica sit quartana: si duplex, in die quietis, si verò continua, in die minoris laboris. Qui non possunt purgans liquidum bibere, vel statim ipsum euomunt, has aut similes pilulas hora consueta sumant: ℞. pilularum Indarum, & de fumo terræ an. ʒ. ʒ. optimi piagridij grana quinque, cum aqua buglossæ fiant pilulæ septem, & aurentur. Post debitam vacationem propter siccitatem à pilulis relictam loco iuris sine sale, bibat vncias sex decocti fructuum & florum cordialium vncias duabus sacchari.

Sed quia hæc materia est heterogenea, & terrestris, non satis est vna præparatio, & purgatio, sed pluribus eget, dummodò inter eas corpus, & partes corroborentur medicamentis, quæ dicemus in quinto remediorum genere: hic tamen syrupus est optimus, & probatus in huius materiæ præparatione: ℞. pimpinellæ, buglossæ, borraginis, lupulorum, ana. m. ij. capilli veneris, scolopendriæ, absynthij, an. m. j. fiat decoctum: de quo percolato accipe ℞. ij. cui adde succorum sine residentia borraginis, endiuæ, & fœniculi, an. ℞. j. succi pomorum redolentium ℞. iiij. sacchari, quod s. misce, & fiat syrupus. Dosis vnciæ tres cum aqua, vel decocto scolopendriæ, & borraginis. Post cuius vsum fiat vacuatio hoc, aut simili medicamento, ℞. cassiæ fistularis recens extractæ ʒ. vj. diasenæ, & confectionis medicaminis Hamec, an. ʒ. iiij. decocti florum cordialium facti in sero caprino addendo parum epithymi quod s. misce, & fiat potus. In hebdomada semel fiat vacuatio per hanc mixturam: ℞. diacatholiconis, diasenæ, an. ʒ. j. ʒ. confectionis medicaminis Hamec, ʒ. j. pulueris epythimi ʒ. iiij. conferuæ buglossæ ʒ. vj. syrupi borraginis: quod

quod s. misce, & fiat confectio. Dosis cochlearia duo. Ali- *Confe-*
quando tamen initiis accessionum est conueniens vomitus ab *atio.*
arte factus, & à natura, quamuis hæc materia suo pondere *Vomitus*
aptius per inferiora expellatur, vt autor est Hippocr. 4.aphor. *landa-*
propter causas nobis occultas graue ascendit, & leue descendit. *tur.*
Prius natura tentante bibat in initio accessionis vncias quatuor
decocti seminis raphani, & anethi cum vncia vna oxymellis,
vel infusionem, vel decoctum raphani cum virtute hellebori
in oxymelle simpl. factum.

Quintò, corroborantibus ventriculum, hepar, splenem, & to- *Corrobo-*
tum corpus, vt conserua buglossæ, borraginis, cortice citri *ratio.*
condito electuario rosatæ nouellæ, electuario diamargarito-
nis frigido. Dosis drachmæ duæ cum aqua aut decocto, vel
syrupo absinthij, vel de scolopendria. Hæc confectio est in *Confer*
hoc genere optima, ℞. confectiois Gentilis contra melan- *atio.*
cholia, & conseruæ buglossæ an. ʒ. j. conseruæ borraginis & *Corro-*
corticis citri cum saccharo conditæ an. ʒ. ʒ. pulueris lætitæ *boratio.*
Gal. & lætificantis Rhasis, & rosatis nouellæ an. ʒ. ij. syrupi de
pomis q. s. misce, & fiat confectio. Dosis est omni hora cochlea-
rium vnum cum aquis melissæ, & buglossæ. Si splen. laborat
obstructione, vel menses, vel hæmorrhoides suppressæ sint,
considera, quæ diximus cap. 45. 52. & 56.

Sextò, rigorem & frigus curantibus, quamuis hoc sym- *Curatio*
ptoma ob sui vehementiam aliquando post secundum ge- *horroris.*
nus auxiliorum sit admouendum, præcipuè mitioribus re-
mediis, vt pannis benè calidis in initiis accessionum parti-
bus extremis sæpe admotis, & spinæ similiter, madefactis
oleis de lilio, de ruta, laurino, & de castoreo. Drachma vna *vis the-*
theriacæ magnæ, vel mithridati cum paucò vino optimo *riacæ*
curat rigorem, & frigus, & quandoque ipsam quartanam, *magna*
maximè post debitam purgationem. Curat similiter hoc *et mi-*
symptoma, & ipsam quartanam drachma vna pulueris se- *thridati.*
minis hypericonis, vel pulueris mille folij cum paucò vino
optimo. Eandem vim habet drachma vna assæ foetidæ. Hæc
mixtura est optima in hoc: ℞. pulueris assæ foetidæ, piperis
longi, rutæ siccæ an. ʒ. ij. mellis quod s. misce, & fiat confectio. *Confer-*
Dosis drachmæ duæ cum vino optimo, vel aqua roris mari- *atio.*
ni, vel saluæ. Hic puluis est in hoc genere optimus. ℞. bac- *puluis.*
carum lauri ʒ. j. zinziberis, & radicis gentianæ an. ʒ. ij. mi-
sce, & fiat puluis. Dosis scrupulus vnus cum vino albo opti-
mo. Rigor, frigus, & alia cum quartana curantur, præsertim
si extrema pannis, regulis, & lateribus ignitis calefiant, & *Viguen-*
dorsum hoc vnguento benè calido vngatur: ℞. theriacæ ma- *tum.*
gnæ

DE CVRAND. MORB.

*Curatio-
nes
varia.*

*Vnguen-
tum.*

*Admo-
nitio.*

*Vis ti-
moris.*

gnæ ʒ.ij. gariophyllorum, spicæ nardi an. ʒ. j. ʒ. olei antiqui, & optimi vini an. ʒ. ij. ʒ. omnia prunis imposita vase aliquo ferueant. Vnguentum Aragon in hoc genere laudatur. Quidam in hoc genere laudant drachmam vnā pulueris cranci humani cum vino optimo. Alij experientia longa curabant simul rigores, & quartanas succo plantaginis, & aqua. Multi liberati sunt à rigore, frigore & quartana hoc medicamento: ℞. mithridati ʒ. iiij. succi plantaginis ʒ. ij. misce. Hoc auxilium ter in principiis accessionis exhibitum curat rigorem, frigus, & quartanam: ℞. succi radicis thapsi barbati, & vini albi odoriferi an. ʒ. ij. misce. Expertum medicamentum in hoc genere est vnum os de corde cerui redactum in puluerem cum paucō decocto dictami, saluæ, camedreos, & camepircos. Puluis ossis leonis curat rigorem, & frigus quartanæ, vt quibusdam placet. Granum vnum musci cum vino est in hoc genere optimum, præsertim si naribus & ori admoveatur oleum rutæ. Hoc vnguentum est valentissimum in hoc genere: ℞. pulueris castorei, theriacæ magnæ an. ʒ. v. myrthæ, olei laurini an. ʒ. iiij. mellis despumati lb. ʒ. misce, & fiat ad modum vnguenti, quo initio accessionis vngantur plantæ pedum, volæ manuum, tempora, frons, & pulsus, & nares: sit bene calidum, bibat drachmam vnā rubræ tinctorum cum vino optimo. Succus calamenti, si bibatur ante accessionem, curat quartanam: animaduerte tamen, ne hæc nimis calida ante euacuationem exhibeantur, ne ex vna fiat duplex, vel ex intermittente continua. Timor magnus ab inimicis incussus curauit quartanam vnus anni. Quidam initio accessionis in flumen deiectus curatus fuit: quidam etiā subito, & præter spem audiens tonitru artificiale à quartana liberatus est, hoc tamen prudenter fieri debet: nam etiā si gaudium magis possit interficere, quàm timor, tamen ipse timor magis, quàm ira, quæ nullo modo potest occidere hominem, autore Galeno.

Scholium.

*Focus in
quarta-
na.*

Quartana duplex est.] Cum lien humore melancholico nutriatur, ipsum ex iecore attrahens, non est mirum, si quartana (qua ex humore melancholico generatur) in venis lienis habeat focum, & principium. Signa quartanæ intermittētis, de qua hic agimus, pete ex lib. 2. de diff. feb. cap. 5.

Secundò si omnia fermè sanguinis.] Ex Galen. lib. 1. de arte curatiua ad Glauc. quartanas ait per initia esse blandè tractandas.

Nullum

Nullum enim medicamentum vehemens exhibendum est, quia hoc Inter-
tenue humoris capit, & reliquum incrassat. Neque vacuandum est, preteratur
nisi sanguis admodum exuperet. Vbi per exuperantiam sanguinis locus Ga-
non est quod intelligamus plethoram, quæ in his, qui quartana la- leni.
borant, non reperitur, sed in hominibus carnosiss, & multo optimo
sanguine abundantibus intelligimus: ergo per abundantiam sangui- Sanguini-
nis, multum sanguinem melancholicum in venis contentum. Quan- nis mis-
do enim talis extat, sanguinem mittimus in principio propter cau- sio.
sam sæpius dictam, quæ est fluxio humorum ad focum putredinis. Sanguini-
Quod si sanguis secta vena egrediens flavus sit, tunc non est mit- nis mis-
tendus sanguis, imò sistendus: quia cum is, qui in venis continetur, sio ex
non sit melancholicus, signum est, ipsum non augere obstructionem, quæ ve-
neque eius fuisse causam: imò ipsum oportet sruare, ut iuuet humo- na.
ris frigidi, & crassi concoctionem. Sanguinis missio exercenda est ex Medica-
brachio sinistro semper & ex basilica, si apparet propter rectitudi- menta
nem venarum, & natura. quibus

Tertiò post tres menses.] Gal. in quartana utitur medica- Gal. at-
mento, quod diatrion pipereon appellant, & diaspolitico appellato. tenua-
Hæc ad extenuandos crassos humores exhibentur, compositiones eo- bat me-
rum 4. de san. tu. scribit, ubi diaspolitici medicamenti duas, tradit lanch-
compositiones: Vnam, quæ magis mouet alium, in qua par est portio liam.
nitri & aliorum medicamentorum: Alteram verò ad magis atte- Prapa-
nuandum, quæ minorem habet nitri portionem. Nos non solemus his ratio
medicamentis attenuare melancholicum succum, sed syrupis de fu- melan-
moterre, borraginis, endiuia cõpositi, de bizantiis & alijs. Cum de- cholia.
cocto fumi terre, radicis capparis, borraginis, tamarisci & similibus. Purga-

Quartò materia.] Coctione absolutâ quando iam non est obstru- tio.
ctio, purgandum est ea ratione, quæ docet auctor. Vomitus possumus Vomitus
etiam purgare post cibum, & sic si nil obstat vii possumus helleboro cum hel-
albo cum Gal. decoquentes ipsum cum raphano, & præbere rapha- libere.
num: hæc enim ratione ipsum propinabant antiqui, facta prius to- Theria-
tius corporis preparatione, humectantes ipsum cibo, potu, quiete, & ca An-
balneo. Nam qui ipsum aliter propinant, ex instituto interficiunt. droma-
Iam si vomitionibus non sit assuetus ager potius oportebit per in- chi.
ferna purgare quàm helleboro. Andromachi theriaca rectè purgat Medica-
humorem. Utitur etiam Gal. medicamento ex succo cyrenæico. mentum
Cuius compositionem tradit libro de rigore, sit enim ex succo cyrc- ex succo
næico & castoreo. Quo medicamento vicemur perfecta coctione, & cyrenæi-
facta purgatione, quando aliquid humeris remanet, repetiturque co.
paroxysmi, neque liberatus est homo à febre. Ab hoc enim medica- Quibus
mento quod relinquatur humeris attenuatur & expurgatur. utitur

Quintò corroborantibus.] Antè coctionem frictionibus, exerci- Gal. an-
tationibus, & balneis utitur Galen. Frictiones non debent esse te coctio-
fortes, sed pingues. Exercitationes non vehementes, balnea pauca rem.

DE CVRAND. MORB.

aut quod melius erit, nulla. Salsamentis etiam utitur, quæ sunt tres sale condita, multa enim sale condiebant veteres, ut asparagus, & alia arborum germina. His ergo utendum ob tenuandi vim quam habent: nam aliter sal crassarum est partium, & ideo probatur in quantum condimentum est. In morbi vigore, quies imperanda, & viscera fouenda ungentes lienem oleo de absinthio, de capparibus radicunt tamarisci, & similibus, unguento etiam marciaton, & de agrippa, vel decocto radice brionie, quæ maximè attenuat, vel oleo, in quo radices capparis, aut thamarisci sint decocta. His humor melancholicus maximè attenuabitur.

Medica-
menta
quadam
dam-
nantur.

Sexto rigorem.] Hac symptomata, si fluunt refrigerato corpore ab humore, & à retractione sanguinis & spiritus ad interna, quid faciet cranium humanum, succus plantaginis, os de corde cervi, aut os leonis?

De Febribus compositis CAP. VII.

Difficilis est descriptio febrium compositarum, difficilior earum tantum cognitio, quod docet Galen. i. de arte curatiua ad Glauconem, dicens: Paucae febres sunt, quæ ad sui dignotionem exquisitam die quarta indigeant: difficillima curatio, sua enim contraria natura, & longitudine hydropem, vel hecticam efficere solent. Sed antequam de iis verba faciam, prius oportet scire tertianam notham non esse adnumerandam inter has compositas febres, quamuis ex bile, & pituita constet: quia seruat motum bilis vincentis, siue sit vnica forma simplex actu, & potentia duæ, siue non. In aliis autem compositis, ut in hæmitritæo sunt duæ, vel plures formæ humorum actu, vel saltem hæ non seruant motum vnus humoris proprium. Harum compositarum febrium infinitæ fermè sunt species, quàm in primis omnia earum genera possint componi, & omnes etiam ex humoribus genitæ cum aliis, ut hectica putrida, & biliosa cum pituitosa, & melancholica: sed quia omnium complicatio, confusio, & compositio in præsentia non est tradenda, ne noster sermo prolixior fiat, tantum agam de febris tertianæ, & quotidianæ compositione, cuius quatuor sunt complicationes autore Galen. capit. 7. lib. 2. de differentiis febrium & capit. 9. libr. 2. de crisi. Vna, quum tertiana, & quotidiana commiscantur, altera, quando tertiana intermittens quotidianæ continuæ coniungitur, & hæc proprie semitertiana dicitur, & hæmitritæus: tertia, quando quotidiana intermittens tertianæ continuæ miscetur: quarta, vbi quotidiana tertiana tertianæ continuæ coniungitur: semitertiana (au-
tore

Diuisio.

to Galeno commentario de typis) alia est exigua, alia media, alia magna: prima spatio 24. horarum vertitur, secunda 36. magna verò 48. quæ & continuæ febrî propinqua est. Quidam volunt tres esse differentias, seu species hæmitritæi, maiorem scilicet, minorem & medium ponentes, apud quos maior est, quum continua biliosa, intermittenti melancholicæ coniungitur, minor quando biliosa continua quotidianæ intermittenti, medius, quando biliosa intermittens quotidianæ continuæ. Harum febrium causæ, & signa ex notitia simplicium febrium cognoscuntur, similiter & curatio. Considera itaque dicta capite de tertiana notha: nam eo ordine & ratione, qua cognoscitur & curatur illa, cognoscetur, & curabitur quæcunque alia febris composita: semper tamen formidandus est exitus harum febrium tanquam suspectus, & maxime periculosus, præcipue quando febris melancholica aliis coniungitur. Multos tamen laborantes hæmitritæo siue semitertiana sanavi post variationes factas pilulis de rhabarbaro, pilulis aggregatiuis, vel confectione diaphœnicon, præcedenti longa concoctione, & post auxilia interna & externa obstructionibus hepatis & splenis vtilibus remediis, nimirum confectione ex testudine & syrupo, quorum hæ sunt descriptiones. ℞. carnem vnius testudinis benè coctam cum aqua hordei, pulueris electuarij resumptiui ℥. ss. cinnamomi electi ʒ. j. medullæ passularum, granorum pini, in aqua rosarum calida prius infusorum, & amygdalarum dulcium sine cortice an. ʒ. ss. sacchari dissoluti in aqua buglossæ q. s. misce, & fiat electuarium ad formam manus Christi. Dosis quolibet die summo mane vncia semis cum vnciis quinque huius syrup. ℞. melissæ borraginis, cichoreæ absinthij ceterach. capilli vene. rostri porcini, scariolæ an. m. j. quinque radicum diureticarum, radicis buglossæ, liquiritiæ an. ʒ. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe libras octo, sacchari libras quatuor, trochiscorum de rhabarbaro vnciam semis, diarrhodon Abbatis ʒ. ij. misce, & fiat syrupus non perfecte decoctus.

Causa, signa, & curatio unde pendenda. Quibus remediis curantur febres.

Scholium.

Difficilis descriptio.] Qui rectè cognoscit febres simplices, & methodum eas curandi, non ignorat, neque ignorabit compositionem febrium curationem.

De Hæctica. CAP. VIII.

B Hæctica

DE CVRAND. MORB.

*Descri-
ptio.*

Hæctica febris est, quando calor præter naturam non so-
lùm in spiritibus & humoribus, sed in partibus etiam so-
lidis consistit, neque pendet ab humorum putredine, neque
à calore spirituum, estque fixus ac confirmatus difficulterque
soluitur, quemadmodum habitus. Fit sæpe semper sensim,
& longo tempore, ideoque non sentitur, ut inæqualis intem-
peries: rarò tamen ob patientis affectionem, & agentis ve-
hementiam, fit subito, & rarius non præcedentibus diaria
& humerali feбри, ut contingit in fulmine consumente fer-
rum intacto corio, & lana. Mœror ergo, ira, lassitudo, ieiu-
nia, febres ardentes, & omnes diurnæ febres hæcticam

Signa.

generant. Initio difficulter cognoscitur, quæ in marasimum
incidit, cognitu facillima est. Quare hæctica quum cogno-
scitur, curari non potest. Quando verò est sanabilis, est in-
cognita, ideoque non esse tres hæcticæ species affirmo, ut Ara-
bes & alij non pauci voluerunt: neque etiam quatuor humi-
ditates cum Avicenna pono, nempe nomen non habentem,

*Error
Arabū.*

rorem, cambium, & gluten, ob quarum consumptionem
tres species constituuntur. Gal. tamen 7. Methodi quatuor sic-
citatibus differentias recenset, à quibus forsan Arabes, &
alij multi iuniores occasionem arripuerunt diuidendi hæcti-
cam in tres species: nos tamen cum Gal. duplicem esse tan-
tùm credimus, primam fixam in hærentem partibus solidis,
quæ omnes corporis humores calfacit, alteram, quæ hæcti-
ca marasimodes, aut simpliciter marasimus nominatur. Hæc
omnes corporis partes colliquat, & consumit, omnemque
curationem respuit, ut diximus, cuius signa notissima sunt:
alterius verò notæ deprehenduntur, ex calore tantum per-
cepto à cibo & potu per duas horas: nam quemadmodum
aqua calci infusa calorem excitat, ita cibi & potus humiditas
à partibus solidis calorem occultum mouet, & elicit. Totius
corporis siccitas, & ariditas & sordes in ipsis aridæ apparent,
pinguedo in excrementis quoque videtur, & totius corpo-
ris extenuatio: non illa maxima, quæ in marasmo spectatur.
Pulsus tenuis, durus, debilis & frequens, & velocior est,
qui augetur adhibito cibo, calorque, ut diximus, incenditur.
Caliditas cum primum manus admouetur, debilis est, paulò
post acris, & rodens erumpit: acriorque sentitur, quum di-
tius arteriam tetigeris. Si verò his præsentibus novis ventris
profluvium superveniat, & pili defluant, mors propinqua est.

Curatio.

Victus.

Aër.

¶ Hæctica febris priusquam ad tabem deveniat, omni cona-
tu curatur refrigerantibus, & humectantibus. Primò aëre ar-
te parato (si naturalis reperiri non possit) violis, nenuphare,
rosis,

rosis, aqua rosata, foliis salicis, lactuca & similibus. *Cibis Cibus.*
 boni succi & facilibus concoctu, & paucis, præcipuè glutin-
 antibus, qui substantiam difficilem dissolutu generant, quæ-
 les sunt pedes animantium, præcipuè suilli vnius anni, & ra-
 næ, testudines, cancri fluuiatiles, & limaces: hi tamen egent
 præparatione: quamuis limaces inter alimenta, quæ atram-
 bilem generant, à Galen. numerantur, ideóque à multis eo-
 rum aqua, & ius magis laudatur. Modus præparandi trade-
 tur. Nutriatur ergo iure gallinæ, & cremore hordei, & iure
 arietis. Nutriatur etiam pullo gallinaceo, gallina tenera,
 perdice attagene, coturnice, turture, cuniculo paruo, vitulo
 assatis & elixis: ouis recentibus sorbilibus, piscibus paruis &
 saxatilibus, & anguilla, quæ in salubri aqua vixerit, si benè
 coquatur, eius tamen aqua est turior. Lac laudatissimum &
 optimum alimentum est, nisi adsint, quæ eius vsum impe-
 dian, de quibus cap. 29. præcedentis libri de tæbe: & hoc
 etiam cap. de his copiosius agetur. Et quia ob morbi longitu-
 dinem omnes ferme hæctici carent appetitu cibi, oportet ali-
 qua auxilia cap. 34. superioris libri in medium adducere,
 præsertim quæ huic febri non nocent, quales sunt succus
 malorum granorum acidulcium cum saccharo, & pauco
 cinnamomo, succus agrestæ, succus acetosæ. Alimenrum *Leuco-*
 etiam, quod fit ex oriza, pectore gallinæ, lacte caprino, (di- *phagm.*
 citur *manjar bianco*) vtile est. Aliquando in iis, atque aliis
 grauissimis morbis cum Hippocrate libr. 2. aphorismorum
 cibi mali præponuntur bonis, & ideo senex Rhases 10. ad
 Almanforem cap. de hæctica præbet infirmis huiusmodi ci-
 bum ex hepatibus auium, ouis, croco & aceto simul frixis:
 laudat etiam intestina quadrupedum plena carnibus, quæ
 lucanice dicuntur, à nostris *longanizas*. Fructus, qui huic *Leuca-*
 febri conferunt, sunt pruna damascena, vix præsertim per *nica.*
 aliquot dies suspensæ, acida cerasa, quæ dicuntur guindas,
 mora parum matura, mala punica acidulcia, & melones aliqui
 molliores, scilicet qui pepones dicuntur, & à barbaris bathe-
 ca refrigerant, humectant, & prosunt satis, nisi humida cum
 hæctica coniungunt. Herbæ & olera bona sunt, vt lactuca,
 portulaca, cucurbita, borrago, spinachia & similia. Si æger *Si æger*
 sit malum imbecillus, nutriatur rebus liquidis, vt iure opti- *fit mal-*
 mo gallinæ & testudinis cum cremore hordei, vel cinullio- *tum im-*
 ne quatuor seminum frigidorum maiorum, vel succo aceto- *becillus.*
 se, vel agrestæ. Succus carniū refrigeratus aliqua ex rebus
 supradictis, & mixtus iuri optimus est, & maximè nutrit:
 aqua tamen carniū est concoctu facilior, maximè citissimè-

DE CVRAND. MORB.

que nutrit : sed eget hæc aqua carnum refrigeratione , facta per ius , & alia superius dicta , ne calor febrilis augeatur.

Aqua carnum Fit aqua carnum hac ratione. ℥. pectus vnus gallinæ iuuenis , & pectus vnus capri, diuide in partes minutas , deinde *Eius præparatio.* laua eas aqua rosata & buglossæ , vel malorum cydoniorum, si sit ventris profluuium , & filo suspende omnes has partes in vase vitreo patuo, cuius os bene occludatur massa , post imponatur prædictum vas vitreum ollæ semiplenæ aqua feruenti , donec aqua exprimatur à carnibus supradictis. Obseruandum tamen est , ne carnes admodum siccatae (à quibus omnis aqua per resudationem extracta fuit) ad se ipsam trahant. Huius aquæ quinque vel septem cochlearia præbenda sunt cum iuris pari quantitate , sexta quaque hora. Aliqui Medici satis eruditi & probari in maxima virium resolutione laudant aquam distillatitiam ex sanguine hominis iuuenis . & perfectè sani , dummodo extrahatur , cum primum fluit à vena secta & instrumento vitreo , & paucò igne. Quia superius diximus alimentum frigidum & humidum , glutinosum esse vtile , & necessarium heceticis , vt ex testudinibus, cancri fluuiatilibus, limacibus , & anguillis , de his omnibus, & horum præparatione verba facienda sunt. Nam anguilla genita ex putredine , vel per conjunctionem serpentis cum anguilla, est pessima, & si sequenti præparetur forma iuuabit multum. Diuisa ergo anguilla prius semota eius pelle , & bene lota aqua rosata salita imple eius carne præparata ventrem gallinæ iuuenis , & post cum sufficienti quantitate aquæ, & paucò hordeo excorticato concoquatur aqua , & anguilla, fiat aqua per distillationem instrumento vitreo , & igne paucò. Dosis vnciæ duæ cum paucò saccharo. Multi medici eruditi ex testudinibus, limacibus, & ranis parum decoctis cum herbis frigidis & humidis aquam per distillationem extractam non minùs , quàm factam ex anguilla , & anguillam laudant in hac febre. Cancris fluuiatiles ex bona aqua electi vehementi lotione egent cum sale , fursure , & cineribus : deinde si aqua dulci luentur & ex hordeo excorticato , sufficientique aquæ parte decoquantur perfectè , sunt optimi alimenti heceticis , & faciles concoctu. Testudines nemorales pauca egent præparatione , quamuis earum ius est facilius concoctu : limaces montani sunt meliores , & optimè nutriunt , si per aliquot dies non pascantur : post tamen saccharo , & farina nutriantur duobus tribusve diebus , dummodo prius decoquantur aqua & paucò sale , postremo iure optimo gallinæ , vel arietis. Hæc ratione præparati refrigerant,

rant, humectant, & bonum sanguinem generant, nec difficiles sunt concoctu: quamuis aqua ex ipsis solis per distillationem expressa sit concoctu facilior, & eandem facultatem habeat, qua curatus fuit illustrissimus Marchio Zeneranus ab egregio doctore medico Doleſa Valentino. Inter omnia, quæ hanc febrem solent & possunt perfectius, & citius curare est lac, quia valenter nutrit, humectat, parum refrigerat, & facillimè concoquitur, humanum tamen est omnibus perfectius, atque vtilius ob similitudinem, huic bonitati proximum est asininum, deinde verò caprinum, & mox vaccinum, à quo butyrum extractum sit. Eligatur ergo iuuenis perfectè sana, optima prædita natura, vel sanguinea, à partu distans per duos vel tres menses: si tamen abhorret à lacte humano, vel si haberi non possit, eligetur lac asinæ nigræ iuuenis à partu distantis per duos, aut tres vel quatuor menses nutritæ hordeo, & herbis frigidis & humidis, aut lactuca, endiuia, cichorea & similibus: ante tamen lactis vsum aliqua sunt obseruanda prius, ea scilicet, quæ ipsum dari prohibent, vt sunt primum catarrhus, & distillatio, & capitis dolor, secundum febris putrida, tertium quibus hypochondria suspensa murmurant, quantum ventris profluuium. Quod verò lac quodcunque prædictis morbis maximè aduersetur, docuit Hipp. lib. 5. aphor. aph. 64. lac inquit dare caput dolentibus malum, malum verò & febricitantibus, & quibus ilia suspensa murmurant, & siticulosi, malum autem & quibus in febribus acutis biliosæ sunt deiectiones, & quibus sanguinis effusio multa accidit. Conuenit autem & tabidis dare, qui non valde febricitant, & in febribus longis, & paruis, si nullum ex supradictis signis affuerit, & præter rationem absumptis: quod confirmat Gal. variis locis, præsertim commentario huius aphor. in quo demonstrat lac ab omnibus causis calidis celerrimè in nidorem fuliginosum verti: quamuis per se probum gignat succum aliquid habens flauentum: si tamen asininum sit lac, nullam habet acrimoniam, quum omnibus sit humidius, Gal. autore lib. 4. de ratione victus in morbis acutis aph. 7. ideoque ventrem solum magis soluit, etiam si inter purgantia omnia medicamenta mitissimum tranquillissimūque existat, & omni lacte sit humidius, ac proinde magis ventrem subducit, vt idem Gal. censet aph. 109. eiusdem lib. 4. de ratione victus in morbis acutis. A quibus Galen. locis & aliis, sumpsit Iacobus Sylius ansam purgandi affectos vere caulo lacte asinæ cocto, quod pace tanti viri, repugnat Hippocr. Gal. rationi, & experientia tur.

*Lactis
aqua ex
limaci-
bus.*

*Histo-
ria.*

*Lactis
prestan-
tia.*

*Lac hu-
manum.*

*Lac asi-
ninum.*

*Quæ
prohi-
beant,
lac ex-
hiberi.*

*Iacobi
Syluij
senten-
tia non*

presta-

DE CVRAND. MORB.

*Fœlici-
tas no-
strorum
tempo-
rum.*

*Qua
impe-
diat la-
ctis coa-
gulatio-
nem.*

*Prior
forma
conficiē-
di ele-
ctuariū
ex testu-
dine.
Altera
forma.*

quamvis lac sua humiditate, & facultate mitissima, & acrimoniae experte minimè febris ardentibus noceat, quia illius substantia facillimo negotio alteratur & corrumpitur, maximèque his & similibus morbis aduersatur, si per os sumitur, sed coctum minus: tempore namque Græcorum se- rum tutius aliis medicamentis acribus, & calidis purgabat: nostro tamen fœlicissimo tempore manna, rhabarbarum, cassia fistularis, tamarindi, & myrobalani saluberrimè purgant, & his, aliisque, & siccis morbis minimè nocent. Quando igitur nihil est, quod lactis usum impediat, fugat æger ipsum ab uberibus fœminæ nutritæ rebus frigidis, & humidis, vel ter in die ventriculo vacuo, vel bibat primò lac caprinum, vel asininum ab ʒ. ij. usque ad ʒ. vj. dummodò ne alteretur ab aëre, quia facillimè corrumpitur, cui semper adde parum sacchari, ne coaguletur in ventriculo, quod etiam valentius prohibetur à sale, vel melle, si æger non possit sugere ab uberibus lac, extrahatur in vas actu calidum, ut conseruetur naturalis calor. Quod si sumpto lacte sentiat acidus ructus, vel putredinem aliquam, abstineat ab eius usu & nutriatur cremore hordei, & iure pulli gallinacei, vel gallinæ, & confectione ex testudine, de qua statim loquemur. Quamvis cap. 29. de tabe descripta sit à nobis confectio ex testudine, tamen in præsentia maioris doctrinæ gratia, duas proponam conficiendi formas, quarum prima est minoris pretij: vel ℥. carnis testudinis aquaticæ optimæ aquæ decoctæ cum hordeo excorticato ʒ. ij. medullæ vuarum passarum, & amygdalarum dulcium sine cortice. an. ʒ. j. granorum pini aqua rosata calida prius infusorum ʒ. ss. pulveris electuarij resumptiui ʒ. ss. seminis papaveris & cinamomi electi an. ʒ. j. conseruæ botraginis ʒ. iij. sacchari dissoluti in aqua botraginis q. s. misce, & fiat electuarium ad formam manus Christi. Altera confectio est maioris pretij ad diuites: ℥. carnis testudinis nemoralis decoctæ cum iure hordei sine cortice ʒ. ij. carnis pectoris gallinæ iuuenis, & capi. ana. ʒ. j. pulveris electuarij resumptiui ʒ. ss. pulveris diarrhodon Abbatis, pulveris di- margaritonis frigidi an. ʒ. ij. gummi dragaganti, gummi Arabici, seminis papaveris albi, & seminis portulacæ, seminis lactucæ, quatuor seminum frigidorum maiorum mundato- rum, seminis bombacis an. ʒ. j. amygdalarum dulcium sine cortice, medullæ vuarum passarum an. ʒ. j. nucleorum pini in aqua rosarum prius calida infusorum ʒ. ss. interioris cin- namomi ʒ. j. ss. sacchari dissoluti in aqua bug-offæ. q. s. misce & fiat electuarium, ad formam manus Christi & leaurarum. Dosis huius

huius confectionis vncia semis cum vnciis sex cremoris hor- *Electua-*
dei, & iure gallinæ, vel gallinacei cum testudine, & ranis. So- *rium re-*
lum electuarium resumptiuum recens est satis utile hec- *sūptiuū.*
tis. Dosis ℥. ss. cum iure prædicto, vel aliqua aqua ex superius *Potus.*
dictis. Inter prandium, & cœnam vel quacūque hora ven- *Condi-*
triculo vacuo bibat aquam hordeaccam, qua semper in po- *tum.*
tu vtatur, nisi ventriculus admodum sit imbecillus, quia tunc
vinum benè aqua dilutum, vel aqua cinnamomi esset potus
conuenientior. Extra igitur mensam bibat aquam hordei
cum hac mixtura: ℥. conferuæ violarum, rosarum; nenu-
pharis & borraginis an. ℥. ij. corticis citri saccharo conditi.
℥. ss. quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum,
seminis papaueris. an. ℥. j. pulueris electuarij resumptiui. ℥.
ss. sacchari q. s. misce, & fiat conditum auro coopertum. Do- *Extin-*
sis, cochlearia duo, vel tria, Iulep violarum, vel rosarum, sy- *guentia*
rupus de nenuphare, & de cucurbita extinguit sitim & totum *situm.*
corpus humectat, & exiccat. Refrigerant, & humectant he- *Clyste-*
par, & totum corpus clysteres ex solo lacte caprino, vel oni- *rum uti-*
no: aut ex oleis, violacco, nenupharis, & papaueris, aut ex *lit as.*
hordei cremore, & si opus fuerit adde cassiam fistularem, vel
butyrum recens. Hic clyster, vel similis est optimus: ℥. iu- *Clyster.*
ris pulli gallinacei, decoctionis hordei sine cortice, foliorum
violarum & lactuæ ℥. x. cassiæ fistulæ præparatæ ℥. iij. mu-
cilaginis seminis cydoniorum ℥. iij. vitellos ouorum ij. sac-
chari optimi ℥. ij. misce, & fiat clyster, si tamen adsit ventris
profluuium, abstine ab iis. Vnguenta ex oleis, & rebus hu- *Vnguen-*
meçantibus & refrigerantibus spinæ, seu dorso, hepati, & *torum*
pectori admota bis vt minimum in die ventriculo vacuo *usus.*
sunt utilissima, & necessaria huic feбри, inter quæ hoc vel si- *Vnguen-*
mile est optimum: ℥. oleorum violarum nenupharis, rosa- *tum.*
rum & papaueris lotorum benè aqua rosata. an. ℥. j. mucila-
ginis seminis psilij, cidoniorum & althææ aqua rosata ex-
tractæ, ℥. ij. butyri recentis, axungia gallinæ, medullæ cru- *Balnei*
rum vituli. an. ℥. iij. pulueris electuarij resumptiui, & pulueris *commo-*
diamargaritonis frigidi. an. ℥. j. ss. ceræ q. s. misce, & fiat vn- *ditas.*
guentum. Balneum est huic morbo præsentissimum auxilium, *Balneū.*
præsertim si non coniungatur hecticæ catarrhus, febris pu- *ex aqua*
trida, obstructio & similes affectus, quibus multum nocet bal- *frigida*
neum, siue sit ex sola aqua frigida, siue ex tepida. Primum *cur no-*
quamuis à Gal. laudatur 10. methodi contra Herophilum est *ceat.*
suspectum, & aptum ad extinguendum calorem imbecillum
hecticorum. & præter hoc sua intensa, & actuali frigiditate
per accidens calfacit, & exsiccat internas partes, ideoque pi-

DE CVRAND. MORB.

*Quod
balneū
sit pro-
bādum.*

*Ante
balneū
seruan-
da.*

*Hora
balnei.*

tuitosos & crassos humores (à quibus fit retanus) resoluit, auctore Hipp. & Gal. 5. lib. aph. 2. 1. aph. nam si laborans retano carnosus, iuuenis, in æstate, & regione calidi potest curari balneo aquæ frigida, hæcticus cum non possit esse carnosus non poterit sine periculo tolerare balneum aquæ frigida. Aliqui post balneum aquæ tepida, laudant balneum aquæ frigida, præcipue si æger fuerit iuuenis: non multum imbecillus, & affluctus balneo aquæ frigida. Alij sensum hæcticos à balneis parum calidis ad minus calida, & tandem ad frigida transferunt, ne ab vno extremo in aliud fiat transmutatio. Balneum aquæ tepida folius, vel ex decocto lactucæ, foliorum & florum violarum, salicis, nenupharis, capitum & pedum arictinorum, vel vitulinorum est tutius, & à me sæpè expertum, aliqua tamen prius oportet animaduertere ante balneum necessaria, & in balneo, & à balneo. Ante balneum per quatuor vel quinque horas nutriatur æger solo lacte asinino cum saccharo, vel optimo iure ex gallina, & testudine, & hordei cremotu, vel duobus recentibus ouis, & sorbilibus, & parum ante balneum sint vacua intestina. In vere hora balneum ingrediendi sit octaua ante meridiem, in æstate septima, in autumnno & hyeme quinta, vel sexta à meridie. Habitatio sit moderatè calida, quemadmodum & aqua, ne sudore & fatigatione afficiatur æger: tempus ergo balnei respondeat voluntati, & delectationi ægroti. Numerus balnei sit proportionem morbi, & ægri: quamuis semel in vnoquoque die sit satis aliquando bis, & ter in hebdomada. A balneo amisso actu humore externo per pannos lini non calidos, sed per frictionem moderatam & blandam ungatur dorsum, pectus, & hepar unguento superius scripto, vel simili, aut lacte humano, & asinino, vel caprino vel bubulo tepidis, deinde quiescat in lecto, & nutriatur cremore hordei facto iure gallinæ, & ranis, & testudine, vel confectione ex testudine, & iure, vel aqua ex limacibus superius dictis.

Scholium.

*Hæctica
quid.*

*Inaqua-
lis in-
tempe-
ris.*

HÆctica febris est) Hæctica febris, est calor præter naturam habitum corporis occupans. In hac est æqualis intemperies in omnibus partibus corporis, quoniam in calore mutata sunt, quem habent ac si esset propria natura, & ideo ab ipso non dolent, nec molestantur, hoc autem quo ad sensum intelligere oportet. Non enim sunt omnino partes mutata à calore præter naturam, quia nec nutriendur, nec tumores qui in hæcticis oriuntur, vnquam ad suppurationem venirent, nec calorem febris putridæ (quæ hæctica superuenit) sentiremus. Hæctica duobus modis fit. Primo sequendo alios morbos.

hos, febres scilicet ardentes diarias, & inflammationes internas. **Duobus**
 Secundo incipiendo, & statim à principio. Quæ similem habet cum **modis** sit
 diaria generationem, ex causa aliqua procatartica, ira, tristitia, **Hectica**
 exercitatione, aut lassitudine cum vitione, hoc secundo modo raro **Primus.**
 contingit: hectica homines calidissimos, & siccissimos tantum inua- **Secun-**
 dens. Hectica duplex est, una simplex, & altera composita. Simplex **us.**
 illa dicitur, in qua calor factus est in partibus sine humiditatis ali- **Hectica**
 cuius consumptione. Composita verò, quæ siccitatem aliquam mor- **duplex.**
 bosam habet coniunctam, quam hecticam marasmodem nomina-
 mus. Absoluta harum hecticarum cognitio ex lib. 1. de diff. feb. ha-
 benda est, hoc in loco de curatione febris hectica simplicis agere in-
 stituimus unà cum auctore, hæc enim febris difficile cognoscitur,
 quamvis facilius curatur.

Hectica febris priusquam ad tabem.] Febris hectica cum sit **Curatio**
 calor simplex, unam habebit & simplicem curatoriam indicatio- **altera-**
 nem ab eo assumptam. Calor enim per contraria refrigerantia sci- **tione** fit.
 licet est aufiendus. Debent autem refrigerantia, humectantia **Refrige-**
 etiam esse, quia humiditas obtundit caloris vim. Tum quia, cum **rantia.**
 calor sit in partibus solidis factus, oportebit prouidere, ne siccitas
 introducatur. Huius hectica curatio quamvis 10. method. à Ga-
 leno tradatur, breuiter tamen hoc in loco eam transferemus. Re- **Sex re-**
 media ergo, quibus hectica curatur, aut foris applicantur, aut inte- **mediis**
 rius assumuntur. Foris applicanda sunt aër, medicamenta cuti ad- **curatur**
 mota & balneum. Interius verò assumuntur cibus, potus, & aer hectica. **hectica.**
 inspiramus. De quibus agendum est incipientes à cibo unà cum **Alimen-**
 auctore. Alimenti qualitas, huic febri accommodata, debet esse fri- **ta.**
 gida & humida, quia affectus est calidus, & qui exiceat corpus.
 Vnde ptisana accommodata est, alimenta etiam temperata alterata
 tamen rebus frigidis, lactuca, succo aggregata, & similibus. Et cum
 in hac febre laborantibus magna fiat substantiæ dissipatio, & calor
 sit fixus in partibus, alimenta debent habere aliquam glutinositatem,
 ne dissipentur facile à calore febrili, qua ratione unà cum gallina **Dānan-**
 testudinis partem coques, comedens ius & gallinam, non autem te- **tur ali-**
 studinem, quam nullus antiquorum commendauit, & difficile co- **qua ali-**
 quitur. Inde colliges multo minus esse exhibenda illa alimenta, qua **menta.**
 solent exhiberi, appellata electuaria in forma manus Christi, quia **Quanti-**
 in his carnes testudinis, & frigida corruptis iam sunt. Poteris etiam **tas ali-**
 extremitates animalium, cum carnibus facilis coctionis elixare, cum **menti.**
 pauco petroselino: & hæc sufficiant de qualitate alimenti. Quanti- **Lactis.**
 tatem ex robore facultatis concoctricis ventriculi habebis. im **Impe-**
 enim in hectica languida sit facultas, oportebit parum, & sæpè ci- **dientia**
 bare. Inter alimenta lac commendatur. Quale autem esse debet & assum-
 qua ratione assumendum recte docet auctor. Quæ impediunt lactis **ptionem.**

DE CVRAND: MORB.

- Primū.** assumptionem hæc sunt. Primo, corruptio eius in ventriculo, quā deprehēdemus ex pulsu, & ructu. Ex pulsu, si inæqualis fiat, & parvus, à lactis assumptione, hic enim pulsus solet fieri affecto orificio ventriculi. Ex ructu hoc modo. Si ructus sit acidus, & à frigidityte ventriculi, corruptum erit lac, si nidorulentus & fumosus à calore. Secundo impedit lactis assumptionem febris putrida, quia ab eius calore corrumpitur, & in vapores mutatur. Tertiò dolor capitis, quia vapores multi, qui à lacte, dū coquitur, in ventriculo eleuantur, caput implent, ac grauant. Quariò, hypochondria eleuata, ab aliqua inflammatione: vapores enim multi, qui à lacte consurgunt, cōprimunt turgorē. Quinto murmurantia hypochondria, quia cū murmur, seu rugitus fiat à flatu, augebitur à vaporibus lactis. Sexto, sitis, siticulosi enim calidū habent ventriculū, à quo lac corrumpetur. Septimò aciectiones biliosæ: quia hæc calorem arguunt, à quo similiter lac corrumpetur. Vltimò impeditur lactis exhibitio à profusio aliquo sanguinis, qui præcessit. Hic enim refrigerauit corpus, ventriculus autem refrigeratus non poterit rectè cōcoquere lac. Potus sit cremor ptisanæ, aut decoctū hordei. Aër inspiratus sit frigidus, dummodo cutem non attingat. Sanguinis missionis, aut purgationis, nullā fecimus mentionem: quia in hectica nullus est affectus euacuationem postulans.
- De remediis, quæ exterius applicantur, modò agendum est, incipientes ab aëre ambiente. Aër, etsi sit materia remedij, cum sit materia nobis connata, proinde indicat, aut sui conseruationem, quando qualitatem habet morbo contrariam, aut sui ablationem ob alterationem contrariam, quando eius qualitas morbum fouet. In hectica ergo aër aut est temperatus, aut calidus, aut frigidus. Si temperatus est, non laedit: si sit calidus fugiendus est, quia calorem augeat febrilem, aut alterandus aqua cum aceto mixta irrigantes cubiculum, in quo decumbit agrotus, aut aqua per euripes cadente, aut aspergendo frigidas herbas, & flores, ut folia salicis, arundines, rosas, myrtos, & similia: si aër frigidus sit pro gratia est habendus, habens naturam morbo contrariam. Quod si sit frigidissimus, inspiratus remedium est, quia per tracheam arteriam, & pulmones, pergit, at per cutem non poterit ingredi sibi ipsi viam præcludens, frigidityte condensans cutem, & prohibens calidorum vaporum exhalationem. Ac proinde permittendum est, ut inspiretur: corpus autem vestibulis operiatur, ne aer hic cutem suo contactu alteret.
- Epithemata.** Epithemata, aut medicamenta, quæ cuti applicantur, debent esse frigida & humida, non autem astringentia, qualia sunt, quæ crassas habent partes, hæc enim non possunt penetrare. Difficile autem erit inuenire medicamēta refrigerantia sine adstrictiore, pauca enim sunt.
- Vnguentū refri-** Inter omnia tamen uti debemus medicamento à Gal. 10. met. descripto, quod officina vnguentū refrigerans Galeni appellare solent. Hoc si potest parari, ut ex eo loco colligimus: ℞. olei rosati omphacini

3.iiij.cera alba & lota 3.j. liquentur in duplici vase, deinde refrige-
 rentur. Et ultimo loco agitando illa in vase addatur tantum aqua Galeni
 fontans, quantum imbibere possit: sed si tibi placet, inde parum aceti. Hoc
 medicamento utitur Gal. ad Erysipelata, & ad ulcera pudendorum,
 maximè enim refrigerat, ut simplicia, quæ ipsum componunt, osten-
 dunt. In primis oleum roscarum omphacinum duplici nomine est frigi-
 dum, & quia habet rosas permixtas, & quia factum est ex oliuis im-
 maturis. Et quamuis cera solum adhibeatur tanquam materia, laua-
 tur tamen ut amittat acrimoniam, & calorem, quem ex melle con-
 traxit. Liquatur autem cera cum oleo in duplici vase, ne ab igne ali-
 quem concipiat calorem. Tandem additur aqua, ut magis refrigeret,
 & humectet. Dixi te posse addere parum aceti, propter penetrationem.
 Aduerte tamen, in officinis seruari medicamentum refrigerans Ga-
 leni à Mesue traditum: quod, ut distinguas à primo, opus erit, ut hoc
 modo schedulam perscribas: ℞. unguenti refrigerantis Galeni ex 10
 method. &c. Hoc unguento debemus inungere regionem eam pectoris,
 quæ est supra cor, iecur, & totam spinam: ita tamen, ut cum manifestè
 iam calefactum est: à corpore abstergamus ipsum, & de nouo fiat
 inunctio. Tertiò huic febri solet applicari balneum: hoc quatuor habet
 partes, prima solum continet aërem calidum, in quo vestes deponimus,
 in quo ager parum immorari debet, ne calore fiat substantia dissipa-
 tio: secunda est ubi lauatur ager, ut meatus aperiantur: tertia est la-
 uacrum aqua frigida: debet autem hectica laborans aqua tepida
 lauari ut caliditas balnei simul cum calore agrotantis sit nutri-
 menti partibus solidis, quæ carnis tegumento distrahuntur: ad hoc, ut
 cum lauantur frigida non laedatur consumpto paucò calore, qui in
 eis est. Lotio autem frigida est febris remedium. Sic dicebat Galen. hecti-
 ci nihil balneo iuuantur, nisi in frigida immergantur. Nec mirum,
 nam in lauacro tepido calor augetur, & vapor humidus, qui in cor-
 pore paucus est, multum augetur, qui mala frigida corrigit, fluxum Obie-
 coërcens, & calorem extinguens. Dices, Hippo. 3. de rat. vic. in acut. c. 10.
 sent. 59. balneum, inquit, non conuenire his, quibus vires languet, non
 ergo hectici sunt lauandi, languidi cum sint. Respondeo, Hippocratem
 loqui de balneo euacuatorio, quod multos sudores mouet, quale hecti-
 cis non conuenit: bene tamen illud, quod ad refrigerandum calorem
 excedentem exhibetur. Iterum obiciet, hectici exiguum habent ca-
 lorem, poterit ergo facile extinguere ab aqua frigiditate.

Balnes
 partes
 quatuor.
 Prima.
 Secunda.
 Tertia.

Lotio in
 frigida.
 Obie-
 ctio.
 Solutio.

Respondeo, verum hoc esse, sed propter metum non est omittendum Expli-
 remedium, melius enim est cum periculo aliquid agere, quam sincere cer-
 tare hominem mori. Et quamuis Gal. lib. 3. acut. scribit languidos non pos-
 se ad frigidam peruenire sine laesione: non proinde eam omittunt hecti-
 ci, quia ibi loquitur de morbis acutis, exercetque methodum in pleuri-
 tide. Quarta pars balnei est, in qua sudores absterguntur, hæc hectici pars.

inuiti

DE CVRAN. MORB.

Nostra inutilis est. Nos heclicos adhuc balnea non ducimus, sed eos in proprio. prius cubiculis lauamus. Primum aqua tepida, & secundo perfundimus eos aqua frigida non actu, sed mixtione aqua calida temperata, qua comparatione alterius aqua frigida est. Sic Hipp. lib. 3. acutorum sent. 49. multas aqua mixturas paratas habet. Præterea oportet maxime considerare, balneum multis causis omitti. Prima est interna inflammatio, quia humores à balneo liquati ad ipsam confluent. Quod si Hippocr. lib. 3. de ratione victus in fine, balneum concedat pleuriticis, & peripneumonicis, id intelligendum est, post totius corporis euacuationem, quo tempore iam nil fluit ad partem affectam: imò tunc spiritus facilitatur, imminuitur inflammatio, & dolor mitescit. Secunda est alicuius partis principis imbecillitas, propter quam facile recipiet humores fluentes in balneo. Quod si pars languida non sit princeps, tunc bene poterimus balneo uti, quia ad articulos & cutem solet natura cum cōmodo animalis expellere. Tertia est plenitudo ad vires, vel ad vasa. Quia in plenitudine ad vires humores fusi, magis grauabunt, in plenitudine vcrò ad vasa rumpent aliquam venam. Quarta est febris putrida. Quia Quinta. hac obstructionem habet, qua augetur fusi humoribus. Quinta. cruditas, hac enim à calore balnei ad venas attrahitur. Sexta est alui fluor. Quæ duabus de causis balneum impedit. Prima est: quia cum balneum ad cutem attrahat, impedit motum naturæ per aluum expellentis. Secunda est, quia balneum cum humectandi vim habeat, fluxiliorem reddet aluum, & ideo heclicis diarrheæ laborantibus interdicitur. Septima est alui densitas & constructio: Quia à calore balnei, tenuiores faciem portiones sursum ad hepar & alias partes ascendent. Vltima causa usum balnei impediens, est Octaua. cibus & potus si parum ante assumpta sint, balneum enim ea cruda ad venas rapit. Et ideo statim à balneo nil est sorbendum, priusquam balnei perturbatio sit sedata.

De febre pestilenti. CAP. IX.

Descriptio. Pestilens febris est febris epidemialis perniciosa, & venenosa, qua multi afficiuntur & pereunt vno tempore & vna regione, vel ciuitate aëris ratione, vel (vt autor est Gal. lib. de theriaca ad Pisonem) pestis quædam bellua existit non paucos interimens, ciuitates quoque tutas depascens malè conficit: quippe praua quædam aëris ad corruptionem prompta mutatio efficitur, & homines cum respirationis necessitate periculum euitare nequeant, ipsum aërem veluti venenum quoddam ad se per os attrahunt. Discrimen inter pestem epidemiam, & eudemum, siue endemium demonstrat Gal. cō. 9. lib. 1. de ra. victus in morbis

bis acutis, in quo docet Hippocratem in lib. de aëre, aqua, & lo-
 cis egisse de endomio morbo, & de epidemio in lib. epid. sed
 de peste nullum peculiarem librum confecit, quia vnum mor-
 bum ex epidemiis esse pestem, per libros epidemiorum mon-
 strauit, & hac de causa 3. epidemiorum lib. pestilentes qual-
 dam tempestates descripsit, vnde infert ex genere esse vulga-
 rem morbum. Quamquam sunt multæ causæ pestis, tamen *Causa.*
 eas tantum, quæ medico sunt necessariae, recensēbo. Fit ita-
 que omnis pestilentia à putredine aëris autore Gal. 2. de dif-
 ferentiis febrium capit. 5. In pestilenti aëris constitutione in- *Externa*
 spiratio potissimum est causa, cur homines corripiantur pe-
 ste: aër enim nos circumstans à putrescente euaporatione vi-
 tiatur, ab aquis videlicet putribus in lacubus, paludibus: à
 multitudine cadauerum. A vi etiam coelesti sæpe fieri solet *Interna.*
 aliquando, aliquando ira Dei mittitur nostris peccatis infen-
 si. Semper tamen dispositio humorum, qui sunt in nostro cor-
 pore est interna causa satis potens, & ideo in eadem ciui-
 tate, vel domo aliqui afficiuntur peste, aliqui non, & affe-
 cti non omnes ab æquali causa moriuntur. Hinc etiam acci-
 dit, rarò tamen, vnum aëre nondum infesto peste laborare,
 quamuis pestis propriè non sit, sed peculiaris morbus vene-
 natus & perniciosus. Lapsus magnus aëris ad calidum, & hu-
 midum est causa satis magna pestis & ideo Gal. 1. de tempera-
 mentis capit. 4. scribit, temperamentum aëris pessimum esse
 calidum & humidum. Qui etiam pleni sunt malis succis, &
 praua victus ratione vtuntur facillè in febres pestilentes inci-
 dunt. Inter omnia anni tempora exitum æstatis & initium
 autumnus videmus maximè febribus pestilentibus conuenire. In- *Signa.*
 dicia futuræ pestis sunt aër minus calidus, & humidus, multitu-
 do exanthematum, & papularum, quæ à nostris Barbaris vario-
 læ & morbilli dicuntur, multitudo etiam phrenitidis venenose,
 copia carbunculorum, multitudo etiam murium, & animalium
 quæ fiunt ex putredine. Si verò volucris aërem proprium fugi-
 ant, & in ipso pereant, præsentem constitutionem pestilentem
 ostendunt, & quum pisces fugiunt aquam & in ipsa moriuntur,
 ab aqua esse ortam pestem dices. Notæ, quæ hominem pestilen-
 tia iam correptum demonstrant, plurimæ sunt, febris scilicet ab
 initio maxima, quamuis sæpe exteriora frigeant & interiora ar-
 deant, capitis grauitas, oris siccitas, vehemens sitis & vehemens
 angustia, difficultas spiritus, vomitus creber, oculorum aspectus
 toruus, ac varius, vigilæ & deliria, aliquando propensio
 magna in somnum: inter ignotas est, si post aures, aut sub
 aliis, aut circa inguina potissimum bubones cum febre parua,
 &

DE CVRAND. MORB.

& magna oriantur, in aliis etiam partibus internis ad exter-
nas: si enim in collo appareat tumor præter naturam, cere-
brum potissimè malè affici ostendit, si in alis, cor: si verò in
inguinibus, iecur, quod Hippocr. 6. epidemiorum parte 2.
aphor. 4. voluit dicens, abscessus veluti bubones signa sunt
carum partium, vnde exuberant. Sed quum non semper appa-
reant bubones, alias notas bene considera. Priusquam cura-
tionem præsentis pestis demonstremus, quo modo præca-
uenda sit ostendere conabimur, quod certissimo fiet, si ad lon-
ginquas & salubres regiones fugiamus, neque reditum lau-
dabo, nisi post perfectam & integram aëris alterationem, &
commutationem: semper tamen ad Dei iram placandam
cura animam tuam: sæpè enim corporis morbi ab animi
morbis fieri solent, dicente Domino languido, quem sana-
uerat, vade, & noli amplius peccare, ne deterius aliquid tibi
contingat. Et alibi, Si oculus tuus, id est, anima tua simplex
fuerit, totum corpus lucidum erit: nam propter peccata no-
stra iratus Deus pellem, & sua fulmina in nos mittit, vt in le-
ge veteri scriptum est, & etiam in noua ante iudicij aduentum
seruatore nostro docente. Quare ieiuniis, precibus, & elec-
mosynis Dei iustitia placanda est. Anima igitur curata præ-
cautio fiet victu conuenienti. Primò, aëre non montano, non
propinquo aquis, aliisque rebus putridis, cadaueribus scili-
cet, stercoribus, coriis, brassicis euulsis, & aliis prauis arbori-
bus. Eligatur ventus septentrionalis, vel orientalis, meridio-
nalis enim est omnibus deterior, medius verò occidentalis.
Habitatio quoque admodum propinqua centro, & cauerno-
sa est passim radij solares optimi sunt, lunæ verò noxij, quia
putredinem efficiunt auctore Galen. 3. de diebus decretoriis.
Aëris alteratio & emendatio summè necessaria est, non solùm
in curanda peste, sed præcauenda, quod maximè vi solius
ignis fieri solet, præsertim ex quercu, & aliis arboribus sa-
lubribus: habemus enim exemplum luis illius, quæ ex Æ-
thiopia ad Græcos peruasit, quam Hipp. multis modis ad-
mirandus curauit igne per totam ciuitatem incenso, vt Ga-
lenus eius fidissimus interpres lib. de theriaca ad Pisonem scri-
bit. Quanquam igitur ignis maximam habeat facultatem in aë-
re alterando, & puriore reddendo, multa tamen sunt calida, &
frigida & temperata cardiaca, quæ aërem efficiunt salubrem,
& illius qualitates prauas & contrarias tollunt. Calida am-
bra, muschus, thus, mastix, sandaracha Arabum, lignum aloës,
mirrha, aloe, resina pini, resina cupressi, laudanum, iunipe-
rus, aristolochia, nux muscata, gariophylli, gummi iuniperi,
eben

*Præcau-
tio pe-
stis.*

Fuga.

*Anima
curatio.*

Victus.

Aër.

Sol.

Luna:

Aër.

*His-
to-
ria.*

*Aërem
salubrē
efficien-
tia.*

*Calida
simpli-
cia.*

ebenus, acorus, enula campana, squinantum, bdellium, vinum aromaticum, cortex citri, storax liquida, laurus ocymum, been cinnamomum, crocus, calamentum, cassia lignea, zedoaria, lilium album, doricum, melissa, menta, ros marinus & similia. Frigida, quæ aërem calidum alterant, & purgant sunt acetum, Karabe, rosa, labruscus, poma, pyra, cydonia, corallus, santalli, acetosa, viola, cichorea, endiuia, nenuphar, balaustræ, coriandrum, bolus armenius, terra sigillata, argentum, myrtus, malum granatum, citrangulus, arancia, limones, agresta & similia. Temperata cardiaca, quæ aërem puriorem reddunt, & pestilentem discutunt, numerantur borrago, buglossa, margarita, carbunculus, hyacinthus, zaphyrus, & similia. Ex his & aliis cardiacis medicamentis multa cardiaca componuntur, vt theriaca magna, mithridatum, confectio Gentilis cordialis contra melancholiam, confectio de hyacintho, confectio ex granis tinctorum, quam alexermes nominat, hæc efficacissima multorum regum ac reginarum testimonio est probata, & à Valentinis omnibus maxime cognita, & frequenter probata, præsertim in quibus natura languet ob longum, vel valde acutum morbum spiritum vitalem dissipantem: quamvis Valentini ob magnam corporum raritatem, & aptitudinem ad caloris & spiritus dissolutionem, & hoc simili cardiaco medicamento magis egeant, & ideo ægri omnes illa semper amant, & postulant. Quare non sunt taxandi Medici, qui in hac regione sæpè iis vtuntur, neque quorundam, & Manardi ratio demonstrat coctum baphicam solum astringere, & suo rubro colore sanguinem & spiritum rationis similitudinis ad se magis distrahere & dissipare, quam cogendo firmare: quia rubra visa mouent sanguinem, & imaginatio per visum ad externas partes etiam sanguinem euocat, sed interius sumpta cardiaca sunt, corroborant cor, quod meliorem generabit spiritum. Neque multorum recentiorum ratio probat lapidem cyaneum, seu stellatum vomitu & deiectione purgare, & naturam turbare, humoresque melancholicos exagitare, nullas enim momenti est ratio: nam etiam si rhubarbarum, & lapis cyaneus largius sumpta purgantia sunt, tamen si parcius sumantur, alia substantia, astringente, & cardiaca corroborant, & purgatoria imbecilla non mouent corpus, præsertim si bene præparentur, vt in hac confectioe alexermes lapis cyaneus sæpè lotus, & in electuario ex gemmis rhubarbarum paucæ quantitatibus. Neque vera est multorum recentiorum etiam opinio dicentium, cardiaca recentiorum esse odora, licet quodcumque odorum sit cardiacum, ideo

*Frigida.**Temperata.**Iam**confe-**ctionis**alexer-**mes.**Manardi.**De lapsi-**de cy-**neo.**Error**recentiorum.*

DE CVRAND. MORB.

ideóque apud hos margarita non est cardiaca, neque lapides pretiosi, & sericum, aut similia: variae enim sunt medicamentorum cardiacorum differentiae & species. Prima eorum est, quae temperatam obtinent naturam, quamvis Auerroes velit parum calida medicamenta temperatis magis corroborare. Secunda est illorum, quae qualitates habent secundas corroborationis aptas, quales sunt stipricitas, odor bonus, ut in rosis, & mulcho & similibus experimur. Tertia eorum, quae à proprietate agunt, siue sint coniuncta qualitati manifestae cardiacae, ut in ipica & croco reperitur proprietas cardiaca cum bono odore & stipricitate, siue per solam occultam vim agant, ut hyacinthus, margarita, & similes. Est tamen inter haec cardiaca tertij modi discrimen: egent enim quae à proprietate coniuncta manifestae qualitati agunt, reductione de potentia ad actum, hoc est quod nativus noster calor agat in ipsa, & cum in actum redacta sunt per evaporationem eorum vis, (quae à quibusdam tertia vis dicitur) ad cor movetur, ipsiunque corroborat: quae verò sola proprietate, & occulta vi agunt, non egent reductione de potentia ad actum, sed tantum eorum vis ad cor deferitur, quae à nonnullis medicis quarta facultas nominatur. Præter superiores modos medicamentorum, quae per se primò corroborant, sunt etiam alij modi medicamentorum cardiacorum per accidens & secundario, quae remouent nocumenta, & qualitates veneficas à corde vacuando, ut lapis stellatus, & mirobalani: quae facultate propria tertia à corde magis euacuant, aut in contrarium alterando per primas qualitates, aut corroborando simul, & prohibendo vaporum elationem, ut terra sigillata, & bolus armenus: aut incidendo, ut facit aqua raphani contra fungos, & acrimonium auferendo ut butyro facimus. Sunt etiam alia medicamenta cardiaca non per se, sed mediatè, & magis per accidens, quàm superiùs dicta, nempe quae aliorum medicamentorum vires ad cor deferunt, ut pulegium, stechas & similia: & quae prohibent aliorum medicamentorum solutionem, ut opium. Ex his igitur & aliis cardiacis compone medicamentum ad formam sphaerae, quod dicitur pomum, vel trochiscos, qui supra ignem positi, aut dissoluti in aqua & aceto aërem putridum & foetidum salubrem efficiunt: gumosa tamen magis amant ignem, & alia humida, & liquida per habitationem inspersa conferunt. Hoc pomum est optimum in pestilenti constitutione, quae sit frigida: nempe: ℞. belzoin 3. ss. storacis calamitæ 3. j. gariophyllorum, laudani optimi, ligni aloës, cinnamomi,

an. 3. ij. santalorum citrinorum corticum citri, *Pomum*
 anthus an. 3. β. thymiani, storacis liquidæ an. 3. j. mentæ sic- *in causa*
 cæ, calami aromatici, macis, nucis muscatæ an. 3. β. musci, *frigida.*
 ambrae, an. ḡ. x. si fuerit diues, adde quantitatem ambrae, &
 musci: omnia misceantur, & cum mucilagine gummi draga-
 ganti pauca, fiat pomum, vel duo poma perforata positis musco
 & ambra in superficie. Hoc pomum aërem calidum pestilen- *Pomum*
 tem, reddet salubrem, vel saltem puriorem. ℞. florum violato- *in causa*
 rum, nenupharis, buglossæ, rosarum, citranguli, & spodij an. 3. *calida.*
 iij. corticum citri, macis, nucis muscatæ, storacis calamitæ, carda-
 momi, masticis splendidi, ligni aloes, cubebæ ana. 3. j. lauda-
 ni 3. j. S. musci & ambrae an. ḡ. x. cum mucilagine dragaganti
 dissoluta in aqua rosarum fiat pomum, vel duo poma perforata,
 ære bene alterato præsertim igne ex lauro, rore marino, calen-
 dula, iunipero, & similibus.

Secundò, cibus facilibus concoctu, boni sanguinis, & pau- *Cibi.*
 corum excrementorum, semper tamen iis sunt miscenda, quæ *Putredi-*
 resistunt putredini, cuiusmodi sunt acetum, succus limonum, *ni resi-*
 succus citri, succus granatorum, succus aggregæ & acetosæ, & *stentia.*
 fructus acidi. Alij omnes, præsertim humidi nocent. Nocet *Qua no-*
 quoque lac, & quæ ex lacte fiunt, & magis si cibus comedatur *cent.*
 Nocent similiter alimenta, quæ pinguedine superabundant.
 Denique nocet ciborum multa quantitas, & varietas, & inor-
 dinatus sumendi modus, ut si cibus crassus præcedat tenuem,
 & prandio minimè concocto cœnet homo. Cibus igitur uti-
 lis iis est, panis boni tritici, carnes arietinæ. Hispanæ hædi-
 næ, vitulinæ, aues montanæ, pullus gallinaceus, gallina te-
 nera, cuniculus parvus, lepus parvus, ova recentia & sorbi-
 lia, pisces parvi, & saxatiles, & alij boni succi, ut lucius. Po- *Potus.*
 tus sit aqua optima fluuiialis, vel fontana, & vinum album,
 aut rubrum mediocris substantiæ, & ætatis mediæ bene di-
 lutum aqua. Aliqui in hac præcautione, pro potu & cura lau-
 dant acetum, & succum granatorum acidulcium, sed ego his
 non pro potu, sed pro medicamento in parua quantitate ad
 futuram putredinem præcauendam vtor. Somnus diurnus *Somnus*
 nocet, & magis inassuetis, sit brevis in die, & per duas horas
 à cibo, & in loco obscuro. Nocturnus sit pro hominis natura
 sex aut septem horarum: nam ex aphorismo quarto libri se-
 cundi, somnus, & vigilia si modum exceßerint, utrunque ma- *Quin-*
 lum. Inanitio & repletio immodica nocent, fames ergo & si- *quo no-*
 tis magna mala sunt, & calidis natura pessima, quemadmo- *cent, &*
 dum plenitudo frigidis. Quare in hac præcautione & curatione *toridem*
 quinque maximè nocent, fames, fatigatio, fructus, scemina, *profunt.*

DE CVRAND. MORB.

Status, & alia quinque maximè iuuant phlebotomia, focus
 fuga, frictio; Fluxus, ideòque singulis diebus saltem semel ab
 stercoribus intestina sunt purganda clystere, aut supposito-
Animi si natura hoc non faciat. Animi perturbationes, calefaciunt,
pertur- & spiritus motu impetuoso mouent, ac resoluunt, multum
batio- nocent, ut ira, tristitia, odium, & coitus, præsertim immo-
nes. dicus, & magis à cibo. Præter hanc debitam victus rationem
Sectio ad præcauendam pestem necessaria est sanguinis missio, si vi-
vena. tium sit in sanguine. Sæpe etiam purgatio est utilis, & neces-
Purga- saria in hac præcautione, præcipuè si fiat per pilulas Ruffi,
tio per quas multi Rhazis appellant, constant enim duabus parti-
pilulas. bus aloes, vna myrrhæ, & medietate croci, & vino albo. Do-
 sis est drachma semis ad drachmam vnā. Semel in hebdo-
 mada purgant sine violentia & putredinem impediunt. Aloes,
 & myrrha mortua corpora nulla putredine, & foetore affecta
Pilula conseruant, nedum viua. Hæ pilulæ sunt valentiores, & me-
alia præ- liores multo, & à multis maximè probatæ, & expertæ. ℥.
stantio- aloes hepaticæ 3. iij. myrrhæ. 3. ij. croci 3. j. rhabarbari ele-
res. cti. 3. j. β. agarici 3. ij. gariophyllorum. ℥. j. spicæ. ℥. j. β.
 corticum citri 3. j. seminis citri. ℥. ij. tormen-
 tillæ. 3. β. santalo-
 rum rubrorum, & granorum ribes, vel feminis acetosæ. 3. β.
 corallorum rubrorum 3. β. boli armenici præparati 3. iij. prius
 agarico inciso, & per sex horas in oximelle simp. infuso, &
 aliis omnibus in puluerem redactis cum syrupo acetoso simpli-
 ci fiant pilulæ septem pro drachma. Dosis drachma semis ad
 drachmam vnā. Bolus armenus solus habet vim magnam in
Boli Ar- hac præcautione. Dosis est eius drachma semis ad drachmam
meni vnā cum vino albo & aqua rosata. Hoc medicamento vsus
laus. fuit quidam Dux Mediolanensis, & omnes eius familiares, quo-
Historia. rum nullus fuit peste affectus. Theriaca magna non solum
Theria- curat præsentem pestem, sed & generari prohibet. Dosis scru-
ca ma- pulus vnus ad drachmam vnā cum aqua acetosæ, vel rosa-
gna. rum per horas quinque ante cibum, & per sex vel septem post
 cibum: nonnulli tamen credunt hanc theriacam afficere ve-
 neno sanos, & veneno affectos curare, quorum opinio mihi
Refuta- displicet: sed Gal. verba lib. de theriaca ad Pisonem, & auream
tio quo- de eius laudibus sententiam audi. In summa theriaca & ex-
vidam. trinsecus apposita, & epota rabiosorum moribus præsentia-
Theria- nei medicaminis cuiusdam instar exactè opitulatur. Cate-
ca com- rum notis etiam in pestifera lue solum hoc antidotum ma-
menda- lo correptis prodesse adeò visum est, ut nullum aliud præsi-
tio. dium ad resistendum huic malo fuerit idoneum. Radix tor-
Tormen- mentillæ (quæ est species pentaphylli, dicitur vincens toxi-
tilla, cum

cum) est optima in hoc genere. Dosis cum vino, vel aqua rosa-
rum, vel acetosæ est ʒ. j. Radix dictami est etiam optima. Ean-
dem habet vim scabiosa sola, vel cum aceto & pimpinella. Hæ
pilulæ conducunt in hoc genere. ℞. xyloaloes ʒ. ʒ. tormen-
tillæ ʒ. ij. dictami ʒ. j. zedoariæ ʒ. ʒ. croci ʒ. j. ʒ. verbenæ ʒ. j.
cornu cerui ʒ. ij. santalorum rubrorum ʒ. j. corallorum rubro-
rum, seminis acetosæ an ʒ. ʒ. margaritarum electarum ʒ. j. bo-
li armenici ʒ. iij. gemmarum, electuarij de gemmis an. ʒ. ʒ.
cornu vnicorni ʒ. j. cum syrup. de acetositate citri fiant pilulæ
in æstate, vel in hyeme cum syrupo de mentha. Dosis drach-
ma seminis vsque ad drachnam vnā bis vel ter in hebdoma-
da. Ex his, & similibus fieri possunt sacculi ad cor apti ad præ-
cautionem, & ad curationem aptiores. Sola tractatio hyacinthi,
smaragdi, zaphyri & carbunculi habet non paruam vim ad præ-
cauendam pestem.

Ephimera pestilens periculosior est aliis, vt aliqui viri eru-
diti tradunt, quoniam venenum vitali spiritui aduersatur, vt
hellebori succus sanguini, & cerebrum felis humano cerebro,
& cantharides vesicæ: ideoque si spiritus animæ seruiens vene-
no afficiatur per se, & subito peribit, neque hoc repugnat
aphorismo 55. lib. 4. ex inguinum videlicet tumoribus febres
omnes malæ, præter diarias. Hæc igitur febris curatur sta-
tim, & summa cum festinatione medicamentis cardiacis in-
ternis & externis, & iis quæ spirituum calorem præter natu-
ram extinguunt, & qualitati venenosæ resistunt, & tandem
spirituum dissolutionem prohibent, & ipsos gignunt, qualia
sunt primo ius gallinæ, & arietis, vel succus eius, vel aqua
carnis cum succo agrestæ, vel acetosæ, vel succo limonum,
vel citri etiam, si morbus acutissimus sit, egeatque per se victu
tenuissimo. Aliquando tamen in robustis & Castellanis solus
succus granatorum cum saccharo, & paucō pane loto est satis
idoneum alimentum, vel succus limonum, & citri cum sac-
charo, & paucō pane, vel pyra tosta, aut mala cydonia. Po-
tus sit aqua hordei cum paucō vino albo optimo, vel aqua ro-
sarum, vel acetosæ, vel buglossæ. Inter prandium & cœnam
bibat aquam hordei cum julep rosato, & syrupo de citro, vel
de limonibus, vel cum hoc condito. ℞. confervæ acetosæ ʒ.
ij. confervæ rosarum, & nenupharis an. ʒ. j. coralli rubri præ-
parati, margaritarum electarum, pulueris radicis dictami,
& boli armenici præparati. ana. ʒ. ʒ. sacchari, quod s. misce,
& fiat conditum deauratum. Si diues sit, adde fragmento-
rum lapidum smaragdi, hyacinthi, Zaphyri. ʒ. ʒ. Omni quo-
que hora iuuat multum hæc confectio. ℞. confectiois de

*Dicta-
mum.*

Pilula.

*Scabio-
sa.*

Sacculi.

*Curatio
diaria.*

*Spiriti-
bus uti-
lia.*

Potus.

*Condi-
tum.*

DE CVRAND. MORB.

*Confe-
ctio.* hyacintho ꝑ. j. ꝑ. confectiois Gentilis cordialis contra me-
lancholiam, & conseruæ acetosæ, an. 3. vj. theriacæ magiæ.
3. ij. coralli rubri præparati, margaritarum electarum, boli
armenici præparati, pulueris radicis dictami, tormentillæ, &
feminis acetosæ. an. 3. j. rasuræ cornu vnicornis, ossium de cor-
de cerui. ana. ꝑ. j. ꝑ. syrupi acetositatis citri, q. s. misce, &
fiat confectio, adde lapidum pretiosorum ꝑ. ꝑ. folia auri tria.
Lapides hi, & alia multa vt sericum, os de corde cerui, & si-
milis cardiaca corroborant, & spiritus puriores, & lucidiores
reddunt à tota substantia, vel proprietate, vt nos contra quos-
dam iuniores superius docuimus, neque ratio quorundam
*Defen-
sio lapil-
lorum.* valida est. Græci hæc, & similia inter cardiaca non scribunt,
igitur non sunt cardiaca, quemadmodum neque hæc ratio
valet, cassia fistula, manna, rhabarbarum, mirobalani non
scribuntur inter medicamenta purgantia à Græcis, ergo non
purgant: si magnes attrahit ferrum, & Karabe paleas, &
pæonia collo appensa prohibet morbum comitalem fieri
à tota substantia, & non à manifesta qualitate, poterunt
*Epithi-
ma cor-
di.* quoque multa medicamenta non odora esse cardiaca. Admo-
uenda sunt cordi sæpè, imò semper, quæ calorem febris extin-
gunt, veneno resistunt, & ipsum cor corroborant in forma
sacculi, vel vnguenti, vel liquida: vt ℥. aquæ rosarum, ace-
tosæ, & buglossæ. an. 3. ij. aquæ melissæ, & ocymi. ana. 3. j.
aquæ florum aranciorum 3. ꝑ. pulueris diamargaritonis fri-
gidi 3. ij. trochiscorum de camphora 3. j. misce, & fiat epi-
thema ad cot. Putrida pestis, quæ ferè semper fit, curatur
*Curatio
putrida.* primò, victu diariæ pestis. Secundò sanguinis missione, si vi-
Victus. rium robur adsit, per sectionem vtriusque basilicæ simul, ne
*Sectio
vena.* sanguis venenosæ qualitatis particeps à parte dextra in si-
nistram fluat, extrahaturque sanguinis copia plenitudini re-
spondens. In aliis etiam morbis, vt in apoplexia sanguinea,
in articulari, & in phlegmone, amborum testium fieri solet
*Quæ ve-
na se-
canda.* sanguinis missio ab vtroque brachio simul. Sed si tumor, vel
carbunculus in hac febre sit post aurem, cephalica eiusdem
partis est secanda: si verò sub ala, basilica eiusdem partis: si
tumor sit in inguine, vena tibiæ, aut pedis interna eiusdem
partis: si autem in ambabus auribus simul, vtræque cephalica
est inscindenda, & si sub duabus quoque, vtræque basilica
simul etiam scindenda: si verò in vnoquoque sit inguine, ve-
næ vtriusque pedis, aut tibiæ. Pari modo faciendum est, si si-
mul sit bubo sub ala dextra, & inguine dextro, simul secabis
*Scarifi-
catio.* basilicam dextram, & venam tibiæ, aut pedis dextri. Quan-
do vires, & ætas prohibent in hac febre per venæ sectionem,
sanguis

sanguis est mittendus per cucurbitulas cum scarificatione, seruata semper rectitudine.

Tertiò, purgatione sine concoctione, quia materia venenosa semper est turgida propriè & per se, vel ob eius læsionem: statim enim subito cor lædit, quod doctissimus Manardus vult lib. 13. epist. 1. Malè igitur contrarium contra veritatem docuit Aloisius Mundella epistola decima sexta, sed quia huius febris materia fermè semper est biliosa, hoc aut simili medicamento vacuari poterit: ℞. medullæ tamarindorum, & medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ana. ʒ. ʒ. rhabarbari electi infusi per noctem, in aqua endiuizæ. ʒ. iij. electuarij de succo rosarum. ʒ. iij. syrupi acetositis citri ʒ. j. aquæ acetosæ quod sufficit misce, & fiat potus. Vel ℞. pilularum de rhabarbaro. ʒ. j. fiant pilulæ 7. Ab hac purgatione quotidie & ante ipsam excrementa sunt depellenda saltem clystere leniente.

Quartò, corroborantibus & alterantibus, vt syrupis confectiõibusque, ac conditis, & electuariis cardiacis, de quibus dictum superiùs in præcautione & curatione diariæ pestilentis: Drachma vna theriacæ magnæ vsque ad duas est nobilissimum medicamentum, si detur cum vino, aut liquore cardiaco, ægroto mox lecto imposito, vestibus & stragulis operto, quo sudor erumpens sanitatis nuntius fuit sæpissime. Multi quoque antidotum celebre ad eundem vsum experti sunt, cuius variz sunt descriptiones: sed ego magis eam laudo, qua doctissimi medici Germani sunt vsi, præcipuè Simon Riquinus Treuir summus Philosophus, & medicus Coloniz in stupenda illa febre sudatoria priùs Britannica, deinde Germanica dicta, quæ sic habet; ℞. ouum, & reiecto eius albumine per foramen angustum adimpleatur croco, & igne lentissimè torreatur, donec cortex croceum præbeat colorem, postea ouum in pila contundatur minutissimè, & corticis reliquæ non appareant: huic pulueri adde medietatem oui, seminis crucæ, radicis tormentillæ, dictami albi ana. ʒ. ij. seminis cardui benedicti, seminis acetosæ ana. ʒ. j. ʒ. nucis vomicæ ʒ. j. rasuræ cornu monoceruini, vel cerui (si primùm comparari non possit) ʒ. ʒ. theriacæ magnæ ad pondus omnium, deinde in mortario simul misceantur, & confundantur, vt formari possint trochisci, quorum dosis est drachma vna semis cum paucis aceto. Omnes ferè, qui hoc antidoto diu vsi sunt, liberi à peste euaserunt. Hoc quoque medicamentum est præstantissimum in præcautione & curatione pestis, & expertum à multis principibus Germaniæ, consilio doctissimorum medicorum. ℞. rasuræ vnicornis, rasuræ eboris ana. ʒ. j. xyloaioris, myrrhæ an. ʒ. j. ʒ. beeni albi,

Purga-
tio sine
conco-
ctione.

Aloisius
Mundel-
la.

Potio.

Pilula.

Clyster.

Corro-
boratio
& alter-
ratio.

Antido-
tum no-
bile.

Conse-
ctio lan-
datissi-
ma.

DE CVRAND. MORB.

albi, & rubri, doronici Romani an. 3. ꝑ. agarici optimi per octo horas in aqua buglossæ macerati 3. j. zinziberis ꝑ. j. gentianæ 3. j. ꝑ. carpobalsami ꝑ. xxv. rhabarbari electi. 3. j. ꝑ. corticum citri 3. j. santalorum alborum, & cirrinorum, an. 3. j. ꝑ. ossis de corde cerui 3. ꝑ. seminis citri ꝑ. ij. fragmentorum quatuor lapidum pretiosorum an. 3. j. limaturæ auri optimi 3. ꝑ. pulueris liquiritiæ. 3. ij. coriandri præparati 3. iiij. conseruæ enulæ, conseruæ rosarum an. 3. iiij. mellis. q. s. misce, & fiat confectio, adde syrupi acetositatis citri ꝑ. ꝑ. conseruetur in vase argenteo, vel vitreo, & tanquam thesaurus habeatur: aduersatur enim non solum pesti, sed vniuersis ferè venenis. Dosis in aurora drachma vna semis: hæc confectio est non minoris momenti, laudata & probata à multis sapientissimis medicis, eaque non pauci peste correpti, & ferè mortui ad sanitatem optimam sunt reuocati: in præcautione quoque est optima. ℥. sanguinis anatis maris & fœminæ, anseris, hædi, rutæ syluestris, seminis fœniculi, cymini, anethi, rapæ syluestris an. 3. iiij. piperis albi, & longi, costi, anisi, cinnamomi ana. 3. ij. radices gentianæ, trifolij, squinantij, thuris, rosarum siccarum ana. 3. iiij. agarici maris 3. ij. myrrhæ, spicæ nardi, an. 3. vj. benzoi, azari, ammoniaci an. 3. j. carpobalsami grana xxx. ireos, croci, reupontici, zinziberis, mastice ana. 3. j. stichados 3. ꝑ. fiat puluis ex his tenuissimus, & cum quadruplo melle fiat confectio, quæ conseruetur vase argenteo, vel vitreo tanquam res summa & ferè diuina ad pestem & venena alia, & præter hoc languentem ventriculum corroborat, flatûsque omnes valenter discutit. Dosis drachma vna vsque ad duas drachmas superioris medicamenti. Sed quia supradicta tria medicamenta calida satis sunt, ideòque febri nocent, necessaria præter illa erunt alia cardiaca frigida interna, & externa, de quibus superius dictum, & etiam cap. de febre ardenti, cap. 30. superioris lib. de palpitatione, & syncope. Si carbunculus huic febri superuenerit, præter vaccinationem per sectionem venæ eiusdem partis, purgationem debitam, cordis confirmationem, febris, & venenosæ qualitatis curationem iam dictam, chirurgus doctus omni arte trahat. exterius venenum admouendo carbunculo animalia viua, gallum videlicet gallinaecum, vel gallinam, cucurbitulas, & sanguisugas, vt aliqui volunt, vel ignem actu, aut potentia, vt Angli faciunt. Mixtura ex luteo oui & sale præcedenti incisione, habet facultatem mitem attrahendi & abstergendi. Panis si actu calidus, dum à forno educitur, carbunculo admoueatur, attrahit exterius venenum. Mixtura ex ficis siccis, & pulueris salis, ireos, & aloes habet magnam in hoc facultatem fermentum cum oleo, & sale

*Confe-
ctio præ-
clarissi-
ma.*

*Commo-
da.*

*Carbun-
culi cu-
ratio.*

*Admo-
uenda.*

*Mixtu-
ra.*

Panis.

*Extra-
bentia
venenæ.*

est

est eiusdem facultatis. Idem efficit mixtura ex opoponaco, fermento, & sale. Cataplasma ex scabiosa, fermento & sale laudatur in hoc. Aliquando oportet ad valentiora procedere: postea tamen crusta inducta sensim, & non violenter est euellenda solo butyro, aut pinguedine suilla, non salita adhuc, vel cataplasmate ex radice althææ, butiro & pinguedine suilla nondum salsa: post crustam euulsam necessaria est vlceris purgatio, & carnis instaurationio per medicamenta probata, cuiusmodi est mixtio ex sarcocolla & melle, vel diachylon, siue gummis, vel foliis ocymi, vel consolida maiori. Si fuerit cum hac febre tumor post aures vel sub alis, vel in inguine, aut in alia parte, habita prius debita, & iam superius dicta victus ratione, factisque necessariis vacationibus, corde corroborata per ea, quæ superius dicta sunt, tumori sunt admouenda, quæ venenum exterius attrahunt: ut cucurbitulæ, & theriaca magna, quæ (Gal. autore libello de theriaca ad Pisonem) non solum exterius sumpta, sed exterius admota est optimum remedium. Quidam medicus doctissimus & senex mixturam ex cantharidibus, butyro & fermento his venenosis tumoribus admouere solebat. Factæ post bullæ scindantur, extrahaturque humor venenosus, & crusta, & tandem facta debita abstersione, & incarnatione vlcerum multos affectos pestilentibus bubonibus Deo auspice curauit.

*Crusta
euulsio.
Carnis
instauratio.*

*Medici
cuius-
dam cu-
randi
ratio.*

Scholium.

Pestilens febris.] Morbi aut sunt epydemij, aut sporades: Epydemij à Latinis, populariter grassantes, vulgares, & communis appellari solent. Dicitur autem epydemius morbus ille, qui vnus existens multos efficit. Qui causam habet omnibus communem: Sporades morbi (à Latinis vacati sparsi) dicuntur, cum multi morbi multos homines sparsim afficiunt, ut quando eodem tempore pleuritis, angina, dyssenteria, & simul alij distincti morbi infestare solent. Hi causam habent particularem, nempe victus rationem. Rursus morbus epydemius aut est epydemus, aut seruans nomen generis epydemius dicitur. Eudemus qui à Latinis dicitur patrius, regionalis, aut vernaculus, nil aliud est, quàm vnus morbus plures afficiens in vna regione: ut lanuensis sit tussis, & catarrhus: Neapolitanis podagra: & aliis tumores in collo. Epydemius morbus diuiditur in simpliciter epydemium & pestem. Morbus epydemius simpliciter est vnus morbus multos afficiens, sed non interficiens multos: hac ratione pleuritis, dyssenteria, exanthemata, & alij huiusmodi populariter vagari solent: pestis verò est epidimia perniciofa: epydimia, quia multos afficit, perniciofa verò, quia

*Epyde-
mius
morbus.
Spora-
des mor-
bi.
Eude-
mus
morbus.
Simpli-
citer epy-
demius.
Pestis.*

DE CVRAND. MORB.

quia multos e medio tollit. Hi morbi pestilentes varij esse solent, carbunculus, febris, & alij similes. De morbis simpliciter epydimia egit Hippocr. in libris epydemion, in quibus etiam de peste egit, ac proinde ei particularem non dicauit librum. Cum pestis sit communis morbus, aliquando unam solum regionem, aliquando plures inuadens: qualis fuit illa quae tempore Marci Antonij totam Babyloniam, Graciam, & Romam inuasit. Habebit ergo causam communem ex lib. 2. de hominis natura sent. 3. & 1. epyd. in proemio. Hae causa communis est aer ambiens, quo omnes perpetuo utimur. Proinde dicebat Galenus 1. de differen. febr. 5: pestilentem febrem inspiratione potius contrahi. Aer autem dicitur habere pestilentem conditionem duobus modis: primo, cum habet prauam qualitatem, hoc est, putredinem, toto temperamento nobis contrariam, quam venen-

Causa pestis.

Primus naturam dicimus. Hanc putredinem aer vel a se ipso contraxit, vel modus; aliunde. A seipso, quum ex vaporibus cum eo permixtis, & non quo aer putrefactis, aliqua eius pars ob prohibitam inspirationem putredicitur scit praua putredine. Aliunde eam contrahit, quum vapores a habere terra, aqua lacustris, leguminibus, olcribus, foetidis cloacis, aut pestilen. a mortuis hominibus, putredinem habentibus venenatam, cum eorum con. permiscetur. Aliqui, ex corporum coelestium coniunctione hanc inditionem. aere infectionem protenire affirmant. Cum scilicet Saturnus, Iu- Quorum- piter, & Mars: aut cum Iupiter & Mars congregantur in humana dam re- domo & signo. Qui omittendi sunt tanquam architecti, in caelo fabricantes domos sola intellectus operatione. Neque enim in caeli corporibus vis nobis contraria est, quae creata sunt ut nobis seruirent, verum tamen est, hanc contagionem tam lethalem a caelo prouenire.

Secundus re, hoc est a Deo, ut peccata purgat. Quod temporibus David regis dicitur mo- euenisse in sacris bibliis legimus. Secundo modo dicitur aer habere das. pestilentem conditionem, quum calidus & humidus est: quia ratione.

1. de tempe. Galen. calidam & humidam constitutionem aeris pestilentibus morbis obnoxiam scribit: & Hipp. 2. epyd. par. 1. sen. 1. in Cranone ex eadem constitutione carbunculos pestilentes factos testatur, erat enim aestas cum pluviarum multitudine. Dices, Nonne

Obiectio. pestis habet putredinem prauam? quia ergo ratione aer calidus &

Solutio. humidus dicitur pestilens? Respondeo, aerem calidum & humidam corpora nostra reddere calida & humida, in eisque humiditates augere, & hac ratione in plerisque corporibus prauam generari putredinem, ex qua vapores eleuatos, & cum aere permixtos similem in

Triticum nec aqua faciunt pestem. eo generare perniciosum, & tunc tam esse causam pestis. Si aer causa pestis est, errant ergo, qui triticum putrefactum, aut aquam, pestem efficere sentiunt. Nam etiam si in tritico, aut aqua possit esse putredo venenata, interficiet ea ratione, quia pestis, non tamen dicitur pestis, quia cum non sit causa communis, non inficiet multos. Quares, si

aer

aër est infectus, cur non afficit omnes, cum omnes eum inspirent? Re- Obie-
spondeo ad actionem non solum requiri causa efficientis praesentiam, Etio.
sed passivam dispositionem: & cum non omnia corpora sint disposita ad Solutio.
pestem, non omnia eam concipient. Corpora disposita sunt illa, qua Corpora
habent aliquas obstructions, aut excrementa ad putredinem para- ad pe-
ta, qualia corporibus calidis & humidis reperiri solent, quae contactu stem dis-
aëris putris, facile putrent. posita.

Prius quam curationem praesentis pestis.] Praecautio corporis à In duo-
peste in duobus consistit: primo in status aëris consideratione: secun- bus con-
do in corporis natura. Si aër caliditate, & humiditate pestem fa- sistit pra-
ciat, ipsum alterabimus refrigerantibus, & exsiccantibus. Si aër iam cautio à
habeat putredinem, in ciuitate, & domo, ignem accendes ex tymo, peste.
pulegio, iunipero, cupresso, & aliis odoratis: quae caliditate rarefa- Primo
ciunt aërem, & siccitate humiditatem absumunt. Secundo conside- in aëre.
ra corpus, nam si aër sit calidus, & humidus, & corpus similiter, Secundo.
hoc refrigerandum, & exsiccandum erit. Si corpus habeat dispositio- in cor-
nem contrariam, frigidam scilicet & siccam, conserua ipsam. Si aër pore.
habeat prauam qualitatem, considera an corpus habeat firmam sa-
nitatem, an lubricam: si habet firmam & integram sanitatem, tota
praecautio consistet in expurgatione excrementorum, quae secundum
naturam colliguntur. Sic quotidie alui excrementa ducentur (si
sponte non fluant) pilulis Rhasis, thamarindis, & cassia. Excrementa
secunda coctionis, bilis, & melancholia cum facibus expurgantur.
Urina reddenda est, quia detenta acres emittit vapores. Ut excre-
menta tertia coctionis liberè euacuentur, oportet ab aëre frigido,
aëquis, & aliis astringentibus cauere, ne ab his cutis densetur. Si cor-
pora habent suauitatem lubricam (est autem hac in corporibus ple-
thoricis, & cacochimis) oportebit plethoram ipsam euacuare atque
cacochimiam expurgare. Quod si plethora coniuncta reperiatur in
corpore cum aliqua cacochimia, tunc temporis utrunque erit pra-
standum: primo igitur secabimus venam basilicam, & deinde cor-
pus purgabimus à cacochimia. Si praua in corpore excrementa re-
periantur, per conuenientes, & ad id à natura destinatas corporis
regiones sunt educenda. Si sit in aliqua vena obstructio, eam aperire
curabis. Si corpus non transpiret, & diffletur, balneo aqua tepida
cutis spiramenta rarefacies. Praeter hac omnia dicta opus etiam
erit in rebus non naturalibus seruare mediocritatem. Cibi sint fa- Cibi.
miliates, parum habentes excrementi, & extenuantes. Quod si ex
natura tales non fiat, arte eos tales reddemus mixtis condimentis:
Vinum sit tenue: Aqua pura: Animi pathemata fugienda. Exerci-
tatio, & Venus modum seruent. Tandem utendum est rebus putre- Potus.
dini contrariis, qualia sunt aromata. Quod si aliquis consuevit uti
Chiriaca, aut alio alexipharmaco, tunc poterit eo uti praecautiois

DE CVRAND. MORB.

gratia : si verò non habuerit illud consuetum , mittendum erit. Quàm falsa sint, quæ hoc loco docet autor de cardiacis medicamentis, intelliges ex capite de syncope.

Non datur diaria pestilens. Epimera pestilens.] Omnis febris pestilens ex Gal. lib. 1. de diff. feb. cap. 7. ex putredine est orta : ac proinde diaria pestilens non reperitur, quia, ut cap. 1. huius lib. probauimus, spiritus non possunt putrescere. Aliqui existimant, bene dari pestilentem diariam, & respon-

Aliquorum ratio probas non omnem pestilentem esse putrem. dent rationi supra dicta: non omnem pestilentem febrem esse putridam, quia ex Gal. lib. 3. de prasagio ex pulsibus c. 4. datur pestilens hectica, at hectica non fit ex putredine. Respondeo aliud esse febrem oriri ex putredine, & aliud esse putridam. Nam febris putrida est illa, qua ortum habet ex putredine existente in humeribus cavitatis cordis. At febris ex putredine orta illa est, qua ortum habet ex putredine, siue sit in cordis cavitare, siue in eius corpore. Et hac ratione hectica febris non est putrida, ortum tamen habet ex putredine,

Solutio. quàm ex foetore anhelitus colligimus. Putret autem in ea substantia per corpus cordis dissipata, qua ros dicitur, à cuius calore corpus cordis dispositum suscipit factam alterationem. Cum autem hac putredo sit venenata, & dispersa per corpus cordis, non est mirum, si hectica pestilens ita citò hominem interficiat corrumpendo temperamentum cordis, ut nullum medico aut remediis locum relinquat.

Sanguinis missio. Putrida pestis quæ.] Febrem putridam pestilentem hac ratione curabis. Cum sit putrida, habebit affectus, quos 1. scholio diximus putridas febres habere. Et ita curatio est incipienda ab humere, qui fluit ad locum affectum. Vnde in principio sanguinem mittemus ex cuiuslibet brachij basilica: neque enim amba basilica simul sunt incindenda, ut autor voluit: praesertim cum eius ratio friuola sit. Scilicet enim vena, ex quacunque parte fiat, per ipsam euacuat sanguinem, non autem eo replet partes vicinas.

Purgatio. Tertiò, purgatione.] Nanquam in principio licet purgare in febre pestilenti: quia fere omnes, qui purgantur, moriuntur, & merito: natura enim eo tempore aut expulsi humorem ad cutem, vel non, si expulsi, iam iuuanda est, neque impediendus est eius motus, qui ad externa fit, praesertim cum humor hic venenatus sit, &

Obiectio. in motu ad interiora possit maxime ledere aliquid ex visceribus. Si natura non expulsi humorem, cum crudus sit, non poterit purgari:

Solutio. neque enim turgent humor, cum sit firmatus in loco obstructionis. Dices, quando ergo erit purgandum? Facilis est responsio, cum purgatio post coctionem utiliter fiat, si natura non euacuat. Dices, in hoc morbo, cum humor sit venenatus, nunquam alterabitur à natura. Respondeo, verum esse non alterari ob nutritionem, sed ut ad excretionem aptius reddatur ea ratione, qua atrā bilem (qua etiam non potest nutrire) vincit. Hoc ex Galen. lib. 5. metho. c. 12. possumus probare:

probare: ubi describit quandam constitutionem pestilentem, in qua expurgato corpore vomitionibus & alui deiectionibus: tandem omnibus, qui euadebant, apparebant nigra exanthemata, octavo, & nono die: qua erant reliquia sanguinis, qui in febre putruerat: quas veluti cinerem natura ad cutem trussit, sicut solet alia etiam supernacua expellere. Iam expurgationem corporis vomitionibus, & alui deiectionibus factam, post coctionem sequutam fuisse, intelliges ex eo, quod utilis fuit. Si hoc ita est, poterit ergo humor venenatus coqui: & à natura utiliter expelli.

Quartò, corroborantibus.] Quando humor venenatus (obstru- Quando
tionis causa) in hac febre expellitur à natura ad cutem, & facit apparet
carbonem: tunc opus est uti medicamentis interiùs assumptis, qua carbo.
sudorem moueant, & exteriùs attrahentibus. Sudorifica sunt, primò Sudori-
hac confectio: ℞. confectiois de hyacintho & theriaca magna an ʒ. fifica me-
j. pulue. scordij. ʒ. ʒ. decocti scordij, aut carlina, qua est chamaleon al- dicamē-
bus, aut cori herba quantum sufficit, misce, & fiat potio. Hac confe- ta.
ctio habet compositionem ex hyacintho, qua roborat interna, ut ex-
pellant ad cutem, habet theriacam & scordium, qua venenis con-
trariantur, & tenues habent partes, quibus, cum decoctione dicta-
rum herbarum mouetur humor ad exteriora: debet tamen ager ve-
stibus & stragulis operiri. Aut possumus etiam uti confectioe ad
modum opiata. ℞. theriaca magna. ʒ. iij. confectiois de hyacintho. Opiata.
ʒ. ij. antidoti de sanguinibus Gal. ʒ. ʒ. pulueris scordij ʒ. ij. conserva
capillorum veneris & acetositis citri an. ʒ. ʒ. cum syrupo acetosi-
tatis citri fiat confectio, ex qua accipiat vsque ad ʒ. ij. cum decocto
scordij, & cooperiatur. Confectio scordei à Fracastoreo descripta op-
tima etiam est cum dictis decoctis. Exteriùs supra carbonem, ut at- Appli-
trahant venenum animalia viua, luteum oui cum sale, panem actu canda
calidum, & alia, qua tanquam imbecilla omittantur, oportet ergo supra
scarificare carbunculum: deinde ipsum lauare aqua salita: & tertio carbo-
apponendum causticū medicamentum: siue tale sit actu, ut est ignis, nem.
siue potentia, ut argentū, & unguentum aegyptiacum. Vltimò crusta
sensim amoueatur, & vlcus ad cicatricem perducatur. Et cum in
transitu humoris ad carbunculū detineatur humor in glandulis ex
sua natura lāguidis, proinde fiūt bubones. Quibus opus est applicare
etiā medicamenta, qua attrahunt, qualia sunt cucurbitula. Empla-
strum ex quatuor gummis oppoponaco, serapino, ammoniaco, & eu-
phorbio utile est: debent enim hac mīsceri, & subigi cū oleo rutaceo,
aut camemeli, aut irino, & fieri emplastrum buboni applicandum.

De Exanthematis. CAP. X.

EXanthemata Græcis, Plinio, & Latinis papulæ, sunt Descri-
timores, & affectus cutis sponte florentes, ut Manardus pris.
de

DE CVRAN. MORB.

de re medica optimè meritis libro septimo epistolarum suarum epistola secunda est autor, quia morborum omnium nomina à nostris recentioribus medicis recepta, & ab antiquis prodita explicantur, quem hac in parte Fuchsius de omnibus bonis disciplinis non secus meritis lib. 5. cap. 8. de curandis morbis sequutus est: quamvis eruditissimus Franciscus Valleriola lib. 1. enarrationum suarum enarratione octava demonstret variolas & morbillos, qui in pestilentibus febribus sæpe (ut præsentis hoc anno, qui est 1555.) apparere per modum quendam iudicii solent, non dici à Gal. exanthemata, neque esse herpes, idem Manardus loco superius citato vult: sed missa nominum quaestione cum Valleriola herpes morbillos non esse

Divisio.

(pace quod Manardi dixerim) affirmamus: quod optimè probat omnium bonorum autorum sententia. Sunt ergo duplicia hæc exanthemata, quædam sublimia, & cum tumore satis perspicuo, & apparente, præsertim circa augmentum & vigorem ipsorum, quæ dicuntur à barbaris medicis variolæ, & ab His-

Lata.

panis vulgari nomine dicuntur viruelas. Alia exanthemata sunt lata & sine sensibili tumore, quæ barbaris medicis sunt

Error

morbilli; & Hispanis sarampion. Qua in re fallitur Leonar-

Fuchsy.

thus Fuchsius loco superius citato, & sensibus omnino repugnat, dicens, variolas latas esse, & morbillos sublimes: neque enim illud docet Gal. comm. 9. libr. vj. aphor. dicens pustulas, & tubercula, quæ fiunt ab humoribus calidis in acumen tendere, & altum petere, quæ verò à frigidiori, latæ sunt, & non admodum pruriunt, quia fiunt ab humore non acri, aut minùs acri, ideoque variolæ sanguineæ magis pruriunt, & sublimiores sunt iis, quæ à sanguine pituitoso fiunt. Morbilli tamen à biliosissimo fiunt sanguine, & ob id minimè petunt altum, nullumque habent sensibilem tumorem, quemadmodum erysipelas: sanguis enim maxime biliosus in hac cutis affectione maculas, & pustulas pilicum moribus similes procreat latas, & non sublimes, maiores tamen, latiores, & rubicundiores iis, quæ fiunt in pestilentibus, & maximis febribus ab Hispanis dicitur pulgon. Hi morbilli sponte in cute erumpentes brevi tempore evanescent, nulla relicta ulceratione. Quare nulla, postquam perfectè eruperunt, egent curatione.

Causa.

Fiunt papulæ sanguineæ, seu variolæ à menstruo sanguine materno, saltem aliqua ex parte, si Arabibus credimus, qui (ut inquit Valleriola nostræ ætatis eruditissimus) plenius de his, & quantum ad substantiæ rationem, & curationem, quam Græci tractauerunt. Avicenna præcipue, qui Fen. prima quarti post febris pestilentis tractationem eximiam

egit de variolis, & morbillis, indicans & à sanguinis, & humorum feruore hæc papularum genera nasci, & per modum cuiusdam crisis fieri, transmittente scilicet, quæ nostrum corpus regit, facultate in eximias corporis partes vitiatos succos: vbi etiam ostendit quibus temporibus, ætatibus, anni constitutionibus eueniant potissimum, & qua ratione personari possint, idque profectò non minùs copiosè, quàm doctè. Atque hæc ipsa in præsentia de Auicenna, vt ostendam, non omnino, vt plerique nunc volunt, tanti viri dogma abiiciendum esse, sed sæpiùs amplectendum atque imitandum, vbi præsertim quid exacto iudicio illius methodum examinantibus rectè tractasse videatur, & vbi etiam apud Græcos & Latinos acuratam doctrinam non inueniamus. Morbilli verò à sanguine biliosissimo gignuntur, menstruo tamen aliqua ex parte & venenoso adiuuante in his, & variolis procreandis, aëre venenoso & praua victus ratione. Quare inter morbos epidemiales numerantur, & futuram pestem indicant, quando iis multi eodem tempore, eadem regione corripuntur. Si quis dubitat, cur hoc papularum genere omnes, modò ad legitimam peruenerint ætatem, semel afficiantur, quamuis aliquando bis, vt ego vidi, & nonnunquam ter aliqui corripiantur, illi satisfacies opinio quorundam Arabum, & aliorum, apud quos, vt diximus, menstruus sanguis est causa, saltem aliqua ex parte, huius mali: cum omnes in utero generentur ipso sanguine, ac nutriantur: nulla enim externa causa potest esse tam communis omnibus: sæpius tamen pueri, & aliquando iuuenes, rarissimè senes hoc morbo corripuntur: natura enim corpus profundum expurgans senibus est imbecillior, pueris valentior, & illorum corpus magis rarum, paratùmque ad plures morbos ob intemperantiam victus, & natura non potest diu sanguinem prauum ferre. Deprehenditur hoc malum siens, & factum vno ex viginti signis. Primum variolarum signum est dorsi dolor, ob sanguinis feruorem: vena enim magna ascendens admodum plena est, partèsque ei proximas, & musculos compressione, pondere, & calore, dolore afficit, vt in plethora experimur. Secundum est nati pruritus ascendunt, namque à sanguine effervescente vapores acres. Tertium est timor in somno, hoc est insomnia illis sunt multa, & ipsos terrent, à toto enim corpore ascendunt vapores, & fumi imaginationem, cogitationem, memoriàmque corrumpentes: quo fit vt dormientes sæpè clament. Quartum est partium sententiam vehementis punctio, præsertim earum, quæ cuti subiacent: sanguis enim

*Morbil-
lorum
origo.*

*Signa.
Dolor
dorsi.*

*Pruri-
tus nati
Timor
in som-
no.
Punctio.*

DE CVRAND. MORB.

nsio. enim ardens, eiúsque fuliginosi, & ignei vapores cutem distendunt, dolorémque pungentem efficiunt. Quintum totius corporis pondus, & tensio à toto sanguine feruescente partésque omnes corporis extendente. Sextum, faciei rubor, præsertim oculorum & maxillarum, quemadmodum in peripneumonia videmus. Septimum, lachrymæ ob vapores à sanguine ascendentes calidos, & acres, à quibus & humoribus aliis distillant lachrymæ. Octauum, sanguinis, & humorum feruor, & calefactio per vniuersum corpus, qualis reperitur in synochis. Nonum, est frequens pandiculatio, quam halicem medici barbari ex Græcis, qui halin & halicin vocant, nominarunt: de qua Hipp. aph. 57. lib. 7. & Gal. in com. egerunt, quo in loco de pandiculatione & oscitatione fit sermo: quamuis Fuchsius dicat eos errare, qui pandiculationem vertunt halicin, cum anxietudinem significet, quam si habuerint sani, Gal. auctore, semper præsentibus molestantur, & ab vno negotio, & actione ad aliam transeunt: eodem modo & ægros illos anxios esse, qui accubitus non ferentes iacendi figuram euariant, quia semper præsens aggrauat eos. Hoc verò præcipuè illis euenire consuevit, quibus in ore ventriculi, (quem nos abutentes vocabulo sæpe solemus stomachum nominare) certa quædam humoris qualitas continetur ventriculo molesta, quæ neque plurima est, neque in ventriculi fluitat cauitate, sed eam ipsæ imbibere tunicæ: sed meo quidem iudicio, licet illud sentiat Fuchsius, Gal. in com. non solum de oscitatione, quæ chasina dicitur græcè, sed etiam de pandiculatione, quæ Græcis est halici, agit dicens: sed & oscitari, sicut pandiculari contenta aliqua in muscoli, per quos tales fiunt motus, quos pandiculationes & oscitationes nominamus, vel humiditate flatuosa, vel spiritu vaporoso fieri, est à nobis demonstratum, sed & pandiculationem vocat Theodorus, & Marius Nizolius vir doctissimus: & teste Sebastino Corrado in literis omnibus, sed maximè Tullianis versatus conuertens Gal. expositionem linguarum Hip. halysmon, & halicin hæsitationem, & agitationem vocauit. Quin & Petrus Iacobus Steue linguarum omnium & rei medicæ peritus lib. 2. epid. sect. 6. aph. 29. contra sententiam Fuchsi halicin pandiculationem interpretatus est, ac vt Fuchsi non impedimus, quo minus anxietudinem conuertat, ita nos auctoritate horum virorum pandiculationem verè appellabimus. Hic aphorismus secundi epidimion similis est aph. 57. lib. 7. aph. præterquam quod in calce aphorismi epidimion additur, aut lac, quod pandiculationi, seu

anxie

anxietudini, & oscitationi multum nocet, quum hæc symptomata à flatu, & frigidis humoribus fiant, & propterea vinum aqua temperatum ea cura, non lac. Quare adiectitiam esse illam partem fatemur: auctore enim Gal. comm. 34. lib. 6. aphor. quando in libris sapientis alicuius sermo inuenitur aliquis manifestò falsus, non sine ratione contingit legentes dubitare, & primo quidem sibi ipsis diffidere, quasi neque illa, quæ sint manifestè nocentia, deinde suspicari, quod mendum fuerit interiectum. Sed his prætermisissis redeamus ad signum nonum papularum. Tam igitur pandiculatio, quæ est, ut diximus, symptoma omnium musculorum, quàm oscitatio, quæ est eorum tantum, quæ sunt iuxta maxillas hæc symptomata à somno fiunt) quàm etiam anxietudinem ægrorum, de qua diximus, indicant exanthemata ob vapores calidos acres & multos à sanguine efferuescente musculos omnes acriter ferientes, imò etiam totum corpus. *Palpitatio. Anhelitus compressio. Rancido.*

Decimum est palpitatio, seu concussio, quam barbari saltum appellant. Hæc differt maximè à conuulsione, tremore, & rigore, ut docet Gal. lib. 5. cap. 2. de symptomatum causis. *Crassities sputi.*

Decimum est anhelitus compressio, à copia sanguinis & vaporis, & fumi crassi thoracem comprimentis. *Capitis grauitas.*

Duodecimum est vox rauca. Decimum tertium sputum crassum à nimio calore. Decimum quartum est capitis pondus, & grauitas. *Dolor capitis.*

Decimum quintum dolor capitis non solum cum grauitate, sed etiam pungens. Decimum sextum est cordis palpitatio, quem Arabes caphan, & barbari tremorem cordis nominant. *pungens simul.*

Fit à febre ardenti & ferme pestilenti. Decimum septimum est oris exsiccatio, & ariditas, quæ semper solet febres ardentes consequi. *Palpitatio cordis.*

Decimum octauum est animi perturbationes, conuulsio, & syncope ob materiam venenosam cerebrum, nervos & cor lædentem. *Oris siccitas.*

Decimum nonum est dolor thoracis, & gutturis. Vigessimum est tremor pedum, præsertim si supra dorsum iaceat æger, nerui in tali accubitu sanguine & vaporibus impleti non liberè animalem spiritum suscipiunt: vnde tremor pedum fit, & non solum pedem sed & aliarum partium, *Animi perturbatio.*

& aliquando totius corporis, ut ego vidi. Vigessimum primum est febris synochus putrida, & ardens, præsertim in morbilis, cuius febris principium, & augmentum occulta sunt: vixit tamen statim apparet, cum sit tempus iudicij Rhases tamen breuitati studens paucioribus notis demonstrat ortum variolarum, & morbillorum lib. 10. ad Almanforem; Cum, inquit, febris acuta & conclusa pueris præcipuè, & iuuenibus euenire cœperit, & cum ea costarum dolor, vasi pruritus, & in somno

DE CVRAND. MORB.

*Remo-
tio ad si-
gna pau-
ciora.*
*Discri-
men.*

mor, & capitis grauitas, & oculorum rubor, & in corpore sentitur punctio, argumentum est ægro vel variolas, vel morbillos citò superuenturos, & libro diuisionum, hoc est aphorismorum, signum, inquit, generationis variolarum est febris acuta, caliditas conclusa, & vehementia doloris dorsi, & pruritus nasi, & timor in somno. Differt morbillus à variola, vt superiùs diximus, quia non habet sensibilem tumorem, lachrymæ etiam in origine morbillorum, sunt plures, & maiores, maior calor, maior respirandi difficultas, & dolor dorsi minor. Salutaria maxime omnium signa sunt febris, omnium symptomatum remissio, facilis egressus, denique omnia boni iudicii signa: mala & sæpe lethalia signa sunt durities, color viridis, violaceus, difficilis & tarda eruptio: tarda suppuratio variolarum, frequens syncopa, & animi defectio, & si post illarum eruptionem subito euanescent, malum indicant, & si contigua sibi sunt omnia variolarum tubercula, & ferme vnum efficiant, vel si vna variola supra aliam exoriatur, est signum noxium, & ostendit materiæ vitiosæ copiam. Peius etiam signum in hoc morbo erit, & lethalius, si colori viridi, violaceo, vel nigro tingantur, & si copiosius in thorace, & ventre, quam in cruribus & extremis partibus efflorescant, sunt noxiæ. Signum etiam in his lethale est vrina sanguinea, & deinde nigra, præsertim si facultatis defectus comiteretur: omnes tamen, qui hoc laborant morbo, angina præfocati ferme semper pereunt, & aliquando ventris profluuium dysenterico, vt inferiùs de puero dicemus.

*Cura-
tio.*

Duplex est curatio exanthematum ante eruptionem, & ab eruptione, prior vtriusque est necessaria, altera verò tantum variolis, quæ ex sanguine non bilioso fiunt. Ante eruptionem curatur quatuor remediorum generibus.

*Ante
eruptio-
nem vi-
ctus.*
Cibus.
Potus.

Primò, victu tenui parum refrigerante, & humorum motum prohibente, vt aëre parum frigido natura, vel arte parato, floribus, herbis, & aquis frigidis. Cibis frigidis, & paucis sanguinis, vt hordei cremore, lacte amygdalarum dulcium, cucurbita saccharo condita, succo malorum granatorum acidulum, lentibus, pyris, pomis, & cotoneis assatis, & abstinentia carniū ouorum & vini. Potus sit aqua lentium biscoctarum. Omnia calida nocent, quare alimenta multum dulcia, & salsa, vt cete falsum, & similia malè à nostris feminis Valentinis exhibentur, quod demonstrat senex Auenzoar: ipse enim puer cum esset, absente patre medico laborans exanthematis ob esōs pisces sallos, & sumptum mel

con.

consilio foeminarum in pernicioſa ſymptomata incidit.

Secundò, auertentibus, vt ſanguinis miſſione per venæ ſe- *Auerſio*
ctiōem in ætate florentibus, & robore virium, vel per cucur- *Per ſe-*
bitulas cum ſcarificatione ſcapulis, aut natibus affixas, & per cle- *ctiōem*
mentem & ſalubrem purgationem, quæ fiet caſſia fiſtulari, tama- *vena.*
rindis, manna, prunis damaſcenſis, rhabarbaro, & mirobalanis, & *Purga-*
non per vehementiora medicamenta, quæ dyſenteriam concita- *tio ſit*
re valeant. hoc enim ſymptoma pernicioſum ſæpe hunc mor- *clemens.*
bum ſequitur, quo multi pereunt, vt ego ſæpe vidi, præſertim *Dyſen-*
hoc anno 1555. inter alios Valentia obiit nobilis & magnifi- *teria ti-*
cus Iacobus de Sylua puer, ſex aut ſeptem annos natus, qui cū *menda.*
à variolis magnis & multis leuatus eſſet, & poſtea affectus mor-
billis ventris profluuiū correptus periit, & patiebatur anhelitus,
& respirandi difficultatem. Optinius quoque eſt hic clyſter in *Clyſter:*
hoc genere remediorum. ℞. foliorum maluarum, violarum,
& mercurialis an. m. j. hordei ſine cortice: & furfuris an. p. j.
fiat decoctum, de quo percolato accipe ꝑ. xv. diacatholiconis
ꝑ. j. olei roſarum ꝑ. iij. ſacchari rubri ꝑ. ſ. miſce, & fiat clyſter.
Suppoſitoria, ſeu glandes ex melle, ſale, & oleo auxilia ſunt, & *Suppoſi-*
neceſſaria etiam infantibus ante primum annum, & ſi oportue- *toria.*
rit, adde parum pulueris hieris ſimplicis. Clyſterem quoque *Obſerua.*
paucæ quantitatis, & vis exhibere pueris, & infantibus ſolemus:
auertentia tamen per ſanguinis miſſionem, & purgationem
nutrici, & non infanti conueniunt.

Tertiò, refrigerantibus cardiacis, vt ſyrupo granatorum, ſyru- *Refrige-*
po roſarum, de agreſta, cydoniorum, myrtillorum, de acetofitate *ratio per*
limonum, de acetofitate citri ſolis, vel cum decocto lentium bis *cardiaca*
decoctarum ſæpe & omni hora exhibitis infantibus quantitate
vnius cochlearij, grandioribus verò maiori: conſerua etiam ro-
ſarum, violarum nenupbaris, cydoniorum, & acetofæ, vel hac *Conſer-*
aut ſimili mixtura. ℞. theriacæ de citro, & limonatae ſmaragdo- *ua.*
rum an. ꝑ. j. confectionis de hyacintho ꝑ. iij. coralli rubri præpa- *Confectio.*
rati ꝑ. ij. conſerue acetofæ, & roſarum an. ꝑ. iij. ſyrupi acetofita-
tis citri q. ſ. miſce, & fiat confectionis. Si æger fuerit pauper. ℞. *Pauperi.*
theriacæ de citro & limonatae ſmaragdorum an. ꝑ. j. ſucci citri
angulorum & malorum granatorum acidulcium an. ꝑ. ſ. miſce
igne pauco.

Quartò, corroborantibus partes aliquibus, ne offendantur, *Corro-*
affectasque curantibus, inter quas ſæpius, & magis oculi, *boratio.*
pulmones & inteſtina læduntur: ſtatim ergo initio febris
ante eruptionem exanthematum ſæpe oculis inſtilletur hic
aut ſimilis liquor frigidus actu. ℞. aquæ roſatæ ꝑ. iij. ſemi- *Initio*
nis cydoniorum, ſumac. an. ꝑ. j. miſce. Zaphirus lapis oculos *feb.*

DE CVRAN. MORB.

Visum suo tactu corroborat. Si incipiant eruptiones exanthematum,
corrobo- adde parum croci medicamentis repellentibus & parum aquæ
rans. fœniculi : si tamen oculi laborarint exanthematibus, sum-
Quando mo studio prohibenda est eorum maturatio per exsiccationem
oculi la- factam mixtura ex sale, camomilla, & fursure actu calidis,
borant aut ex semine fœniculi, milio & ruta. Oculorum albugo, &
variolis. cicatrix, ne visio pereat, curatur aqua corticum fabarum, sy-
Quibus rupo rosarum, rhodomelle, pulvere sacchari candi, pulvere
curatur ossis sæpiæ & aliis, de quibus capite 18. & 19. superioris lib.
albugo. Thorax, & pulmones corroborantur ab initio, & semper loch
Corro- ex lentibus, cuius duæ sunt præcipuæ descriptiones, prior hæc.
borantia ℥. farinæ, vel pulueris lentium. ℥. iij. seminis papaveris ℥. j.
thoracæ. conseruæ rosarum ℥. ij. iulep rosati ℥. β. misce, & fiat loch:
Loch altera est in usu apud Valentinus. ℥. lentium p. ij. vuarum
lentium, passarum sine granis. p. j. seminis papaveris. ℥. ij. rosarum
cuius ℥. β. fiat decoctum ad pondus lib. i. cui percolato adde saccha-
duæ sunt ri candi lib. β. Pulueris dragaganti frigidi ℥. ij. misce, & igne
descri- pauco fiat loch, de quo accipiat sensim transglutiendo, vt ab
ptiones. vna via in aliam permeent. Intestina corroborantur clystere ex
Intesti- solo lacte, in quo lapides igniti extincti sint, vel calybs. Si
norum ventris profluuium adsit, adde pulueris dragaganti, masticis,
corrobo- sanguinis draconis. an. ℥. j. & si hoc non satis fuerit, illa ne-
ratio. cessaria erunt, quæ cap. 36. 37. & 38. superioris libri diximus.
Narium Naribus quoque ne impediatur capitis purgatio, & refrigera-
auxilia. tio, sunt admouenda oleum violaceum, amygdalarum dul-
Post eru- cium, sesaminum, vnguentum rosatum, & ad maiorem pur-
ptionem. gationem succus betæ, vel maioranæ cum aqua rosarum est
 bonus. Vlcera narium curantur, tersione per mulsam, rhodo-
 mel, oxymel simplex, & post per vnguentum lithargyrii cum
 pauco pulvere tuthiæ præparatæ, vel consule doctum chirur-
 gum. Apparantibus exanthematis, si natura probè illa excre-
 uerit, nullam oportet facere medicinam iuxta aphorismum
 vigesimumprimum Hipocratis libri primi, quæ indicantur, aut
 indicata sunt integrè neque mouere, neque nouare siue medi-
 camētis, siue aliter irritando, sed sinere oportet, victus tamen est
 permutandus : nam omnia, quæ non impediunt eruptionem, &
 ipsam facilem reddant, sunt necessaria, vt aër calidus, victus
 tenuis, aperiens, & mouens ad cutem humores, vt est ius ex
 ciceribus, foliis raphani, petroselini, & croco, & similibus.
 Potus sit aqua hordei, & caricarum. Inspicere res rubras, &
 puniceas summè necessarium, propter imaginationem enim
 feruntur ad cutem humores. Aliqui inuoluunt infantes pannis
 puniceis, quod non damno, sed primum magis laudo. Quòd
 si

si natura in expellendis humoribus tardior, aut imbecillior sit, ipsaque exanthemata difficulter egrediantur, & modò emineant, modò aspectum fugiant, est signum perniciosum: si id ob magnam plenitudinem aduenit, sanguinis missio fiat secta vena iccoraria, vel ab scapulis sanguis mittatur per cucurbitulas cum scarificatione: hæc enim vacuatio non impedit opus naturæ, quemadmodum ea, quæ fit secta vena. Deinde, etiam si non præcesserit sanguinis missio, plenitudo non est, & robur virium, hoc, aut simili medicamento vtere, quod tollit obstructions clementer, humoresque ad summam cutem ducit. ℞. caricæ xv. seminis fœniculi, apij, laccæ, an. ʒ. ij. lentium sine corticibus ʒ. j. ꝑ. gummi dragaganti, rosarum, santalorum, seminis cydoniorum an. ʒ. ij. decoquatur in libris viij. aquæ ad medietatem, cui percolato adde croci in puluerem redacti. ʒ. ij. Dosis bis in die vncia vna. Hoc medicamentum est etiam expertum, & optimum huic generi. ℞. laccæ ablutæ ʒ. vj. lentium sine cortice ʒ. viij. gummi dragaganti ʒ. iij. decoquantur in ʒ. viij. aquæ ad medietatem. Dosis omni hora est cochlearium vnum præsertim ventriculo vacuo. Si ei adderes syrupi de duabus radicibus, & cap. Vc. an. ʒ. ij. melius saperet, & valeret. Suffitus rerum redolentium calidarum trahit quoque humores ad cutem. Inuoluerere etiam totum corpus pannis calidis suffitu rerum calidarum ducit ad cutem humores. Post integram exanthematum eruptionem, & maculationem est necessaria puris euacuatio, & exsiccatio: ruptis igitur exanthemantibus acu aurea, vel argentea perfectiùs, & citiùs exsiccabuntur, & in futurum paruæ remanebunt cicatrices: pus enim, si diutiùs permanferit, magnam efficiet cauitatem, maioreſque cicatrices apparebunt. Hoc medicamento desiccantur exanthemata. ℞. salis, farinæ fabarum, & lentium an. ꝑ. j. farinæ orobi, lithargirij, cerusæ an. ꝑ. ꝑ. misce. Exsiccantur similiter fotu solius salis, quo auxilio vtuntur nostræ fœminæ in desiccandis exanthematibus, etiam non facta arte incisione: quamvis si, vt dixi, fiat, multò minores cicatrices, & vestigia apparebunt. Sed si cupis exanthematum vestigia tollere, & faciem pristino nitori restituere, lege, quæ diximus cap. 22. inter alia oleum roris marini (optimum sit in oppido de Octinent, & aliis Valentiniæ ditionis oppidis) & balsamum in hoc sunt sæpè probata. Mixture ex optimo melle, ex puluere ossis sæpè adnota locis affectis omnes cicatrices, & maculas tollit. Eandem vim habet spu-

*Quando
sanguis
vacuan-
dus.*

*Optimū
auxiliū
cū natu-
ra
tarda est
in edu-
cendo ad
cutem.*

Suffitus.

Euacuatio, & exsiccatio.

Laudatur incisionem.

Ad tollenda.

Mixtura optima.

DE CVRAND. MORB.

Spuma maris. ma maris. Post balneum frequens laua sæpe faciem, & alias partes affectas cicatricibus, & signis aqua calida cum farina orizæ, furfure, & amido, & curabis. Hæc aqua calida eundem præstabit

Aqua præstantiſſima. vſum, ſi ea sæpe calida lauentur partes: & radicis ſerpentariæ lib. j. foliorum, florum, & corticum fabarum viridum m. iij. ſucci ſaponariæ ꝑ. iij. aquæ roſarum, & ſucci limonum an. ꝑ. iij. miſce, & fiat ex his aqua per diſtillationem. Idem præſtat hoc medicamentum. Ꝙ. pinguedinis gallinæ ꝑ. j. gummi draganti, & arabici, florum fabarum an. ꝑ. ꝑ. fiat decoctum in aqua decocti furfuris, quo reſervato in vitreo vaſe laua partes has ſaltem

Medicamentum optimū quod dicitur. bis in die. Hoc quoque medicamentum eſt optimum in hoc genere remediorum. Ꝙ. lithargirij bene loti, cineris radicū cannarum, oſſium canis, vel leonis, farinæ cicerum, & orizæ, ſeminum melonum, cucurbitæ, been, coſti an. ꝑ. ꝑ. miſceantur omnia, & cum muſcilaginibus fœnugreci, ſeminis lini, & pauco melle fiat mixtura, quæ à noſtris fœminis dicitur muda, quæ sæpè faciem, & alias partes his maculis laborantes prima nocte & ſummo mane lotas aliqua ex ſupradictis aqua, vel ſolo decocto furfuris proculdubio curavit. Deoque auſpice, cui laus & gloria ſempiterna tribuenda eſt.

Scholium.

Febres in variolis & morbillis. **Discrimen inter hæc.** **Curatio.** Xanthemata Græcis.] Quamvis exanthema ſit nomen generale, omnes cutis effloreſcentias comprehendens ſpeciatiim, per exanthemata, variolas & morbillos intelligimus. Sunt ergo due febres, quarum una ſynochos eſt, & altera tertiana continua: quæ eam habent naturam & conſtitutionem, ut celerem habeant motum, & ſtatim criſi ſiniantur, ita ut ſynochos humorem expellat ad cutem, qui facit variolas, quæ ſunt tumores à noſtris appellati pigora, tertiana verò efficit morbillos, tumores latos & leuatos parum, qui à noſtris pallola dicuntur. Humor autem in his febribus neque eſt permixtus cum ſanguine menſtruo, neque eſt venenatus: ſed aut eſt ſanguis, aut bilis: quæ talem putredinem conceperunt, quæ citò vixcitur, & expellitur: ita ut illos tumores efficiat. Inter hos tumores eſt diſcrimen: morbilli enim ſunt tumores ſicci, & qui non veniunt ad ſuppurationem: bene tamen variola, in quibus ſtatim humor mutatur in pus: & ſic vlcera multa efficiet. Inde colliges, malum eſſe humorem, & recurrere ad interna, quia facit in ventriculo, inteſtinis, & aliis partibus multa vlcera quæ lethaliffima ſunt, quia ex ipſis lyenteria, & alia ſymptomata eueniunt. Quem metum non habemus in morbillis. Harum febrium curatio, cum ſint putres, ab obſtructione ſiente erit inchoanda, ac proinde in principio ſanguinem

sanguinem mittimus. Et cum natura statim vincens humorem in Quibus
foco existentem efflorescentias faciat, aut verius tumores: proinde inuenitur
his apparentibus oportebit cessare à missione sanguinis, & motum motus
natura iuuare. Quod præstabimus potu, alimentis & medicamen- natura.
tis astringentibus, roborantes partes internas. Sic potius est secun-
dum ius lentium quod adstringit. Alimenta sunt pyra, malum gra- Alimen-
natum & similia. Nos solemus malum granatum totum contun- ta.
dere, succumque exprimere, cui permiscemus croci parum & syru-
pum de agrestia, quod interdum propinamus sæpe. Medicamenta sunt Medica-
sympi adstringentes, & alia similia. Vnde videmus errare Ama- menta.
tum, & qui illum sequuntur in his exanthematis vtentes rebus
sudorem mouentibus: hæc enim aperiunt meatus internos, & sic
imminet periculum, ne humor ad interiora recurrat. Hoc autem
timemus, non quia humor in transitu exulceret, ut omnes video sen-
tire, humor enim benignus est, & à natura victus: sed ne fiant in
solitis partibus internis tumores, quos variolas appellamus. Atque
hæc sufficiant. Sitque laus, gloria, & honor omnipotenti Deo semper.

F I N I S.

MEDICA DISPUTATIO.

*An cannabis, & aqua, in qua mollietur,
possint aërem inficere.*

CVM febrium tam multarum, tamque grauium, quæ pro-
ximo autumnio Valentiam inuaserunt, causam eruditissi-
mi medici scrutarentur, in eam opinionem quidam inciderunt,
ut hæc omnia detrimenta, quæ non solum ad Valentiam, sed
etiam oppida finitima redissent, ad congeries aquarum, in qui-
bus cannabis emolliretur, referrent, qua sententia intellecta
meam ut proferrem, iusserunt grauisissimi inquisitores nostri,
quorum familiarum ego medicus præpositus sum. Quibus ut liben-
tissime parerem, quid sentire, volui declarare. Cannabem igitur,
& aquam in qua infunditur atque mollietur, aërem inficere atque
corrumpere qui censent, ex ingrato odore demonstrare conan-
tur, qui effectus à putredine cum sit, maximam vim affert ad
aërem alterandum, quo alterato necesse est morbos procreari.
Quod argumentum videtur Galenus in libello de iheriaca ad

DE CVRAND. MORB.

Pisonem Hippocratis exemplo confirmare his verbis. Quamobrem inquit Hippocratem illum multis modis admirandum laudo qui lucem illam ex Æthiopia Græcos inuadentem non aliter curauerit, quam aëris mutatione, & alteratione, ne talis amplius inspiretur. Præterea Auicenna sententia prima, quarto libro, tractatu secundo, capite primo visus est, velle aërem infici posse ab aqua, in qua cannabis maceraretur his verbis: Putredo accidit aut propter cibum malum, quum est præparatus, ut putrescat illud, quod generatur ab eo propter malitiam suæ substantiæ, aut propterea quod velociter recipit corruptionem, quamuis sit bonæ substantiæ, sicut lac: aut quia aquosus nutrimenti mali remouens sanguinem à substantia sua, sicut illud, quod generatur à fructibus humidis, valde tardis ad digerendum, aut quoniam ex illis est, qui non conuertuntur ad sanguinem bonum, imò remanet humor malus, frigidus, quem abhorret calor innatus, & putrefacit illum, sicut ille, qui generatur à cacumine, & citrulo, pyris & similibus, aut propter malitiam artificij eius, aut horæ ipsius, aut ordinis eius, secundum quod scis: aut propter oppilationem prohibentem respirationem, & euacuationem propter complexionem corporis malam, cum non potest digestionem facere bonam: aut propter dispositiones extrinsecus ex aëribus malis, sicut est aër pestilentiae, & aër lacunarum & locorum infusorum, in quibus huiusmodi res madesunt, ut linum, & spartum paulò post alias feruè putredinis causas scribit Auicenna, motum videlicet, & balneum à cibo, & solem in æstate, & alimenta calida in secunda mensa. Sed omnibus iis argumentis aduersatur experientia, cui magna fides habenda est auctore Galenò libris prioribus de simplicium medicamentorum facultate: sunt enim vires, & oppida multa in Hispania saluberrima, in quibus magna cannabis copia seritur, & emollitur, Setabis, videlicet, Tarraco, Alcagnicium, Requena, Vtielum, Vilanoua, Infantium, & de Alcarras (sunt hæc oppidorum nomina) in quibus & plerisque aliis homines, & sanitatem, & senectute fruuntur. Contra verò plurima oppida vidimus febribus vexata, in quibus nullus cannabis cultus est. Imò Valentia anno 1523. & 1530. maxima peste fuit correpta, quo tempore ne seriebatur quidem cannabis, nedum macerabatur: ab anno tamen 1530. ad hæc vsque tempora magna vis cannabis alitur, & mollitur, nec pestilens constitutio genita est. Verum his experimentis multæ subiunguntur rationes, quarum prima est non solum non alterare aërem, sed putredinem noxiam expellere, & superare quæ posset in aqua gigni. Atque ut hoc intelligentius expediatur, quid de cannabe scripserint phy-

Experientia docet aquam cannabis non inficere aërem. Ratio confirmans experientiam.


fici,

fici, & medici veteres, videndum erit. Dioscorides ergo libr. 3. Diosco-
 cap. 141. duplicem esse cannabem asseruit, vnam syluestrem, *rid. quid*
 quæ inflammationes lenit, tumores discutit, tophos articulo- *de can-*
 rum, lapidosasque durities dissipat, & funibus texendis est apta: *nabe.*
 alteram verò satiuam, cuius semen maiori copia sumptum ge-
 nitale semen extinguit, eiusque succus auribus instillatus earum
 dolores curat. Plinius verò libr. 19. capit. 9. dicit, eam integra- *Plinius.*
 tum habere odorem, quando seritur, & quando vellitur, cuius
 semen Italorum est cibus, & post lib. 10. cap. 23. dicit cannabis
 in syluis nata est nigriore filo & asperiore, semen eius extin-
 guere genituram virorum dicitur, succus vermiculos aurium, &
 quodcunque intrauerit eiicit, sed cum dolore capitis: tantæque
 vis ei est, ut aquæ infusus eam coagulare dicatur. Radix con-
 tractos articulos emollit in aqua cocta, item podagras, & simi-
 les impetus. Galenus post Hippocratem medicorum facile prin- *Gale-*
 ceptus 1. de alimentorum facultatibus cap. de semine cannabis, *nus.*
 asserit quosdam ipsum contusum cum aliis tragematibus, id
 est, bellariis secundæ mensæ potus gratia comedere: & libro 7.
 de facultatibus simplicium medicamentorum eadem, quæ Dio-
 scorides scribit, additque, flatus eo dissipari. Cuius ergo tanta vis
 ut est, hæc omnia, quæ ab his autoribus scribuntur, efficiat, credi
 non facile potest, aërem infici ab eo posse, sed nec inficere pos-
 se credendum est, cum gramina omnia, & herbarum noxiarum ipsius
 vicinitate pereant. Quod si hæc vires cannabi tribuuntur, non *Enecat*
 tantum putrefaciet aquam, quantum, quæ sit putredinem excu- *herbas.*
 tuer. Vires autem hæc cannabis, quæ calidissima & siccissima est, *Ratio*
 ac planè ignea, ut ab scriptoribus proditæ sunt, & eas experimur *validis-*
 quotidie. Tam acri ergo facultate prædita cum sit, agricolæ, ut *sima.*
 ea uti possint, in aquis mergunt, ut humiditate & frigiditate con-
 trariis qualitatibus eius vis vinci possit, quæ in pugna tam re-
 missæ sunt vires harum qualitatum, ut cum neutra superet alte-
 ram, putredo noxia gigni non possit: quæ tamen caliditate &
 humiditate superante generatur. Ingratum verò odorem esse,
 & caput eo offendi ex Plinio scimus: non tamen valde putrem:
 nec enim id velus autor affirmavit, nec ratione confirmari po-
 test, sed cum tanta sit eius acrimonia, tamque ignea eius fa-
 cultas, potest offendere non solum odoratum, sed caput etiam
 ipsum: at hoc ad gignendos morbos populares, quales isti vole-
 bant, satis esse non constitit, nec vlla ratione demonstrarunt.
 Neque locus ex Galeno indicat veram esse illorum sententiam,
 neque eo uti potuerunt, nisi ostensum fuisset, aërem canna-
 bis aqua posse infici, nam alioqui infecto aëri sola eius mu-
 tatione, & alteratione mederi possumus. De Auicennæ autori-

DE CVRAND. MORD.

tate ita iudico, vt contra nihil faciat, cùm in ea nulla cannabis fiat mentio, & si vera esset, loca, in quibus spartum emollitur, essent insalubria, quod experientia aduersatur, cum oppidum del Villar regni Valentini sit saluberrimum: infunditur tamen semper spartum. Præterea si in his omnibus esset credendum Aui-
In Aui- cennæ, alimenta mali succi, vt fructus ab eo dicti, & etiam lac
cennam. optimi succi, & alia multa vt exercitationes, balneum, calida ali-
Tempe- menta à cibo essent omnino prohibenda. Scio ego temperatam
rata regionem esse omnium saluberrimam, quam non possident
omnium Valentini, vt Ledesina eruditissimus credebat: scio & hanc para-
saluber- tam esse ad morbos humidos, & pituitosos, quamuis ferè omnes
rima. sint biliosi, & propterea multi apoplexia pereunt, plurimi morbo
Valen- comitali perimuntur: sed tamen hæc omnia non conuincunt
zia qui- ad cannabis lacunas causam morborum esse reiiciendam. Sed
bus mor. his omnibus omissis non esse hæc curanda vellem, sed dico re-
bis obno- gionem hanc non iis, sed aliis circumfusiis aquis totam alterari,
Ma, ideoque pars, quæ ad mare pertinet, est insalubrior, vt domus regia, & omnes domus, à via Saguntina vsque ad mare non salubri loco sunt: sunt enim humiliores, nam loca montana salubria sunt magis. Si ingratus censetur ab his odor cannabis, multò magis brutorum, & vermium, quibus nostra Valentia sæpissime est plena: si ingratus est odor cannabis, multò grauior est odor excrementorum corporis humani, quorum vacuatione carere non possumus, at multò magis iis abundant, quia cloacæ innumeræ sæuam exhalant graueolentiam, & semper apertæ sunt. Si principes ciuitates, & domus saluberrimas amant, & vaporum graueolentium expertes, eligant loca temperata, & alta, & à mari, & aliis aquis stagnantibus multum distantia, in quibus nulla arbor, nullaque herba aërem aliquando inficiant, qualis sunt nux, ficus, sambucus, helleborus, eruca & brassica. Sed cùm ex his intelligi possit, pestilentium morborum aliò referendam fuisse causam, plures rationes non addam, cùm tamen adiungi possint & rationi, & experientia consentaneæ.

INDEX



I N D E X

R E R V M, A C V E R B O R V M.

A



CRIA nocent
Diarrhææ.

100. a

Accipitris &
murium vis

41. a

Achorum descriptio causæ &
notæ. 17. b

Admonitio in sistendo fluxu
sanguinis à capite. 72. a

In parte difficili. 161. b

In quartana. 190. b

Adeps caprinus curat ventris
profluuium. 101. a

Aërem salubre efficientia. 199. b

Aëtius reprehenditur. 23. a
145. b

Albuginum oculorum descri-
ptio causæ & curatio. 59. b

Alexandri Tralliani medica-
mentum purgans pituitam
lethargi. 29. b

Algalia quâdo necessaria. 135. b

Amati Lusitani error. 97. b

Amor insanus quid. 43. b

Amoris insani præseruatio. ibi-
dem.

Animæ curatio. 199. b

Anasarææ curatio. 122. b

Ani procidentia descriptio &
causæ. 150. b

Curatio. ibid. b

Anodyna in arthritide. 168. b

Anginæ descriptio & causæ.
68. b

Causæ notæ & curatio. 69. a

Ante balneum quæ seruanda.
196. b

Antiquæ cephalalgia curatio.
23. a

Antidorum nobile ad pestem.
203. a

An secunda sit vena in omni
febre putrida. 181. a

A pleuritide suppurata pauci
cuadunt. 78. b

Apium & alia multa epilepsiam
detegunt. 36. a

A pituita fere semper epilepsia.
ibid.

Apoplexiæ descriptio & cau-
sæ. 46. a

Notæ & curatio. ibid. b

Apoplexiæ topica auxilia. 47. b

Apoplexiæ vitæ & mortis ex-
ploratio. 48. a

Apoplectici cur non sepelien-
di nisi post tres dies. ibid.

- Apophlegmatismi, masticato-
 ria barbari vocant. 47.a
 Apoplexia proxima epilepsiæ.
 38. a
 Appetentia immodica, & eius
 causæ. 94.a
 Appetentia cur necessaria. 95. b
 Appetentia quomodo fiat &
 quid sit. ibid.
 Apparantia bilem cum pituita
 & vacuantia. 186. b
 Aqua ligni guaiaci. 12. b
 Aqua similacis asperæ. ibid.
 Aquæ faciem terriorem & can-
 didiorem reddentes. 66. a
 Aqua efficacissima & approba-
 ta. 56. b
 Aqua ceraforum præstantissi-
 mum remedium in epilepsia.
 36. b
 Aqua præstantissima in Tabe.
 84. b
 Aquæ carnis laus, eius præpa-
 ratio. 194. b
 Aqua roris marini vtilissima
 resolutis. 50. a
 Aqua carnis heceticis. 194. b
 Aquæ ex limacibus laus.
 195. a
 Ardoris urinae descriptio, cau-
 sæ & notæ. 137. b
 Ardoris urinae curatio. 138. a
 Arabum opinio in Iscuria.
 134. b
 Arthritidis descriptio species
 & causæ externæ. 167. a
 Arthritide pauci laborabant
 Hippocratis tempore. ibid.
 Arthritide laborantes Eunū-
 chos vidit Galenus, non au-
 tem pueros. ibid.
 Arthriticus visus puer. 7.8.9.
 annorum. ibid.
 Arthritis hæreditarius morbus.
 167. b
 Arthritidis curatio. 168. a
 Ascitis causæ & Anasarca.
 122. a
 Ascitis curatio. 123. b
 Aspectum corroborantia.
 58. b
 Auentia. 59. a
 Asthma quid. 74. a
 Asthma vt epilepsia accessio-
 nes habet. ibid. b
 Asthmatis curatio extra acces-
 sionem. ibid.
 Asthma morbus cronicus. ibi-
 dem.
 Auertentia sanguinis impe-
 tum. 69. a
 Auertentia pituitam. 21. b
 Auertentia in accessione epi-
 lepsiæ 34. b
 Auenzoar vixit 135. annos.
 160. b
 Augentia capillos. 7. b
 Auctor quibus auxiliis curauit
 febres compositas. 193. a
- B
- Balnei commoditas. 196. a
 Balneum ex aqua frigida no-
 cet heceticis. ibid.
 Benedictæ Nicolai composi-
 tio. 103. b
 Bene & liberaliter nutrientia.
 16. a
 Bilis purgatorium mixtum cū
 purgatorio pituitæ purgat
 pituitam. 30. a
 Bilis flaua coquenda est. 2. a
 Bilem flauam coquentia sim-
 plicia

plicia & composita. 2.b
 Bilem atram concoquentia
 simplicia & composita. 3.a
 Bilem atram purgantia simpli-
 cia & composita. 3. b
 Bilis vacuatur in arthritide sine
 concoctione. 168. b
 Bilis turgentis purgatio.
 181. b
 Bilis non turgentis præparatio
 & euacuatio. ibid.
 Bouis mortui propinqui caro
 est boni succi. 39. b
 Brasauoli error. 71. a
 Britannica febris sudatoria.
 203. a

C

Calculi vesicæ causæ & notæ.
 131. a. b
 Calculi renum notæ. ibid.
 Calculi renum & vesicæ cura-
 tio. 132. a. b
 Camphora calida. 87. a
 Cantharides. 134. b
 Cantharidum improbatio.
 223. a
 Cancri fluuiatiles. 194. a
 Capitis doloris nomina & cau-
 sæ generales. 19. a
 Capitis doloris singularis cau-
 sæ & notæ. 19. a. b
 Capitis doloris curatio. 19. b
 Capitis distillatio diarrhæam
 facit. 100. a
 Cardiacorum species. 199. b
 Carbunculi curatio. 203. b
 Cataplasma ad hydropem.
 125. a
 Cæparum esus largus lethar-
 gum gignit. 29. b
 Cauterium in fluxu sangui-

nis quando necessarium.
 146. a
 Cibi fastidium quid, causæ, no-
 notæ, & curatio. 95. b
 Cinis scorpionum. 133. a
 Cinis leporis, corticum ouo-
 rum gallinarum & mortua-
 cillæ. ibid. b
 Clyster nutriens. 40. a
 Clyster ad somnum. 102. b
 Clyster ex iure gallorum.
 112. b
 Clyster communis colici dolo-
 ris. ibid. a. b
 Clyster potentissimus in mola.
 160. b
 Clyster periculosus habentibus
 herniam. 165. b
 Clyster in quartana. 190. a
 Cholæræ descriptio causæ no-
 tæ & curatio. 97. a. b
 Colici doloris descriptio, cau-
 sæ & notæ. 110. a. b
 Colici doloris curandi regulæ
 obseruandæ. 111. a. b
 Colici fetus & repellentia.
 112. b
 Colocinthidis substantia no-
 cet intestinis. ibid. a
 Comitialis morbi descrip-
 tio, diuisi o, causæ & notæ
 33. b
 Comitialis morbus hæredita-
 rius non curatur, non hære-
 ditarius difficulter, maximè
 à 25. annis. 34. a
 Composita lapidem frangen-
 tia. 134. b
 Composita pituitam conco-
 quentia 3. a. purgantia. 3. b
 Concoctio quid indicat. 1. b
 Concoctione non præcedenti
 vacuatio non facienda. ibid.
 Con

Conditum in hectica. 195.b

Confectionis hamech compositio. & dos. 5.a

Confectio purgans ad Gallicum morbum. 12.a

Confectio utilissima mingentibus sanguinem. 140.a

Confectio diabeti optima. 141.b

Confectio utilissima conuulsioni. 49.b

Confectio expuentibus sanguinem. 82.b

Confectiones duæ in quartana. 191.a

Confectio laudatissima ad pestem. 203.b

Corrixa catharrhis raucedo, tusses. 71.a

Correctio rigoris & frigoris in tertiana. 186.b

Corrigentia symptomata februm putridarum. 182.b

Corroborandus ventriculus in tertiana notha. 187.b

Constantinus. 109.a

Consuetudo Carpentanorum in sumendis syrupis. 3.a

Consolida optima in hernia. 166.a

Conuulsionis descriptio, species & diuisio. 50.b. 51.a

Conuulsionis causæ. ibid.

Conuulsionis notæ & curatio. 52.a

Conuulsionis purgatio sine concoctione. 52.b

Conuulsioni admirabile medicamentum topicum. ibid.

Cucurbitula vomitum & deiectionem cohibet. 98.a

Curatio achorum cum pileis. 18.b

Curatio mixta doloris colici & renum. 112.a

Curatio Arthritidis calidæ. 168.a

Curatio frigidæ Arthritidis. 168.b

D

Decidentia capillorum descriptio, causa & signa. 1.a

Decidentia capillorum morbi Gallici symptoma est. 1.a

Decidentia capillorum curatio. 1.a

Decidentia capillorum à causa valida vnguentum. 7.a

Decidentia capillorum à causa frigida vnguentum. ibid.

Decoctum sumendum die purgationis melancholiæ. 40.a

Defluxus humorum à capite. 71.a

Dentium dolores, & de ipsis quoque denigratis & mobilibus, & horum causis. 67.a

Dentium dolorum notæ & curatio. ibid.

Dentes maiori cum dolore medicamentis quàm ferro euelluntur. 68.a

Dentium omnem dolorem curant serpentum exulcia. ibidem.

Dentibus enascentibus pueris multi morbi fiunt. ibid.b

Deriuatio humorum in lethargo. 30.a

Deriuatio in vertigine pueri.

tuitosa. 33.a
 Deriuantia pituitam. 22.a
 Diabetis descriptio & causæ. 140.b
 Diabetis historia inaudita. ibidem.
 Diabetis signa & curatio. ibidem.
 Diaphœnicon compositio & dosis. 5.a
 Diarrhææ descriptio & diu-
 sio. 99.b
 Diarrhææ notæ & curatio. ibid. 100.a
 Diligentior epilepsiæ curatio in gratiam Valentinorum. 34.b
 Discrimen doloris colici à magnitudine & humore acri. 110.b
 Discutientia reliquias in melancholia & alterantia. 40.b
 Dissipantia humores qui anginam pepererunt. 69.b
 Dissipantia in morbo laterali. 78.a
 Dissipantia in arthritide. 169.a
 Discutientia pituitam. 22.a
 Dissoluentia grumos sanguinis. 83.a
 Distillationis à causa frigida curatio. 71.b
 Distillationis à causa calida curatio. 72.a
 Diuerſentia in morbo comitiali. 35.b
 Doloris aurium causæ & notæ. 61.a
 Doloris aurium curatio. ibidem.b
 Dormiendūne sit an non

sumpto medicamento pur-
 gante. 2.a
 Dosis syruporum. 3.a
 Dysenteria descriptio causæ & notæ. 106.a
 Dysenteria curatio. ibid.b
 Dysenteria antiquæ curatio. 107.b
 Dyspnææ descriptio, causæ, notæ. 74.a

E

Electuariorum ferme om-
 nium purgantium compo-
 sitio & quantitas simpli-
 cium valenter purgantium & dosis. 6.a.b
 Electuarium mirabile ad sol-
 uendam epilepsiam. 37.a
 Electuarium in febre com-
 posita. 193.a
 Electuarium in hectica ex te-
 stitudine. 195.b
 Empyematis descriptio, cau-
 sæ, notæ. 83.a
 Empyematis curatio. ibid. b
 Epilepsiæ descriptio, causæ & signa. 33.b
 Epilepsiam mouentia. 36.a
 Epilepsiæ curatio. 34.a
 Epithema cardiacum. 181.b
 Error quorundam in purgan-
 tibus medicamentis. 4.b
 Error Fuchsi. 206.b
 Error quorundam in compo-
 nendo diaphœnicon. 4.b
 Error quorundam in compo-
 nendis pilulis coctus. 6.b
 Error Auicennæ. 35.a & 193.b
 Error indoctorum in pleuri-
 tide

- tide. 78. b
 Error in explicatione icteri. 95. b
 Error in curandis hæmorrhoidibus. 147. b
 Error iuniorum super affatione rhabarbari. 97. b
 Error quorundam in præparandis cantharidibus. 124. a
 Errores digni memoria. 179. b
 Error fœminarum in victu febrium putridarum. 181. a
 Error Arabum in hectica. 193. b
 Error recentiorum in febre pestilenti. 200. a
 Errhina ad lethargum. 30. a
 Exempla duo vertiginis antiquæ. 33. a
 Excitantia & liberantia epilepticum in accessione. 35. b
 Extinguentia sitim in hectica. 196. a
 Exanthematum descriptio, diuisio, & causæ. 306. b
 Exanthematum origo. 206. b
 Exanthematum notæ multæ. ibid.
 Exanthematum curatio. 207. b
- F.
- Facultas argenti viui an. timenda sit. 13. a
 Facultas lapidis Smaragdi. 102. a
 Fastidienti melancholico omnia genera ciborum offerenda. 140. a
 Fastidium cibi, quid, & fames. 95. b
 Fastidij cibi seu inappetentiæ causæ, notæ, & curatio. 96. a
 Febris sanguinem synochus putridis. 172. b
 Febris tertiana exquisita. 184. a. b
 Febris ardentis descriptio causæ, & curatio. 180. b
 Febris ardentis & tertianæ discrimen. ibid.
 Febris compositæ difficilis descriptio, difficilior cognitio, & curatio. 192. b
 Februm compositarum diuisio. ibid.
 Februm compositarum notæ, causæ, curationes. 193. a
 Febris pestilens quid sit. 198. b
 Febris pestilentis causæ, & signa. 199. b
 Febris pestilentis victus ratio. 199. b
 Febris pestilentis curatio. ibid. b
 Febris pestilentis putridæ curatio. 202. a
 Figura naturalis partus. 162. a
 Fluxus sanguinis quando sistendus. 146. a
 Fœlicitas nostri temporis. 195. b
 Fœminæ Valentinae damnantur in curandis infantibus. 35. a
 Fœtus mortui signa. 162
 Fœtum mortuum expellentia. ibid.

Fœtum mortuum suffitus expellens. 162. b

Formula purgantium omnes humores. 4. a

Formula omnium medicamentorum purgantium caput per loca propinqua. 47. b

Forma præparandi cantharides. 124. a. 134. b

Frangentia lapidem à qualitate manifesta. 133. a

Frangentia lapidem simplicia ferme omnia. 134. a

Fuchsius notatur. 23. a

G

Græcorum medicamenta purgantia vehementia. 77. b

Gallici morbi descriptio, causæ, & signa. 11. b

Gallici morbi curationes multæ. ibid.

Gallicum morbum iuuantia & nocentia. ibid.

Gallici morbi antiqui curatio. 13. a

Grandiorum epilepticorum curatio. 35. b

Grauedo ad nares. 71. a

H

Hæmorrhoidum descriptio & differentia. 145. a

Hæmorrhoidum causæ, notæ, & curatio. ibid. b

Hæmorrhoidum dolor quibus curatur. 148. a

Hæmorrhoides quatuor de causis ægrè curantur. ibid.

Hæctica quid sit. 193. b

Hæctica notæ & curatio.

195. b

Hepatis obstructio. 117. b

Curatio. 118. a

Hepatis inflammationis natura, causæ, & notæ. 115. b

Hepatis inflammationis in caua parte curatio. ibid.

Hepatis inflammati in gibba curatio. 116. a

Herba contra vermes. 143. b

Herniæ differentia, causæ, & notæ. 164. a. b

Herniæ flatuosæ curatio. 165. a

Herniæ carnosæ curatio. ibidem.

Herniæ aquosæ & varicosæ curatio. ibid.

Hernia facile curatur in infantibus. 166. a

Hernia aliquando postulat operationem manuum. ibid. b

Hieræ logodionis compositio, & dos. 13. b

Hieronimus Gabucinus. 143. b

Hieræ simplicis laus. 123. a

Historia scitu digna. 66. b

Historia puellæ habentis lumbricos multos. 142. b

Historia puellæ habentis lumbricum duodecim cubitorum. 94. a

Historia Arnaldi de ictero. 121. a

Historia in tympanite mira. 123. b

Historia de profluvio mensium. 1252. a

Historia mira in hæmorrhoidum curatione. 147. b

Histo

Historia admiranda in foemina pariente flatu. 160.b

Historia febris pestilentis.

199

Historia doctissimi Doleſæ.

194.a

Historiæ quorundam autorum quomodo, vxores utrum gererent non cognouerunt. 160.b

Hædus bonus cibus etiam melancholicis. 39.a

Hollerius. 170.a

Homines Alexandria vefcuntur carnibus asininis atque etiam camelinis. 91.a

Horrorem & rigorem tolerantia. 186.b. 191.a

Horroris in quartana curatio. ibid.

Hora balnei. 196.b

Humores lethargum gignentibus repellentia. 19.b

Hydropis descriptio & species. 122.a

Hydropis signa communia. ibidem.b

Hydropis formatum distinctio. ibid.

Hypochondriaca melancholia quomodo dignoscenda.

139. quomodo curanda. 41.a

I

Iacobi Syluij error. 195.a

Icteri descriptio & causæ.

119.b

Icteri notæ & curatio. 120.

a. b

Ileus quid. 110. Curatio eiusdem. 113.b

1111

Imbecilli aspectus descriptio, causæ, & curatio. 58.a

Incisio inter costas in tabe. 87.a

Incisio quomodo facienda in hydrope, & eius dux admiranda historia. 125.a

Incubonis descriptio, causæ, & notæ. 42.b

Incubonis curatio. 43.a

Incurabilis tremor. 55.a

Insanientium præ amore descriptio, & notæ. 43.b

Infantium præseruatio ab epilepsia. 34.a

In pharmacopolas. 35.b

Intemperies sicca quibus alteratur. 40.b

Intestina lupi. 112.a

Ischiadis doloris remedia validiora arthritidis. 169.b

Ischuriæ descriptio, causæ, notæ, & curatio. 128.b

L

Lac virginicum. 66.a

Lactis chalybeati laus. 107.a

Lactis facultas. 195.a

Lactis genera. ibid.

Lac humanum melius. ibid.

Lacte sumpto non dormiendum. 84.b

Lac an noceat hydropicis. 124.b

Lac humanum foetum mortuum expellit. 162.b

Lac an noceat dysentericis sumptum per os. 107.a

Lac dari quæ prohibet. 195.a

Lactis coagulationem quæ impediunt. ibid.

Lapidis lazuli vis. 3.b

Lapi

Lapidis armen. & lazuli vsus
reformidatur. 40.a
Lapidum renum, & vesicæ
causæ, discrimen, & notæ.
131.a
Lapidis renum, & vesicæ cu-
ratio duplex. ibid.b
Lapidem frangentia qualita-
te manifesta. 133.a
Lapidem fragentis compo-
sita. 134.a
Lapis Iudaicus. 133.a
Lapis spongiæ. ibid.b
Lapis lyncis. ibid.
Lapis hominis & porci. ibid.
Lapides gallorum. 134.a
Lapis Aquilæ. 161.b
Lapis cyaneus. 210.a
Laus aquæ ex limacibus.
195.a
Laus confectionis Alkermes.
200.a
Lethargi descriptio, diuisio,
causæ, & notæ. 29.a. 30.b
Lethargi curatio. ibid.
Lethargicorum pulsus & vri-
na. ibid.
Lethargicorū præcipua sym-
ptomata. 30.b
Leucophagum hecticis con-
fert. 194.a
Liquor sputum promouens.
78.a
Lienis obstructionis descri-
ptio, causæ, & curatio.
127.a.b
Loth ad sputum educendum.
78.a
Longa melancholicorum vi-
gilia. 40.a
Lucanica. 194.a
Lumbricorum differentia,
causæ, & notæ. 142.b. 143.a

Lumbricorum curatio du-
plex. ibid.
Lunæ radij noxij sunt.
199.b
Lyenteria. 104.a

M

Medicamenta duo præstan-
tissima ad vindicandos in-
fantes ab epilepsia. 34.b
Medicamentum visum ma-
ximè confirmans. 60.b
Medicamentum visui vtile.
ibidem.
Medicamentum visui senum
perutile. ibid.
Medicamentum interius pus
efficiens. 78.b
Medicamenta necantia ver-
mes. 143.b
Medicamentum conseruans
vterum in suo loco. 150.b
Medicamentum optimum ad
mensium fluorem. 152.a
Medicamenta menses mo-
uentia. 155.b
Medici audaces taxantur.
37.b
Melancholiæ descriptio, cau-
sæ, & diuisio. 38.b
Melancholicorum imagina-
tionis incerta, ratio reddi-
tur. 39.a
Melancholiæ curatio. 39.a
Mel an dari possit dysenteri-
cis cum Galeno. 107.a
Mensium immodicorum cau-
sæ. 151.a
Mensium immodicorum no-
ta, & curatio. ibid.
Mensium suppressorum cau-
sæ, notæ, & curatio. 159.b
E Micleta

Micleta astringit satis. 101.b
 Moderatè dissipantia in ar-
 thritide frigida. 168.b
 Modus conficiendi aquam
 carnis. 194.b
 Molæ vteri descriptio & cau-
 sæ. 160.a.b
 Molæ vteri signa, historiar, &
 curatio. ibid.
 Morbi comitialis ex lacte
 coagulato in ventriculis
 infantium curatio. 35.a
 Morbillorum origo. 207.a
 Curatio. 208.b
 Mouentia epilepsiam. 36.a
 Mundellæ error in purgati-
 dis peste laborantibus.
 203.a
 Muscus marinus. 144.a

N

Narcoticorum vsus. 26.a
 Narcotica quomodo securio-
 ra. 102.b
 Narcoticorum vsus in colico
 dolore. 113.a
 Narcotica quo vetustiora se-
 curiora. 102.b
 Necantia vermes. 67.b
 Nicolai Florentini curatio
 rara. 37.a
 Nicandri laus. 88.a
 Notantur mulieres exhiben-
 tes pueris cerusam, argen-
 tum viuum & minium. 35.b
 Notæ singularum causarum
 distillationis & rursus. 71.
 a.b
 Notæ omnium causarum flu-
 xus sanguinis, & partium
 à quibus fluit. 81.a
 Nutriens clyster quando me-

lancholicis necessarius.

40.a
 Observatio elegans in mis-
 cendis medicamentis. 5.a
 Observanda historia. 30.a
 Observatio in curanda verti-
 gine pituitosa. 32.b
 Obstructionis hepatis causæ,
 notæ, & curatio. 117.b
 Oculis noxia. 159.b
 Odera vehementer vterum
 ad se trahunt. 158.b
 Oleum ad secundinam expel-
 lendam. 163.a
 Ophthalmiæ diuisio, descri-
 ptio, causæ, & notæ. 55.a
 Ophthalmiæ curatio. ibid.b
 Ophthalmiæ antiquæ curatio.
 56.b

Oribasij error. 115.b
 Ortophræa quid. 74.a
 Ortophrææ notæ, & cura-
 tio. ibid.b
 Ossa mespilorum. 133.b
 Ossium corruptio cauterio
 eget. 13.b
 Oxyrhodinum lethargo utile.
 29.b

P

Palpitationis descriptio, notæ,
 & curatio. 86.b
 Palpitatio à veneno. 88.a
 Paraphrenitis quid. 25.a
 Curatio. 26.a
 Paralysis descriptio. 48.a
 Paralysis causæ, notæ, & cura-
 tio. ibid.b
 Paralyfi utilis confectio. 49.b
 Para

Paralyſi topica medicamenta.

49. b

Paralyſis curatæ pulchra hiſtoria. ibid.

Partus laborioſus & ſecundæ retentæ. 161. b

Partum facillimum quæ efficiant. ibid.

Pectinatio aſſidua capillos auget. 7. b

Peleiana non laudatur. 35. b

Pentaphylli radix. 166. a

Perdix aſſa & elixa astringit. 100. a

Peripneumonix deſcriptio, cauſæ, & notæ. 76. b. 77. a

Peſſi in mola. 160. b

Petri Iacobi Steuclaus. 98. a

Phrenitidis deſcriptio. 24. b

Curatio. 25. a

Phtifis deſcriptio, & cauſæ eiufdem notæ. 83. b

Phtifis antiqua incurabilis. 85. b

Phtifica furnaria vixit 28. annis. ibid.

Picra vermes necat. 144. a

Pilularum omnium ferme, quæ in uſu ſunt compoſitio, & quantitas medicamentorum valenter purgantium. 5. b. 6. a

Pilularum uſus damnatur in morbis bilioſis. 133. b

Pilulæ ex helleboro. 14. a

Pilulæ nobiliſſimæ. 33. a

Pilulæ ad epilepſiam. 37. a

Pilulæ laudatæ in aſthmate. 75. a

Pilulæ menſes euocantes. 156. a

Pituitam concoquentia ſimplicia & compoſita. 3. a

Pituitam purgantia ſimplicia & compoſita. 3. b

Pleuritidis deſcriptio, cauſæ, & notæ. 76. b

Pleuritidis curatio. 77. a

Pleuriticis quæ vena ſecunda. ibid.

Pleuriticis quæ purgantia exhiberi poſſunt. ibid.

Plinius. 132. b

Pomum confert in conſtitutione peſtis frigida. 201. a

Pomum in cauſa calida. ibid.

Porrorum barbaræ cum hordeo viſ. 29. b

Portiones vacuantes concretum lac in ventriculis infantium. 35. a

Potus lethargicorum. 29. b

Potus menſes ducens. 155. b

Potus aquæ frigidæ in ſynochō impedimenta. 173. b

Potus in quartana. 190. a

Præſeruatio ab arthritide. 169. a

Præparatio aquæ ex anguilla. 194. b

Præcautio peſtis. 199. b

Procidencia ani quomodo curanda in puero. 150. a

Procidencia vteri. ibid.

Promouentia ſputum & roborantia pulmones. 75. b

Pulmo vulpis & Ericij. 85. a

Puluis Ioannis de Vigo. 13. b

Puluis ſaluberrimus ad melancholiam. 40. b

Puluis ad dentes liueſcentes, aut nigreſcentes. 68. a

Puluis ad fulciendos dentes mobiles. ibid.

Puluis Cunicis. 133. b

Puluis aniferis. 134. a

E 2 Pul

Pulvis pullorum hirundi-
num. *ibid.*

Pulvis optimus ad resolu-
dos flatus in hydrope. 124.
b

Pulvis optimus in partu dif-
ficili. 163. a

Punctura nervi convulsio-
nem efficit. 53. b

Purgatio in hydrope per vri-
nam. 124. b

Purgatio in tertiana exquisi-
ta quando facienda. 184. b

Pyra partum impediunt.
161. b

Q

Quantitas clysteris in ven-
tris profluviis cur pauca.
107. b

Quartanae divisio, causæ, &
notæ. 189. b

Quartanae longa curatio.
190. a

Quæ dicuntur medicamenta
benedicta. 7. a

Quæ Aureos reddant capil-
los. 7. b

Quæ nigros capillos effi-
ciunt. *ibid.*

Quæ in vertigine fugienda.
32. a

Quæ vena secanda in melan-
cholia. 40. a

Quæ abscessum rumpunt in
peripneumonia, atque etiam
in pleuritide. 78. d

Quæ necessaria sint in hy-
drope curanda. 123. b

Quæ ano apposita hæmor-
rhoidas sanant. 147. a

Quæ hepati admouenda in

febre putrida, & quando.
182. b

Quibus partibus admouen-
dum vnguentum in cura
morbi Gallici. 13. b

Quibus fiat reuulsio in ac-
cessionibus vertiginis.
32. a

Quotidianæ febris descri-
ptio, causæ, & notæ. 188. b

Quotidianæ curatio. 187. a

R

Raparum vis oculis prodest.
58. a

Ratio cognoscendi quæ sint
benigna, & quæ valentia
medicamenta purgantia. 4.
b. 5. a

Raucedinis, tussis, corizæ, ca-
tarrhi eadem ferè natura.
71. a

Raucedo ad asperam arte-
riam. *ibid.*

Raucedinis causæ. *ibid.*

Refrigerantia & corroboran-
tia iecur. 174. a

Refrigerantia cor, iecur, &
totum corpus interius &
exterius in febribus. 182. a

Reliquias materiæ ex oculo
vacuantia & resoluentia.
56. a

Remedium optimum ad la-
uandum ventriculum &
intestina à purgatione. 2. a

Remittentia feruorem san-
guinis. 168. b

Repellentia humores angi-
næ. 69. b

Repellentia medicamenta fo-
ris non sunt admouen-
da

- da in pleuritide. 78.a
 Resoluentia humores epilep-
 siae. 37.a
 Roborantia caput melanchol-
 licum. 40.b
 Rubedo faciei, & eius causae,
 & reuulsio. 65.b
 Ruptio abscessus in angina.
 70.a

S

- Salubria medicamenta quae
 dicantur. 20.b
 Sanguinem fluentem auer-
 tentia. 63.a
 Sanguinis e naribus fluentis
 causae & notae. 62.b
 Sanguinis profluuij curatio.
 63.a
 Sanguinem sistentia à tota
 substantia. 64.a
 Sanguine expuentibus opti-
 ma purgatio. ibid.
 Sanguine quae medicamenta
 purgantia sistunt. 82.a
 Sanguinem fluentem narco-
 tica compescunt. ibid.b
 Sanguinem sistentibus mi-
 scenda pectoralia. ibid.
 Sanguinis mictio. 139.b
 Sauanarola laudatur. 190.b
 Scirrhus lienis quibus cura-
 tur. 127.b
 Secundine expellentia. 62. b
 Sectio venae quando simul
 ex duabus venis. 202.b
 Sectio venae an conueniat in
 febre putrida. 181.a
 Sedantia singulum. 93.b
 Signa causae sine humore, &
 cum humore cuiuscunque
 doloris capitis. 19.b
- Singultus descriptio, & cau-
 sa. 93.a
 Singultus notae & curatio.
 ibid.b
 Sistentia fluxum humorum
 à capite. 72.a
 Sitim extinguentia. 196.a
 Somni profundi lethargico-
 rum curatio. 130.b
 Somnus arcendus sumpto
 veneno. 110.a
 Somnus quando cauendus
 in accessionibus febrium.
 184.b
 Spatium accessionis tertianae
 exquisitae. ibid.b
 Species medicamentorum
 cardiacorum. 200.b
 Spiratio lethargicorum qua-
 lis. 29.a
 Sputi sanguinis causae, & cu-
 ratio. 81.a.b
 Sputi sanguinis reuulsio. ibi-
 dem.
 Sputo sanguinis utilia. ibid.
 Stercus lupi à tota substantia
 colicum dolorem mirum
 in modum sanat. 122.a
 Scillae vis ad morbum comi-
 talem. 37.b
 Suffusionis descriptio & cau-
 sa. 60.a
 Suffusionis curatio. ibid.
 Suppurationis descriptio, cau-
 sa, & notae. 83.a
 Suppurationis curatio. ibid.b
 Suppurati loci cognitio.
 60.a
 Suppressionis urinae descri-
 ptio, causae, notae, & cura-
 tio. 128.a.b
 Synope. 86. b. Curatio eius-
 dem. 88.a

Synochi, descriptio, diuisio,
causæ, notæ, curatio. 172.

b. 173. a

Syrupus ex decocto ligni
guaiaci. 12. a

Syrup. vtilissimus in hepatis
obstructione. 193. a

Syrupus in quartana secundo
loco. 190. b

Syrup. ad febres compositas.

198. a

Tabes.

Tabes.

Tabes. 83. a

Tapus barbarus tenesmo v-
tilis. 109. b

Tempus curandi morbum
Gallicum. 12. b

Tentatoria curatio in pleuri-
tide. 78. b

Tenesmi descriptio. 109. a

Tenesmus vterum gerenti-
bus molestus. ibid.

Tenesmi causæ, notæ, & cu-
ratio. ibid. b

Tenesmus quomodo abor-
sum faciat. ibid.

Tertianæ exquisitæ descri-
ptio, causæ, notæ, & cura-
tio. 184. a. b

Tertianæ nothæ descriptio,
diuisio, causæ & notæ. 186.
a. b

Tertianæ nothæ curatio. ibi-
dem.

Theriaca magna an sanos ve-
neno afficiat. 35. a. b

Theriace commendatio. 201.
b

Theriace & Mithridati vis
191. a

Timoris vis. 191. b

Topica ad lethargum. 30. a

Topica ad sputum excitan-
dum. 75. b

Tormentilla. 201. b

Tremor ex imbecillitate ner-
uorum. 54. b

Tremoris notæ, causæ, & cu-
ratio. 55. a

Tres formulæ purgantes bi-
lem flauam. 3. b

Tres formulæ purgantes pi-
tuitam. ibid.

Tussis causæ, & curatio. 71. b
72. a

Tympanitæ causæ. 123. b

Tympanitæ notæ & differen-
tiæ. ibid. b

Tympanitæ curatio. 123. a

V

Vaccarum stercus vtile, coli-
co dolori. 112. b

Valentinæ mos ad tuen-
dos infantes, ab epilepsia.

34. a

Valleriana. 166. a

Varie melancholicorum ima-
ginationes. 39. a

Vena quæ secunda in quarta-
na. 190. b

Venenum conuulsionem fa-
cit. 51. a

Venenum educentia. 53. b

Ventriculi imbecillitas, do-
lor, inflammatio. 90. b

Ventriculi gallinarû, mergi,
& struthiocameli an cor-
roborent nostrum ventri-
culum. 92. a

Verbasculum. 37. a

Verri

I N D E X.

Vertiginis descriptio & causæ.	32.a	structis admouenda.	187.b
Vertigo non differt ab scotomia.	ibid.	Vnguentum ad quartanam.	191.a
Vini generosi vsus.	95.a	Vngula mulæ.	152.b
Vini multi vsus.	53.b	Vomitus prouocandus in dolore colico.	113.a
Vinum Alkekengi valenter prouocat vrinam.	130.a	Vomitus excitatio in tertiana spuria.	187.a
Vini AlKeKengi confectio.	ibidem.	Vomitus utilis in tertiana.	ibidem.
Vires theriacæ & mithridati.	190.b	Vomitus laus in quartana.	191.a
Vis cantharidum.	134.b	Vrinæ suppressio.	128.a
Visus imbecilli descriptio, causæ, & notæ, curatio.	58.a	Ardor.	137.b
Visum acuentia.	59.a	Vsus pilularum damnatur, & medicamenta vehementer purgantia in morbis biliosis.	173.b
Visui quæ nocent exterius & interius.	58.b	Vteri procidentia descriptio, & causæ.	150.b
Vnguentum expertum ad morbum Gallicum.	13.a	Vteri procidentia notæ, & curatio.	ibid.
Vnguentum humectans melancholicos.	41.a	Vteri suffocationis varia descriptio, & nomina.	157.b
Vnguentum filij Zachariæ.	109.b	Vteri suffocationis causæ, notæ, & curatio.	158.a
Vnguentum optimum ad suppressam vrinam.	129.b	Vtero admouenda in profluvio mensium.	152.b
Vnguentum optimum ad lapidem renum & vesicæ.	ibidem.		
Vnguentum ad hæmorrhoidas.	147.a.b		
Vnguentum ad partum difficilem.	163.a		
Vnguentum optimum biliosis & febribus venenosis.	174.a		
Vnguenta spleni & iecori ob-			

X

Xyloaloc. 199.b

Z

Zaphyrus. 199.a. 201.a. 208.a

Zeber. 158.b

Zedoaria. 200.g

FINIS INDICIS.

